

■ 予後予測／回復期リハ

高齢入院患者の退院時ADL、最強の予測因子は入院前のADL

スペインの機能回復病棟957人・LASSO回帰で $R^2=0.849$

スペイン・マドリードの老年科と工科大学のチーム(AIRCOT研究)が、機能回復病棟に入院した957人を解析した。平均年齢は82.4歳で女性が多く、後天性脳損傷と大腿骨近位部骨折の患者が多く含まれる。社会的背景、臨床所見、機能、心理社会面の変数を集め、筋力や歩行能力も評価に加えた。

退院時の自立度と関連したのは、入院前と入院時のMBI、体幹の筋緊張、認知機能障害、受傷からの期間だった。単純なモデルより多くの変数を入れて絞り込むモデルが優れ、LASSO回帰で $R^2=0.849$ に達した。強い予測因子は入院前MBI、入院時MBI、体幹筋緊張、運動性失語、筋力の順。併存症や血液検査値

の関連は一貫しなかった。

単施設の後ろ向き研究で、他院での外部検証はこれから。著者らは機械学習の応用と臨床での有用性の検証を次の課題に挙げる。入院時に「入院前の生活」を丁寧に聞き取ることが、退院時の見通しを立てる一番の材料になるという回復期の実感を、数字で裏づける結



入院前の暮らしの聞き取りが、退院時の見通しの土台になる

果だ。

出典 [Advances in Medical Sciences](#) ↗

数字で見る

957人

機能回復病棟の入院患者

82.4歳

平均年齢

0.849

最良モデル(LASSO)の R^2

■ 嚥下障害／言語聴覚

島皮質の腫瘍摘出後、むせない誤嚥が術後3日目に最多

ウズベキスタンの脳神経外科センターと米イェール大学などの前向き研究。異常は術後3日目に最も目立ち、喉頭侵入、誤嚥、むせない不顕性誤嚥、咽頭残留、分泌物の貯留がみられた。呼吸器合併症は8人(16.7%)で、不顕性誤嚥と分泌物管理の障害に関連した。

多くは経過とともに回復したが、一部の高リスク例では残った。単施設



の観察研究で、全例VEが転帰を改善するかは未検証。「むせないから安全」とは言えない時期があるという点は、脳卒中の嚥下評価にも通じる。

出典 [Neurological Research](#) ↗

■ サルコペニア／運動・栄養

サルコペニアに運動24週、握力2.5kg改善・歩行速度も向上

60～70歳の90人に有酸素＋筋力運動を24週行った。24週時点の対照との差は、握力が運動群+2.49kg(95%CI 1.57～3.42)、運動＋栄養群+2.23kg。歩行速度は運動群のみ+0.206m/秒で、栄養を加えた群では差が出なかった。骨格筋量の変化はどちらも小さい。

1群1地域のため介入と地域差を切り分けられ



ず、栄養の上乗せ効果は判断できないと著者ら自身が述べる(試験登録も事後)。握力の改善と設計の弱さはセットで読むべきだ。

出典 [Nutrients](#) ↗

短 信

〈心臓リハ〉中南米の心リハ、国別カバー率は中央値2.9%

ICCPRの2025年監査。35か国中25か国に337施設、需要に対し年63万人分が不足 出典 [Braz J Phys Ther](#) ↗

〈心臓リハ〉姿勢バランス型の心リハ、反応者が多い

冠動脈疾患＋糖尿病167人のRCT二次解析。VO2max反応者31.0%対有酸素11.3% 出典 [Scand Cardiovasc J](#) ↗

〈呼吸リハ〉拘束性換気障害、胸郭徒手療法の上乗せ

48人のRCT。通常の呼吸リハに加えるとFVC・胸郭拡張が8週と4週後も大きく改善 出典 [Life \(Basel\)](#) ↗

〈排泄ケア〉便失禁の個別療法、3か月持続反応15%

米5施設260人。食事調整・薬・骨盤底筋訓練で1か月23%が反応、77%は非反応 出典 [Clin Gastroenterol Hepatol](#) ↗

〈脳損傷〉脳損傷後の暴力、支援者は性格を過大視

実務者8人の面接(質的研究)。ABIが未充足のニーズを重ね、暴力の危険を高めると指摘 出典 [Disabil Rehabil](#) ↗

〈小児リハ〉ダウン症の青年、VR運動と走行訓練で効果に違い

40人のRCT、10週20回。VRは柔軟性・握力、トレッドミルは移動能力で優位 出典 [Disabil Rehabil](#) ↗

〈自主トレ〉首の痛みの自主トレ、動画アプリで改善大

34人のRCT、6週。紙資料より上位頸椎の回旋と圧痛の閾値が大きく改善した 出典 [Healthcare \(Basel\)](#) ↗

〈医療AI〉予測モデル、院内カルテでは精度低下

全国登録で作った小児術後感染モデル。院内1万450件でc統計量0.75→0.60、較正で回復 出典 [JAMIA](#) ↗

〈認知機能〉ナッツを多く食べる人、認知テスト高成績

豪州1,700人超の観察研究の報道。関連を示すのみで、因果関係は分らない 出典 [ITmedia](#) ↗

〈評価尺度〉脳卒中影響尺度の短縮版、アラビア語版を検証

サウジの脳卒中130人。内的一貫性 α 0.87～0.97、再検査ICC0.78～0.94 出典 [Disabil Rehabil](#) ↗