リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年10月12日（月）

第32号　朝刊

きょうの紙面　▶心大血管リハ　▶呼吸リハ・転倒　▶脳卒中・歩行訓練　▶短信 8本

■ 心大血管リハ

在宅型心臓リハの紹介は90日以内で29.6%　Kaiser 4.4万人

紹介された群は1年以内の入院が少ない関連（観察研究）

米Kaiser Permanente南カリフォルニアで、2021年1月～2024年9月に在宅型心臓リハ（HBCR）の対象となる出来事や手技のあった成人44,468人を後ろ向きに解析した研究が、JAHAに出ました。90日以内に紹介されたのは13,164人（29.6%）で、紹介された群のほうが若く（平均65.6歳対70.6歳）、男性が多い（71.4%対59.5%）という偏りがありました。

紹介された群は365日の全入院（有病率比0.83、95%CI 0.79～0.86）と心血管疾患による入院（0.70、0.66～0.75）が少なく、参加した群も30日の全入院（0.78、0.66～0.92）と365日の全入院（0.89、0.82～0.96）が少ない関連でした。

観察研究のため、状態の良い人ほど紹介や参加に至る選択の影響は除けません。米国の1つの医療システムで、日本の制度とも異なります。高齢者と女性で紹介が少ない偏りは、退院時に心臓リハへつなぐ対象を見直す材料になります。



退院時に、心臓リハへつなぐ人の偏りを見直す材料に。

出典 J Am Heart Assoc ↗

数字で見る


44,468人
解析した成人（HBCR対象の出来事・手技）

29.6%
90日以内にHBCRを紹介された割合

0.70
紹介と365日の心血管疾患入院（有病率比）

■ 呼吸リハ・転倒

COPDの転倒、バランス障害との関連が最も一貫　25研究



COPDの人は同年代より転倒が多いのに、原因は体力低下とひとくくりにされがちです。2024年11月までの英語論文から25研究・1,295人を採用した系統的レビュー（Int J COPD）で、17研究が、調べた因子の少なくとも1つと転倒歴や転倒リスクの有意な関連を報告しました。

バランス障害は、調べた17研究のうち14で関連がありました。大腿四頭筋の筋力低下はオッズ比2.9の報告がある一方、関連なしの研究もあり一貫しません。歩幅時間のばらつきの増大も転倒と関連しました。大半は観察研究で、バランスや筋力の訓練で転倒が減るかは未検証です。

出典 Int J Chron Obstruct Pulmon Dis ↗

■ 脳卒中・歩行訓練

脳卒中の歩行訓練、閉眼・誘導なしの群が歩行速度で上回る



脳卒中の人36人を3群に無作為に分けた8週間の研究（Restor Neurol Neurosci）。内在的フィードバック群は閉眼のまま口頭の誘導なしで歩行課題を行い、外在的フィードバック群は同じ課題を継続的な口頭誘導つきで、対照群は通常の理学療法を、各群とも1回30分・週5回で受けました。

内在的フィードバック群は、FSST、歩行速度、歩行率、麻痺側の歩幅時間、重複歩時間、10m歩行で、他の2群を上回りました（$p<0.05$）。36人と小規模で、抄録に効果量や病期、閉眼時の安全管理の記載はありません。

出典 Restor Neurol Neurosci ↗

短信

〈心大血管〉 **ACS後1年の血圧、130～140mmHgが最低**
スイス2,074人、中央値4.0年追跡。最低は138mmHgのJ字型。著者は治療目標としない。 出典 Eur J Prev Cardiol ↗

〈嚥下〉 **脳卒中後嚥下障害にrTMS＋感覚覚醒ケア**
160人RCT、2週。SSA差−3.9。肺炎は5/80対11/80でp=0.118。意義は未確立。 出典 JoVE ↗

〈認知症〉 **SNH短期リハ後の再入院、認知症診断は無関連**
米国4,527退院の15.8%が30日再入院。既往の入院と併存疾患が高リスク。 出典 J Am Geriatr Soc ↗

〈脳卒中〉 **脳卒中サバイバーのデジタル健康リテラシー**
ノルウェー177人の横断研究。年齢・教育・健康度が関連、失語や認知は調整後に無関連。 出典 Cerebrovasc Dis ↗

〈上肢〉 **熱傷後の肘部管症候群、HILTがESWTを上回る**
75人RCT、4週。両者とも運動のみより神経伝導とDASHが改善、12週後も維持。 出典 Arch Phys Med Rehabil ↗

〈療法士×AI〉 **脳卒中リハ療法士のAI活用、期待と不安**
米国・アジアのOT/PTの混合研究。費用や導入時期が不明確で、教育を望む声。 出典 Work ↗

〈継続〉 **脳卒中の自主トレ継続、自己効力感が最も強い**
中国549人の横断調査。自己効力感→アドヒアランス $\beta=0.37$、動機付け $\beta=0.25$。 出典 Front Public Health ↗

〈制度〉 **小多機・GHの夜勤、令和9年度介護報酬改定の論点**
10/9の介護給付費分科会。見守り機器を条件にGHの夜勤2人体制を広げる案など。 出典 POST ↗