Вариант 2

Биктимиров Данила Рустемович, ФКН

1.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -20x + 5y = P(x, y) \\ \frac{dy}{dt} = -120x + y = Q(x, y) \end{cases}$$

Найдем особые точки:

$$\begin{cases}
-20x + 5y = 0 \\
-120x + y = 0
\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}
x = \frac{1}{4}y \\
y = 120x
\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}
x_0 = 0 \\
y_0 = 0
\end{cases}$$

(0;0) – особая точка (критическая). Далее исследуем на устойчивость:

$$x = x_0 + \varepsilon, \quad y = y_0 + \mu$$


$$\begin{cases} \frac{d(\varepsilon)}{d(t)} = -20\varepsilon + 5\mu \\ \frac{d(\mu)}{d(t)} = -120\varepsilon + \mu \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} -20 - \lambda & 5 \\ -120 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(-20 - \lambda)(1 - \lambda) - (-120) \cdot 5 = 0$$


$$\lambda^2 + 19\lambda + 580 = 0$$

$$\lambda = -\frac{19}{2} \pm \frac{i\sqrt{1959}}{2}$$

Так как это два комплексных корня, и $Re\lambda < 0$ получаем, что это устойчивый фокус.



(a)






Рис. 1: Кинетические (a) и фазовый (b) портреты при начальном значении $(x_0, y_0) = (2, 2)$




Рис. 2: Схема модели системы уравнений

2.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 3x - 2xy - x^2\\ \frac{dy}{dt} = 2y - 2xy - y^2 + 3x^2 \end{cases}$$

(а) Ищем особые точки

$$\begin{cases} 3x - 2xy - x^2 = 0\\ 2y - 2xy - y^2 + 3x^2 = 0 \end{cases}$$

Заметим, что $x=0,\,y=0$ является решением. Таким образом, точка A(0;0) является критической.

При x = 0 система принимает вид:

$$\begin{cases} 0 = 0 & \Leftrightarrow y = 0 \\ 2y - y^2 = 0 & \Leftrightarrow y = 2 \end{cases}$$

Таким образом получаем критическую точку B(0;2).

$$\begin{cases} 3x - 2xy - x^2 = 0 \\ 2y - 2xy - y^2 + 3x^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x(3 - 2y - x) = 0 \\ 2y - 2xy - y^2 + 3x^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{3-x}{2} \\ 2y - 2xy - y^2 + 3x^2 = 0 \end{cases}$$
$$2 \cdot \frac{3-x}{2} - 2x \cdot \frac{3-x}{2} - \left(\frac{3-x}{2}\right)^2 + 3x^2 = 0$$
$$12 - 4x - 12x + 4x^2 - 9 + 6x - x^2 + 12x^2 = 0$$

$$x = \frac{\sqrt{5} - 2i}{3\sqrt{5}}$$
$$15x^2 - 10x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\sqrt{5} + 2i}{3\sqrt{5}}$$
$$x = \frac{\sqrt{5} + 2i}{3\sqrt{5}}$$

Так получаем точки $C(\frac{\sqrt{5}-2i}{3\sqrt{5}},\frac{4\sqrt{5}+i}{3\sqrt{5}})$ и $D(\frac{\sqrt{5}+2i}{3\sqrt{5}},\frac{4\sqrt{5}-i}{3\sqrt{5}}).$

(b) Исследование на устойчивость (рассматриваем только вещественные точки).

$$x = x_0 + \varepsilon, \quad y = y_0 + \mu$$

$$\begin{cases} \frac{d(\varepsilon)}{d(t)} = (3 - 2y - 2x)\varepsilon + (-2x)\mu \\ \frac{d(\mu)}{d(t)} = (-2y + 6x)\varepsilon + (2 - 2x - 2y)\mu \end{cases}$$
i. $A(0;0)$

$$\begin{cases} \frac{d(\varepsilon)}{d(t)} = (3)\varepsilon + (0)\mu \\ \frac{d(\mu)}{d(t)} = (0)\varepsilon + (2)\mu \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 0 \\ 0 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(3 - \lambda)(2 - \lambda) = 0$$

Два положительных вещественных корня \Rightarrow это неустойчивый узел.

ii. B(0; 2)

$$\begin{cases} \frac{d(\varepsilon)}{d(t)} = (-1)\varepsilon + (0)\mu \\ \frac{d(\mu)}{d(t)} = (-4)\varepsilon + (-2)\mu \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} -1 - \lambda & 0 \\ -4 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$
$$(-1 - \lambda)(-2 - \lambda) = 0$$

Два отрицательных вещественных корня ⇒ это устойчивый узел.




Рис. 3: Кинетические (a) и фазовый (b) портреты при начальном значении $(x_0, y_0) = (1, 1)$




Рис. 4: Кинетические (a) и фазовый (b) портреты при начальном значении $(x_0, y_0) = (-1, 1)$




Рис. 5: Кинетические (a) и фазовый (b) портреты при начальном значении $(x_0,y_0)=(-1,-1)$




Рис. 6: Кинетические (a) и фазовый (b) портреты при начальном значении $(x_0,y_0)=(1,-1)$




Рис. 7: Схема модели системы уравнений

3.