# Problemas de Análisis Matemático





# Indice de contenidos

Prefacio		3
1	Teoría de conjuntos	4
2	Números reales	14
3	Topología de los números reales	18
4	Sucesiones de números reales	25

# **Prefacio**

Colección de problemas de Análisis Matemático aplicado.

# 1 Teoría de conjuntos

Ejercicio 1.1. Dado el conjunto universo de los números de un dado  $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  y los subconjuntos correspondientes a sacar par en el lanzamiento de un dado  $A = \{2, 4, 6\}$  y sacar menos de 5 en el lanzamiento de un dado  $B = \{1, 2, 3, 4\}$ , calcular e interpretar los siguientes conjuntos:

- a.  $A \cup B$
- b.  $A \cap B$
- c.  $\overline{A}$  y  $\overline{B}$
- d. A B y B A
- e.  $A\triangle B$
- f.  $\overline{(A \cup B)}$
- g.  $(A \cap \overline{B})$
- h.  $\underline{A \cup B}$
- i.  $\overline{A} \cap B$

¿Qué conjuntos de números en el lanzamiento de un dado serían disjuntos con A? ¿Y con  $A \cup B$ ?

## Solución

- a.  $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$
- b.  $A \cap B = \{2, 4\}$
- c.  $\overline{A} = \{1, 3, 5\} \text{ y } \overline{B} = \{5, 6\}$
- d.  $A B = \{6\}$  y  $B A = \{1, 3\}$
- e.  $A\triangle B = \{1, 3, 6\}$
- $f. \ \overline{(A \cup B)} = \{5\}$
- g.  $\overline{(A \cap B)} = \{1, 3, 5, 6\}$
- h.  $A \cup \overline{B} = \{2, 4, 5, 6\}$
- i.  $\overline{\overline{A} \cap B} = \{2, 4, 5, 6\}$

Serían disjuntos con A todos los conjuntos que solo tuviesen alguno de los números 1, 3 o 5, por ejemplo el conjunto  $\{1,5\}$ . El único conjunto disjunto con  $A \cup B$ , además del vacío es  $\{5\}$ .

**Ejercicio 1.2.** Expresar con operaciones entre los conjuntos A, B y C, los conjuntos que se corresponden con las regiones sombreadas en los siguientes diagramas.



Figura 1.1: a.

Figura 1.2: b.

Figura 1.3: b.

## Solución

- a.  $(B-A) \cup (A \cap B \cap C)$
- b.  $(A \cup B) \cap \overline{(A \cap C)} \cap \overline{(B \cap C)} \cup (A \cap B \cap C)$
- c.  $(A \cup B \cup C) ((A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C))$

**Ejercicio 1.3.** Demostrar gráficamente las leyes de Morgan  $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$  y  $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ .

**Ejercicio 1.4.** Construir por extensión el conjunto potencia del conjunto de los grupos sanguíneos  $S = \{0, A, B, AB\}$ . ¿Cuál es su cardinal?

## Solución

$$\begin{split} \mathcal{P}(S) &= \{\emptyset, \{A\}, \{B\}, \{AB\}, \\ \{\emptyset, A\}, \{\emptyset, B\}, \{\emptyset, AB\}, \{A, B\}, \{A, AB\}, \{B, AB\}, \{\emptyset, A, B\}, \\ \{\emptyset, A, AB\}, \{\emptyset, B, AB\}, \{A, B, AB\}, \\ \{\emptyset, A, B, AB\}\} \end{split}$$

Ejercicio 1.5. Construir el producto cartesiano del conjunto d los grupos sanguíneos  $S = \{0, A, B, AB\}$  y el conjunto de los factores Rh  $R = \{Rh+, Rh-\}$ .

Solución

$$S \times R = \{(0, Rh+), (0, Rh-), (A, Rh+)), (A, Rh-), (B, Rh+), (B, Rh-), (AB, Rh+), (AB, Rh-)\}$$

**Ejercicio 1.6.** Demostrar que la relación  $R = \{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 : x-y \text{ es par}\}$  es una relación de equivalencia.

## Solución

Propiedad reflexiva:  $\forall a \in \mathbb{Z} \ a - a = 0$  es par, de manera que aRa.

Propiedad simétrica:  $\forall a, b \in \mathbb{Z}$  si aRb entonces a - b es par, es decir, existe  $k \in \mathbb{Z}$ tal que a-b=2k. Por tanto, b-a=2(-k) también es par y bRa. Propiedad transitiva:  $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$ , si aRb y bRc entonces a - b y b - c son pares, de manera que su suma a - b + b - c = a - c también es par, y aRc.

Ejercicio 1.7. ¿Cuáles de las siguientes relaciones son relaciones de equivalencia? ¿Cuáles don de orden?

- $\begin{aligned} &\text{a. } R_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x = y\} \\ &\text{b. } R_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq y\} \\ &\text{c. } R_3 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\} \\ &\text{d. } R_4 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\} \end{aligned}$

#### 🅊 Solución

- a.  $R_1$  es relación de equivalencia.
- b.  $R_2$  es relación de orden.
- c.  $R_3$  no es relación de equivalencia ni de orden porque no cumple las propiedades reflexiva y transitiva.
- d.  ${\cal R}_4$ es no es relación de equivalencia ni de orden porque tampoco cumple las propiedades reflexiva y transitiva.

Ejercicio 1.8. Para cada uno de los conjuntos siguientes, calcular si existe el supremo, el ínfimo, el máximo y el mínimo.

- a.  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- b.  $B = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}\}\$
- c.  $C = \{x \in \mathbb{Q} : 0 < x \le 1\}$

## Solución

- a.  $\sup(A) = 5$ ,  $\inf(A) = 1$ ,  $\max(A) = 5$ ,  $\min(A) = 1$ .
- b.  $\inf(B)=2$  y  $\min(B)=2$ . No existe el supremo ni el máximo porque B no está acotado superiormente.
- c.  $\sup(C) = 1$ ,  $\inf(C) = 0$  y  $\max(C) = 1$ . No existe el mínimo.

**Ejercicio 1.9.** Dar ejemplos de funciones  $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$  que cumplan lo siguiente:

- a. f es inyectiva pero no sobreyectiva.
- b. f es sobreyectiva pero no inyectiva.
- c. f no es inyectiva ni sobrevectiva.
- d. f es biyectiva y distinta de la función identidad.

## Solución

- b.  $f(x) = x^3 x$ . c.  $f(x) = x^2$
- d. f(x) = 2x + 1

**Ejercicio 1.10.** Dadas las siguientes funciones de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$ , estudiar cuáles son inyectivas y cuáles sobreyectivas:

- a.  $f(x) = x^2$
- b.  $g(x) = x^3$
- c.  $h(x) = x^3 x^2 2x$
- d. i(x) = |x|

- a.  $f(x) = x^2$  no es ni inyectiva ni sobreyectiva.
- b.  $g(x) = x^3$  es biyectiva.
- c.  $h(x) = x^3 x^2 2x$  es sobreyectiva pero no inyectiva.
- d. i(x) = |x| no es ni invectiva ni sobrevectiva.

**Ejercicio 1.11.** Demostrar que la composición de dos funciones inyectivas es también inyectiva.

## Solución

Sean f y g dos funciones inyectivas tales que  $FrIm(f) \subseteq FrDom(g)$ . Veamos que  $g \circ f$  es inyectiva. Supongamos ahora que existen  $a, b \in FrDom(f)$  tales que  $g \circ f(a) = g \circ f(b)$ , es decir, g(f(a)) = g(f(b)). Como g es inyectiva, se tiene que f(a) = f(b), y como f es inyectiva se tiene que  $g \circ f$  es inyectiva.

**Ejercicio 1.12.** Dados dos conjuntos finitos A y B, demostrar que  $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$  y que  $|A \times B| = |A||B|$ .

#### Solución

a.  $A \cup B = (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B)$  con (A - B),  $A \cup B$  y B - A disjuntos dos a dos, de manera que  $|A \cup B| = |A - B| + |B - A| + |A \cap B|$ . Por otro lado,  $A = (A - B) \cup (A \cap B)$ , y  $B = (B - A) \cup (A \cap B)$ , de modo que

$$|A| + |B| - |A \cap B| = |A - B| + |A \cap B| + |B - A| + |A \cap B| - |A \cap B|$$
$$= |A - B| + |B - A| + |A \cap B|,$$

que coincide con el resultado anterior.

b. Supongamos que  $A=\{a_1,\ldots,a_n\}$  y  $B=\{b_1,\ldots,b_m\}$ , de manera que |A|=n y |B|=m. Para cada elemento  $a_i\in A$  se pueden formar m pares  $(a_i,b_1),\ldots(a_i,b_m)$ . Como A tiene n elementos, en total se pueden formar  $n\cdot m$  pares, así que  $|A\times B|=n\cdot m=|A||B|$ .

**Ejercicio 1.13.** Dada una función  $f: A \to B$ , demostrar que si f es inyectiva, entonces  $|A| \le |B|$ , y si f es sobreyectiva, entonces  $|A| \ge |B|$ . ¿Cómo es |A| en comparación con |B| cuando f es biyectiva?

## Solución

Sea  $f:A\to B$  inyectiva. Entonces para cualesquiera  $a_1,a_2\in A$  con  $a_1\neq a_2$  se tiene que  $f(a_1)\neq f(a_2)$ , por lo que  $|A|\leq |B|$ .

Sea  $f:A\to B$  sobreyectiva. Entonces para todo  $b\in B$  existe  $a\in A$  tal que f(a)=b. Además dos elementos de B no pueden tener la misma preimagen porque entonces f no sería una función, por lo que  $|A|\geq |B|$ .

De lo anterior se deduce que si f es biyectiva, entonces |A| = |B|.

**Ejercicio 1.14.** Dados dos conjuntos finitos A y B con |A| = n y |B| = m. ¿Cuántas funciones distintas se pueden construir de A a B. ¿Y cuántas funciones inyectivas suponiendo que  $n \le m$ ?

## Solución

Se pueden construir  $m^n$  funciones distintas, y  $\frac{m!}{(m-n)!}$  funciones inyectivas.

**Ejercicio 1.15.** Tomando el conjunto de los números naturales  $\mathbb{N}$  como conjunto universo, dar un ejemplo de un subconjunto infinito cuyo complemento también sea infinito.

## Solución

 $A = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}\}\$  es infinito y  $\overline{A} = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es impar}\}\$  también es infinito.

**Ejercicio 1.16.** Demostrar que todo conjunto infinito tiene un subconjunto infinito numerable.

#### Solución

Sean A un conjunto infinito. Como A no es vacío, existe un elemento  $a_1 \in A$ . Considérese ahora el conjunto  $A_1 = A$   $\{a_1\}$ . Es evidente que  $A_1$  sigue siendo infinito y podemos elegir otro elemento  $a_2 \in A_1$  de manera que el conjunto  $A_2 = A_1 - \{a_2\}$ 

sigue siendo infinito. Repitiendo este proceso indefinidamente obtenemos que el conjunto  $\{a_1,a_2,...\}$  es un subconjunto de A que es numerable.

**Ejercicio 1.17.** Demostrar que un conjunto es infinito si y solo si es equipotente a un subconjunto propio.

## Solución

Sea A un conjunto. Si A es finito, entonces cualquier subconjunto  $B \subset A$  cumple que |B| < |A| por lo que no se puede establecer una biyección entre A y B. Si A es infinito, por el ejercicio anterior se tiene que existe un subconjunto numerable  $B = \{a_1, a_2, \ldots\} \subseteq A$ . Si tomamos la aplicación  $f: B \to B \ \{a_1\}$  dada por  $f(a_i) = a_{i+1}$ , entonces f es biyectiva, y su extensión  $\hat{f}: A \to A \ \{a_1\}$  dada por

$$\hat{f}(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \notin B \\ f(x) & \text{si } x \in B \end{cases}$$

es también biyectiva, por lo que A es equipotente a A  $\{a_1\}$  que es un subconjunto propio suyo.

**Ejercicio 1.18.** Demostrar que el producto cartesiano de dos conjuntos numerables es numerable. ¿Y el producto cartesiano de n conjuntos numerables?

## Solución

Sean A y B dos conjuntos numerables. Entonces existe una aplicación inyectiva  $f:A\to\mathbb{N}$  y otra  $g:B\to\mathbb{N}$ . Si se toma ahora la función  $h:A\times B\to\mathbb{N}$  definida como

$$f(a,b) = 2^{f(a)}3^{g(b)} \, \forall a \in A, b \in B,$$

se tiene que f es inyectiva y por tanto  $A \times B$  es numerable.

Por inducción, es fácil probar que el producto cartesiano de n conjuntos numerables es también numerable.

Ejercicio 1.19. Demostrar que el conjunto de los números racionales es numerable.

Si se considera la aplicación  $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Z}\times\mathbb{N}$  que a cada número racional r le hace corresponder el par  $(p,q)\in\mathbb{Z}\times\mathbb{N}$  donde  $\frac{p}{q}$  es la fracción irreducible de r con denominador positivo, se tiene que f es inyectiva. Como el producto cartesiano de dos conjuntos numerables es numerable, existe otra aplicación inyectiva de  $g:\mathbb{Z}\times\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ , con lo que  $g\circ f:\mathbb{Q}\to\mathbb{N}$  es inyectiva y  $\mathbb{Q}$  es numerable.

Ejercicio 1.20. Demostrar que la unión de dos conjuntos numerables es numerable.

## Solución

Sean A y B dos conjuntos numerables disjuntos. Entonces existen dos biyecciones  $f:A\to\mathbb{N}$  y  $g:B\to\mathbb{N}$ . A partir de estas biyecciones se puede definir otra  $h:A\cup B\to\mathbb{N}$  dada por

$$h(x) = \begin{cases} 2f(x) - 1 & \text{si } x \in A \\ 2g(x) & \text{si } x \in B \end{cases}$$

Así pues,  $A \cup B$  es numerable.

Si A y B no son disjuntos, entonces  $A \cup B = A \cup (B \ A)$ . Si  $B \ A = \{b_1, \dots, b_n\}$  es finito, se puede tomar la biyección  $g = \{(b_1, 1), \dots, (b_n, n)\}$  y, a partir de ella, construir la biyección  $h: A \cup B \to \mathbb{N}$  dada por

$$h(x) = \begin{cases} f(x) + n & \text{si } x \in A \\ g(x) & \text{si } x \in B \ A \end{cases}$$

Mientras que si B A es infinito, se puede razonar como al principio pues A y B A son disjuntos.

Ejercicio 1.21. Demostrar que el conjunto de los números irracionales no es numerable.

## Solución

Ya hemos visto en el ejercicio Ejercicio 1.19 que  $\mathbb Q$  es numerable, de manera que si  $\mathbb R$   $\mathbb Q$  fuese numerable, entonces por el Ejercicio 1.20  $\mathbb Q \cup \mathbb R$   $\mathbb Q = \mathbb R$  sería numerable, lo cual no es cierto.

Ejercicio 1.22. Demostrar la unión de un conjunto numerable de conjuntos numerables es numerable.

## Solución

Sea A un conjunto numerable de conjuntos numerables. Por ser A numerable existe una biyección  $f: \mathbb{N} \to A$ , de manera que podemos enumerar los elementos de A de tal forma que  $A_i = f(i)$ . Del mismo modo, como cada conjunto  $A_i$  es numerable se puede establecer una enumeración de sus elementos  $A_i = \{a_{i1}, a_{i2}, ...\}$ . Así pues, podemos representar los elementos de  $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$  en una tabla como la siguiente

Siguiendo el orden de las flechas es posible enumerar todos los elementos de este conjunto, por lo que  $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$  es numerable.

Ejercicio 1.23. Demostrar que el conjunto de todos los polinomios con coeficientes enteros  $P=\{a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n:n\in\mathbb{N},a_i\in\mathbb{Z}\}$  es numerable. ¿Y el de los polinomios con coeficientes racionales?



## Solución

Para cada  $n \in \mathbb{N}$  sea  $P_n$  el conjunto de los polinomios de grado n con coeficientes enteros  $P_n=\{a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n:a_i\in\mathbb{Z}\}.$  Para cada polinomio  $a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n:a_i\in\mathbb{Z}\}$  $a_2x^2+\cdots+a_nx^n\in P_n$  podemos establecer una biyección entre sus coeficientes y la tupla  $p_n=(a_0,a_1,\dots,a_n),$  con  $a_i\in\mathbb{Z}.$  Por tanto, existe una biyección entre  $P_n$  y  $\mathbb{Z}^n,$ y como  $\mathbb{Z}^n$  es numerable, el  $P_n$  también lo es.

Finalmente,  $P=\cup_{i=1}^{\infty}P_n$  que es la unión numerable de conjuntos numerables, que, como ya se vió en el Ejercicio 1.22, es numerable.

Ejercicio 1.24. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son numerables?

- a.  $A = \{3k : k \in \mathbb{Z}\}$
- b.  $B = \{x \in \mathbb{Q} : -10 < x < 10\}$
- c.  $C = \{x \in \mathbb{R} : 0 \le x \le 1\}$

$$\begin{aligned} &\text{d. }D = \{(x,y): x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Q}\}\\ &\text{e. }E = \{1/n: n \in \mathbb{N}\} \end{aligned}$$

Ejercicio 1.25. ¿Es el conjunto de todas las secuencias infinitas de ADN numerable?

# 2 Números reales

Ejercicio 2.1. Para los siguientes subconjuntos de números reales, determinar si están acotados por arriba o por abajo, y en tal caso dar el supremo o el ínfimo.

- a.  $A = \{-1, 0, 1\}$ b. B = [0, 1)
- c.  $C = (0, \infty)$
- d.  $D = \{1 + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ e.  $E = \{(-2)^n : n \in \mathbb{N}\}$
- f.  $F = \{x \in \mathbb{R} : x^2 3x + 2 = 0\}$
- g.  $G = \{x \in \mathbb{R} : x^3 x < 0\}$

## Solución

- a. A está acotado por arriba y por abajo.  $\sup(A) = 1$  y  $\inf(A) = -1$ .
- b. B está acotado por arriba y por abajo.  $\sup(B)=1$  y  $\inf(B)=0$ .
- c. C está acotado por abajo, pero no por arriba.  $\inf(C) = 0$ .
- d. D está acotado por arriba y por abajo.  $\sup(D) = 2$  y  $\inf(D) = 1$ .
- e. E no está acotado por arriba ni por abajo.
- f. F está acotado por arriba y por abajo. $\sup(F) = 2$  y  $\inf(F) = 1$ .
- g. G está acotado por arriba pero no por abajo.  $\sup(G) = 1$ .

Ejercicio 2.2. Calcular el supremo y el ínfimo de los siguientes conjuntos. ¿Tienen máximo y mínimo?

- a.  $A = \{x \in \mathbb{R} : 2 < x^2 2 < 7\}$ b.  $B = \{x \in \mathbb{R} : 1 < 4x^2 3 \le 5\}$

- a.  $A=(-3,-2)\cup(2,3)$ , que como está acotado tiene supremo  $\sup(A)=3$  e ínfimo  $\inf(A)=-3$ . Sin embargo,  $3\notin A$  y  $-3\notin A$ , por lo que no tiene ni máximo ni mínimo.
- b.  $B = [-\sqrt{2}, -1) \cup (1, \sqrt{2}]$ , que como está acotado tiene supremo  $\sup(B) = \sqrt{2}$  e ínfimo  $\inf(B) = -\sqrt{2}$ . Como además,  $-\sqrt{2} \in B$  y  $\sqrt{2} \in B$ , se tiene que  $\max(B) = \sqrt{2}$  y  $\min(B) = -\sqrt{2}$ .

**Ejercicio 2.3.** Dadas dos funciones f y g ambas con dominio  $A \subseteq \mathbb{R}$ , demostrar que si sus imágenes están acotadas y  $f(a) \leq g(a) \ \forall a \in A$ , entonces  $\sup(FrIm(f)) \leq \sup(FrIm(g))$ .

## Solución

Como las imágenes de f y g están acotadas, y suponiendo que no fuesen vacías, por el axioma del supremo, se tiene que existe  $c,d\in\mathbb{R}$  tales que  $c=\sup(FrIm(f))$  y  $d=\sup(FrIm(g))$ . Como d es el supremo de la imagen de g, se tiene que es una cota superior de la imagen de f, ya que, para cualquier  $a\in A$ , se tiene  $f(a)\leq g(a)\leq d$ . Por consiguiente, tiene que ser  $c\leq d$ , ya que de lo contrario c no sería el supremo por ser d una cota superior de la imagen de f menor que c.

**Ejercicio 2.4.** Demostrar que si  $c \in \mathbb{R}$  es una cota superior de un conjunto A, entonces -c es una cota inferior del conjunto de los opuestos  $A' = \{-a \in \mathbb{R} : a \in A\}$ , y si c es una cota inferior de A entonces -c es una cota superior de A'.

#### Solución

Sea  $c \in \mathbb{R}$  una cota superior del conjunto A. Entonces,  $a \leq c \ \forall a \in A$ . De ello se deduce que para cualquier  $a \in A$ ,

$$a < c \Rightarrow (-1)a \ge (-1)c \Rightarrow -a \ge -c$$

lo que demuestra que -c es una cota inferior de A'.

Del mismo modo, si c una cota inferior del conjunto A. Entonces,  $c \le a \ \forall a \in A$ , y de ello se deduce que para cualquier  $a \in A$ ,

$$c < a \Rightarrow (-1)c \ge (-1)a \Rightarrow -c \ge -a$$

de manera que -c es cota superior de A'.

Ejercicio 2.5. Demostrar que todo subconjunto no vacío de números reales acotado inferiormente tiene un ínfimo.

## Solución

Sea  $A \subset \mathbb{R}$  no vacío y acotado inferiormente. Entonces existe un  $c \in \mathbb{R}$  que es cota inferior de A. Si tomamos ahora el conjunto  $A' = \{-a \in \mathbb{R} : a \in A\}$ , por el ejercicio Ejercicio 2.4, se cumple que -c es una cota superior de A'. Así pues, A' es un conjunto no vacío y acotado superiormente, y por el axioma del supremo, existe  $-s \in \mathbb{R}$  tal que  $-s = \sup(A')$ .

Veamos ahora que s es el ínfimo de A. Como -s es el supremo de A', es una cota superior de A', y por el ejercicio Ejercicio 2.4, se cumple que -(-s) = s es cota inferior de A. Supongamos ahora que existe otra cota inferior x de A tal que x > s. Entonces, aplicando una vez más el Ejercicio 2.4, se tiene que -x es cota superior de A', pero  $x > s \Rightarrow (-1)x < (-1)s \Rightarrow -x < -s$ , lo que contradice que -s sea el supremo de A', ya que -x sería una cota superior menor que -s. Luego s es el ínfimo de A.

**Ejercicio 2.6.** Demostrar que  $|a| - |b| \le |a - b| \ \forall a, b \in \mathbb{R}$ .

## Solución

Veamos todas las posibilidades que pueden darse:

- Si a = 0, entonces  $|a| |b| = -|b| \le |-b| = |a b|$ .
- Si b = 0, entonces |a| |b| = |a| = |a b|.
- Si  $a \ge b > 0$ , entonces |a| |b| = a b = |a b|.
- Si  $b \ge a > 0$ , entonces  $|a| |b| = a b \le 0 \le |a b|$ .
- Si a > 0 > b, entonces |a| |b| = a (-b) = a + b < a b = |a b|.
- Si b > 0 > a, entonces |a| |b| = -a b < -a + b = -(a b) = |a b|.
- Si  $a \le b < 0$ , entonces |a| |b| = -a (-b) = -a + b = -(a b) = |a b|.
- Si  $b \le a < 0$ , entonces  $|a| |b| = -a (-b) = -a + b \le 0 \le |a b|$ .

**Ejercicio 2.7.** Usando la propiedad arquimediana de los números reales, demostrar que para cualquier número real  $a \in \mathbb{R}$  con a > 0 existe un número natural n tal que  $n-1 \le a < n$ .

Como a>0 se tiene que  $\frac{1}{a}>0$ , y por la propiedad arquimediana se cumple que existe  $n\in\mathbb{N}$  tal que a< n.

Considérese ahora el conjunto  $A=\{m\in\mathbb{N}:a< m\}$ . Como a< n se tiene que  $n\in A$  y por tanto A no está vacío. Aplicando ahora el principio de buena ordenación de los números naturales, como  $A\subset\mathbb{N}$ , existe un primer elemento  $n_0\in A$ , tal que  $n_0-1\notin A$ , de manera que  $n_0-1\le a$  y con ello se tiene que  $\$n_0-1\le a< n$ .

**Ejercicio 2.8.** Se dice que un conjunto A es denso en  $\mathbb{R}$  si cada intervalo (a,b) de  $\mathbb{R}$  contiene algún elemento de A. Demostrar que  $\mathbb{Q}$  es denso en  $\mathbb{R}$ .

## Solución

La prueba es la misma que la de la propiedad arquimediana. Basta con tomar  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $\frac{1}{n} < b-a$ . Si ahora se toma el primer múltiplo de 1/n tal que  $a < \frac{m}{n}$ , también se cumplirá que  $\frac{m}{n} < b$ , ya que de lo contrario  $\frac{m-1}{n} < a < b < \frac{m}{n}$  lo que lleva a la contradicción de que  $\frac{1}{n} > b-a$ .

# 3 Topología de los números reales

**Ejercicio 3.1.** Dada la sucesión de intervalos anidados  $I_n = [0, \frac{1}{n}], n \in \mathbb{N}$ , demostrar que  $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{0\}$ . Demostrar también que si se consideran intervalos abiertos en lugar de cerrados entonces la intersección es vacía.

## Solución

En primer lugar, es fácil ver que  $0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$  ya que  $0 \in I_n \ \forall n \in \mathbb{N}$ . Veamos ahora que 0 es el único elemento de la intersección. Para cualquier x>0, aplicando la propiedad arquimediana se tiene que existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $\frac{1}{n} < x$ , de manera que  $x \notin [0, \frac{1}{n}] = I_n$ , por lo que  $x \notin \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ . Por tanto,  $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{0\}$ .

Si se consideran intervalos abiertos en lugar de cerrados, entonces 0 tampoco pertenecería a la intersección y  $\cap_{n=1}^{\infty} I_n = \emptyset$ .

**Ejercicio 3.2.** ¿Cuál es el interior del conjunto  $A = \{a\}$ ?

#### Solución

a no es un punto interior de A, ya que para cualquier  $\varepsilon > 0$ , el entorno  $(a-\varepsilon, a+\varepsilon) \nsubseteq A$ . Por tanto,  $FrInt(A) = \emptyset$ .

En general, cualquier conjunto con un solo punto no tiene puntos interiores.

**Ejercicio 3.3.** Sean  $a, b, c \in \mathbb{R}$  tales que a < b < c y sea  $A = \{a\} \cup (b, c)$ . Calcular FrInt(A), FrExt(A) y FrFr(A).

## Solución

Como el interior de un conjunto con un solo punto es vacío y el interior de un intervalo abierto es el propio intervalo abierto (ver proposición), se tiene que FrInt(A) = (a, b). Por otro lado,  $\overline{A} = (-\infty, a) \cup (a, b) \cup (c, \infty)$ , que al ser la unión de

intervalos abiertos se tiene que  $FrExt(A) = FrInt(\overline{A}) = (-\infty, a) \cup (a, b) \cup (c, \infty)$ . Finalmente,  $FrFr(A) = \{a, b, c\}$ , ya que cualquier entorno de estos puntos contiene puntos de A y de  $\overline{A}$ .

**Ejercicio 3.4.** Demostrar que todos los puntos de  $\mathbb{Z}$  son puntos frontera.

#### Solución

Sea  $x \in \mathbb{Z}$ , entonces, para cualquier  $\varepsilon > 0$ , el entorno  $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$  siempre contiene números enteros (por ejemplo el propio x), y números no enteros, por los que x es un punto frontera.

Ejercicio 3.5. Demostrar que el conjunto de los números racionales no tiene puntos interiores. ¿Y el conjunto de los números irracionales?



#### Solución

Sea  $x \in \mathbb{Q}$ , entonces, para cualquier  $\varepsilon > 0$ , por la densidad de los números racionales, el entorno  $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)$  siempre contiene números racionales, y por la densidad de los números irracionales también contiene números irracionales, de manera que todos los puntos de  $\mathbb{Q}$  son frontera y no tiene puntos interiores.

Por el mismo motivo, R Q tampoco tiene puntos interiores y todos sus puntos son puntos frontera.

**Ejercicio 3.6.** Demostrar que si x es un punto interior de A y  $A \subseteq B$ , entonces x también es un punto interior de B.



#### Solución

Sea x un punto interior de A. Entonces existe un  $\varepsilon > 0$  tal que el entorno (x - 1) $\varepsilon, x + \varepsilon \subseteq A \subseteq B$ , de manera que x también es un punto interior de B.

Ejercicio 3.7. Demostrar que si x es un punto interior de dos conjuntos A y B, entonces también es un punto interior de su unión y su intersección.

Sea x un punto interior de A y B. Entonces, existe un  $\varepsilon_1 > 0$  tal que el entorno  $(x - \varepsilon_1, x + \varepsilon_1) \subseteq A \subseteq A \cup B$ , de manera que x es también un punto interior de  $A \cup B$ .

Por otro lado, como x es también un punto interior de B, existe otro  $\varepsilon_2 > 0$  tal que el entorno  $(x - \varepsilon_2, x + \varepsilon_2) \subseteq B$ . Tomando  $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}$ , se tiene que el entorno  $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A$  y  $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq B$ , por lo que  $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A \cap B$ , y x es también un punto interior de  $A \cap B$ .

**Ejercicio 3.8.** Demostrar que para cualesquiera dos conjuntos de números reales A y B, se cumple que  $FrInt(A \cap B) = FrInt(A) \cap FrInt(B)$ .

Demostrar también que el anterior resultado no es cierto para la unión, es decir, dados  $A, B \subseteq \mathbb{R}$ , no se cumple siempre que  $FrInt(A \cup B) = FrInt(A) \cup FrInt(B)$ .

## Solución

En el Ejercicio 3.7 hemos visto que si x es un punto interior de A y B, entonces también lo es de su intersección. Veamos ahora el otro sentido de la implicación. Supongamos que x es un punto interior de  $A \cap B$ . Entonces, existe un  $\varepsilon > 0$  tal que el entorno  $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A \cap B$ . Pero como  $A \cap B \subseteq A$  y  $A \cap B \subseteq B$ , se tiene que x es también un punto interior de A y de B.

Para ver que este resultado no es cierto para la unión, basta con tomar A = (-1,0) y B = [0,1). Entonces  $A \cup B = (-1,1)$ , y al ser un intervalo abierto,  $FrInt(A \cup B) = (-1,1)$ . Sin embargo, FrInt(A) = (-1,0) y FrInt(B) = (0,1), por lo que  $FrInt(A) \cup FrInt(B) = (-1,1)$   $\{0\} \neq (-1,1) = FrInt(A \cup B)$ .

**Ejercicio 3.9.** Dado un conjunto  $A \subset \mathbb{R}$ , probar que los conjuntos FrInt(A), FrExt(A) y FrFr(A) forman una partición de  $\mathbb{R}$ .

#### Solución

Veamos primero, que FrInt(A), FrExt(A) y FrFr(A) son disjuntos dos a dos.

- Si  $x \in FrInt(A)$ , entonces existe  $\varepsilon > 0$  tal que el entorno  $(x \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A$ . De aquí se deduce que  $a \in A$ , y por tanto  $x \notin \overline{A}$  por lo que  $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \nsubseteq \overline{A}$  $\forall \varepsilon > 0$  y x no es un punto exterior de A. Por otro lado,  $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A$ , por lo que este entorno de x no contiene puntos de  $\overline{A}$  y  $x \notin FrFr(A)$ .
- Si  $x \in FrExt(A)$ , entonces existe  $\varepsilon > 0$  tal que el entorno  $(x \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq \overline{A}$ .

De aquí se deduce que  $x \notin A$ , y por tanto x no es un punto interior de A. Por otro lado, como  $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq \overline{A}$ , existe un entorno de x que no contiene puntos de A y  $x \notin FrFr(A)$ .

• Si  $x \in FrFr(A)$ , entonces para cualquier  $\varepsilon > 0$ , el entorno  $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$  contiene puntos de A y de  $\overline{A}$ , de manera que, no existe  $\varepsilon > 0$  tal que  $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A$  o  $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq \overline{A}$ , así que, x no es un punto interior ni exterior de A.

Veamos ahora que  $FrInt(A) \cup FrExt(A) \cup FrFr(A) = \mathbb{R}$ , o dicho de otro modo, cualquier  $x \in \mathbb{R}$  debe pertenecer a alguno de estos conjuntos.

- Si existe  $\varepsilon > 0$  tal que  $(x \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A$ , entonces x es un punto interior de A.
- En caso contrario, si existe  $\varepsilon > 0$  tal que  $(x \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq \overline{A}$ , entonces x es un punto exterior de A.
- Finalmente, si para cualquier  $\varepsilon > 0$   $(x \varepsilon, x + \varepsilon) \nsubseteq A$  y  $(x \varepsilon, x + \varepsilon) \nsubseteq \overline{A}$ , se tiene que  $(x \varepsilon, x + \varepsilon)$  contiene tanto puntos de A como de  $\overline{A}$ , por lo que x es un punto frontera de A.

**Ejercicio 3.10.** Calcular los puntos de adherencia y de acumulación del conjunto  $A = \{\frac{n+1}{n} : n \in \mathbb{N}\}.$ 

## Solución

Como  $\frac{n+1}{n}=1+\frac{1}{n},\ 1$  es un punto de acumulación de A, ya que para cualquier  $\varepsilon>0,\ (1-\varepsilon,1+\varepsilon)\ \{1\}$  contiene puntos de A. Para verlo, basta aplicar la propiedad arquimediana, de manera que existe  $n\in\mathbb{N}$  tal que  $\frac{1}{n}<\varepsilon$ , de manera que  $1+\frac{1}{n}<1+\varepsilon$ , y por tanto  $1-\varepsilon,1+\varepsilon$   $1+\varepsilon$ .

Para calcular los puntos de adherencia de A basta tener en cuenta que  $A\subseteq FrAdh(A)$ , y que  $FrAc(A)\subseteq FrAdh(A)$ , por lo que 1 también es un punto de adherencia de A. Veamos ahora que cualquier otro punto, no es punto de adherencia de A. Si x<1, tomando  $\varepsilon=|x-1|$  el entorno  $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)$  no contiene puntos de A. Del mismo modo, si x>2, tomando  $\varepsilon=|x-2|$  el entorno  $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)$  tampoco contiene puntos de A. Finalmente, si  $1< x\leq 2$ , por la propiedad arquimediana, existe  $n\in \mathbb{N}$  tal que  $\frac{1}{n+1}\leq x<\frac{1}{n}$ . Tomando  $\varepsilon=\min(\{|x-\frac{1}{n+1}|,|x-\frac{1}{n}|\})$  también se tiene que el entorno  $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)$  no contiene puntos de A. Por tanto,  $FrAdh(A)=A\cup\{1\}$ .

Para calcular los puntos de acumulación de A, ya sabemos que 1 es un punto de acumulación y faltaría por ver si algún otro punto de A es un punto de acumulación de A, ya que el resto de puntos no pertenecen a la adherencia y por tanto no pueden ser puntos de acumulación al ser  $FrAc(A) \subseteq FrAdh(A)$ . Ahora bien, si  $x \in A$ ,

entonces existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $x = 1 + \frac{1}{n}$ , de manera que tomando  $\varepsilon = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$  se tiene que el entorno reducido  $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$   $\{x\}$  no contiene puntos de A, por lo que x no es punto de acumulación de A. Así pues,  $FrAc(A) = \{1\}$ .

**Ejercicio 3.11.** Calcular los puntos de adherencia y de acumulación de  $\mathbb Z$  y también de  $\mathbb Q$ .

## Solución

 $FrAdh(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z} \text{ y } FrAc(\mathbb{Z}) = \emptyset.$  $FrAdh(\mathbb{Q}) = FrAc(\mathbb{Q}) = \mathbb{R}.$ 

Ejercicio 3.12. Dar un ejemplo de dos conjuntos no abiertos pero cuya intersección es abierta.

## Solución

Si se toma A=[0,2) y B=(1,3], tanto A como B no son abiertos, pero  $A\cap B=(1,2)$  que es un conjunto abierto.

Ejercicio 3.13. Estudiar si el conjunto de los números racionales  $\mathbb Q$  es abierto o cerrado.

## Solución

 $\mathbb Q$  no es abierto ya que como se vio en el Ejercicio 3.5  $FrInt(\mathbb Q)=\emptyset$ . En el mismo ejercicio se vio también que  $FrInt(\overline{\mathbb Q})=FrInt(\mathbb R \ \mathbb Q)=\emptyset$ , por lo que  $\mathbb Q$  tampoco es cerrado.

## Ejercicio 3.14. Probar las siguientes propiedades:

- a. La unión de una colección de conjuntos abiertos es un conjunto abierto.
- b. La intersección de una colección finita de conjuntos abiertos es un conjunto abierto.
- c. La intersección de una colección de conjuntos cerrados es cerrada.
- d. La unión de una colección finita de conjuntos cerrados es un conjunto cerrado.

- a. Sea  $A_n$   $n \in \mathbb{N}$  una colección arbitraria de conjuntos abiertos y sea  $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ . Entonces existe un  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $x \in A_n$ , y como  $A_n$  es abierto, existe un  $\varepsilon > 0$  tal que el entorno  $(x \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ , por lo que x es un punto interior de  $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ .
- b. Vamos a probarlo por inducción. Sean  $A_1$  y  $A_2$  dos conjuntos abiertos. Si  $A_1 \cap A_2 = \emptyset$  ya estaría probado. En caso contrario, sea  $x \in A_1 \cap A_2$ . Entonces, como  $x \in A_1$  existe un  $\varepsilon_1 > 0$  tal que el entorno  $(x \varepsilon_1, x + \varepsilon_1) \subseteq A_1$ , y como  $x \in A_2$  existe un  $\varepsilon_2 > 0$  tal que el entorno  $(x \varepsilon_2, x + \varepsilon_2) \subseteq A_2$ . Tomando  $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}$ , se tiene que  $(x \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A_1$  y  $(x \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A_2$ , por lo que  $(x \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A_1 \cap A_2$ , y  $A_1 \cap A_2$  es un conjunto abierto.
  - Sea ahora una colección  $A_1,\dots,A_m,A_{m+1}$  una colección de conjuntos abiertos y supongamos que  $A=\cap_{n=1}^m A_n$  es un conjunto abierto. Si  $A\cap A_{m+1}=\emptyset$  ya estaría probado. En caso contrario, sea  $x\in A\cap A_{m+1}$ . Entonces, como  $x\in A$  existe un  $\varepsilon_1>0$  tal que el entorno  $(x-\varepsilon_1,x+\varepsilon_1)\subseteq A$ , y como  $x\in A_{m+1}$  existe un  $\varepsilon_2>0$  tal que el entorno  $(x-\varepsilon_2,x+\varepsilon_2)\subseteq A_{m+1}$ . Tomando  $\varepsilon=\min\{\varepsilon_1,\varepsilon_2\}$ , se tiene que  $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)\subseteq A$  y  $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)\subseteq A_{m+1}$ , por lo que  $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)\subseteq A\cap A_{m+1}$ , y  $\cap_{n=1}^{m+1}A_n$  es un conjunto abierto.
- c. Sea  $A_n, n \in \mathbb{N}$ , una colección arbitraria de conjuntos cerrados. Entonces, aplicando la ley de Morgan, se tiene que  $\overline{\cap_{n=1}^{\infty} A_n} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{A_n}$ . Como  $A_n$  es cerrado,  $\overline{A_n}$  es abierto  $\forall n \in \mathbb{N}$ , y por el apartado (a), se tiene que  $\bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{A_n}$  es un conjunto abierto, por lo que  $\overline{\cap_{n=1}^{\infty} A_n}$  es abierto y  $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$  es cerrado.
- d. Sea ahora una colección  $A_1,\ldots,A_n$  una colección de conjuntos cerrados. De nuevo, aplicando la ley de Morgan, se tiene que  $\overline{\cup_{n=1}^\infty A_n} = \cap_{n=1}^\infty \overline{A_n}$ . Como  $A_i$  es cerrado,  $\overline{A_i}$  es abierto  $\forall i=1,\ldots,n,$  y por el apartado (b), se tiene que  $\cap_{n=1}^\infty \overline{A_n}$  es un conjunto abierto, por lo que  $\overline{\cup_{n=1}^\infty A_n}$  es abierto y  $\cup_{n=1}^\infty A_n$  es cerrado.

Ejercicio 3.15. Demostrar que la adherencia de cualquier conjunto es siempre cerrada.

## Solución

 y por consiguiente  $\overline{FrAdh(A)}$  es abierto y FrAdh(A) es cerrado.

**Ejercicio 3.16.** Demostrar que cualquier conjunto es cerrado si y solo si coincide con su adherencia.

## Solución

Sea A un conjunto cerrado. Ya sabemos que  $A\subseteq FrAdh(A)$ . Supongamos ahora que existe un punto  $x\in FrAdh(A)$  A. Entonces, como x es un punto de adherencia de A, para cualquier  $\varepsilon>0$ ,  $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)\cap A\neq\emptyset$ , pero como  $x\notin A$ , también se cumple que  $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)$   $\{x\}\cap A\neq\emptyset$ , por lo que x es un punto de acumulación de A, pero eso contradice que A sea un conjunto cerrado, pues no contiene a todos sus puntos de acumulación (ver teorema). Así pues, FrAdh(A)=A. Para probar el otro sentido de la implicación, supongamos que FrAdh(A)=A. Entonces, para cualquier  $x\in\overline{A}$  existe un  $\varepsilon>0$  tal que  $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)\cap A=\emptyset$ , por lo que  $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)\subseteq\overline{A}$  y  $\overline{A}$  es abierto, de manera que A es cerrado.

# 4 Sucesiones de números reales

Ejercicio 4.1. Una sucesión constante es una sucesión de números reales en la que cada término es igual que el anterior. Demostrar que una sucesión constante siempre converge.

Ejercicio 4.2. Una sucesión aritmética es una sucesión de números reales en la que cada término se obtienen sumando un número constante al anterior, es decir,  $x_{n+1} = c + x_n$ . Estudiar la convergencia de las sucesiones aritméticas.

Ejercicio 4.3. Una sucesión geométrica es una sucesión de números reales en la que cada término se obtienen multiplicando un número constante al anterior, es decir,  $x_{n+1} = cx_n$ . Estudiar la convergencia de las sucesiones geométricas.

Ejercicio 4.4. Una sucesión alternada es una sucesión de números reales en la que cada término tiene signo distinto del anterior. Demostrar que la sucesión alternada  $((-1)^n)_{n=1}^{\infty}$ es divergente. ¿Puede una sucesión alternada ser convergente?

Ejercicio 4.5. Demostrar, aplicando la definición de límite de una sucesión, que las siguientes sucesiones de números reales convergen a los valores dados.

- $\begin{array}{l} \text{a. } \lim_{n\to\infty}\frac{2n}{n^2}=0\\ \text{b. } \lim_{n\to\infty}\frac{n^2-1}{3n^2+n-2}=\frac{1}{3}\\ \text{c. } \lim_{n\to\infty}\frac{3n^2+2}{n^2-n}=3 \end{array}$

**Ejercicio 4.6.** Demostrar que si una sucesión de números reales  $(x_n)_{n=1}^{\infty}$  converge un número l, entonces la sucesión  $(x_n - l)_{n=1}^{\infty}$  converge a 0.

**Ejercicio 4.7.** Demostrar que si una sucesión de números reales converge a x, entonces la sucesión de sus valores absolutos converge a |x|. ¿Es cierto lo contrario?

**Ejercicio 4.8.** Demostrar que si una sucesión de números reales positivos converge a x, entonces la sucesión de sus raíces cuadradas positivas converge a  $\sqrt{x}$ .

**Ejercicio 4.9.** Demostrar que si  $(x_n)_{n=1}^{\infty}$  es una sucesión de números reales acotada e  $(y_n)_{n=1}^{\infty}$  es otra sucesión que converge a 0, entonces la sucesión  $(x_ny_n)_{n=1}^{\infty}$  también converge a 0.

**Ejercicio 4.10.** Demostrar las siguientes sucesiones convergen a 0 usando el teorema de compresión de sucesiones.

- a.  $\left(\frac{n+\cos(n)}{n^2+1}\right)_{n=1}^{\infty}$
- b.  $\left(\frac{2^n}{n!}\right)_{n=1}^{\infty}$
- c.  $\left(\frac{n^2}{2^n}\right)_{n=1}^{\infty}$