Problemas de Análisis Matemático





Tabla de contenidos

| Prefacio | | 3 |
|----------|---------------------------------|-----|
| 1 | Teoría de conjuntos | 4 |
| 2 | Números reales | 14 |
| 3 | Topología de los números reales | 18 |
| 4 | Sucesiones de números reales | 24 |
| 5 | Límites de funciones | 39 |
| 6 | Derivadas de funciones | 54 |
| 7 | Series de números reales | 91 |
| 8 | Integrales de funciones | 115 |
| 9 | Funciones vectoriales | 158 |
| 10 | Funciones de varias variables | 174 |

Prefacio

Colección de problemas de Análisis Matemático aplicado.

1 Teoría de conjuntos

Ejercicio 1.1. Dado el conjunto universo de los números de un dado $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y los subconjuntos correspondientes a sacar par en el lanzamiento de un dado $A = \{2, 4, 6\}$ y sacar menos de 5 en el lanzamiento de un dado $B = \{1, 2, 3, 4\}$, calcular e interpretar los siguientes conjuntos:

```
a. A \cup B
b. A \cap B
c. \overline{A} \neq \overline{B}
d. A - B \neq B - A
e. A \triangle B
f. \overline{(A \cup B)}
```

- g. $(A \cap \overline{B})$ h. $A \cup \overline{B}$
- h. $\underline{A \cup \overline{B}}$ i. $\overline{\overline{A} \cap B}$

¿Qué conjuntos de números en el lanzamiento de un dado serían disjuntos con A? ¿Y con $A \cup B$?

```
Solución

a. A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}
b. A \cap B = \{2, 4\}
c. \overline{A} = \{1, 3, 5\} y \overline{B} = \{5, 6\}
d. A - B = \{6\} y B - A = \{1, 3\}
e. A \triangle B = \{1, 3, 6\}
f. \overline{(A \cup B)} = \{5\}
g. \overline{(A \cap B)} = \{1, 3, 5, 6\}
h. A \cup \overline{B} = \{2, 4, 5, 6\}
i. \overline{\overline{A} \cap B} = \{2, 4, 5, 6\}
```

Serían disjuntos con A todos los conjuntos que solo tuviesen alguno de los números 1, 3 o 5, por ejemplo el conjunto $\{1,5\}$. El único conjunto disjunto con $A \cup B$, además del vacío es $\{5\}$.

Ejercicio 1.2. Expresar con operaciones entre los conjuntos A, B y C, los conjuntos que se corresponden con las regiones sombreadas en los siguientes diagramas.



Figura 1.1: a.

Figura 1.2: b.

Figura 1.3: b.



- a. $(B-A) \cup (A \cap B \cap C)$
- b. $(A \cup B) \cap \overline{(A \cap C)} \cap \overline{(B \cap C)} \cup (A \cap B \cap C)$
- c. $(A \cup B \cup C) ((A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C))$

Ejercicio 1.3. Demostrar gráficamente las leyes de Morgan $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ y $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Ejercicio 1.4. Construir por extensión el conjunto potencia del conjunto de los grupos sanguíneos $S = \{0, A, B, AB\}$. ¿Cuál es su cardinal?

Solución

$$\mathcal{P}(S) = \{\emptyset, \{0\}, \{A\}, \{B\}, \{AB\}, \{A, AB\}, \{A, AB\}, \{B, AB\}, \{0, A, AB\}, \{0, A, AB\}, \{A, B, AB\}, \{A, B, AB\}, \{A, B, AB\}, \{0, A, B, AB\}\}$$

Ejercicio 1.5. Construir el producto cartesiano del conjunto d los grupos sanguíneos $S = \{0, A, B, AB\}$ y el conjunto de los factores Rh $R = \{Rh+, Rh-\}$.

$$S \times R = \{(0, Rh+), (0, Rh-), (A, Rh+)), (A, Rh-), (B, Rh+), (B, Rh-), (AB, Rh+), (AB, Rh-)\}$$

Ejercicio 1.6. Demostrar que la relación $R = \{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 : x-y \text{ es par}\}$ es una relación de equivalencia.

Solución

Propiedad reflexiva: $\forall a \in \mathbb{Z} \ a - a = 0$ es par, de manera que aRa.

Propiedad simétrica: $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ si aRb entonces a-b es par, es decir, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que a - b = 2k. Por tanto, b - a = 2(-k) también es par y bRa.

Propiedad transitiva: $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$, si aRb y bRc entonces a - b y b - c son pares, de manera que su suma a - b + b - c = a - c también es par, y aRc.

Ejercicio 1.7. ¿Cuáles de las siguientes relaciones son relaciones de equivalencia? ¿Cuáles don de orden?

- $\begin{aligned} &\text{a.}\ \ R_1=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x=y\}\\ &\text{b.}\ \ R_2=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x\leq y\}\\ &\text{c.}\ \ R_3=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x^2+y^2=1\}\\ &\text{d.}\ \ R_4=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x^2+y^2\leq 1\} \end{aligned}$

Solución

- a. R_1 es relación de equivalencia.
- b. R_2 es relación de orden.
- c. R_3 no es relación de equivalencia ni de orden porque no cumple las propiedades reflexiva y transitiva.
- d. R_4 es no es relación de equivalencia ni de orden porque tampoco cumple las propiedades reflexiva y transitiva.

Ejercicio 1.8. * Para cada uno de los conjuntos siguientes, calcular si existe el supremo, el ínfimo, el máximo y el mínimo.

- a. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- b. $B = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}\}\$
- c. $C = \{x \in \mathbb{Q} : 0 < x \le 1\}$

- a. $\sup(A) = 5$, $\inf(A) = 1$, $\max(A) = 5$, $\min(A) = 1$.
- b. $\inf(B)=2$ y $\min(B)=2$. No existe el supremo ni el máximo porque B no está acotado superiormente.
- c. $\sup(C) = 1$, $\inf(C) = 0$ y $\max(C) = 1$. No existe el mínimo.

Ejercicio 1.9. \star Dar ejemplos de funciones $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ que cumplan lo siguiente:

- a. f es inyectiva pero no sobreyectiva.
- b. f es sobreyectiva pero no inyectiva.
- c. f no es inyectiva ni sobreyectiva.
- d. f es biyectiva y distinta de la función identidad.

Solución

- a. f(x) = 2x
- b. f(x) = |x/2|.
- c. $f(x) = x^2$
- d. f(x) = x + 1

Ejercicio 1.10. \star Dadas las siguientes funciones de \mathbb{R} en \mathbb{R} , estudiar cuáles son inyectivas y cuáles sobreyectivas:

- a. $f(x) = x^2$
- b. $q(x) = x^3$
- c. $h(x) = x^3 x^2 2x$
- d. i(x) = |x|

Solución

- a. $f(x) = x^2$ no es ni inyectiva ni sobreyectiva.
- b. $g(x) = x^3$ es biyectiva.
- c. $h(x) = x^3 x^2 2x$ es sobreyectiva pero no inyectiva.
- d. i(x) = |x| no es ni inyectiva ni sobreyectiva.

Ejercicio 1.11. Demostrar que la composición de dos funciones inyectivas es también inyectiva.

Sean f y g dos funciones inyectivas tales que $\operatorname{Im}(f) \subseteq \operatorname{Dom}(g)$. Veamos que $g \circ f$ es inyectiva. Supongamos ahora que existen $a, b \in \operatorname{Dom}(f)$ tales que $g \circ f(a) = g \circ f(b)$, es decir, g(f(a)) = g(f(b)). Como g es inyectiva, se tiene que f(a) = f(b), y como f es inyectiva se tiene que $g \circ f$ es inyectiva.

Ejercicio 1.12. Dados dos conjuntos finitos A y B, demostrar que $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ y que $|A \times B| = |A||B|$.

Solución

a. $A \cup B = (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B)$ con A - B, $A \cup B$ y B - A disjuntos dos a dos, de manera que $|A \cup B| = |A - B| + |B - A| + |A \cap B|$. Por otro lado, $A = (A - B) \cup (A \cap B)$, y $B = (B - A) \cup (A \cap B)$, de modo que

$$|A| + |B| - |A \cap B| = |A - B| + |A \cap B| + |B - A| + |A \cap B| - |A \cap B|$$
$$= |A - B| + |B - A| + |A \cap B|,$$

que coincide con el resultado anterior.

b. Supongamos que $A=\{a_1,\ldots,a_n\}$ y $B=\{b_1,\ldots,b_m\}$, de manera que |A|=n y |B|=m. Para cada elemento $a_i\in A$ se pueden formar m pares $(a_i,b_1),\ldots (a_i,b_m)$. Como A tiene n elementos, en total se pueden formar $n\cdot m$ pares, así que $|A\times B|=n\cdot m=|A||B|$.

Ejercicio 1.13. Dada una función $f:A\to B$, demostrar que si f es inyectiva, entonces $|A|\le |B|$, y si f es sobreyectiva, entonces $|A|\ge |B|$. ¿Cómo es |A| en comparación con |B| cuando f es biyectiva?

Solución

Sea $f: A \to B$ inyectiva. Entonces para cualesquiera $a_1, a_2 \in A$ con $a_1 \neq a_2$ se tiene que $f(a_1) \neq f(a_2)$, por lo que $|A| \leq |B|$.

Sea $f:A\to B$ sobreyectiva. Entonces para todo $b\in B$ existe $a\in A$ tal que f(a)=b. Además dos elementos de B no pueden tener la misma preimagen porque entonces f no sería una función, por lo que $|A|\geq |B|$.

De lo anterior se deduce que si f es biyectiva, entonces |A| = |B|.

Ejercicio 1.14. Dados dos conjuntos finitos A y B con |A| = n y |B| = m. ¿Cuántas funciones distintas se pueden construir de A a B? ¿Cuántas funciones sobrevectivas se pueden construir suponiendo que $n \geq m$? ¿Y cuántas funciones inyectivas suponiendo que $n \leq m$?

Solución

Se pueden construir m^n funciones distintas, m^{m-n} funciones sobreyectivas y $\frac{m!}{(m-n)!}$ funciones invectivas.

Ejercicio 1.15. Tomando el conjunto de los números naturales N como conjunto universo, dar un ejemplo de un subconjunto infinito cuyo complemento también sea infinito.

Solución

 $A = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}\}\$ es infinito y $\overline{A} = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es impar}\}\$ también es infinito.

Ejercicio 1.16. Demostrar que todo conjunto infinito tiene un subconjunto infinito numerable.

Solución

Sean A un conjunto infinito. Como A no es vacío, existe un elemento $a_1 \in A$. Considérese ahora el conjunto $A_1 = A \{a_1\}$. Es evidente que A_1 sigue siendo infinito y podemos elegir otro elemento $a_2 \in A_1$ de manera que el conjunto $A_2 = A_1 - \{a_2\}$ sigue siendo infinito. Repitiendo este proceso indefinidamente obtenemos que el conjunto $\{a_1, a_2, ...\}$ es un subconjunto de A que es numerable.

Ejercicio 1.17. Demostrar que un conjunto es infinito si y solo si es equipotente a un subconjunto propio.



Solución

Sea A un conjunto. Si A es finito, entonces cualquier subconjunto $B \subseteq A$ cumple que |B| < |A| por lo que no se puede establecer una biyección entre A y B. Si A es infinito, por el ejercicio anterior se tiene que existe un subconjunto numerable $B = \{a_1, a_2, ...\} \subseteq A$. Si tomamos la aplicación $f : B \to B \setminus \{a_1\}$ dada por $f(a_i) = a_{i+1}$, entonces f es biyectiva, y su extensión $f: A \to A \ \{a_1\}$ dada por

$$\hat{f}(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \notin B \\ f(x) & \text{si } x \in B \end{cases}$$

es también biyectiva, por lo que A es equipotente a A $\{a_1\}$ que es un subconjunto propio suyo.

Ejercicio 1.18. \star Demostrar que el producto cartesiano de dos conjuntos numerables es numerables. ¿Y el producto cartesiano de n conjuntos numerables?

Solución

Sean A y B dos conjuntos numerables. Entonces existe una aplicación inyectiva $f:A\to \mathbb{N}$ y otra $g:B\to \mathbb{N}$. Si se toma ahora la función $h:A\times B\to \mathbb{N}$ definida como

$$f(a,b) = 2^{f(a)}3^{g(b)} \, \forall a \in A, b \in B,$$

se tiene que f es inyectiva y por tanto $A \times B$ es numerable.

Por inducción, es fácil probar que el producto cartesiano de n conjuntos numerables es también numerable.

Ejercicio 1.19. * Demostrar que el conjunto de los números racionales es numerable.

Solución

Si se considera la aplicación $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Z}\times\mathbb{N}$ que a cada número racional r le hace corresponder el par $(p,q)\in\mathbb{Z}\times\mathbb{N}$ donde $\frac{p}{q}$ es la fracción irreducible de r con denominador positivo, se tiene que f es inyectiva. Como el producto cartesiano de dos conjuntos numerables es numerable, existe otra aplicación inyectiva de $g:\mathbb{Z}\times\mathbb{N}\to\mathbb{N}$, con lo que $g\circ f:\mathbb{Q}\to\mathbb{N}$ es inyectiva y \mathbb{Q} es numerable.

Ejercicio 1.20. Demostrar que la unión de dos conjuntos numerables es numerable.

Solución

Sean A y B dos conjuntos numerables disjuntos. Entonces existen dos biyecciones $f:A\to\mathbb{N}$ y $g:B\to\mathbb{N}$. A partir de estas biyecciones se puede definir otra $h:A\cup B\to\mathbb{N}$ dada por

$$h(x) = \begin{cases} 2f(x) - 1 & \text{si } x \in A \\ 2g(x) & \text{si } x \in B \end{cases}$$

Así pues, $A \cup B$ es numerable.

Si A y B no son disjuntos, entonces $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$. Si $B \setminus A = \{b_1, \dots, b_n\}$ es finito, se puede tomar la biyección $g = \{(b_1,1), \dots, (b_n,n)\}$ y, a partir de ella, construir la bivección $h:A\cup B\to \mathbb{N}$ dada por

$$h(x) = \begin{cases} f(x) + n & \text{si } x \in A \\ g(x) & \text{si } x \in B \ A \end{cases}$$

Mientras que si B A es infinito, se puede razonar como al principio pues A y B Ason disjuntos.

Ejercicio 1.21. * Demostrar que el conjunto de los números irracionales no es numera-

Solución

Ya hemos visto en el ejercicio Ejercicio 1.19 que $\mathbb Q$ es numerable, de manera que si \mathbb{R} \mathbb{Q} fuese numerable, entonces por el Ejercicio 1.20 $\mathbb{Q} \cup \mathbb{R}$ $\mathbb{Q} = \mathbb{R}$ sería numerable, lo cual no es cierto.

Ejercicio 1.22. Demostrar la unión de un conjunto numerable de conjuntos numerables es numerable.



Solución

Sea A un conjunto numerable de conjuntos numerables. Por ser A numerable existe una biyección $f:\mathbb{N}\to A,$ de manera que podemos enumerar los elementos de A de tal forma que $A_i = f(i)$. Del mismo modo, como cada conjunto A_i es numerable se puede establecer una enumeración de sus elementos $A_i = \{a_{i1}, a_{i2}, ...\}$. Así pues, podemos representar los elementos de $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ en una tabla como la siguiente

Siguiendo el orden de las flechas es posible enumerar todos los elementos de este conjunto, por lo que $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ es numerable.

Ejercicio 1.23. Demostrar que el conjunto de todos los polinomios con coeficientes enteros $P = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n : n \in \mathbb{N}, a_i \in \mathbb{Z}\}$ es numerable. ¿Y el de los polinomios con coeficientes racionales?

Para cada $n \in \mathbb{N}$ sea P_n el conjunto de los polinomios de grado n con coeficientes enteros $P_n = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n : a_i \in \mathbb{Z}\}$. Para cada polinomio $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \in P_n$ podemos establecer una biyección entre sus coeficientes y la tupla $p_n = (a_0, a_1, \dots, a_n)$, con $a_i \in \mathbb{Z}$. Por tanto, existe una biyección entre P_n y \mathbb{Z}^n , y como \mathbb{Z}^n es numerable, P_n también lo es.

Finalmente, $P = \bigcup_{i=1}^{\infty} P_n$ que es la unión numerable de conjuntos numerables, que, como ya se vió en el Ejercicio 1.22, es numerable.

Del mismo modo, el conjunto de los polinomios de grado n con coeficientes racionales también es numerable, ya que podemos establecer una biyección entre sus coeficientes y la tupla $p_n=(a_0,a_1,\ldots,a_n),$ con $a_i\in\mathbb{Q}.$ Por tanto, existe una biyección entre P_n y \mathbb{Q}^n , que es numerable.

Ejercicio 1.24. * ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son numerables?

- a. $A = \{3k : k \in \mathbb{Z}\}$
- b. $B = \{x \in \mathbb{Q} : -10 < x < 10\}$
- c. $C = \{x \in \mathbb{R} : 0 \le x \le 1\}$
- $d. D = \{(x, y) : x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Q}\}\$
- e. $E = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$

Solución

- a. A es numerable ya que es un subconjunto de $\mathbb Z$ y un subconjunto de un conjunto numerable es numerable.
- b. B es numerable ya que es un subconjunto de $\mathbb Q$ y un subconjunto de un conjunto numerable es numerable.
- c. C no es numerable ya que cualquier intervalo real con más de un número es no numerable. Para probarlo podemos usar el mismo razonamiento que para probar que el conjunto de los números reales es no numerable. El conjunto C está formado por los números decimales de la forma $0.d_1d_2,...$ Supongamos que existe la siguiente biyección entre C y \mathbb{N} :
 - 1. $0.d_{1,1}, d_{1,2}, d_{1,3}, \dots$
 - 2. $0.d_{2.1}, d_{2.2}, d_{2.3}, \dots$
 - 3. $0.d_{3,1}, d_{3,2}, d_{3,3}, \dots$
 - 4. ..

Entonces es posible construir otro número real $0.c_1c_2c_3$, ldots tal que $c_i = d_{i,i} + 1$ o $c_i = 0$ si $d_{i,i} = 9$. Este número real sería diferente de todos los de la enumeración anterior, ya que se diferenciaría de cada uno de ellos en al menos una cifra decimal. Por tanto, habría al menos un número que no

estaría emparejado con un número natural mediante la aplicación, por lo que no podría ser una biyección entre C y \mathbb{N} .

- d. D es numerable al ser el producto cartesiano de dos conjuntos numerables.
- e. E es numerable ya que se puede establecer la biyección f(n) = 1/n entre N

Ejercicio 1.25. ¿Es el conjunto de todas las secuencias infinitas de ADN numerable?

Solución

No es numerable, ya que, al igual que ocurre con los números reales, no es posible hacer una enumeración de sus elementos. Las cadenas de ADN son secuencias de elementos conocidos como bases, que pueden ser A (Adenina), T (Timinia), G (Guanina), C (Citosina). Si existiese una biyección entre el conjunto de estas cadenas infinitas y N, como por ejemplo, la siguiente,

- 1. A, T, C, ...
- 2. C, G, A ...
- 3. T, C, G, ...
- 4. ...

podríamos construir una nueva cadena distinta de todas las de esta enumeración, cambiando la base de la posición i por otra distinta de la que tenga en la misma posición la cadena i de la enumeración. De esta manera, la enumeración anterior no sería una biyección, pues habría al menos una cadena que no tendría asociado un número natural.

2 Números reales

Ejercicio 2.1. * Para los siguientes subconjuntos de números reales, determinar si están acotados por arriba o por abajo, y en tal caso dar el supremo o el ínfimo.

- a. $A = \{-1, 0, 1\}$
- b. B = [0, 1)
- c. $C = (0, \infty)$
- d. $D = \{1 + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ e. $E = \{(-2)^n : n \in \mathbb{N}\}$
- f. $F = \{x \in \mathbb{R} : x^2 3x + 2 = 0\}$
- g. $G = \{x \in \mathbb{R} : x^3 x < 0\}$

Solución

- a. A está acotado por arriba y por abajo. $\sup(A) = 1$ y $\inf(A) = -1$.
- b. B está acotado por arriba y por abajo. $\sup(B) = 1$ y $\inf(B) = 0$.
- c. C está acotado por abajo, pero no por arriba. $\inf(C) = 0$.
- d. D está acotado por arriba y por abajo. $\sup(D) = 2$ y $\inf(D) = 1$.
- e. E no está acotado por arriba ni por abajo.
- f. F está acotado por arriba y por abajo. $\sup(F) = 2$ y $\inf(F) = 1$.
- g. G está acotado por arriba pero no por abajo. $\sup(G) = 1$.

Ejercicio 2.2. Calcular el supremo y el ínfimo de los siguientes conjuntos. ¿Tienen máximo y mínimo?

- a. $A = \{x \in \mathbb{R} : 2 < x^2 2 < 7\}$
- b. $B = \{x \in \mathbb{R} : 1 < 4x^2 3 \le 5\}$

Solución

a. $A = (-3, -2) \cup (2, 3)$, que como está acotado tiene supremo $\sup(A) = 3$ e ínfimo $\inf(A) = -3$. Sin embargo, $3 \notin A$ y $-3 \notin A$, por lo que no tiene ni máximo ni mínimo.

b. $B = [-\sqrt{2}, -1) \cup (1, \sqrt{2}]$, que como está acotado tiene supremo $\sup(B) = \sqrt{2}$ e ínfimo $\inf(B) = -\sqrt{2}$. Como además, $-\sqrt{2} \in B$ y $\sqrt{2} \in B$, se tiene que $\max(B) = \sqrt{2}$ y $\min(B) = -\sqrt{2}$.

Ejercicio 2.3. Dadas dos funciones f y g ambas con dominio $A \subseteq \mathbb{R}$, demostrar que si sus imágenes están acotadas y $f(a) \leq g(a) \ \forall a \in A$, entonces $\sup(\operatorname{Im}(f)) \leq \sup(\operatorname{Im}(g))$.

Solución

Como las imágenes de f y g están acotadas, y suponiendo que no fuesen vacías, por el axioma del supremo, se tiene que existe $c,d\in\mathbb{R}$ tales que $c=\sup(\mathrm{Im}(f))$ y $d=\sup(\mathrm{Im}(g))$. Como d es el supremo de la imagen de g, se tiene que es una cota superior de la imagen de f, ya que, para cualquier $a\in A$, se tiene $f(a)\leq g(a)\leq d$. Por consiguiente, tiene que ser $c\leq d$, ya que de lo contrario c no sería el supremo por ser d una cota superior de la imagen de f menor que c.

Ejercicio 2.4. Demostrar que si $c \in \mathbb{R}$ es una cota superior de un conjunto A, entonces -c es una cota inferior del conjunto de los opuestos $A' = \{-a \in \mathbb{R} : a \in A\}$, y si c es una cota inferior de A entonces -c es una cota superior de A'.

Solución

Sea $c \in \mathbb{R}$ una cota superior del conjunto A. Entonces, $a \leq c \ \forall a \in A$. De ello se deduce que para cualquier $a \in A$,

$$a < c \Rightarrow (-1)a \ge (-1)c \Rightarrow -a \ge -c$$

lo que demuestra que -c es una cota inferior de A'.

Del mismo modo, si c una cota inferior del conjunto A. Entonces, $c \le a \ \forall a \in A$, y de ello se deduce que para cualquier $a \in A$,

$$c < a \Rightarrow (-1)c \ge (-1)a \Rightarrow -c \ge -a$$

de manera que -c es cota superior de A'.

Ejercicio 2.5. \star Demostrar que todo subconjunto no vacío de números reales acotado inferiormente tiene un ínfimo.

Sea $A \subset \mathbb{R}$ no vacío y acotado inferiormente. Entonces existe un $c \in \mathbb{R}$ que es cota inferior de A. Si tomamos ahora el conjunto $A' = \{-a \in \mathbb{R} : a \in A\}$, por el ejercicio Ejercicio 2.4, se cumple que -c es una cota superior de A'. Así pues, A' es un conjunto no vacío y acotado superiormente, y por el axioma del supremo, existe $-s \in \mathbb{R}$ tal que $-s = \sup(A')$.

Veamos ahora que s es el ínfimo de A. Como -s es el supremo de A', es una cota superior de A', y por el ejercicio Ejercicio 2.4, se cumple que -(-s) = s es cota inferior de A. Supongamos ahora que existe otra cota inferior x de A tal que x > s. Entonces, aplicando una vez más el Ejercicio 2.4, se tiene que -x es cota superior de A', pero $x > s \Rightarrow (-1)x < (-1)s \Rightarrow -x < -s$, lo que contradice que -s sea el supremo de A', ya que -x sería una cota superior menor que -s. Luego s es el ínfimo de A.

Ejercicio 2.6. Demostrar que $|a| - |b| \le |a - b| \ \forall a, b \in \mathbb{R}$.

Solución

Veamos todas las posibilidades que pueden darse:

- Si a = 0, entonces $|a| |b| = -|b| \le |-b| = |a b|$.
- Si b = 0, entonces |a| |b| = |a| = |a b|.
- Si $a \ge b > 0$, entonces |a| |b| = a b = |a b|.
- Si $b \ge a > 0$, entonces $|a| |b| = a b \le 0 \le |a b|$.
- Si a > 0 > b, entonces |a| |b| = a (-b) = a + b < a b = |a b|.
- Si b > 0 > a, entonces |a| |b| = -a b < -a + b = -(a b) = |a b|.
- Si $a \le b < 0$, entonces |a| |b| = -a (-b) = -a + b = -(a b) = |a b|.
- Si $b \le a < 0$, entonces $|a| |b| = -a (-b) = -a + b \le 0 \le |a b|$.

Ejercicio 2.7. \star Usando la propiedad arquimediana de los números reales, demostrar que para cualquier número real $a \in \mathbb{R}$ con a > 0 existe un número natural $n \in \mathbb{N}$ tal que $0 < \frac{1}{n} < a$. Demostrar también que existe otro número natural $m \in \mathbb{N}$ tal que $m-1 \le a < m$.

Solución

Como a > 0 se tiene que $\frac{1}{a} > 0$, y por la propiedad arquimediana, existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{a} < n$, de donde se deduce que $\frac{1}{1/a} > \frac{1}{n} > 0$, es decir, $0 < \frac{1}{n} < a$.

Para demostrar la segunda parte, considérese ahora el conjunto $A = \{k \in \mathbb{N} : a < k\}$. Por la propiedad arquimedana sabemos que existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que a < n, y por tanto, $n \in A$ por lo que A no está vacío. Aplicando ahora el principio de buena

ordenación de los números naturales, como $A \subset \mathbb{N}$, existe un primer elemento $m \in A$, tal que $m-1 \notin A$, de manera que $m-1 \leq a$ y con ello se tiene que $\$m - 1 \le a < m.$

Ejercicio 2.8. Se dice que un conjunto A es denso en \mathbb{R} si cada intervalo (a,b) de \mathbb{R} contiene algún elemento de A. Demostrar que \mathbb{Q} es denso en \mathbb{R} .

Solución

La prueba es la misma que la de la propiedad arquimediana. Basta con tomar $n \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{n} < b-a$. Si ahora se toma el primer múltiplo de 1/n tal que $a < \frac{m}{n}$, también se cumplirá que $\frac{m}{n} < b$, ya que de lo contrario $\frac{m-1}{n} < a < b < \frac{m}{n}$ lo que lleva a la contradicción de que $\frac{1}{n} > b-a$.

3 Topología de los números reales

Ejercicio 3.1. Dada la sucesión de intervalos anidados $I_n = [0, \frac{1}{n}], n \in \mathbb{N}$, demostrar que $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{0\}$. Demostrar también que si se consideran intervalos abiertos en lugar de cerrados entonces la intersección es vacía.

Solución

En primer lugar, es fácil ver que $0 \in \cap_{n=1}^{\infty} I_n$ ya que $0 \in I_n \ \forall n \in \mathbb{N}$. Veamos ahora que 0 es el único elemento de la intersección. Para cualquier x>0, aplicando la propiedad arquimediana se tiene que existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{n} < x$, de manera que $x \notin [0, \frac{1}{n}] = I_n$, por lo que $x \notin \cap_{n=1}^{\infty} I_n$. Por tanto, $\cap_{n=1}^{\infty} I_n = \{0\}$.

Si se consideran intervalos abiertos en lugar de cerrados, entonces 0 tampoco pertenecería a la intersección y $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \emptyset$.

Ejercicio 3.2. ¿Cuál es el interior del conjunto $A = \{a\}$?

Solución

a no es un punto interior de A, ya que para cualquier $\varepsilon > 0$, el entorno $(a-\varepsilon, a+\varepsilon) \nsubseteq A$. Por tanto, $\operatorname{Int}(A) = \emptyset$.

En general, cualquier conjunto con un solo punto no tiene puntos interiores.

Ejercicio 3.3. Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que a < b < c y sea $A = \{a\} \cup (b, c)$. Calcular Int(A), Ext(A) y Fr(A).

Solución

Como el interior de un conjunto con un solo punto es vacío y el interior de un intervalo abierto es el propio intervalo abierto (ver proposición), se tiene que $\operatorname{Int}(A)=(a,b)$. Por otro lado, $\overline{A}=(-\infty,a)\cup(a,b)\cup(c,\infty)$, que al ser la unión de intervalos abiertos se tiene que $\operatorname{Ext}(A)=\operatorname{Int}(\overline{A})=(-\infty,a)\cup(a,b)\cup(c,\infty)$. Finalmente, $\operatorname{Fr}(A)=\{a,b,c\}$, ya que cualquier entorno de estos puntos contiene puntos de A y de \overline{A} .

Ejercicio 3.4. \star Demostrar que todos los puntos de \mathbb{Z} son puntos frontera.

Sea $x \in \mathbb{Z}$, entonces, para cualquier $\varepsilon > 0$, el entorno $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ siempre contiene números enteros (por ejemplo el propio x), y números no enteros, por los que x es un punto frontera.

Ejercicio 3.5. ★ Demostrar que el conjunto de los números racionales no tiene puntos interiores. ¿Y el conjunto de los números irracionales?

Solución

Sea $x \in \mathbb{Q}$, entonces, para cualquier $\varepsilon > 0$, por la densidad de los números racionales, el entorno $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ siempre contiene números racionales, y por la densidad de los números irracionales también contiene números irracionales, de manera que todos los puntos de \mathbb{Q} son frontera y no tiene puntos interiores.

Por el mismo motivo, \mathbb{R} \mathbb{Q} tampoco tiene puntos interiores y todos sus puntos son puntos frontera.

Ejercicio 3.6. Demostrar que si x es un punto interior de A y $A \subseteq B$, entonces x también es un punto interior de B.

Solución

Sea x un punto interior de A. Entonces existe un $\varepsilon > 0$ tal que el entorno $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A \subseteq B$, de manera que x también es un punto interior de B.

Ejercicio 3.7. Demostrar que si x es un punto interior de dos conjuntos A y B, entonces también es un punto interior de su unión y su intersección.

Solución

Sea x un punto interior de A y B. Entonces, existe un $\varepsilon_1>0$ tal que el entorno $(x-\varepsilon_1,x+\varepsilon_1)\subseteq A\subseteq A\cup B$, de manera que x es también un punto interior de $A\cup B$.

Por otro lado, como x es también un punto interior de B, existe otro $\varepsilon_2 > 0$ tal que el entorno $(x - \varepsilon_2, x + \varepsilon_2) \subseteq B$. Tomando $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}$, se tiene que el entorno $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A$ y $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq B$, por lo que $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A \cap B$, y x es también un punto interior de $A \cap B$.

Ejercicio 3.8. Demostrar que para cualesquiera dos conjuntos de números reales A y B, se cumple que $Int(A \cap B) = Int(A) \cap Int(B)$.

Demostrar también que el anterior resultado no es cierto para la unión, es decir, dados $A, B \subseteq \mathbb{R}$, no se cumple siempre que $\operatorname{Int}(A \cup B) = \operatorname{Int}(A) \cup \operatorname{Int}(B)$.

Solución

En el Ejercicio 3.7 hemos visto que si x es un punto interior de A y B, entonces también lo es de su intersección. Veamos ahora el otro sentido de la implicación. Supongamos que x es un punto interior de $A \cap B$. Entonces, existe un $\varepsilon > 0$ tal que el entorno $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A \cap B$. Pero como $A \cap B \subseteq A$ y $A \cap B \subseteq B$, se tiene que x es también un punto interior de A y de B.

Para ver que este resultado no es cierto para la unión, basta con tomar A = (-1,0) y B = [0,1). Entonces $A \cup B = (-1,1)$, y al ser un intervalo abierto, $\operatorname{Int}(A \cup B) = (-1,1)$. Sin embargo, $\operatorname{Int}(A) = (-1,0)$ y $\operatorname{Int}(B) = (0,1)$, por lo que $\operatorname{Int}(A) \cup \operatorname{Int}(B) = (-1,1)$ $\{0\} \neq (-1,1) = \operatorname{Int}(A \cup B)$.

Ejercicio 3.9. Dado un conjunto $A \subset \mathbb{R}$, probar que los conjuntos $\operatorname{Int}(A)$, $\operatorname{Ext}(A)$ y $\operatorname{Fr}(A)$ forman una partición de \mathbb{R} .

Solución

Veamos primero, que Int(A), Ext(A) y Fr(A) son disjuntos dos a dos.

- Si $x \in \text{Int}(A)$, entonces existe $\varepsilon > 0$ tal que el entorno $(x \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A$. De aquí se deduce que $a \in A$, y por tanto $x \notin \overline{A}$ por lo que $(x \varepsilon, x + \varepsilon) \nsubseteq \overline{A}$ $\forall \varepsilon > 0$ y x no es un punto exterior de A. Por otro lado, $(x \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A$, por lo que este entorno de x no contiene puntos de \overline{A} y $x \notin \text{Fr}(A)$.
- Si $x \in \text{Ext}(A)$, entonces existe $\varepsilon > 0$ tal que el entorno $(x \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq \overline{A}$. De aquí se deduce que $x \notin A$, y por tanto x no es un punto interior de A. Por otro lado, como $(x \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq \overline{A}$, existe un entorno de x que no contiene puntos de A y $x \notin \text{Fr}(A)$.
- Si $x \in Fr(A)$, entonces para cualquier $\varepsilon > 0$, el entorno $(x \varepsilon, x + \varepsilon)$ contiene puntos de A y de \overline{A} , de manera que, no existe $\varepsilon > 0$ tal que $(x \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A$ o $(x \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq \overline{A}$, así que, x no es un punto interior ni exterior de A.

Veamos ahora que $\operatorname{Int}(A) \cup \operatorname{Ext}(A) \cup \operatorname{Fr}(A) = \mathbb{R}$, o dicho de otro modo, cualquier $x \in \mathbb{R}$ debe pertenecer a alguno de estos conjuntos.

- Si existe $\varepsilon > 0$ tal que $(x \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A$, entonces x es un punto interior de A.
- En caso contrario, si existe $\varepsilon > 0$ tal que $(x \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq \overline{A}$, entonces x es un punto exterior de A.
- Finalmente, si para cualquier $\varepsilon > 0$ $(x \varepsilon, x + \varepsilon) \not\subseteq A$ y $(x \varepsilon, x + \varepsilon) \not\subseteq \overline{A}$, se tiene que $(x \varepsilon, x + \varepsilon)$ contiene tanto puntos de A como de \overline{A} , por lo que x es un punto frontera de A.

Ejercicio 3.10. * Calcular los puntos de adherencia y de acumulación del conjunto $A = \{\frac{n+1}{n} : n \in \mathbb{N}\}.$

Solución

Como $\frac{n+1}{n}=1+\frac{1}{n},\ 1$ es un punto de acumulación de A, ya que para cualquier $\varepsilon>0,\ (1-\varepsilon,1+\varepsilon)\ \{1\}$ contiene puntos de A. Para verlo, basta aplicar la propiedad arquimediana, por la que existe $n\in\mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{n}<\varepsilon$, de manera que $1+\frac{1}{n}<1+\varepsilon$, y por tanto $(1-\varepsilon,1+\varepsilon)\ \{1\}\cap A\neq\emptyset$.

Para calcular los puntos de adherencia de A basta tener en cuenta que $A\subseteq \mathrm{Adh}(A)$, y que $\mathrm{Ac}(A)\subseteq \mathrm{Adh}(A)$, por lo que 1 también es un punto de adherencia de A. Veamos ahora que cualquier otro punto, no es punto de adherencia de A. Si x<1, tomando $\varepsilon=|x-1|$ el entorno $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)$ no contiene puntos de A. Del mismo modo, si x>2, tomando $\varepsilon=|x-2|$ el entorno $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)$ tampoco contiene puntos de A. Finalmente, si $1< x\leq 2$, por la propiedad arquimediana, existe $n\in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{n+1}\leq x<\frac{1}{n}$. Tomando $\varepsilon=\min(\{|x-\frac{1}{n+1}|,|x-\frac{1}{n}|\})$ también se tiene que el entorno $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)$ no contiene puntos de A. Por tanto, $\mathrm{Adh}(A)=A\cup\{1\}$. Para calcular los puntos de acumulación de A, ya sabemos que 1 es un punto de acumulación y faltaría por ver si algún otro punto de A es un punto de acumulación de A, ya que el resto de puntos no pertenecen a la adherencia y por tanto no pueden ser puntos de acumulación al ser $\mathrm{Ac}(A)\subseteq\mathrm{Adh}(A)$. Ahora bien, si $x\in A$, entonces existe $n\in \mathbb{N}$ tal que $x=1+\frac{1}{n}$, de manera que tomando $\varepsilon=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$ se tiene que el entorno reducido $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)$ $\{x\}$ no contiene puntos de A, por lo que x no es punto de acumulación de A. Así pues, $\mathrm{Ac}(A)=\{1\}$.

Ejercicio 3.11. Calcular los puntos de adherencia y de acumulación de \mathbb{Z} y también de \mathbb{Q} .

Solución

 $Adh(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z} \text{ y } Ac(\mathbb{Z}) = \emptyset.$ $Adh(\mathbb{Q}) = Ac(\mathbb{Q}) = \mathbb{R}.$

Ejercicio 3.12. Dar un ejemplo de dos conjuntos no abiertos pero cuya intersección es abierta.

Solución

Si se toma A=[0,2) y B=(1,3], tanto A como B no son abiertos, pero $A\cap B=(1,2)$ que es un conjunto abierto.

Ejercicio 3.13. \star Estudiar si el conjunto de los números racionales $\mathbb Q$ es abierto o cerrado.

Solución

 $\mathbb Q$ no es abierto ya que como se vio en el Ejercicio 3.5 $\operatorname{Int}(\mathbb Q)=\emptyset$. En el mismo ejercicio se vio también que $\operatorname{Int}(\overline{\mathbb Q})=\operatorname{Int}(\mathbb R \ \mathbb Q)=\emptyset$, por lo que $\mathbb Q$ tampoco es cerrado.

Ejercicio 3.14. Probar las siguientes propiedades:

- a. La unión de una colección de conjuntos abiertos es un conjunto abierto.
- b. La intersección de una colección finita de conjuntos abiertos es un conjunto abierto.
- c. La intersección de una colección de conjuntos cerrados es cerrada.
- d. La unión de una colección finita de conjuntos cerrados es un conjunto cerrado.

Solución

- a. Sea A_n $n \in \mathbb{N}$ una colección arbitraria de conjuntos abiertos y sea $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Entonces existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $x \in A_n$, y como A_n es abierto, existe un $\varepsilon > 0$ tal que el entorno $(x \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, por lo que x es un punto interior de $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$.
- b. Vamos a probarlo por inducción. Sean A_1 y A_2 dos conjuntos abiertos. Si $A_1\cap A_2=\emptyset$ ya estaría probado. En caso contrario, sea $x\in A_1\cap A_2$. Entonces, como $x\in A_1$ existe un $\varepsilon_1>0$ tal que el entorno $(x-\varepsilon_1,x+\varepsilon_1)\subseteq A_1$, y como $x\in A_2$ existe un $\varepsilon_2>0$ tal que el entorno $(x-\varepsilon_2,x+\varepsilon_2)\subseteq A_2$. Tomando $\varepsilon=\min\{\varepsilon_1,\varepsilon_2\}$, se tiene que $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)\subseteq A_1$ y $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)\subseteq A_2$, por lo que $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)\subseteq A_1\cap A_2$, y $A_1\cap A_2$ es un conjunto abierto.
 - Sea ahora una colección A_1,\dots,A_m,A_{m+1} una colección de conjuntos abiertos y supongamos que $A=\cap_{n=1}^m A_n$ es un conjunto abierto. Si $A\cap A_{m+1}=\emptyset$ ya estaría probado. En caso contrario, sea $x\in A\cap A_{m+1}$. Entonces, como $x\in A$ existe un $\varepsilon_1>0$ tal que el entorno $(x-\varepsilon_1,x+\varepsilon_1)\subseteq A$, y como $x\in A_{m+1}$ existe un $\varepsilon_2>0$ tal que el entorno $(x-\varepsilon_2,x+\varepsilon_2)\subseteq A_{m+1}$. Tomando $\varepsilon=\min\{\varepsilon_1,\varepsilon_2\}$, se tiene que $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)\subseteq A$ y $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)\subseteq A_{m+1}$, por lo que $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)\subseteq A\cap A_{m+1}$, y $\cap_{n=1}^{m+1}A_n$ es un conjunto abierto.
- c. Sea $A_n, n \in \mathbb{N}$, una colección arbitraria de conjuntos cerrados. Entonces, aplicando la ley de Morgan, se tiene que $\overline{\cap_{n=1}^{\infty} A_n} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{A_n}$. Como $\underline{A_n}$ es cerrado, $\overline{A_n}$ es abierto $\forall n \in \mathbb{N}$, y por el apartado (a), se tiene que $\bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{A_n}$ es un conjunto abierto, por lo que $\overline{\cap_{n=1}^{\infty} A_n}$ es abierto y $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ es cerrado.
- d. Sea ahora una colección A_1,\ldots,A_n una colección de conjuntos cerrados. De nuevo, aplicando la ley de Morgan, se tiene que $\overline{\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n}=\cap_{n=1}^{\infty}\overline{A_n}$. Como

 A_i es cerrado, $\overline{A_i}$ es abierto $\forall i=1,\ldots,n,$ y por el apartado (b), se tiene que $\cap_{n=1}^{\infty} \overline{A_n}$ es un conjunto abierto, por lo que $\overline{\cup_{n=1}^{\infty} A_n}$ es abierto y $\cup_{n=1}^{\infty} A_n$ es cerrado.

Ejercicio 3.15. Demostrar que la adherencia de cualquier conjunto es siempre cerrada.

Solución

Sea $A \subset \mathbb{R}$. Para probar que $\operatorname{Adh}(A)$ es un conjunto cerrado, veremos que $\operatorname{\overline{Adh}}(A)$ es abierto. Si $x \in \operatorname{\overline{Adh}}(A)$, entonces $x \notin \operatorname{Adh}(A)$, y existe un $\varepsilon > 0$ tal que $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap A = \emptyset$. Para cualquier $y \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$, se tiene, tomando $\varepsilon' = \min(\{x - \varepsilon - y, x + \varepsilon - y\})$, que $(y - \varepsilon', y + \varepsilon') \subseteq (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ y por tanto $(y - \varepsilon', y + \varepsilon') \cap A = \emptyset$, por lo que $y \notin \operatorname{Adh}(A)$. Así pues, $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq \operatorname{\overline{Adh}}(A)$, y por consiguiente $\operatorname{\overline{Adh}}(A)$ es abierto y $\operatorname{Adh}(A)$ es cerrado.

Ejercicio 3.16. Demostrar que cualquier conjunto es cerrado si y solo si coincide con su adherencia.

Solución

Sea A un conjunto cerrado. Ya sabemos que $A \subseteq Adh(A)$. Supongamos ahora que existe un punto $x \in Adh(A)$ A. Entonces, como x es un punto de adherencia de A, para cualquier $\varepsilon > 0$, $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$, pero como $x \notin A$, también se cumple que $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ $\{x\} \cap A \neq \emptyset$, por lo que x es un punto de acumulación de A, pero eso contradice que A sea un conjunto cerrado, pues no contiene a todos sus puntos de acumulación (ver teorema). Así pues, Adh(A) = A.

Para probar el otro sentido de la implicación, supongamos que $\mathrm{Adh}(A) = A$. Entonces, para cualquier $x \in \overline{A}$ existe un $\varepsilon > 0$ tal que $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap A = \emptyset$, por lo que $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq \overline{A}$ y \overline{A} es abierto, de manera que A es cerrado.

4 Sucesiones de números reales

Ejercicio 4.1. Una sucesión constante es una sucesión de números reales en la que cada término es igual que el anterior. Demostrar que una sucesión constante siempre converge.

Solución

Sea $(c)_{n=1}^{\infty}$ una sucesión constante. Veamos que converge a c. Para cualquier $\varepsilon>0$ basta tomar k=1, de manera que $\forall n\geq k$ se tiene que $|x_n-c|=|c-c|=0<\varepsilon$. Por tanto, $\lim_{n\to\infty} x_n = c$.

Ejercicio 4.2. Una sucesión aritmética es una sucesión de números reales en la que cada término se obtienen sumando un número constante $c \in \mathbb{R}$ al anterior, es decir, $x_1 = c$ y $x_{n+1}=c+x_n \ \forall n=2,3,....$ Estudiar la convergencia de las sucesiones aritméticas.

Solución

Si c=0 entonces la sucesión es constante y por el Ejercicio 4.1, la sucesión converge. Supongamos que c>0 y veamos que la sucesión aritmética $(nc)_{n=1}^{\infty}$ no converge a ningún número $x \in \mathbb{R}.$ Para ello, basta tomar $\varepsilon = 1,$ de manera que por la propiedad arquimediana se tiene que existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{x+1}{c} < m$, así que para cualquier $k \in \mathbb{N}$, tomando $n = \max(\{k, m\})$, se cumple que existe $n \geq k$ tal que

$$\frac{x+1}{c} < m \le n \Rightarrow x+1 < nc = x_n$$

$$\Rightarrow x_n - x > 1$$

$$\Rightarrow |x_n - x| > 1 = \varepsilon.$$

Por consiguiente, la sucesión diverge. De forma similar se puede prueba que si c < 0la sucesión también diverge.

Otra forma de demostrarlo es probar que la sucesión es monótona y no acotada y aplicar el teorema de la convergencia de sucesiones monóntonas para concluir que la sucesión no converge.

Ejercicio 4.3. Una sucesión geométrica es una sucesión de números reales en la que cada término se obtienen multiplicando un número constante $c \in \mathbb{R}$ por el anterior, es decir, $x_1 = c$ y $x_{n+1} = cx_n$. Estudiar la convergencia de las sucesiones geométricas.

Si c=0 o c=1 entonces la sucesión es constante y por el Ejercicio 4.1, la sucesión converge.

Supongamos que c>1 y veamos que la sucesión geométrica $(c^n)_{n=1}^\infty$ no converge a ningún número $x\in\mathbb{R}$. Para ello, basta probar que la sucesión es creciente y no acotada. Probaremos que por inducción que la sucesión es creciente. $x_1=c< cc=c^2=x_2$ por ser c>1. Supongamos ahora que $x_{n-1}< x_n$, entonces $x_n=c^n< cc^n=c^{n+1}=x_{n+1}$. Por tanto, la sucesión es creciente.

Veamos ahora que no está acotada por reducción al absurdo. Supongamos que existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $x > x_n \ \forall n \in \mathbb{N}$. Como c > 1, podemos escribir $x_n = c^n = (1+a)^n$ con a > 0. Aplicando ahora el teorema del binomio, se tiene

$$\begin{split} (1+a)^n &= \binom{n}{0} 1^n a^0 + \binom{n}{1} 1^{n-1} a^1 + \binom{n}{2} 1^{n-2} a^2 + \dots + \binom{n}{n} 1^0 a^n \\ &= 1 + na + \frac{n(n-1)}{2} a^2 + \dots + a^n \\ &\geq 1 + na. \end{split}$$

Aplicando ahora la propiedad arquimediana, se tiene que existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{x-1}{a} < n$, de modo que

$$\frac{x-1}{a} < n \Rightarrow x-1 < na \Rightarrow x < 1 + na < (1+a)^n = x_n,$$

por lo que x no puede ser cota de la sucesión. Por consiguiente, la sucesión es monótona y no acotada, y por el teorema de la convergencia de sucesiones monónotas la sucesión diverge.

De forma similar se puede prueba que si c < 0 la sucesión también diverge.

Veamos finalmente que si 0 < c < 1 entonces la sucesión converge a 0.

Ejercicio 4.4. * Una sucesión alternada es una sucesión de números reales en la que cada término tiene signo distinto del anterior. Demostrar que la sucesión alternada $((-1)^n)_{n=1}^{\infty}$ es divergente. ¿Puede una sucesión alternada ser convergente?

Solución

Veamos que no existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $\lim_{n \to \infty} (-1)^n = x$. Para $x \in \mathbb{R}$ $\{-1,1\}$ es sencillo, ya que tomando $\varepsilon = |1-|x||$ para cualquier $k \in \mathbb{N}$, si $n \ge k$ se tiene que $|x_n-x| = |(-1)^n-x| \ge ||(-1)^n|-|x|| = |1-|x|| = \varepsilon$, por tanto, la sucesión no converge a x.

Veamos ahora que la sucesión no converge a 1. Para ello basta tomar $\varepsilon=1$, de manera que para cualquier $k\in\mathbb{N}$ existe $n=2k+1\geq k$ tal que $|x_n-1|=1$

$$|(-1)^{2k+1}-1|=|-1-1|=|-2|=2>1=\varepsilon.$$

Del mismo modo se puede probar que tampoco converge a -1. Para ello basta tomar de nuevo $\varepsilon=1$, de manera que para cualquier $k\in\mathbb{N}$ existe $n=2k\geq k$ tal que $|x_n-(-1)|=|(-1)^{2k}-(-1)|=|1-(-1)|=|2|=2>1=\varepsilon$.

que $|x_n-(-1)|=|(-1)^{2k}-(-1)|=|1-(-1)|=|2|=2>1=\varepsilon$. Otra forma de demostrar la no convergencia de la sucesión es tomar las subsucesiones suyas $((-1)^{2n})_{n=1}^{\infty}$ y $((-1)^{2n+1})_{n=1}^{\infty}$ que convergen a 1 y -1 respectivamente, al ser constantes, de manera que aplicando el teorema de la convergencia de las subsucesiones, se tiene que las sucesión original no converge.

Por otro lado, no toda sucesión alternada es divergente. Por ejemplo, las sucesiones $\left(\frac{(-1)^n}{n}\right)_{n=1}^{\infty}$ y $\left(\frac{(-1)^n}{n^2}\right)_{n=1}^{\infty}$ son alternadas y convergen a 0.

Ejercicio 4.5. ¿Cómo podríamos demostrar que las siguientes afirmaciones son falsas?

- a. En cada banco de una ciudad existe al menos un cliente moroso.
- b. Existe un banco en una ciudad donde cada cliente tiene una pensión o una hipoteca.
- c. Para todos los bancos de una ciudad existe un cliente que cada mes usa una tarjeta de crédito o de débito.

Solución

- a. Para refutar la afirmación habría que encontrar un banco en el no hubiese al menos un cliente moroso, es decir, que todos sus clientes no fuesen morosos.
- b. Para refutar la afirmación habría que mostrar que todos los bancos de la ciudad tienen algún cliente que no tiene pensión ni hipoteca.
- c. Para refutar la afirmación habría que encontrar un banco en el que ningún cliente usase cada mes la tarjeta de crédito o de débito, es decir, en el que para todos los clientes hay algún mes que no usan ni la tarjeta de crédito ni la de débito.

Ejercicio $4.6. \star$ Dar un ejemplo de sucesión que cumpla las siguientes condiciones, o, en caso de no existir ninguna, explicar porqué.

- a. Una sucesión con un número infinito de ceros que no converge a 0.
- b. Una sucesión con un número infinito de unos que converge a un número distinto de uno.
- c. Una sucesión divergente tal que para cada $n \in \mathbb{N}$ se pueden encontrar n ceros consecutivos en la sucesión.

a. La sucesión $(x_n)_{n=1}^\infty$ tal que

$$x_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 2k \\ 1 & \text{si } n = 2k+1 \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}$$

b. No existe.

c. La sucesión $0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, \dots$

Ejercicio 4.7. ★ Demostrar, aplicando la definición de límite de una sucesión, que las siguientes sucesiones de números reales convergen a los valores dados.

a.
$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n}{n^2} = 0$$

b.
$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2-1}{3n^2+n-2} = \frac{1}{3}$$

c.
$$\lim_{n\to\infty} \frac{3n^2+2}{n^2-n} = 3$$

Solución

a.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2n}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{n}=0.$$

b.

$$\begin{split} \lim_{n \to \infty} \frac{n^2 - 1}{3n^2 + n - 2} &= \lim_{n \to \infty} \frac{1 - \frac{1}{n^2}}{3 + \frac{1}{n} - \frac{2}{n^2}} \\ &= \frac{\lim_{n \to \infty} 1 - \frac{1}{n^2}}{\lim_{n \to \infty} 3 + \frac{1}{n} - \frac{2}{n^2}} \\ &= \frac{\lim_{n \to \infty} 1 - \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n^2}}{\lim_{n \to \infty} 3 + \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} - \lim_{n \to \infty} \frac{2}{n^2}} \\ &= \frac{1 - 0}{3 + 0 - 0} = \frac{1}{3}. \end{split}$$

c.

$$\begin{split} \lim_{n \to \infty} \frac{3n^2 + 2}{n^2 - n} &= \lim_{n \to \infty} \frac{3 + \frac{2}{n^2}}{1 - \frac{1}{n}} \\ &= \frac{\lim_{n \to \infty} 3 + \frac{2}{n^2}}{\lim_{n \to \infty} 1 - \frac{1}{n}} \\ &= \frac{\lim_{n \to \infty} 3 + \lim_{n \to \infty} \frac{2}{n^2}}{\lim_{n \to \infty} 1 - \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n}} \\ &= \frac{3 + 0}{1 - 0} = 3 \end{split}$$

Ejercicio 4.8. * Dar un ejemplo de sucesiones que cumplan las siguientes condiciones, o, en caso de no existir ninguna, explicar porqué.

- a. Dos sucesiones $(x_n)_{n=1}^\infty$ e $(y_n)_{n=1}^\infty$ que divergen pero $(x_n+y_n)_{n=1}^\infty$ converge. b. Dos sucesiones $(x_n)_{n=1}^\infty$ e $(y_n)_{n=1}^\infty$ que convergen pero $(x_n+y_n)_{n=1}^\infty$ diverge. c. Una sucesión $(x_n)_{n=1}^\infty$ que converge y otra $(y_n)_{n=1}^\infty$ que diverge, pero tales que $(x_n + y_n)_{n=1}^{\infty}$ converge.
- d. Una sucesión $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ que converge y otra $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ que diverge, pero tales que $(x_n y_n)_{n=1}^{\infty}$ converge.
- e. Dos sucesiones divergentes $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ e $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ con $y_n \neq 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$ tales que $\left(\frac{x_n}{y_n}\right)_{n=1}^{\infty}$ converge.

Solución

- a. $(n)_{n=1}^{\infty}$ y $(-n)_{n=1}^{\infty}$ divergen, pero $(n+(-n))_{n=1}^{\infty}=(0)_{n=1}^{\infty}$ converge por ser
- b. No es posible (ver proposición).
- c. Para ver que no es posible, daremos una demostración por reducción al absurdo. Supongamos que $(x_n+y_n)_{n=1}^\infty$ converge. Entonces, como $(x_n)_{n=1}^\infty$ converge, se tiene que $((x_n + y_n) - x_n)_{n=1}^{\infty} = (y_n)_{n=1}^{\infty}$ también converge (ver proposición, con lo que se llega a una contradicción pues partíamos de que $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ es divergente.
- d. $\left(\frac{1}{n}\right)_{n=1}^{\infty}$ converge y $((-1)^n)_{n=1}^{\infty}$ diverge, pero $\left(\frac{(-1)^n}{n}\right)_{n=1}^{\infty}$ converge.
- e. $(n)_{n=1}^{\infty}$ es divergente, pero $\left(\frac{n}{n}\right)_{n=1}^{\infty}=(1)_{n=1}^{\infty}$ converge por ser constante. Otro ejemplo son $((-1)^{n+1})_{n=1}^{\infty}$ y $((-1)^n)_{n=1}^{\infty}$ que divergen, pero $(\frac{(-1)^{n+1}}{(-1)^n})_{n=1}^{\infty}=(\frac{(-1)^n(-1)}{(-1)^n})_{n=1}^{\infty}=(-1)_{n=1}^{\infty}$ converge al ser constante.

Ejercicio 4.9. Demostrar que si una sucesión de números reales $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ converge un número x, entonces la sucesión $(x_n - x)_{n=1}^{\infty}$ converge a 0.

Solución

Supongamos que $\lim_{n\to\infty} x_n = x$. Entonces, para cualquier $\varepsilon>0$ existe $k\in\mathbb{N}$ tal que $|x_n-x|<\varepsilon\ \forall n\geq k$, pero entonces es obvio que $|(x_n-x)-0|<\varepsilon\ \forall n\geq k$, por lo que $\lim_{n\to\infty} x_n-x=0$.

Ejercicio 4.10. Dado un polinomio p(x), demostrar que si $\lim_{n\to\infty} x_n = x$ entonces $\lim_{n\to\infty} p(x_n) = p(x)$.

Solución

Sea $p(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_mx^m$ un polinomio cualquiera y supongamos que $\lim_{n\to\infty}x_n=x$. Entonces,

$$\begin{split} \lim_{n\to\infty} p(x_n) &= \lim_{n\to\infty} a_0 + a_1 x_n + \dots + a_m x_n^m \\ &= \lim_{n\to\infty} a_0 + \lim_{n\to\infty} a_1 x_n + \dots + \lim_{n\to\infty} a_m x_n^m \\ &= \lim_{n\to\infty} a_0 + \lim_{n\to\infty} a_1 \lim_{n\to\infty} x_n + \dots + \lim_{n\to\infty} a_m \lim_{n\to\infty} x_n^m \\ &= \lim_{n\to\infty} a_0 + \lim_{n\to\infty} a_1 \lim_{n\to\infty} x_n + \dots + \lim_{n\to\infty} a_m (\lim_{n\to\infty} x_n)^m \\ &= a_0 + a_1 x + \dots + a_m x^m = p(x). \end{split}$$

Ejercicio 4.11. Demostrar que si una sucesión de números reales converge a x, entonces la sucesión de sus valores absolutos converge a |x|. ¿Es cierto lo contrario?

Solución

Supongamos que $\lim_{n\to\infty}x_n=x$. Entonces, para cualquier $\varepsilon>0$ existe $k\in\mathbb{N}$ tal que $|x_n-x|<\varepsilon\ \forall n\geq k$, pero entonces, aplicando la desigualdad triangular, también se tiene que $||x_n|-|x||\leq |x_n-x|<\varepsilon\ \forall n\geq k$, por lo que $\lim_{n\to\infty}|x_n|=|x|$.

Ejercicio 4.12. Demostrar que si una sucesión de números reales no negativos converge a x, entonces la sucesión de sus raíces cuadradas positivas converge a \sqrt{x} .

Veamos primero el caso en que x=0. Supongamos que $\lim_{n\to\infty}x_n=0$. Dado $\varepsilon>0$ sea $\varepsilon_1=\varepsilon^2>0$, entonces existe $k\in\mathbb{N}$ tal que $|x_n-0|=|x_n|<\varepsilon_1\ \forall n\geq k$, pero entonces, también se cumple que

$$|\sqrt{x_n} - \sqrt{0}| = |\sqrt{x_n}| = \sqrt{x_n} < \sqrt{\varepsilon_1} = \sqrt{\varepsilon^2} = \varepsilon.$$

Luego $\lim_{n\to\infty} \sqrt{x_n} = \sqrt{0}$.

Supongamos ahora que x>0 y $\lim_{n\to\infty}x_n=x$. Dado $\varepsilon>0$ sea $\varepsilon_2=\varepsilon\sqrt{x}>0$, entonces existe $k\in\mathbb{N}$ tal que $|x_n-x|<\varepsilon_2$ $\forall n\geq k$, pero entonces, también se cumple que

$$\begin{split} |\sqrt{x_n} - \sqrt{x}| &= \left| \frac{(\sqrt{x_n} - \sqrt{x})(\sqrt{x_n} + \sqrt{x})}{\sqrt{x_n} + \sqrt{x}} \right| \\ &= \frac{|(\sqrt{x_n})^2 - (\sqrt{x})^2|}{\sqrt{x_n} + \sqrt{x}} = \frac{|x_n - x|}{\sqrt{x_n} + \sqrt{x}} \\ &\leq \frac{|x_n - x|}{\sqrt{x}} < \frac{\varepsilon_2}{\sqrt{x}} = \frac{\varepsilon \sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \varepsilon. \end{split}$$

Luego $\lim_{n\to\infty} \sqrt{x_n} = \sqrt{x}$.

Ejercicio 4.13. Demostrar que si $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión de números reales acotada e $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ es otra sucesión que converge a 0, entonces la sucesión $(x_ny_n)_{n=1}^{\infty}$ también converge a 0.

Solución

Sea c una cota de la sucesión $(x_n)_{n=1}^\infty$, es decir, $|x_n| \leq c \ \forall n \in \mathbb{N}$, y supongamos que $\lim_{n \to \infty} y_n = 0$. Dado $\varepsilon > 0$, sea $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{c} > 0$, entonces existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $|y_n - 0| = |y_n| < \varepsilon' \ \forall n \geq k$, pero entonces, también se cumple que

$$|x_ny_n-0|=|x_ny_n|=|x_n||y_n|\leq c\varepsilon'=c\frac{\varepsilon}{c}=\varepsilon.$$

Luego $\lim_{n\to\infty} x_n y_n = 0$.

Ejercicio 4.14. \star Demostrar las siguientes sucesiones convergen a 0.

a.
$$\left(\frac{n+\cos(n)}{n^2+1}\right)_{n=1}^{\infty}$$

b.
$$\left(\frac{2^n}{n!}\right)_{n=1}^{\infty}$$

c.
$$\left(\frac{n^2}{2^n}\right)_{n=1}^{\infty}$$

a. Como $-1 \leq \cos(n) \leq 1$ se tiene que $\frac{n-1}{n^2+1} \leq \frac{n+\cos(n)}{n^2+1} \leq \frac{n+1}{n^2+1} \ \forall n \in \mathbb{N}.$ Como

$$\begin{split} \lim_{n \to \infty} \frac{n-1}{n^2 + 1} &= \lim_{n \to \infty} \frac{\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{1}{n^2}} \\ &= \frac{\lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} - \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n^2}}{\lim_{n \to \infty} 1 + \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n^2}} \\ &= \frac{0 - 0}{1 + 0} = 0. \end{split}$$

y del mismo modo, se puede probar que $\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n^2+1}=0$, por lo que aplicando el teorema de compresión de sucesiones convergentes se concluye que $\lim_{n\to\infty}\frac{n+\cos(n)}{n^2+1}=0$.

b. Como

$$\begin{split} \lim_{n \to \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} &= \lim_{n \to \infty} \frac{\frac{2^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{2^n}{n!}} = \lim_{n \to \infty} \frac{2^{n+1}n!}{2^n(n+1)!} \\ &= \lim_{n \to \infty} \frac{2^n 2n!}{2^n(n+1)n!} = \lim_{n \to \infty} \frac{2}{n+1} = 0 < 1, \end{split}$$

por el criterio del cociente se tiene que $\lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{n!} = 0$.

c. Como

$$\lim_{n \to \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \to \infty} \frac{\frac{(n+1)^2}{2^{n+1}}}{\frac{n^2}{2^2}} = \lim_{n \to \infty} \frac{2^n (n+1)^2}{2^{n+1} n^2}$$

$$= \lim_{n \to \infty} \frac{(n+1)^2}{2n^2} = \lim_{n \to \infty} \frac{n^2 + 2n + 1}{2n^2}$$

$$= \lim_{n \to \infty} \frac{1}{2} + \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2}$$

$$= \lim_{n \to \infty} \frac{1}{2} + \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} + \lim_{n \to \infty} \frac{1}{2n^2} = \frac{1}{2} < 1,$$

por el criterio del cociente se tiene que $\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{2^n}=0.$

Ejercicio 4.15. \star Demostrar que las siguientes sucesiones de números reales son monótonas y calcular su límite cuando exista.

a.
$$\left(\frac{3n}{2n^2}\right)_{n=1}^{\infty}$$

b.
$$x_1 = 1 \text{ y } x_{n+1} = \frac{x_n + 3}{2} \ \forall n \in \mathbb{N}$$

c.
$$\left(\frac{n^2}{2n+1}\right)_{n=1}^{\infty}$$

d.
$$x_1 = 1$$
 y $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 6} \ \forall n \in \mathbb{N}$

e.
$$x_1 = 1$$
 y $x_{n+1} = \sqrt{4x_n} \ \forall n \in \mathbb{N}$

- a. $\left(\frac{3n}{2n^2}\right)_{n=1}^{\infty}=\left(\frac{3}{2}\frac{1}{n}\right)_{n=1}^{\infty}$, que es decreciente al ser $\left(\frac{1}{n}\right)_{n=1}^{\infty}$ decreciente. Como además está acotada, por el teorema de la convergencia de sucesiones monótonas, se tiene que $\lim_{n\to\infty}x_n=\inf\left\{\frac{3}{2n}:n\in\mathbb{N}\right\}=0$.
- b. Veamos que la sucesión es creciente por inducción. $x_1=1<2=x_2$. Supongamos ahora que $x_{n-1}< x_n$. Entonces, $x_{n+1}=\frac{x_n+3}{2}>\frac{x_{n-1}+3}{2}=x_n$.

Veamos ahora que 3 es una cota superior de la sucesión también por inducción. $x_1=1<3$. Supongamos que $x_n<3$. Entonces, $x_{n+1}=\frac{x_n+3}{2}<\frac{3+3}{2}=3$.

Así pues, según el teorema de la convergencia de sucesiones monótonas la sucesión converge. Para calcular el límite, aprovechando la definición recursiva de la sucesión se tiene

$$x = \lim_{n \to \infty} x_n = \lim_{n \to \infty} x_{n+1} = \lim_{n \to \infty} \frac{x_n + 3}{2} = \frac{x + 3}{2}$$

Resolviendo la ecuación se tiene

$$x = \frac{x+3}{2} \Rightarrow 2x = x+3 \Rightarrow x = 3.$$

c. Para ver que la sucesión es creciente, probaremos que la sucesión de sus inversos es decreciente.

$$\left(\frac{n^2}{2n+1}\right)^{-1} = \frac{2n+1}{n^2} = \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2} > \frac{2}{n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} \ \forall n \in \mathbb{N}.$$

Sin embargo, la sucesión no está acotada, ya que para cualquier $c \in \mathbb{R}$, por la propiedad arquimediana existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $c < n < \frac{n^2}{2n+1} = x_n$ si n > 2. Por tanto, según el el teorema de la convergencia de sucesiones monótonas la sucesión diverge.

d. Veamos que la sucesión es creciente por inducción. $x_1=1<\sqrt{7}=x_2$. Supongamos ahora que $x_{n-1}< x_n$. Entonces, $x_{n+1}=\sqrt{x_n+6}>\sqrt{x_{n-1}+6}=x_n$.

Veamos ahora que 3 es una cota superior de la sucesión también por inducción. $x_1=1<3$. Supongamos que $x_n<3$. Entonces, $x_{n+1}=\sqrt{x_n+6}<\sqrt{3+6}=3$.

Así pues, según el teorema de la convergencia de sucesiones monótonas la sucesión converge. Para calcular el límite, aprovechando la definición recursiva de la sucesión se tiene

$$x = \lim_{n \to \infty} x_n = \lim_{n \to \infty} x_{n+1} = \lim_{n \to \infty} \sqrt{x_n + 6} = \sqrt{x + 6}$$

Resolviendo la ecuación se tiene

$$x = \sqrt{x+6} \Rightarrow x^2 = x+6 \Rightarrow x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow x = -2 \text{ o } x = 3.$$

Como x = -2 no puede ser al ser todos los términos de la sucesión positivos, se concluye que x = 3.

e. Veamos que la sucesión es creciente por inducción. $x_1=1<2=x_2$. Supongamos ahora que $x_{n-1}< x_n$. Entonces, $x_{n+1}=\sqrt{4x_n}>\sqrt{4x_{n-1}}=x_n$. Veamos ahora que 4 es una cota superior de la sucesión también por inducción. $x_1=1<4$. Supongamos que $x_n<4$. Entonces, $x_{n+1}=\sqrt{4x_n}<\sqrt{4\cdot 4}=4$. Así pues, según el teorema de la convergencia de sucesiones monótonas la sucesión converge. Para calcular el límite, aprovechando la definición recursiva

$$x = \lim_{n \to \infty} x_n = \lim_{n \to \infty} x_{n+1} = \lim_{n \to \infty} \sqrt{4x_n} = \sqrt{4x}$$

Resolviendo la ecuación se tiene

de la sucesión se tiene

$$x = \sqrt{4x} \Rightarrow x^2 = 4x \Rightarrow x^2 - 4x = 0 \Rightarrow x(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ o } x = 4.$$

Como x=0 no puede ser al ser $x_n \ge 1 \ \forall n \in \mathbb{N}$, se concluye que x=4.

Ejercicio 4.16. * Dado un segmento como el de la figura de más abajo,



tal que $\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b} = \varphi$. A este número se le conoce como número áureo y es el número

irracional $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1.618033988749...$

Demostrar que este número es el límite de las siguientes sucesiones de números reales.

a.
$$x_1=1$$
 y $x_{n+1}=1+\frac{1}{x_n}$ $\forall n\in\mathbb{N}$
b. $x_1=1$ y $x_{n+1}=\sqrt{1+x_n}$ $\forall n\in\mathbb{N}$

b.
$$x_1 = 1 \text{ y } x_{n+1} = \sqrt{1 + x_n} \ \forall n \in \mathbb{N}$$

Solución

a. Veamos en primer lugar que la sucesión está acotada. De la definición resulta obvio que $x_n \geq 1 \ \forall n \in \mathbb{N}$. De esto se deduce que, $\frac{1}{x_n} \leq 1 \Leftrightarrow 1 + \frac{1}{x_n} \leq 2$ $\forall n \in \mathbb{N}$. Así pues, $1 \le x_n \le 2 \ \forall n \in \mathbb{N}$.

Veamos ahora que la subsucesión de los términos impares $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ $(x_{2n-1})_{n=1}^{\infty}$ converge. Para ello veremos que es creciente por inducción. $y_1=$ $1 < y_2 = 1.5$. Supongamos que $y_{n-1} < y_n$. Entonces,

$$\begin{split} y_{n+1} &= x_{2(n+1)-1} = x_{2n+1} = 1 + \frac{1}{x_{2n}} \\ &= 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x_{2n-1}}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{y_n}} \\ &> 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{y_{n-1}}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x_{2n-3}}} \\ &= 1 + \frac{1}{x_{2n-2}} = x_{2n-1} = y_n. \end{split}$$

Como la subsucesión también está acotada, por el teorema de la convergencia de sucesiones monótonas converge. Para calcular el límite, aprovechando la definición recursiva de la sucesión se tiene

$$y = \lim_{n \to \infty} y_n = \lim_{n \to \infty} y_{n+1} = \lim_{n \to \infty} 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{y_n}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{y}}$$

Resolviendo la ecuación se tiene

$$\begin{split} y &= 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{y}} \Rightarrow y - 1 = \frac{1}{\frac{y+1}{y}} = \frac{y}{y+1} \\ &\Rightarrow (y-1)(y+1) = y \\ &\Rightarrow y^2 - 1 = y \Rightarrow y^2 - y - 1 = 0 \\ &\Rightarrow y = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \text{ o } y = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}. \end{split}$$

Como $y=\frac{1-\sqrt{5}}{2}<0$ no puede ser al ser todos los términos de la sucesión positivos, se tiene que $y=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Del mismo modo se puede probar que la subsucesión de los términos pares $(z_n)_{n=1}^\infty=(x_{2n})_{n=1}^\infty$ también converge a $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Finalmente, se deja como ejercicio probar que si las subsucesiones de los términos pares e impares de una sucesión convergen al mismo límite, entonces la sucesión converge al mismo límite.

b. Veamos que la sucesión es creciente por inducción. $x_1=1<\sqrt{2}=x_2$. Supongamos ahora que $x_{n-1}< x_n$. Entonces, $x_{n+1}=\sqrt{1+x_n}>\sqrt{1+x_{n-1}}=x_n$. Veamos ahora que 2 es una cota superior de la sucesión también por inducción. $x_1=1<2$. Supongamos que $x_n<2$. Entonces, $x_{n+1}=\sqrt{1+x_n}<\sqrt{1+2}=\sqrt{3}<2$.

Así pues, según el teorema de la convergencia de sucesión es monótonas la sucesión converge. Para calcular el límite, aprovechando la definición recursiva de la sucesión se tiene

$$x = \lim_{n \to \infty} x_n = \lim_{n \to \infty} x_{n+1} = \lim_{n \to \infty} \sqrt{1 + x_n} = \sqrt{1 + x}$$

Resolviendo la ecuación se tiene

$$x = \sqrt{1+x} \Rightarrow x^2 = 1 + x \Rightarrow x^2 - x - 1 = 0$$
$$\Rightarrow x = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \text{ o } x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}.$$

Como $x = \frac{1-\sqrt{5}}{2} < 0$ no puede ser al ser todos los términos de la sucesión positivos, se concluye que $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Ejercicio 4.17. Dada una sucesión de números reales tal que $\lim_{n\to\infty} x_n = x$, probar o refutar las siguientes proposiciones:

- a. Si cada x_n es una cota superior de un conjunto A, entonces x es también una cota superior de A.
- b. Si $x_n \in \overline{(a,b)} \ \forall n \in \mathbb{N}$, entonces $x \in \overline{(a,b)}$.
- c. Si $x_n \in \mathbb{Q} \ \forall n \in \mathbb{N}$, entonces $x \in \mathbb{Q}$.

a. Si x_n es cota superior de $A \ \forall n \in \mathbb{N}$, se tiene que para cualquier $a \in A, a \leq x_n$. Veamos que entonces que $a \leq x$ por reducción al absurdo. Supongamos que existe $a \in A$ tal que $a \leq x_n \ \forall n \in \mathbb{N}$ pero a > x. Como $\lim_{n \to \infty} x_n = x$, se tiene que para $\varepsilon = a - x > 0$ existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $|x_n - x| \leq a - x \ \forall n \geq k$, pero entonces también se cumple

$$|x_n - x| = x_n - x < a - x \Rightarrow x_n < a,$$

por lo que x_n no sería cota superior de A, así que, necesariamente x tiene que ser cota superior de A.

- b. Como $\overline{(a,b)}$ es un conjunto cerrado, para demostrar la proposición basta aplicar este teorema.
- c. Veamos que la proposición es falsa con un contraejemplo. La sucesión $x_1=1$ y $x_{n+1}=\frac{1}{1+x_n}$ $\forall n=2,3,...$ está formada por números racionales, sin embargo, su límite es el número irracional $\varphi=\frac{1+\sqrt{5}}{2}=1.618033988749...$ (ver Ejercicio 4.16).

Ejercicio 4.18. * Una cuenta de ahorro ofrece el primer año un tipo de interés $x_1 = 0.5\%$ y los años sucesivos un interés $x_{n+1} = \frac{3}{2+x_n}\%$. Si se mantiene la cuenta abierta por un periodo indefinido, ¿hacia donde tienden los tipos de interés?

Solución

a. Veamos en primer lugar que la sucesión está acotada. De la definición resulta obvio que $x_n \geq 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$ pues todos los términos son positivos. De esto se deduce que, $\frac{3}{2+x_n} \leq \frac{3}{2} \ \forall n \in \mathbb{N}$. Así pues, $0 \leq x_n \leq \frac{3}{2} \ \forall n \in \mathbb{N}$.

Veamos ahora que la subsucesión de los términos impares $(y_n)_{n=1}^{\infty} = (x_{2n-1})_{n=1}^{\infty}$ converge. Para ello veremos que es creciente por inducción. $y_1 = 0.5 < y_2 = 0.9375$. Supongamos que $y_{n-1} < y_n$. Entonces,

$$\begin{split} y_{n+1} &= x_{2(n+1)-1} = x_{2n+1} = \frac{3}{2+x_{2n}} \\ &= \frac{3}{2+\frac{3}{2+x_{2n-1}}} = \frac{3}{2+\frac{3}{2+y_n}} \\ &> \frac{3}{2+\frac{3}{2+y_{n-1}}} = \frac{3}{2+\frac{3}{2+x_{2n-3}}} \\ &= \frac{3}{2+x_{2n-2}} = x_{2n-1} = y_n. \end{split}$$

Como la subsucesión también está acotada, por el teorema de la convergencia de sucesiones monótonas converge. Para calcular el límite, aprovechando la definición recursiva de la sucesión se tiene

$$y = \lim_{n \to \infty} y_n = \lim_{n \to \infty} y_{n+1} = \lim_{n \to \infty} \frac{3}{2 + \frac{3}{2 + y_n}} = \frac{3}{2 + \frac{3}{2 + y}}$$

Resolviendo la ecuación se tiene

$$y = \frac{3}{2 + \frac{3}{2 + y}} \Rightarrow y = \frac{3}{\frac{(4 + 2y) + 3}{2 + y}} = \frac{3(2 + y)}{2y + 7}$$
$$\Rightarrow y(2y + 7) = 3y + 6$$
$$\Rightarrow 2y^2 + 4y - 6 = 0$$
$$\Rightarrow y = -3 \text{ o } y = 1.$$

Como y = -3 no puede ser al ser todos los términos de la sucesión positivos, se tiene que y = 1.

Del mismo modo se puede probar que la subsucesión de los términos pares $(z_n)_{n=1}^{\infty}=(x_{2n})_{n=1}^{\infty}$ también converge a 1.

Finalmente, como las subsucesiones de los términos pares e impares de una sucesión convergen al mismo límite, entonces la sucesión converge al mismo límite.

Ejercicio 4.19. Determinar cuáles de las siguientes sucesiones de números reales son de Cauchy.

a.
$$\left(\frac{(-1)^n}{n}\right)_{n=1}^{\infty}$$

b.
$$\left(\frac{n}{n+1}\right)_{n=1}^{\infty}$$

c.
$$\left(\frac{\operatorname{sen}(n)}{n}\right)_{n=1}^{\infty}$$

d.
$$(x_n)_{n=1}^{\infty}$$
 con

$$x_n = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{si } n \text{ es par} \\ 1 + \frac{1}{n} & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

Solución

a. Es una sucesión de Cauchy ya que converge a 0, pues las subsucesiones de los términos pares e impares, convergen a 0 al ser monótonas y acotadas.

b. Es una sucesión de Cauchy ya que converge a 1, pues

$$\begin{split} \lim_{n\to\infty} x_n &= \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1+\frac{1}{n}} \\ &= \frac{\lim_{n\to\infty} 1}{\lim_{n\to\infty} 1 + \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}} = \frac{1}{1} = 1. \end{split}$$

c. Es una sucesión de Cauchy ya que converge a 0. Para probarlo, dado $\varepsilon>0$, por la propiedad arquimediana, existe $k\in\mathbb{N}$ tal que $\frac{2}{k}<\varepsilon$. Por tanto, para cualquier $n,m\geq k$ se tiene

$$\begin{split} |x_n - x_m| &= \left|\frac{\operatorname{sen}(n)}{n} - \frac{\operatorname{sen}(m)}{m}\right| \leq \left|\frac{\operatorname{sen}(n)}{n}\right| + \left|\frac{\operatorname{sen}(m)}{m}\right| \\ &\leq \frac{1}{n} + \frac{1}{m} \leq \frac{1}{k} + \frac{1}{k} = \frac{2}{k} < \varepsilon. \end{split}$$

d. No es una sucesión de Cauchy, pues tomando $\varepsilon = 1/2$, para cualquier $k \in \mathbb{N}$, si $n \geq k$, entonces n o n+1 debe ser impar, y suponiendo que es n+1 (la otra suposición lleva a un razonamiento similar) se tiene

$$\begin{split} |x_n - x_{n+1}| &\geq ||x_{n+1}| - |x_n|| = \left| \left(1 + \frac{1}{n+1} \right) - \frac{1}{n} \right| \\ &= 1 - \frac{1}{n(n+1)} \geq 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \varepsilon. \end{split}$$

Por tanto, la sucesión no converge.

5 Límites de funciones

Ejercicio 5.1. Sea f(x)=c una función constante. Demostrar que $\lim_{x\to a}f(x)=c$ $\forall a\in\mathbb{R}.$

Solución

Para cualquier $\varepsilon>0$ se puede tomar $\delta=1$ tal que si $|x-a|<\delta=1$, entonces $|f(x)-c|=|c-c|=0<\varepsilon$.

Ejercicio 5.2. * Dada la función f(x)=4x-10, demostrar usando la definición de límite que $\lim_{x\to 3} f(x)=2$.

Solución

Para cualquier $\varepsilon > 0$ se puede tomar $\delta = \frac{\varepsilon}{4}$ tal que si $|x - 3| < \delta = \frac{\varepsilon}{4}$, entonces

$$|f(x)-2| = |4x-10-2| = |4x-12| = 4|x-3| < 4\frac{\varepsilon}{4} = \varepsilon.$$

Ejercicio 5.3. * Dada la función $f(x) = \frac{|x|}{x}$, usar el criterio de las sucesiones para demostrar que no existe el límite de f en 0.

Solución

Tomando las sucesión $\left(\frac{-1}{n}\right)_{n=1}^{\infty}$ que converge a 0, se tiene

$$\lim_{n\to\infty} f\left(\frac{-1}{n}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{|-1/n|}{-1/n} = -1.$$

Y tomando la sucesión $\left(\frac{1}{n}\right)_{n=1}^{\infty}$ que también converge a 0, se tiene

$$\lim_{n \to \infty} f\left(\frac{1}{n}\right) = \lim_{n \to \infty} \frac{|1/n|}{1/n} = 1.$$

Por tanto, por el criterio de las sucesiones convergentes, no existe el límite de f en 0.

Ejercicio 5.4. La función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{si } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

se conoce como la función de Dirichlet. Demostrar que no existe el límite de f en cualquier número real.

Solución

Tomemos cualquier $a \in \mathbb{R}$ y sea $(x_n)_{n=1}^\infty$ una sucesión de números racionales que converja a a. Entonces la sucesión $(f(x_n))_{n=1}^\infty=(1)_{n=1}^\infty$ que converge a 1. Por otro lado, sea $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ una sucesión de números irracionales que converja a a. Entonces la sucesión $(f(y_n))_{n=1}^\infty=(0)_{n=1}^\infty$ que converge a 0. Por tanto, por el criterio de la sucesiones convergentes no existe el límite de f en a.

Ejercicio 5.5. \star Demostrar que no existe $\lim_{x\to 0} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$.

Solución

Tomando la sucesión $\left(\frac{1}{(2n-1)\pi/2}\right)_{n=1}^{\infty}$ que converge a 0, se tiene que

$$\lim_{n\to\infty}\cos\left(\frac{1}{\frac{1}{(2n+1)\pi/2}}\right)=\lim_{n\to\infty}\cos((2n-1)\pi/2)=0.$$

Y tomando la sucesión $\left(\frac{1}{2n\pi}\right)_{n=1}^{\infty}$, que también converge a 0, se tiene que

$$\lim_{n\to\infty}\cos\left(\frac{1}{\frac{1}{2n\pi}}\right)=\lim_{n\to\infty}\cos(2n\pi)=1.$$

Por tanto, por el criterio de las sucesiones convergentes, no existe el límite de $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ en 0.

Ejercicio 5.6. Dado un polinomio p(x), demostrar que $\lim_{x\to a} p(x) = p(a) \ \forall a \in \mathbb{R}$.



Solución

Sea $p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$, entonces, por el álgebra de límites se tiene,

$$\begin{split} \lim_{x \to a} p(x) &= \lim_{x \to a} a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n \\ &= \lim_{x \to a} a_0 + \lim_{x \to a} a_1 x + \lim_{x \to a} a_2 x^2 + \dots + \lim_{x \to a} a_n x^2 \\ &= a_0 + a_1 \lim_{x \to a} x + a_2 \lim_{x \to a} x^2 + \dots + a_n \lim_{x \to a} x^n \\ &= a_0 + a_1 a + a_2 a^2 + \dots + a_n a^n = p(a) \end{split}$$

Ejercicio 5.7. Dada una función racional $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} \ \forall x \in \mathbb{R}$ tal que $q(x) \neq 0$, demostrar que $\lim_{x \to a} f(x) = f(a) \ \forall a \in \mathbb{R}$ tal que $q(a) \neq 0$.

Solución

Sea $f(x)=\frac{p(x)}{q(x)}$ con p(x) y q(x) dos polinomios. Entonces, por el ejercicio anterior y el álgebra de límites se tiene que

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{\lim_{x\to a} p(x)}{\lim_{x\to a} q(x)} = \frac{p(a)}{q(a)} = f(a).$$

Ejercicio 5.8. * Demostrar, haciendo uso del teorema de compresión de funciones que $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(x)}{x} = 0$.

Solución

$$\begin{split} \lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} &= \lim_{x \to 0} \frac{(1 - \cos(x))(1 + \cos(x))}{x(1 + \cos(x))} = \lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos(x)^2}{x(1 + \cos(x))} \\ &= \lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)^2}{x(1 + \cos(x))} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} \frac{\sin(x)}{1 + \cos(x)} = \\ &= \lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} \lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{1 + \cos(x)} = 1 \cdot 0 = 0. \end{split}$$

Ejercicio 5.9. \star Calcular los siguientes límites si existen:

a.
$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2}$$

b.
$$\lim_{x \to 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^4 - 4x + 3}$$

c.
$$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen}(x+a) - \operatorname{sen}(a)}{x}$$

d.
$$\lim_{x \to \infty} \frac{x^2 - 3x + 2}{e^{2x}}$$

e.
$$\lim_{x \to \infty} \frac{\log(x^2 - 1)}{x + 2}$$

f.
$$\lim_{x \to 1} \frac{\log(1/x)}{\operatorname{tg}(x + \frac{\pi}{2})}$$

$$\text{g. } \lim_{x \to a} \frac{x^n - a^n}{x - a} \quad n \in \mathbb{N}$$

h.
$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[n]{x}-1}{\sqrt[m]{x}-1}$$
 $n,m\in\mathbb{Z}$

i.
$$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{tg}(x) - \operatorname{sen}(x)}{x^3}$$

j.
$$\lim_{x \to \pi/4} \frac{\operatorname{sen}(x) - \operatorname{cos}(x)}{1 - \operatorname{tg}(x)}$$

k.
$$\lim_{x\to 0} x^2 e^{1/x^2}$$

l.
$$\lim_{x\to 0} (1+x)^{1/x}$$

$$\mathrm{m.} \lim_{x \to \infty} \sqrt[x]{x^2}$$

$$\text{n. } \lim_{x \to 0} \left(\frac{1}{x}\right)^{\operatorname{tg}(x)}$$

o.
$$\lim_{x\to 0}(\cos x)^{1/\operatorname{sen}(x)}$$

p.
$$\lim_{x\to 0} \frac{6}{4+e^{-1/x}}$$

$$\text{q. } \lim_{x \to \infty} \Big(\sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 - 2x - 1} \Big).$$

r.
$$\lim_{x \to \pi/2} \sec x - \operatorname{tg}(x)$$

a.
$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2} = \lim_{x \to 2} \frac{(x + 3)(x - 2)}{x - 2} = \lim_{x \to 2} \frac{x + 3}{1} = 5.$$

b.

$$\begin{split} \lim_{x \to 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^4 - 4x + 3} &= \lim_{x \to 1} \frac{(x - 1)^2 (x + 2)}{(x - 1)^2 (x^2 + 2x + 3)} \\ &= \lim_{x \to 1} \frac{(x + 2)}{(x^2 + 2x + 3)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}. \end{split}$$

c. Aplicando la propiedad trigonométrica sen(x + a) = sen(x)cos(a) + cos(x)sen(a), se tiene

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin(x+a) - \sin(a)}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)\cos(a) + \cos(x)\sin(a) - \sin(a)}{x}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)\cos(a) - \sin(a)(1 - \cos(x))}{x}$$

$$= \cos(a)\lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} - \sin(a)\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos(x)}{x}$$

$$= \cos(a) \cdot 1 - \sin(a) \cdot 0 = \cos(a).$$

d. Como $x < e^x \ \forall x > 0$, se tiene que

$$0 < \frac{x}{2} < e^{x/2} \Rightarrow 0 < x < 2e^{x/2} \Rightarrow 0 < \frac{x}{e^{2x}} < \frac{2e^{x/2}}{e^{2x}} = \frac{2}{e^{3x/2}},$$

de modo que, como $\lim_{x\to\infty}\frac{2}{e^{3x/2}}=0$, aplicando el teorema de compresión de funciones se tiene que $\lim_{x\to\infty}\frac{x}{e^{2x}}=0$.

Usando este resultado se tiene,

$$\lim_{x \to \infty} \frac{x^2 - 3x + 2}{e^{2x}} = \lim_{x \to \infty} \frac{x^2}{e^{2x}} - 3 \lim_{x \to \infty} \frac{x}{e^{2x}} + \lim_{x \to \infty} \frac{2}{e^{2x}} = 0.$$

e. Cuando $x\to\infty, \frac{\log(x^2-1)}{x+2}\to\frac{\infty}{\infty}$ que es indeterminado. Aplicando la regla de L'Hôpital se tiene,

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\log(x^2-1)}{x+2}=\lim_{x\to\infty}\frac{1/x}{1}=0.$$

$$\text{f. } \lim_{x \to 1} \frac{\log(1/x)}{\operatorname{tg}(x + \frac{\pi}{2})} = \frac{\lim_{x \to 1} \log(1/x)}{\lim_{x \to 1} \operatorname{tg}(x + \frac{\pi}{2})} = \frac{\log(1)}{\operatorname{tg}(1 + \frac{\pi}{2})} = 0$$

g. $x^n-a^n=(x-a)(x^{n-1}+ax^{n-2}+a^2x^{n-3}+\cdots+a^{n-2}x+a^{n-1}\ \forall n\in\mathbb{N},\ n\geq 2.$ Así pues,

$$\lim_{x \to a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = \lim_{x \to a} \frac{(x - a)(x^{n-1} + ax^{n-2} + \dots + a^{n-2}x + a^{n-1})}{x - a}$$

$$= \lim_{x \to a} x^{n-1} + ax^{n-2} + \dots + a^{n-2}x + a^{n-1}$$

$$= a^{n-1} + \dots + a^{n-1} = na^{n-1}$$

h. Cuando $x\to 1$ $\frac{\sqrt[n]{x}-1}{\sqrt[n]{x}-1}\to \frac{0}{0}$ que es indeterminado. Aplicando la regla de L'Hôpital se tiene

$$\lim_{x \to 1} \frac{\sqrt[n]{x} - 1}{\sqrt[m]{x} - 1} = \lim_{x \to 1} \frac{x^{1/n} - 1}{x^{1/m} - 1} = \lim_{x \to 1} \frac{\frac{1}{n} x^{1/n - 1}}{\frac{1}{m} x^{1/m - 1}}$$
$$= \lim_{x \to 1} \frac{m x^{1/n - 1}}{n x^{1/m - 1}} = \frac{m}{n}.$$

i. Como $sen(x) \approx tg(x) \approx x$ cuando $x \to 0$, se tiene

$$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{tg}(x) - \operatorname{sen}(x)}{x^3} = \lim_{x \to 0} \frac{x - x}{x^3} = \lim_{x \to 0} \frac{0}{x^3} = 0.$$

j. Aplicando propiedades trigonométricas se tiene

$$\begin{split} \lim_{x \to \pi/4} \frac{\operatorname{sen}(x) - \operatorname{cos}(x)}{1 - \operatorname{tg}(x)} &= \lim_{x \to \pi/4} \frac{\operatorname{sen}(x) - \operatorname{cos} x}{1 - \frac{\operatorname{sen}(x)}{\operatorname{cos}(x)}} \\ &= \lim_{x \to \pi/4} \frac{\operatorname{sen}(x) - \operatorname{cos} x}{\frac{\operatorname{cos}(x) - \operatorname{sen}(x)}{\operatorname{cos}(x)}} \\ &= \lim_{x \to \pi/4} - \operatorname{cos}(x) = \frac{-\sqrt{2}}{2}. \end{split}$$

k. Cuando $x\to 0,\ x^2e^{1/x^2}\to 0\cdot\infty,$ que es indeterminado. Transformando la indeterminación en una de tipo cociente y aplicando la regla de L'Hôpital se tiene

$$\lim_{x\to 0} x^2 e^{1/x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{e^{1/x^2}}{1/x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{e^{1/x^2} \frac{-2}{x^3}}{-2/x^3} = \lim_{x\to 0} e^{1/x^2} = \infty.$$

l. Cuando $x \to 0$, $\ln(1+x) \approx x$, de manera que

$$\begin{split} \lim_{x \to 0} \left(1 + x\right)^{1/x} &= \lim_{x \to 0} e^{\ln(\left(1 + x\right)^{1/x})} = e^{\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1 + x)}{x}} \\ &= e^{\lim_{x \to 0} \frac{x}{x}} = e^{\lim_{x \to 0} 1} = e^{1} = e. \end{split}$$

m. Cuando $x \to \infty$ $\sqrt[x]{x^2} = x^{2/x} \to \infty^0$, que es intedeterminado. Transformando la indeterminación en una de tipo cociente y aplicando la regla de L'Hôpital, se tiene

$$\begin{split} \lim_{x \to \infty} \sqrt[x]{x^2} &= \lim_{x \to \infty} x^{2/x} = \lim_{x \to \infty} e^{\ln(x^{2/x})} \\ &= e^{\lim_{x \to \infty} \frac{2\ln(x)}{x}} = e^{\lim_{x \to \infty} \frac{2}{1}} = 1. \end{split}$$

$$\text{n. } \lim_{x \to 0} \left(\frac{1}{x}\right)^{\operatorname{tg}(x)}$$

o.
$$\lim_{x \to 0} (\cos x)^{1/\operatorname{sen}(x)}$$

p.
$$\lim_{x\to 0} \frac{6}{4+e^{-1/x}}$$

q.
$$\lim_{x \to \infty} \left(\sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 - 2x - 1} \right)$$
.

r.
$$\lim_{x \to \pi/2} \sec x - \operatorname{tg}(x)$$

Ejercicio 5.10. \star Dar ejemplo de funciones que cumplan las siguientes condiciones:

a.
$$\lim_{x\to 0} f(x) = +\infty$$
 y $\lim_{x\to \infty} f(x) = 0$.

b.
$$\lim_{x\to 3^+} f(x) = +\infty$$
, $\lim_{x\to 3^-} f(x) = -\infty$ y $\lim_{x\to \infty} f(x) = 1$.

c.
$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty$$
y $\lim_{x \to \infty} f(x) = -\infty$

a.
$$f(x) = \frac{1}{x^2}$$

b.
$$g(x) = \frac{x}{x-3}$$

a.
$$f(x) = \frac{1}{x^2}$$
.
b. $g(x) = \frac{x}{x-3}$.
c. $h(x) = -\ln(x)$.

Ejercicio 5.11. \star Sea $g(x) = e^{1/x} \ \forall x \neq 0$. Demostrar que no existe el límite de g en 0.

Basta con probar que el límite lateral por la derecha no existe. Para ello, tomando la sucesión de términos positivos $\left(\frac{1}{n}\right)_1^{\infty}$ que converge a 0, se tiene que

$$\lim_{n\to\infty}g\left(\frac{1}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{1}{1/n}}=\lim_{n\to\infty}e^n=\infty.$$

Así pues, según el criterio de las sucesiones convergentes, no existe el límite por la derecha de g en 0, y por tanto tampoco existe el límite.

Ejercicio 5.12. Dada la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2, \text{si } x \le 1, \\ ax - 1, \text{si } x > 1 \end{cases}$$

con $a \in \mathbb{R}$. ¿Para que valor de a existe el límite de f en 1?

Solución

Los límtes laterales en 1 valen

 $\lim_{x \to 1^{-}} f(x) = \lim_{x \to 1^{-}} x^{2} = 1^{2} = 1$. $\lim_{x \to 1^{+}} f(x) = \lim_{x \to 1^{+}} ax - 1 = a - 1$. Para que exista el límite de f en 1 debe ser $\lim_{x \to 1^{-}} f(x) = \lim_{x \to 1^{+}} f(x)$, es decir, 1 = a - 1, luego debe ser a = 2.

Ejercicio 5.13. * Calcular los límites laterales de la función $f(x) = \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{1-x}}}$ en el punto x = 1. ¿Existe el límite en ese punto?

Solución

$$\begin{split} \lim_{x \to 1^{-}} f(x) &= \lim_{x \to 1^{-}} \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{1 - x}}} = \frac{1}{1 + \lim_{x \to 1^{-}} e^{\frac{1}{1 - x}}} \\ &= \frac{1}{1 + e^{\lim_{x \to 1^{-}} \frac{1}{1 - x}}} = \frac{1}{1 + e^{\infty}} = \frac{1}{1 + \infty} = 0. \end{split}$$

$$\begin{split} \lim_{x \to 1^+} f(x) &= \lim_{x \to 1^+} \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{1-x}}} = \frac{1}{1 + \lim_{x \to 1^+} e^{\frac{1}{1-x}}} \\ &= \frac{1}{1 + e^{\lim_{x \to 1^+} \frac{1}{1-x}}} = \frac{1}{1 + e^{-\infty}} = \frac{1}{1 + 0} = 1. \end{split}$$

Como los límites laterales son distintos, no existe el límite de f en 1.

Ejercicio 5.14. * Calcular las asíntotas de las siguientes funciones:

a.
$$f(x) = (1 - x)e^x$$

b.
$$q(x) = xe^{1/x}$$

c.
$$h(x) = 2x^2 - \ln(x)$$

d.
$$i(x) = \log(x^2 + 3x + 2)$$

e.
$$j(x) = \frac{x^3}{(x+1)^2}$$

f.
$$k(x) = \cos x - \log(\cos x)$$

Solución

a. f está definida en \mathbb{R} , así que no tiene asíntotas verticales.

Para ver si f tiene asíntotas horizontales estudiamos los límites en el infinito. Cuando $x \to -\infty$ $(1-x)e^x \to -\infty \cdot 0$ que es indeterminado. Transformando la indeterminación en una de tipo cociente

$$\begin{split} \lim_{x \to -\infty} (1-x)e^x &= \lim_{x \to -\infty} \frac{1-x}{e^-x} = \lim_{x \to -\infty} \frac{1}{e^{-x}} - \lim_{x \to -\infty} \frac{-x}{e^{-x}} \\ &= 0 - \lim_{x \to -\infty} \frac{-x}{e^{-x}}. \end{split}$$

Por otro lado $\forall x < 0$ se cumple que $e^{-x} \ge x^2$ $0 \le \frac{-x}{e^{-x}} \le \frac{-x}{x^2} = \frac{1}{x}$, y como $\lim_{x \to -\infty} \frac{-1}{x} = 0$, por el teorema de compresión de funciones se tiene que $\lim_{x \to -\infty} \frac{-x}{e^{-x}} = 0$.

Así pues, y = 0 es una asíntota horizontal en $-\infty$.

Por otro lado, $\lim_{x\to\infty}(1-x)e^x=-\infty*\infty=-\infty$, de modo que no hay asíntota horizontal en ∞ .

Finalmente para ver si f tiene asíntotas oblicuas, estudiamos estudiamos el límite de f(x)/x en ∞ (en $-\infty$ no puede haber asíntota oblicua porque existe una horizontal).

$$\lim_{x\to\infty}\frac{(1-x)e^x}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1-x}{x}\lim_{x\to\infty}e^x=-1\cdot\infty=-\infty.$$

Por tanto, tampoco existe asíntota oblicua en ∞ .

b. g está definida en \mathbb{R} $\{0\}$, así que, el único punto donde pueden existir asíntotas verticales es x=0. Calculando los límites laterales se tiene

$$\begin{split} \lim_{x\to 0^-} x e^{1/x} &= \lim_{x\to 0^-} x \lim_{x\to 0^-} e^{1/x} = 0 \cdot e^- \infty = 0 \cdot 0 = 0. \\ \lim_{x\to 0^+} x e^{1/x} &= \lim_{x\to 0^+} \frac{e^{1/x}}{1/x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{(e^{1/x})'}{(1/x)'} \\ &= \lim_{x\to 0^+} \frac{e^{1/x} (1/x)'}{(1/x)'} = \lim_{x\to 0^+} e^{1/x} = \infty. \end{split} \tag{L'Hôpital}$$

Por tanto, g tiene asíntota vertical x=0 por la derecha, pero no por la izquierda.

Para ver si g tiene asíntotas horizontales estudiamos los límites en el infinito.

$$\lim_{x\to -\infty} x e^{1/x} = \lim_{x\to -\infty} x \lim_{x\to -\infty} e^{1/x} = \infty*1 = \infty.$$

$$\lim_{x\to \infty} x e^{1/x} = \lim_{x\to \infty} x \lim_{x\to \infty} e^{1/x} = \infty*1 = \infty.$$

Así pues, ambos límites no existen y, por tanto, g no tiene asíntotas horizontales

Finalmente para ver si f tiene asíntotas oblicuas, estudiamos estudiamos el límite de f(x)/x en $\pm \infty$.

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{xe^{1/x}}{x} = \lim_{x \to -\infty} e^{1/x} = e^0 = 1.$$

Luego, existe una asíntota oblicua en $-\infty$ con pendiente 1. Para ver el término independiente de la asíntota calculamos el límite de $f(x) - 1 \cdot x$ en $-\infty$.

$$\begin{split} \lim_{x \to -\infty} x e^{1/x} - x &= \lim_{x \to -\infty} x (e^{1/x} - 1) = \lim_{x \to -\infty} \frac{e^{1/x} - 1}{1/x} \\ &= \lim_{x \to -\infty} \frac{(e^{1/x} - 1)'}{(1/x)'} \\ &= \lim_{x \to -\infty} \frac{e^{1/x} (1/x)'}{(1/x)'} = \lim_{x \to -\infty} e^{1/x} = 1. \end{split}$$
 (L'Hôpital)

Así pues, g tiene una asíntota oblicua y=x+1 en $-\infty$. Del mismo modo se puede probar que esta misma recta es asíntota oblicua en ∞ .

c. h(x) está definida en \mathbb{R}^+ , así que, el único punto donde pueden existir asíntotas verticales x=0. Como h no está definida para x<0, estudiaremos el límite por la derecha en 0.

$$\lim_{x \to 0^+} 2x^2 - \ln(x) = 0 - \ln(0) = \infty$$

Por tanto, h tiene una asíntota vertical x=0 por la derecha, pero no por la izquierda.

Para ver si g tiene asíntotas horizontales estudiamos el límite en el infinito (en $-\infty$ no puede haber asíntota horizontal al no estar definida la función para x < 0).

$$\begin{split} \lim_{x \to \infty} 2x^2 - \ln(x) &= \lim_{x \to \infty} \ln(e^{2x^2 - \ln(x)}) = \lim_{x \to \infty} \ln\left(\frac{e^{2x^2}}{e^{\ln(x)}}\right) \\ &= \ln\left(\lim_{x \to \infty} \frac{e^{2x^2}}{x}\right) = \ln\left(\lim_{x \to \infty} \frac{(e^{2x^2})'}{x'}\right) \qquad \text{(L'Hôpital)} \\ &= \ln\left(\lim_{x \to \infty} \frac{e^{2x^2} 4x}{1}\right) = \ln(\infty) = \infty. \end{split}$$

Por tanto, h no tiene asíntotas horizontales.

Finalmente, veamos si existe asíntota oblicua en ∞ .

$$\lim_{x \to \infty} \frac{2x^2 - \ln(x)}{x} = \lim_{x \to \infty} 2x - \frac{\ln(x)}{x}$$

$$= \lim_{x \to \infty} 2x - \lim_{x \to \infty} \frac{\ln(x)}{x}$$

$$= \lim_{x \to \infty} 2x - \lim_{x \to \infty} \frac{(\ln(x))'}{x'}$$

$$= \lim_{x \to \infty} 2x - \lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} = \infty - 0 = \infty.$$
(L'Hôpital)

Luego, h tampoco tiene asíntota oblicua en ∞ .

Ejercicio 5.15. \star Mediante simulación por ordenador se ha podido cuantificar la cantidad de agua almacenada en un acuífero en función del tiempo, m(t), en millones de metros cúbicos, y el tiempo t en años transcurridos desde el instante en el que se ha hecho la simulación, teniendo en cuenta que la ecuación sólo tiene sentido para t > 0:

$$m(t) = 10 + \frac{\sqrt{t}}{e^t}$$

¿Qué cantidad de agua almacenada habrá en el acuífero asintóticamente?

Cuando \$t $\to \infty \frac{\sqrt{t}}{e^t} \to \frac{\infty}{\infty}$ que es indeterminado. Aplicando la regla de L'Hôpital se tiene

$$\lim_{t\to\infty}10+\frac{\sqrt{t}}{e^t}=10+\lim_{t\to\infty}\frac{\sqrt{t}}{e^t}=lim_{t\to\infty}\frac{1}{2\sqrt(t)e^t}=10.$$

Por tanto el volumen del lato tiende asintóticamente a 10 millones de metros cúbicos.

Ejercicio 5.16. \star La cosecha de trigo de una plantación (en toneladas) depende de la cantidad de abono x según la función $f(x) = T(1 - \frac{1}{2}e^{-kx})$, donde T es la extensión del terreno (en hectáreas) y k es la proporción de humedad. ¿Para qué cantidad de abono se conseguiría una cosecha de T toneladas de trigo?

Solución

Como k>0 se tiene $\frac{1}{2}e^{-kx}=\frac{1}{2e^{kx}}<1 \ \forall x>0$, de manera que $f(x)< T \ \forall x>0$. Si calculamos ahora el límite en infinito se tiene

$$\lim_{x \to \infty} T(1 - \frac{1}{2}e^{-kx}) = T(1 - \lim_{x \to \infty} \frac{1}{2e^{kx}}) = T(1 - 0) = T.$$

De modo la cantidad de trigo cosechada tiene asintóticamente a T, pero al ser menor que T, nunca llegará a valer T.

Ejercicio 5.17. Sea $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ una función creciente. Demostrar lo siguiente:

- a. Si f está acotada superiormente, entonces existe $\lim_{x\to b^-} f(x)$.
- b. Si f no está acotada superiormente, entonces $\lim_{x\to b^-} f(x) = \infty$.

Ejercicio 5.18. Demostrar que la función $f(x) = \cos(x)$ es continua en todo \mathbb{R} .

Ejercicio 5.19. ¿Qué tipo de discontinuidad presenta la función $f(x) = x \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ en x = 0? Redefinir la función para que sea continua en dicho punto.

Ejercicio 5.20. Estudiar la continuidad de las siguientes funciones en los puntos que se indican:

a.
$$f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$$
, en el punto $x = 0$.

b.

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1 + e^{1/x}}{1 - e^{1/x}} & \text{si } x \neq 0, \\ 1 & \text{si } x = 0, \end{cases}$$

en el punto x = 0.

c.

$$h(x) = \begin{cases} x \sin \frac{\pi}{x} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \end{cases}$$

en el punto x = 0.

d.

$$i(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{1/x}} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \end{cases}$$

en el punto x = 0.

Ejercicio 5.21. Clasificar las discontinuidades de las siguientes funciones

a.

$$f(x) = \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}}{\frac{3}{x-1} - \frac{1}{x}}.$$

b.

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} & \text{si } x < 0, \\ e^{\frac{1}{x-1}} & \text{si } x \ge 0. \end{cases}$$

Solución

a. A simple vista, podemos ver que se trata de una función racional y estará definida en todo $\mathbb R$ salvo en los puntos que anulen alguno de los denominadores. Dichos puntos son fáciles de obtener igualando a 0 los denominadores:

$$x = 0$$

$$x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1$$

$$x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

$$\frac{3}{x - 1} - \frac{1}{x} = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$$

Por tanto, obtenemos 4 punto de discontinuidad, que son: $x=0,\ x=1,\ x=-1$ y $x=-\frac{1}{2}.$

Para clasificar estas cuatro discontinuidades, tenemos que estudiar los correspondientes límites por la izquierda y por la derecha.

• Discontinuidad en x = 0:

$$\lim_{x \to 0^{-}} f(x) = \lim_{x \to 0^{-}} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}}{\frac{3}{x-1} - \frac{1}{x}} = \lim_{x \to 0^{-}} \frac{x-1}{(x+1)(2x+1)} = \lim_{x \to 0^{-}} \frac{-1}{1} = -1,$$

$$\lim_{x \to 0^{+}} f(x) = \lim_{x \to 0^{+}} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}}{\frac{3}{x-1} - \frac{1}{x}} = \lim_{x \to 0^{+}} \frac{x-1}{(x+1)(2x+1)} = \lim_{x \to 0^{+}} \frac{-1}{1} = -1.$$

Como ambos límites coinciden, se trata de una discontinuidad evitable.

• Discontinuidad en x = 1:

$$\lim_{x \to 1^{-}} f(x) = \lim_{x \to 1^{-}} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}}{\frac{3}{x-1} - \frac{1}{x}} = \lim_{x \to 1^{-}} \frac{x-1}{(x+1)(2x+1)} = \lim_{x \to 1^{-}} \frac{0}{6} = 0,$$

$$\lim_{x \to 1^{+}} f(x) = \lim_{x \to 1^{+}} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}}{\frac{3}{x-1} - \frac{1}{x}} = \lim_{x \to 1^{+}} \frac{x-1}{(x+1)(2x+1)} = \lim_{x \to 1^{+}} \frac{0}{6} = 0.$$

De nuevo, como ambos límites coinciden, se trata de una discontinuidad evitable.

• Discontinuidad en x = -1:

$$\lim_{x \to -1^{-}} f(x) = \lim_{x \to -1^{-}} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}}{\frac{3}{x-1} - \frac{1}{x}} = \lim_{x \to -1^{-}} \frac{x-1}{(x+1)(2x+1)} = \lim_{x \to -1^{-}} \frac{-2}{-0 \cdot -1} = -\infty,$$

$$\lim_{x \to -1^{+}} f(x) = \lim_{x \to -1^{+}} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}}{\frac{3}{x-1} - \frac{1}{x}} = \lim_{x \to -1^{+}} \frac{x-1}{(x+1)(2x+1)} = \lim_{x \to -1^{+}} \frac{-2}{+0 \cdot -1} = \infty.$$

Como ambos límites divergen, se trata de una discontinuidad de primera especie de salto infinito.

• Discontinuidad en $x = -\frac{1}{2}$:

$$\lim_{x \to -1/2^{-}} f(x) = \lim_{x \to -1/2^{-}} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}}{\frac{3}{x-1} - \frac{1}{x}} = \lim_{x \to -1/2^{-}} \frac{x-1}{(x+1)(2x+1)} = \lim_{x \to -1/2^{-}} \frac{-3/2}{1/2 \cdot -0} = +\infty,$$

$$\lim_{x \to -1/2^{+}} f(x) = \lim_{x \to -1/2^{+}} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x}}{\frac{3}{x-1} - \frac{1}{x}} = \lim_{x \to -1/2^{+}} \frac{x-1}{(x+1)(2x+1)} = \lim_{x \to -1/2^{+}} \frac{-2}{1/2 \cdot +0} = -\infty.$$

Por último, como ambos límites divergen, se trata también de una discontinuidad de primera especie de salto infinito.

b. La función $\frac{\text{sen}(x)}{x}$ es continua en \mathbb{R} {0} y en consecuencia es continua en la región donde está definida, es decir $(-\infty,0)$. Por su parte, la función $e^{\frac{1}{x-1}}$ es continua en todos los puntos en que sea continuo el exponente $\frac{1}{x-1}$, es decir en \mathbb{R} {1}, en consecuencia, es continua en toda la región en donde está definida, menos en el 1. Así pues, reduciremos el estudio de la continuidad a dos puntos, el 0 por ser donde cambia la definición de la función y el 1, por no estar definida la función $e^{\frac{1}{x-1}}$.

Estudiamos primero la continuidad en el punto x = 0:

$$\begin{split} & \lim_{x \to 0^{-}} f(x) = \lim_{x \to 0^{-}} \frac{\text{sen}(x)}{x} \overset{\text{L'Hôpital}}{=} \lim_{x \to 0^{-}} \frac{\cos x}{1} = 1, \\ & \lim_{x \to 0^{+}} f(x) = \lim_{x \to 0^{+}} e^{\frac{1}{x-1}} = e^{-1}. \end{split}$$

Como ambos límites laterales son distintos, en x=0 hay una discontinuidad de salto.

Estudiamos ahora la continuidad en el punto x = 1:

$$\begin{split} &\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} e^{\frac{1}{x-1}} = e^{-\infty} = 0, \\ &\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} e^{\frac{1}{x-1}} = e^{\infty} = \infty. \end{split}$$

Como el límite lateral por la derecha no existe, en x=1 hay una discontinuidad de segunda especie.

Ejercicio 5.22. Calcular una raíz de la función $f(x) = x^5 - x + 1$ con una aproximación de 2 decimales.

Ejercicio 5.23. Dadas dos funciones $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ continuas en [a, b] con f(a) < g(a) y f(b) > g(b), demostrar que existe $c \in (a, b)$ tal que f(c) = g(c).

Ejercicio 5.24. Demostrar que las siguientes ecuaciones tienen al menos una solución real.

a.
$$cos(x) = x$$
.

b.
$$e^x = -x$$
.

6 Derivadas de funciones

Ejercicio 6.1. Usando la definición de derivada, demostrar que la derivada de la función $f(x) = x^n \text{ es } f'(x) = nx^{n-1} \text{ donde } n \in \mathbb{N}.$

Solución

Ver Ejercicio 5.9 apartado (g).

Ejercicio 6.2. Demostrar que la función f(x) = |x-1| es continua en x=1 pero no es derivable en dicho punto.



Solución

Si calculamos los límites laterales tenemos

$$\lim_{x \to 1^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - 1} = \lim_{x \to 1^-} \frac{|x - 1| - |1 - 1|}{x - 1} = \lim_{x \to 1^-} \frac{-(x - 1)}{x - 1} = \lim_{x \to 1^-} -1 = -1.$$

$$\lim_{x \to 1^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - 1} = \lim_{x \to 1^+} \frac{|x - 1| - |1 - 1|}{x - 1} = \lim_{x \to 1^+} \frac{x - 1}{x - 1} = \lim_{x \to 1^+} 1 = 1.$$

Como el límite por la izquierda y por la derecha son distintos, no existe la derivada de f en 1.

Ejercicio 6.3. Estudiar si es derivable la función $f(x) = \sqrt[3]{x-1}$ en el punto x=1.



Solución

Si calculamos los límites laterales tenemos

$$\begin{split} \lim_{x \to 1} \frac{f(x) - f(a)}{x - 1} &= \lim_{x \to 1} \frac{\sqrt[3]{x - 1} - \sqrt[3]{1 - 1}}{x - 1} = \lim_{x \to 1} \frac{\sqrt[3]{x - 1}}{x - 1} \\ &= \lim_{x \to 1} \frac{\sqrt[3]{x - 1} \sqrt[3]{(x - 1)^2}}{(x - 1) \sqrt[3]{(x - 1)^2}} = \lim_{x \to 1} \frac{x - 1}{(x - 1) \sqrt[3]{(x - 1)^2}} \\ &= \lim_{x \to 1} \frac{1}{\sqrt[3]{(x - 1)^2}} = \infty. \end{split}$$

Como el límite no existe, no existe la derivada de f en 1.

Ejercicio 6.4. Estudiar la derivabilidad de f en los puntos $x=-1,\ x=2$ y x=3 siendo

$$f(x) = \begin{cases} \log(-x) & \text{si } x < -1, \\ \sin(\pi x) & \text{si } x \in [-1, 2], \\ x/2 & \text{si } x \in (2, 3), \\ 3/2 & \text{si } x \ge 3. \end{cases}$$

Solución

Las funciones de todos los trozos son derivables en todo su dominio, por lo que estudiaremos la derivada por la izquierda y por la derecha en cada uno de los puntos.

Derivabilidad en en x = -1:

$$f'^{-}(-1) = \frac{-1}{-1} = 1$$
$$f'^{+}(-1) = \pi \cos(-\pi) = -\pi$$

Como $f'^-(-1) \neq f'^+(-1)$ la función no es derivable en x=-1. Derivabilidad en en x=2:

$$f'^{-}(2) = \pi \cos(2\pi) = \pi$$
$$f'^{+}(2) = 1/2$$

Como $f'^-(2) \neq f'^+(2)$ la función no es derivable en x=2. Derivabilidad en en x=2:

$$f'^{-}(3) = 1/2$$
$$f'^{+}(3) = 0$$

Ejercicio 6.5. Estudiar la derivabilidad de las siguientes funciones y hallar la función derivada correspondiente en los puntos donde exista.

a.

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x & \text{si } x \le 0, \\ e^{-x} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

b. $g(x) = 2x + |x^2 - 2|$.

Solución

a. La función 1-x es un polinomio y por tanto es derivable en todo \mathbb{R} . Del mismo modo, la función e^{-x} es una función exponencial que también es derivable en todo \mathbb{R} . Por tanto, faltaría estudiar si existe la derivada en el punto donde cambia la definición de la función, es decir, en x=0. Estudiaremos la derivada por la izquierda y por la derecha en ese punto.

$$f'^{-}(0) = -1$$

 $f'^{+}(0) = -e^{0} = -1$

Como $f'^-(0)=f'^+(0)$ la función es derivable en x=0 y f'(0)=-1.

Así pues, la función derivada de f es

$$f'(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x \le 0, \\ -e^{-x} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

b. Para estudiar la derivabilidad de g primero vamos a expresar la función $|x^2-2|$ como una función a trozos. Para ello necesitamos saber en qué puntos la función x^2-2 es positiva, y en qué puntos es negativa. Si calculamos las raíces de esta función tenemos:

$$|x^2 - 2| = 0 \Leftrightarrow x^2 = 2 \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{2}.$$

Si estudiamos el signo en los intervalos definidos por las raíces, podemos comprobar fácilmente sin más que calcular la función en cualquier punto de los intervalos que x^2-2 es negativa en el intervalo $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$ y positiva en el resto de su dominio. Por tanto, podemos expresar el valor absoluto de la siguiente manera:

$$|x^{2}-2| = \begin{cases} x^{2}-2 & \text{si } x < -\sqrt{2}, \\ -x^{2}+2 & \text{si } -\sqrt{2} \le x \le \sqrt{2}, \\ x^{2}-2 & \text{si } x > \sqrt{2}. \end{cases}$$

y entonces, la función original puede expresarse como:

$$g(x) = \begin{cases} 2x + x^2 - 2 & \text{si } x < -\sqrt{2}, \\ 2x - x^2 + 2 & \text{si } -\sqrt{2} \le x \le \sqrt{2}, \\ 2x + x^2 - 2 & \text{si } x > \sqrt{2}. \end{cases}$$

Ahora, si estudiamos la derivabilidad de cada una de estas funciones en los trozos correspondientes, vemos que ambas son polinomios y por tanto son derivables en sus dominios. Faltaría por estudiar la derivabilidad en los puntos donde cambia la definición de la función. Para ello estudiamos la derivada por la izquierda y por la derecha en esos puntos. En el punto $x = -\sqrt{2}$ tenemos:

$$g'^{-}(-\sqrt{2}) = 2 - 2\sqrt{2}$$
$$g'^{+}(-\sqrt{2}) = 2 + 2\sqrt{2}$$

Y como ambas derivadas no coinciden la función no es derivable en $x=-\sqrt{2}$. En $x=\sqrt{2}$ tenemos:

$$g'^{-}(\sqrt{2}) = 2 - 2\sqrt{2}$$

$$g'^{+}(\sqrt{2}) = 2 + 2\sqrt{2}$$

Ambas derivadas no coinciden y tampoco es derivable en $x=\sqrt{2}$. Así pues, la derivada de g vale:

$$g'(x) = \begin{cases} 2 + 2x & \text{si } x < -\sqrt{2}, \\ 2 - 2x & \text{si } -\sqrt{2} < x < \sqrt{2}, \\ 2 + 2x & \text{si } x > \sqrt{2}. \end{cases}$$

Ejercicio 6.6. Dada la función

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen}(x)^2 & \text{si } x \le 0, \\ ax^2 + b & \text{si } 0 < x \le c, \\ \ln(x) & \text{si } c < x, \end{cases}$$

con $a, b, c \in \mathbb{R}$, ¿existe algún valor de las constantes de manera que la función sea continua y derivable en todo su dominio?

Solución

Estudiaremos primero la continuidad y luego la derivabilidad.

Las funciones $sen(x)^2$, $ax^2 + b$ y ln(x) son todas continuas en sus dominios, por tanto, basta con estudiar los puntos donde cambia la definición de la función.

En el punto x = 0 tenemos:

$$\lim_{x \to 0^{-}} f(x) = \lim_{x \to 0^{-}} \operatorname{sen}(x)^{2} = \operatorname{sen}(0)^{2} = 0,$$

$$\lim_{x \to 0^{+}} f(x) = \lim_{x \to 0^{+}} ax^{2} + b = a0^{2} + b = b,$$

$$f(0) = \operatorname{sen}(0)^{2} = 0.$$

Por tanto, la función será continua en x = 0 si y sólo si b = 0. En el punto x = c tenemos:

$$\begin{split} \lim_{x \to c^{-}} f(x) &= \lim_{x \to c^{-}} ax^{2} + b = ac^{2} + b, \\ \lim_{x \to c^{+}} f(x) &= \lim_{x \to c^{+}} \ln(x) = \ln(c), \\ f(c) &= ac^{2} + b. \end{split}$$

Luego la función será continua en x = c si y sólo si $ac^2 + b = \ln(c)$.

Por consiguiente, para que la función sea continua en todo su dominio deben cumplirse las dos ecuaciones siguientes:

$$\begin{cases} b = 0 \\ ac^2 + b = \ln(c) \end{cases}$$

Con la derivabilidad ocurre lo mismo pues las funciones $sen(x)^2$, $ax^2 + b$ y ln(x)son derivables en su dominio y basta con estudiar la derivada por la izquierda y por la derecha en los puntos donde cambia la definición de la función.

En el punto x=0 (imponemos b=0 pues de lo contrario la función no sería continua en este punto y tampoco derivable) tenemos:

$$f'^{-}(0) = 2\operatorname{sen}(0)\cos(0) = 0$$
$$f'^{+}(0) = 2a \cdot 0 = 0$$

Luego la función es derivable en x = 0 si y sólo si b = 0. En el punto x = c tenemos:

$$f'^{-}(c) = 2ac$$
$$f'^{+}(c) = 1/c$$

Luego, para que la función sea derivable en x=c, además de la condición de continuidad, se debe cumplir $2ac=\frac{1}{c}$.

Así pues, para que la función sea continua y derivable en todo su dominio deben cumplirse las tres ecuaciones siguientes:

$$\begin{cases} b = 0 \\ ac^2 + b = \ln(c) \\ 2ac = \frac{1}{c} \end{cases}$$

Resolviendo el sistema llegamos a:

$$a = \frac{1}{2c^2} \Rightarrow \ln(c) = ac^2 + b = \frac{1}{2c^2}c^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow c = e^{1/2},$$

y, por tanto,

$$a = \frac{1}{2(e^{1/2})^2} = \frac{1}{2e}.$$

Los valores de las constantes que hacen que la función sea continua y derivable en todo su dominio son:

$$a = \frac{1}{2e},$$

$$b = 0,$$

$$c = e^{1/2}.$$

Ejercicio 6.7. Para cada una de las siguientes curvas, hallar las ecuaciones de las rectas tangente y normal en el punto a indicado.

a.
$$y = x^{\text{sen}(x)}$$
, $a = \pi/2$.
b. $y = \ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$, $a = 0$.

Solución

La ecuación de la recta tangente a la función f en el punto x=a es y=f(a)+f'(a)(x-a) y la ecuación de la recta normal en ese mismo punto es $y=f(a)-\frac{1}{f'(a)}(x-a)$, de modo que necesitamos calcular la derivada de la función en el punto dado.

a.
$$y' = x^{\text{sen(x)}} \left(\cos(x) \ln(x) + \frac{\text{sen(x)}}{x}\right)$$
, y en $x = \pi/2$ se tiene $y'(\pi/2) = (\pi/2)^{\text{sen(/2)}} \left(\cos(\pi/2) \ln(\pi/2) + \frac{\text{sen(\pi/2)}}{\pi/2}\right) = 1$.

Por tanto, como $\left(\frac{\pi}{2}\right)^{\operatorname{sen}(\pi/2)} = \frac{\pi}{2}$, la ecuación de la recta tangente en $x = \pi/2$

es $y = \frac{\pi}{2} + x - \frac{\pi}{2} = x$, y la ecuación de la recta normal es $y = \frac{\pi}{2} - x + \frac{\pi}{2} = -x + \pi$.

b. Es este caso, antes de derivar conviene simplificar la función.

$$\begin{split} y' &= \left(\ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\right)' = \left(\frac{1}{2}(\ln(1+x) - \ln(1-x))\right)' \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x}\right) = \frac{1}{1-x^2} \end{split}$$

, y en x = 0 se tiene y'(0) = 1.

Por tanto, como $\ln \sqrt{\frac{1+0}{1-0}} = 0$, la ecuación de la recta tangente en x = 0 es y = x, y la ecuación de la recta normal es y = -x.

Ejercicio 6.8. Dadas las funciones $f(x) = \ln\left(\frac{x^2}{2}\right)$ y $g(x) = x^3 + 2$, ¿existe algún valor de x en el que la recta normal a f y la recta tangente a g en dicho punto sean paralelas?

•

Solución

Para ver si dos rectas son paralelas, basta con ver si tienen la misma pendiente.

$$f'(x) = \left(\ln\left(\frac{x^2}{2}\right)\right)' = (2\ln(x) - \ln(2))' = \frac{2}{x}$$
$$g'(x) = 3x^2$$

Así pues, la pendiente de la recta normal a f en x es $\frac{-1}{f'(x)} = \frac{-x}{2}$ y la pendiente de la recta tangente a g en x es $3x^2$. Igualando las dos pendientes y resolviendo la ecuación resultante, se tiene

$$\frac{-x}{2} = 3x^2 \Leftrightarrow 6x^2 + x = 0 \Leftrightarrow x(6x+1) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ o } x = \frac{-1}{6}.$$

Ahora bien, como f no está definida en x = 0, el único valor de x para el que la recta normal a f es paralela a la recta tangente a g es x = -1/6.

Ejercicio 6.9. Demostrar que cualquier función polinómica $f(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_n x^n$ con $n \in \mathbb{N}$ es derivable en todo \mathbb{R} .

Sea el polinomio $f(x)=c_0+c_1x+c_2x^2+\cdots+c_nx^n$ con $n\in\mathbb{N}.$ Aplicando el álgebra de derivadas, se tiene

$$\begin{split} f'(x) &= (c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_n x^n)' \\ &= c_0' + (c_1 x)' + (c_2 x^2)' + \dots + (c_n x^n)' \\ &= c_1 + c_2 x + \dots + c_n x^{n-1}, \end{split}$$

que existe para todo \mathbb{R} .

Ejercicio 6.10. Demostrar que cualquier función racional $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, con f(x) y g(x)funciones polinómicas, es derivable en todo $x \in \mathbb{R}$ tal que $g(x) \neq 0$.

Solución

Como f(x) y g(x) son dos polinomios, por el ejercicio anterior se tiene que son derivables en todo \mathbb{R} , y aplicando el álgebra de derivadas se tiene h(x) es derivable en todo $x \in \mathbb{R}$ tal que $g(x) \neq 0$, y

$$h'(x) = \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}.$$

Ejercicio 6.11. Hallar la expresión de la derivada n-ésima de las siguientes funciones:

- a. $f(x) = a^x \ln(a)$.
- a. $j(x) = a \cdot \text{Im}(a)$. b. $g(x) = \frac{\sin(x) + \cos(x)}{2}$. c. $h(x) = \frac{9x^2 2x 25}{x^3 2x^2 5x + 6}$. d. $j(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$.

a.

$$f'(x) = a^{x} \ln(a)^{2},$$

$$f''(x) = a^{x} \ln(a)^{3},$$

$$f'''(x) = a^{x} \ln(a)^{4},$$

$$\vdots$$

$$f^{(n)}(x) = a^{x} \ln(a)^{n+1}$$

b.

$$\begin{split} g'(x) &= \frac{\cos(x) - \sin(x)}{2}, \\ g''(x) &= \frac{-\sin(x) - \cos(x)}{2}, \\ g'''(x) &= \frac{-\cos(x) + \sin(x)}{2}, \\ g''''(x) &= \frac{\sin(x) + \cos(x)}{2}, \end{split}$$

Como g'''' = g, las derivadas se van a repetir cíclicamente cada múltiplo de cuatro. Podemos expresar la derivada de orden n de la siguiente forma

$$g^{(n}(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x) + \cos(x)}{2} & \text{si } n = 4k, \\ \frac{\cos(x) - \sin(x)}{2} & \text{si } n = 4k + 1, \\ \frac{-\sin(x) - \cos(x)}{2} & \text{si } n = 4k + 2, \\ \frac{\sin(x) + \cos(x)}{2} & \text{si } n = 4k + 3. \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}.$$

c. Descomponiendo primero en fracciones simples, se tiene que

$$h(x) = \frac{9x^2 - 2x - 25}{x^3 - 2x^2 - 5x + 6} = \frac{9x^2 - 2x - 25}{(x - 3)(x - 1)(x + 2)}$$
$$= \frac{5}{x - 3} + \frac{3}{x - 1} + \frac{1}{x + 2}$$
$$= 5(x - 3)^{-1} + 3(x - 1)^{-1} + (x + 2)^{-1}$$

Calculamos ahora las sucesivas derivadas.

$$h'(x) = 5(-1)(x-3)^{-2} + 3(-1)(x-1)^{-2} + (-1)(x+2)^{-2}$$

$$h''(x) = 5(-1)(-2)(x-3)^{-3} + 3(-1)(-2)(x-1)^{-3} + (-1)(-2)(x+2)^{-3}$$

$$h'''(x) = 5(-1)(-2)(-3)(x-3)^{-4} + 3(-1)(-2)(-3)(x-1)^{-4} + (-1)(-2)(-3)(x+2)^{-4}$$

$$\vdots$$

$$h^{(n)}(x) = 5(-1)^{n}n!(x-3)^{-(n+1)} + 3(-1)^{n}n!(x-1)^{-(n+1)} + (-1)^{n}n!(x+2)^{-(n+1)}$$

$$d. \ j(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}} = (1+x)^{-1/2}.$$

$$j'(x) = \frac{-1}{2}(1+x)^{-3/2}$$

$$j''(x) = \frac{-1}{2}\frac{-3}{2}(1+x)^{-5/2}$$

$$j'''(x) = \frac{-1}{2}\frac{-3}{2}\frac{-5}{2}(1+x)^{-7/2}$$

$$\vdots$$

$$j^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n}\prod_{i=1}^{n}2i-1}{2^{n}}(1+x)^{-\frac{2n+1}{2}}$$

Ejercicio 6.12. Se sabe que la demanda de un producto, en decenas de miles de unidades, depende de su precio según la función $D(x) = \ln(10/x)$. Si el precio mensual evoluciona según la función $x(t) = 2 + \frac{t}{10}$, ¿cuál será la tasa de variación de la demanda en el instante t = 5? Según esta tasa de variación de la demanda, ¿qué demanda aproximada se espera tener un mes después?

Solución

La función que expresa la demanda en función del tiempo es la composición de x con D. Aplicando la regla de la cadena se tiene

$$D'(t) = \frac{dD}{dt} = \frac{dD}{dx}\frac{dx}{dt} = \frac{-1}{x}\frac{1}{10} = \frac{-1}{(2 + \frac{t}{10})10} = \frac{-1}{20 + t}.$$

En el instante t=5 la tasa de variación instantánea de la demanda es

$$D'(5) = \frac{-1}{20+5} = \frac{-1}{25},$$

es decir, la demanda decrecerá 10000/25 = 400 unidades al mes, a partir de ese instante.

Para predecir la demanda aproximada un més después se puede utilizar la recta tangente a D en el instante t=5, que tiene ecuación,

$$y = D(5) + D'(5)(t - 5) = \ln\left(\frac{10}{2 + \frac{5}{10}}\right) - \frac{1}{25}(t - 5) = \ln(4) + \frac{1}{5} - \frac{t}{25}.$$

La predicción de la recta tangente un mes después, es decir para t=6 es $\ln(4)+1$ $\frac{1}{5} - \frac{6}{25} = 1.35$ decenas de miles de unidades.

Ejercicio 6.13. Un balón relleno de aire tiene radio 10 cm cuando se empieza a introducir más aire, de manera que el radio se incrementa con una velocidad de 2 cm/s. ¿Con qué velocidad varía el volumen en ese instante?

Solución

Suponiendo que el balón tiene forma esférica, el volumen de aire depende del radio del balón según la función $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$. Ahora bien, como empezamos a introducir aire en el balón, el radio dependerá del tiempo, según la función r(t), y por tanto el volumen depende también del tiempo según la función $V(r(t)) = \frac{4}{3}\pi r(t)^3$. La velocidad con la que varía el volumen en el instante t_0 en que el radio es $r(t_0)$ = 10 cm y empieza a variar con una velocidad $r'(t_0) = 2$ cm/s, es

$$\begin{split} V(r(t_0))' &= \frac{dV}{dr}(r(t_0))\frac{dr}{dt}(t_0) = \frac{4}{3}\pi 3r(t_0)^2 r'(t_0) \\ &= 4\pi (10 \text{ cm})^2 \cdot 2 \text{ cm/s} = 800\pi \text{ cm}^3/\text{s}. \end{split}$$

Ejercicio 6.14. Una pipeta cilíndrica de radio 5 mm almacena una solución. Si la pipeta empieza a vaciarse a razón de 0.5 ml por segundo, ¿a qué velocidad disminuye el nivel de la pipeta?

Solución

Como el radio de la pipeta es constante r=5 mm, el volumen de solución en la pipeta depende del nivel de la pipeta y según la función $V(h) = \pi (5 \text{ mm})^2 h$. Ahora bien, como la pipeta empieza a vaciarse, el nivel de la pipeta dependerá del tiempo según la función h(t), y por tanto, el volumen también depende del tiempo según la función $V(h(t)) = \pi(5 \text{ mm})^2 h(t)$.

La velocidad con la que cambia el volumen en el instante t_0 es, aplicando la regla de la cadena.

$$\begin{split} V(h(t_0))' &= \frac{dV}{dh}(h(t_0))\frac{dh}{dt}(t_0) = 25\pi \text{ mm}^2 h'(t_0) = -500 \text{ mm}^3/\text{s} \\ \Rightarrow h'(t_0) &= \frac{-500 \text{ mm}^3/\text{s}}{25\pi \text{ mm}^2} = \frac{-20}{\pi} \text{ mm/s} \approx -6.37 \text{ mm/s}. \end{split}$$

Ejercicio 6.15. Un cilindro de 4 cm de radio (r) y 3 cm de altura (h) se somete a un proceso de calentamiento con el que varían sus dimensiones de tal forma que $\frac{dr}{dt} = \frac{dh}{dt} = 1$ cm/s. Hallar de forma aproximada la variación de su volumen a los 5 segundos y a los 10 segundos.

Solución

El volumen de un cilindro depende del radio de la base r y de la altura h, según la fórmula $V(r,h)=\pi r^2h$. Ahora bien, como el proceso de calentamiento provoca un cambio de las dimensiones, podemos decir que el radio cambia con el tiempo según la función r(t) y la altura cambia también con el tiempo según la función h(t), de manera que el volumen también depende del tiempo según la función $V(r(t),h(t))=\pi r(t)^2h(t)$. La tasa de variación instantánea del volumen en el instante t_0 en el que comienza el calentamiento es, aplicando la regla de la cadena,

$$\begin{split} V(r(t_0),h(t_0))' &= \pi((r(t_0)^2)'h(t_0) + r(t_0)^2h'(t_0)) \\ &= \pi(2r(t_0)r'(t_0)h(t_0) + r(t_0)^2h'(t_0)) \end{split}$$

En el instante t_0 en el que comienza el proceso de calentamiento, sabemos que $r(t_0)=4$ cm, $h(t_0)=3$ cm y $r'(t_0)=h'(t_0)=1$ cm/s, de manera que sustituyendo en la expresión anterior se tiene

$$V(r(t_0), h(t_0))' = \pi(2 \cdot 4 \text{ cm} \cdot 1 \text{ cm/s} \cdot 3 \text{ cm} + (4 \text{ cm})^2 \cdot 1 \text{ cm/s}) = 40\pi \text{ cm}^3/\text{s}.$$

Así pues $\frac{dV}{dt}=40\pi~{\rm cm}^3/{\rm s}$, de donde se deduce que $dV=40\pi~{\rm cm}^3/{\rm s}~dt$, de manera que para una variación de tiempo $dt=5~{\rm s}$, la variación aproximada del volumen será $dV=40\pi~{\rm cm}^3/{\rm s}\cdot 5~{\rm s}=200\pi~{\rm cm}^3$, y para una variación de tiempo $dt=10~{\rm s}$, la variación aproximada del volumen será $dV=40\pi~{\rm cm}^3/{\rm s}\cdot 10~{\rm s}=400\pi~{\rm cm}^3$.

Ejercicio 6.16. La ventas mensuales de bicicletas en una ciudad depende del precio de las bicicletas x, en euros, y el precio del combustible y, en céntimos de euro, según la función $v(x,y) = 200 - 10\sqrt{x} + (\frac{y}{10} + 20)^{3/2}$. Si en un determinado instante el precio de las bicicletas es de $200 \in y$ el precio del combustible es de $1 \in y$, y el precio de las bicicletas comienza a subir a razón de $1 \in y$ al mes, mientras que el precio del combustible empieza a subir a razón de 5 céntimos al mes. ¿Qué tasa de variación experimentarán las ventas de bicicletas en ese instante? Según esta tasa de variación, ¿qué ventas aproximadas se espera tener el próximo mes?

Como el precio de las bicicletas y del combustible no son constantes, sino que dependen del tiempo según las funciones x(t) y y(t) respectivamente, las ventas también dependen del tiempo según la función $v(x(t),y(t))=200-10\sqrt{x(t)}+(\frac{y(t)}{10}+20)^{3/2}$. Por tanto, la tasa de variación instantánea de las ventas es, aplicando la regla de la cadena,

$$\begin{split} v(x(t),y(t))' &= (200)' - \left(10\sqrt{x(t)}\right)' + \left(\left(\frac{y(t)}{10} + 20\right)^{3/2}\right)' \\ &= \frac{-10}{2\sqrt{x(t)}}x'(t) + \frac{3}{2}\sqrt{\frac{y(t)}{10} + 20}\frac{y'(t)}{10} \\ &= \frac{-5x'(t)}{\sqrt{x(t)}} + \frac{3y'(t)}{20}\sqrt{\frac{y(t)}{10} + 20}. \end{split}$$

En el instante t_0 en el que el precio de las bicicletas es $x(t_0) = 200 \in$, el precio del combustible es y(t) = 100 céntimos, y la tasa de variación instantánea del precio de las bicicletas es $x'(t_0) = 1 \in$ /mes y del precio del combustible $y(t_0) = 5$ céntimos/mes, sustituyendo en la expresión anterior se tiene

$$\begin{split} v(x(t_0),y(t_0))' &= \frac{-5x'(t_0)}{\sqrt{x(t_0)}} + \frac{3y'(t_0)}{20}\sqrt{\frac{y(t_0)}{10}} + 20 \\ &= \frac{-5\cdot 1}{\sqrt{200}} + \frac{3\cdot 5}{20}\sqrt{\frac{100}{10} + 20} = 3.75 \text{ unidades/mes.} \end{split}$$

Para predecir las ventas el próximo mes, podemos utilizar la aproximación de la recta tangente a v en ese instante, que tiene ecuación

$$\begin{split} y &= v(t_0) + v'(t_0)(t-t_0) \\ &= 200 - 10\sqrt{200} + (\frac{100}{10} + 20)^{3/2} + 3.75(t-t_0) \\ &= 222.9 + 3.75(t-t_0). \end{split}$$

Si queremos predecir las ventas el mes siguiente, la variación del tiempo es $t-t_0=1$ mes, y sustituyendo en la ecuación de la tangente se tiene que las ventas aproximadas serán $222.9+3.75\cdot 1=226.65$ unidades.

Ejercicio 6.17. Dada la función $f: [-\pi/2, \pi/2] \to \mathbb{R}$, tal que $f(x) = \operatorname{sen}(x)$, calcular la derivada de su función inversa $f^{-1}(x) = \operatorname{arcsen}(x) \ \forall x \in (-1, 1)$.

Aplicando la regla para la derivada de la función inversa, se tiene

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{\cos(\arcsin(x))} \forall x \in (-1, 1).$$

Por otro lado, como $sen(x)^2 + cos(x)^2 = 1$, se deduce que $cos(x) = \sqrt{1 - sen(x)^2}$, de manera que sustituyendo en la expresión anterior se tiene

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-\text{sen}(\arcsin(x))^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \forall x \in (-1,1).$$

Ejercicio 6.18. Se desea medir la superficie de una célula esférica y para ello se ha medido el radio de una célula de 5 μ m con un error de 0.2 μ m. ¿Cuál será el error aproximado cometido en el cálculo de la superficie de la célula? En general, si al medir el radio se comete siempre un error relativo del 2%? ¿Cómo afecta esto al error de la medida de la superficie de la célula?

Solución

La superficie de una esfera depende del radio según la función $S(r)=4\pi r^2.$

Como $S'(r) = \frac{dS}{dr}$ se deduce que dS = S'(r)dr, de manera que si se interpreta la variación del radio dr como el error en su medición, y la variación de la superficie dS como el error en su medición, el error en la medición del radio se transmite a la medición de la superficie multiplicando por la derivada de la superficie. Como $S'(r) = 8\pi r$, para un radio de 5 μ m se tiene S'(5) = 8.5 m = 40 m. Por tanto, una error en la medición del radio de $dt = 0.2 \mu$ m, producirá un error en la medición de la superficie de $dS = 40\pi \ \mu$ m · 0.2 μ m = $8\pi \ \mu$ m².

Para la segunda parte del problema, hay que tener en cuenta que si dr se interpreta como el error absoluto del radio, $\frac{dr}{r}$ es el error relativo en la medición del radio, y $\frac{dS}{S}$ es el error relativo en la medición de la superficie. Así pues, se tiene

$$\frac{dS}{S} = \frac{S'(r)dr}{S} = \frac{8\pi r dr}{4\pi r^2} = 2\frac{dr}{r}.$$

Como el error relativo en la medición del radio es del 2%, se tiene que $\frac{dr}{r}=0.02$ y sustituyendo en el resultado anterior se tiene

$$\frac{dS}{S} = 2\frac{dr}{r} = 2 \cdot 0.02 = 0.04,$$

de manera que el error relativo en la medición de la superficie es del 4%.

Ejercicio 6.19. La velocidad de la sangre que fluye por una arteria está dada por la ley

$$v(r) = cr^2,$$

donde v es la velocidad de la sangre, r es el radio de la arteria y c es una constante. Si se puede medir el radio de la arteria con una precisión del 5%, ¿qué precisión tendrá el cálculo de la velocidad?

Solución

Si se interpreta dr se interpreta como el error absoluto del radio de la arteria, $\frac{dr}{r}$ es el error relativo en la medición del radio, y $\frac{dv}{v}$ es el error relativo en la medición de la velocidad de la sangre. Así pues, se tiene

$$\frac{dv}{v} = \frac{v'(r)dr}{v} = \frac{2cr \cdot dr}{cr^2} = 2\frac{dr}{r}.$$

Como el error relativo en la medición del radio es del 5%, se tiene que $\frac{dr}{r} = 0.05$ y sustituyendo en el resultado anterior se tiene

$$\frac{dv}{v} = 2\frac{dr}{r} = 2 \cdot 0.05 = 0.1,$$

de manera que el error relativo en la medición de la velocidad de la sangre es del 10%.

Ejercicio 6.20. En muchos vertebrados existe una relación entre la longitud del cráneo y la longitud de la espina dorsal que puede expresarse mediante la ecuación

$$C(t) = aE(t)^b$$

donde a>0 y b son constantes y t es el tiempo. Esta ecuación se conoce como ecuación alométrica. ¿Cómo se relaciona la tasa de crecimiento de la espina dorsal con la del cráneo? ¿Para qué valores de b es la función C creciente, pero de forma que la relación C/E disminuye al aumentar E? ¿En qué estado de desarrollo tienen los vertebrados cráneos mayores en relación con la longitud de sus cuerpos?

Solución

La tasa de crecimiento de la espina dorsal es E' y la del cráneo es C', así que se trata de ver la relación entre las dos derivadas. Si calculamos la derivada de la longitud del cráneo, como E(t) es una función que depende del tiempo, aplicando la regla de la cadena se tiene

$$C'(t) = abE(t)^{b-1}E'(t)$$

Para que la C sea creciente su derivada debe ser positiva, es decir, $abE(t)^{b-1}E'(t) > 0$. Como E(t) es el la longitud de la espina dorsal, que es positiva, E'(t) es la tasa de crecimiento de la espina dorsal que en los vertebrados también es positiva ya que crece con los años, y a>0, para que C'(t)>0 debe ser b>0.

Por otro lado, la relación E/C es

$$\frac{C(t)}{E(t)} = \frac{aE(t)^b}{E(t)} = aE(t)^{b-1},$$


y su derivada vale

$$\left(\frac{C(t)}{E(t)}\right)'=a(b-1)E(t)^{b-2}.$$

Como a > 0 y E(t) > 0, para que la derivada sea negativa tiene que ser (b-1) < 0, es decir, b < 1. Por tanto, se debe cumplir 0 < b < 1.

Por tanto, si 0 < b < 1 se tiene que C/E es decreciente y eso quiere decir que la espina dorsal crece más rápidamente que el cráneo en los vertebrados, por lo que el cráneo será mayor en relación a la espina dorsal al nacer.

Ejercicio 6.21. La siguiente figura muestra la gráfica de la derivada de una función f. Estudiar el comportamiento de la función (crecimiento, decrecimiento, extremos, concavidad y puntos de inflexión).



Solución

A la vista de la gráfica de f'(x) se observa que los puntos críticos de f (los puntos que anulan la derivada) son x = a y x = c y x = e.

Estudio del crecimiento

Observando el signo de f' podemos estudiar el crecimiento de f aplicando el criterio del signo de la primera derivada. A la vista de la gráfica se observa que f'(x) > 0 $\forall x \in (a,c) \cup (e,\infty)$, y, por tanto, f es creciente en estos intervalos, y f'(x) < 0 $\forall x \in (-\infty,a) \cup (c,e)$, y, por tanto, f es decreciente en estos intervalos.

Estudio de los extremos

Los posibles extremos de f estarán entre sus puntos críticos. Observando el crecimiento de la f a la izquierda y a la derecha de cada punto crítico podemos determinar si son máximos, mínimos o puntos de inflexión.

- En $x=a\ f$ decrece a la izquierda y crece a la derecha, luego hay un mínimo relativo.
- En x=c f crece a la izquierda y decrece a la derecha, luego hay un máximo relativo.
- En x = e f decrece a la izquierda y crece a la derecha, luego hay un mínimo relativo.

Estudio de la concavidad

Para estudiar la concavidad utilizaremos el criterio del signo de la segunda derivada. Para ver el signo de f'' basta con observar el crecimiento de f' en la gráfica ya que f'' es la derivada de f' y por tanto su signo depende del crecimiento de f'. Observando la gráfica de f' se tiene que f'(x) es creciente en $(-\infty, b)$ y (d, ∞) de manera que $f''(x) > 0 \ \forall x \in (-\infty, b) \cup (d, \infty)$, y, por tanto, la f es cóncava hacia arriba en estos intervalos. Por otro lado, f'(x) es decreciente en el intervalo (b, d), por lo que $f''(x) < 0 \ \forall x \in (b, d)$ y, por tanto, f es cóncava hacia abajo en este intervalo.

Estudio de los puntos de inflexión

Los puntos de inflexión son los puntos donde cambia la concavidad de la función, de modo que, según el estudio de la concavidad, f tiene puntos de inflexión en x = b y x = d.

Ejercicio 6.22. Hallar a, b y c en la función $f(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$ para que tenga un punto de inflexión en x = 3, pase por el punto (1,0) y alcance un máximo en x = 1.



Solución

Calculamos las dos primeras derivadas.

$$f'(x) = 3x^2 - 2bx + c$$

$$f''(x) = 6x - 2b$$

Para que la función tenga un punto de inflexión en x=3 debe ser f''(3)=0, es decir, $f''(3)=6\cdot 3-2b=18-2b=0$, de donde se deduce que b=9.

Para que la función tenga un máximo en x=1 debe ser f'(1)=0, es decir, $f'(1)=3\cdot 1^2-2\cdot 9\cdot 1+c=3-18+c=-15+c=0$, de donde se deduce que c=15.

Finalmente, para que pase por el punto (1,0)\$ debe ser f(1)=0, es decir, $f(1)=1^3-9\cdot 1^2+15\cdot 1+d=1-9+15+d=7+d=0$, de donde se deduce que d=-7.

Ejercicio 6.23. La cantidad de trigo en una cosecha C depende del nivel de nitrógeno en el suelo n según la ecuación

$$C(n) = \frac{n}{1+n^2}, \quad n \ge 0.$$

¿Para qué nivel de nitrógeno se obtendrá la mayor cosecha de trigo?

9 S

Solución

Se trata de calcular el valor de n donde se alcanza el máximo de C(n). Veremos primero si hay algún máximo relativo. Para ello calculamos los puntos críticos.

$$C'(n) = \frac{(n)'(1+n^2) - n(1+n^2)'}{(1+n^2)^2} = \frac{(1+n^2) - n(2n)}{(1+n^2)^2} = \frac{1-n^2}{(1+n^2)^2}$$

$$C'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - n^2 = 0 \Leftrightarrow n^2 = 1 \Leftrightarrow n = \pm 1.$$

Como no tienen sentido cantidades de nitrógeno negativas, el único punto crítico está en n=1. Para ver si se trata de un máximo, estudiamos ahora el signo de la primera derivada a la izquierda y a la derecha de este punto. Tomando, por ejemplo n=0, se tiene $C'(0)=\frac{1-0^2}{(1+0^2)^2}=1>0$, por lo que la función es creciente a la izquierda de n=1. Y tomando, por ejemplo n=2, se tiene $C'(2)=\frac{1-2^2}{(1+2^2)^2}=-3/25<0$, por lo que la función es decreciente a la derecha de n=1. Por tanto, en n=1 existe un máximo relativo, que además, es único. Como la función es continua en todo $\mathbb R$ al ser una función racional y no anularse nunca su denominador, se tiene que el máximo absoluto coincide con el relativo, de manera que el nivel de nitrógeno para el que la cosecha será máxima es n=1.

Ejercicio 6.24. La velocidad v de una reacción irreversible $A + B \rightarrow AB$ es función de la concentración x del producto AB y puede expresarse según la ecuación

$$v(x) = 4(3-x)(5-x).$$

¿Qué valor de x maximiza la velocidad de reacción?

Veremos primero si hay algún máximo relativo. Para ello calculamos los puntos críticos de $v(x)=4(3-x)(5-x)=4x^2-32x+60$

$$v'(x) = 8x - 32 = 0 \Leftrightarrow x = 4.$$

Para ver si se trata de un máximo relativo, estudiamos el signo de la segunda derivada en el punto crítico. v''(x)=8>0, luego la función es cóncava hacia arriba en todo $\mathbb R$ y en particular en x=4, por lo que tiene un mínimo local en x=4.

Como el dominio de la función es $[0,\infty)$ ya que las concentraciones no pueden ser negativas, y $\lim_{n\to\infty}v(x)=\lim_{x\to\infty}4x^2-32x+60=\infty$, la función no tiene máximo local, por lo que no existe un valor de x que maximice la velocidad de reacción.

Ejercicio 6.25. Un naufrago se encuentra en una isla situada en un plano con coordenadas (2,0). Se sabe que un ferry hace siempre la trayectoria dada por la función $f(x) = \sqrt{x+1}$. ¿Hacia qué punto de la trayectoria del ferry debe nadar el naufrago para recorrer la menor distancia posible? ¿Qué distancia recorrerá si nada hacia ese punto?

Solución

El ferry pasará por todos los puntos (x, f(x)), por lo que se trata de averiguar el valor de x que hace mínima la distancia del punto (2,0) a (x, f(x)), o lo que es lo mismo, minimizar el módulo del vector $\{(x,f(x))-(2,0)=(x-2,f(x)), \text{ que vale }\}$

$$|(x-2,f(x))| = \sqrt{(x-2)^2 + (\sqrt{x})^2} = \sqrt{x^2 - 2x + 4 - x} = \sqrt{x^2 - x + 4}.$$

Se trata, por tanto, de calcular el mínimo de la función $m(x) = \sqrt{x^2 - x + 4}$. Calculamos los puntos críticos.

$$m'(x) = \frac{2x-1}{2\sqrt{x^2-x+4}} = 0 \Leftrightarrow 2x-1 = 0 \Leftrightarrow x = 1/2.$$

Para ver si se trata de un mínimo relativo, estudiamos el signo de la derivada a la izquierda y a la derecha del punto crítico. Tomando, por ejemplo, x=0, se tiene $m'(0)=\frac{2\cdot 0-1}{2\sqrt{0^2-0+4}}=-1/4<0$, de manera que el módulo decrece a la izquierda de x=1/2. Y tomando, por ejemplo, x=1, se tiene que $m'(1)=\frac{2\cdot 1-1}{2\sqrt{1^2-1+4}}=1/4>0$, de manera que el módulo crece a la derecha de x=1/2. Por tanto, la función del módulo tiene un mínimo relativo en x=1/2, que además es único, y como m es continua en todo $\mathbb R$, el mínimo relativo es también mínimo absoluto, y por tanto, el naufrago debe nadar hacia el punto $(1/2,\sqrt{1/2})$.

Ejercicio 6.26. Un hotel alquila habitaciones por un precio entre $40 \in y$ 100 diarios. Se ha observado que el número de habitaciones que alquilan depende del precio x según la función h(x) = 300 - 3x. ¿Qué precio se debe cobrar por habitación para obtener los máximos ingresos?

Solución

Los ingresos vienen dados por la función $f(x) = xh(x) = x(300-3x) = 300x-3x^2$. Se trata de calcular el máximo absoluto de esta función. Para ello veremos primero si tiene algún máximo relativo. Calculamos los puntos críticos.

$$f'(x) = 300 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 50.$$

Para ver si se trata de un máximo relativo, estudiamos el signo de la segunda derivada en el punto crítico. f''(x) = -6 < 0, por lo que la función es cóncava hacia abajo en todo \mathbb{R} , y en particular en x=50, por lo que f tiene un máximo relativo en este punto, que además es único. Como f es continua en todo \mathbb{R} , el máximo relativo es también absoluto, y el precio de las habitaciones que maximiza los ingresos es x = 50€.

Ejercicio 6.27. Existen organismos que se reproducen una sola vez en su vida como por ejemplo los salmones. En este tipo de especies, la velocidad de incremento per cápita v, que mide la capacidad reproductiva, depende de la edad x según la ecuación

$$v(x) = \frac{\ln(p(x)h(x))}{x},$$

donde p(x) es la probabilidad de sobrevivir hasta la edad x y h(x) es el número de nacimientos de hembras a la edad x. Calcular la edad óptima de reproducción, es decir, el valor que maximice v, para $p(x) = e^{-0.1x}$ y $h(x) = 4x^{0.9}$.

Solución

Se trata de calcular el máximo absoluto de la función

$$\begin{split} v(x) &= \frac{\ln(e^{-0.1x}4x^{0.9})}{x} = \frac{\ln(e^{-0.1x}) + \ln(4) + \ln(x^{0.9})}{x} \\ &= \frac{-0.1x + \ln(4) + 0.9\ln(x)}{x} = -0.1 + \frac{\ln(4) + 0.9\ln(x)}{x}. \end{split}$$

Veamos primero si la función tiene algún máximo relativo. Calculamos los puntos

$$\begin{split} v'(x) &= \frac{(x)'(\ln(4) + 0.9\ln(x)) - x(\ln(4) + 0.9\ln(x))'}{x^2} \\ &= \frac{\ln(4) + 0.9\ln(x) - 0.9}{x^2} = 0 \Leftrightarrow \ln(4) + 0.9\ln(x) - 0.9 = 0 \\ &\Leftrightarrow \ln(x) = \frac{0.9 - \ln(4)}{0.9} \Leftrightarrow x = e^{\frac{0.9 - \ln(4)}{0.9}} \approx 0.5826. \end{split}$$

Para ver si v tiene un máximo relativo en este punto, estudiamos el signo de la derivada a la izquierda y a la derecha del punto crítico. Tomando, por ejemplo, x=0, se tiene $v'(0.5)\approx 0.5502>0$, por lo que la función crece a la izquierda de x=0.5826. Y tomando, por ejemplo, x=0.6, se tiene que $v'(0.6)\approx -0.0738<0$, por lo que v decrece a la derecha de v=0.5826, así que, v tiene un máximo relativo en v=0.5826, que además es único. Como v=0.5826, que además es único. Como v=0.5826, que además es único. Como v=0.5826 años.

Ejercicio 6.28. Un lata de refresco cilíndrica contiene 33 cl. Hallar las dimensiones de la lata para que la cantidad de aluminio utilizada en su creación sea mínima.

Ejercicio 6.29. La distancia en kilómetros que recorre un coche de alquiler con 1 litro de gasolina depende de la velocidad a la que circule según la función d(x) = 120 - x para $x \in (50, 120)$. Si el coste de la gasolina es de $2 \in /1$ y el coste del alquiler es de $10 \in /h$, ¿a qué velocidad debe circular para que el coste del trayecto sea mínimo? ¿Cuál será el coste por kilómetro si circula a esa velocidad?

Solución

Como la distancia recorrida a una velocidad x es d(x)=120-x y, como la velocidad es $x=\frac{d(x)}{t}$, el tiempo necesario para recorrer esa distancia es $\frac{d(x)}{x}$, de manera que el coste del alquiler para recorrer esa distancia es $\frac{d(x)}{x}10$. A esto hay que sumar el precio del litro de gasolina necesario para recorrer esa distancia, de manera que el coste de recorrer esa distancia es $\frac{d(x)}{x}10+2$. Por tanto, el coste por kilómetro para una velocidad x viene dado por la función

$$c(x) = \frac{\frac{d(x)}{x}10 + 2}{120 - x} = \frac{8x - 1200}{x^2 - 120x}$$

Para determinar el mínimo de la función calculamos los puntos críticos. La derivada vale

$$c'(x) = \frac{-8x^2 + 2400x - 144000}{x^4 - 240x^3 + 14400x^2}$$

y resolviendo la ecuación $-8x^2+2400x-144000=0$ se obtienen los puntos críticos x=82.92 y x=217.08. Como el segundo punto crítico queda fuera del rango

de velocidades de 50 a 120, estudiaremos solo el primero. Usando el criterio de la primera derivada, estudiamos el signo de la primera derivada a la izquierda y a la derecha del punto crítico, por ejemplo c'(80) = -1/3200 < 0 y c'(83) = 88/9431041 > 0, por lo que c tiene un mínimo en x = 82.92, es decir, la velocidad a la que debe viajar para que el coste sea mínimo es 82.92 km/h, y el precio por kilómetro a esa velocidad será $0.17 \in /l$.

Ejercicio 6.30. En un tramo de carretera limitado a una velocidad máxima de 70 km/h existe un semáforo de tramo. Según el registro del semáforo, un vehículo pasa por el comienzo del tramo, situado en el kilómetro 12 a las 8:00 y pasa por el final del tramo, situado en el kilómetro 14, un minuto y medio después. ¿Será sancionado el vehículo por exceso de velocidad?

•

Solución

Suponiendo que la función f que determina la posición del vehículo en cada instante es continua y derivable en el tramo del enunciado, según el teorema del valor medio, existe al menos un instante c en el que

$$f'(c) = \frac{14-12}{8.025-8} = \frac{2}{0.025}I = 80 \text{ km/h}.$$

Como f' es la velocidad instantánea, se puede concluir que en algún momento la velocidad instantánea fue de 80 km/h, y como la máxima velocidad permitida en el tramo es de 70 km/h, el vehículo será sancionado.

Ejercicio 6.31. La posición que ocupa un coche que se mueve en línea recta, puede expresarse en función del tiempo según la ecuación

$$e(t) = 4t^3 - 2t + 1.$$

Calcular su velocidad y aceleración en cualquier instante.

Nota: La aceleración es la tasa de variación instantánea de la velocidad.



Solución

La velocidad es la tasa de variación instantánea del espacio con respecto al tiempo, es decir, la primera derivada de e, que vale $e'(t) = 12t^2 - 2$.

La aceleración es la tasa de variación instantánea de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, la segunda derivada de e, que vale e''(t) = 24t.

Ejercicio 6.32. El espacio recorrido por un objeto que se lanza verticalmente hacia arriba, sin tener en cuenta la resistencia del aire, viene dado por la ecuación

$$e(t)=v_0t-\frac{1}{2}gt^2$$

donde v_0 es la velocidad inicial con que se lanza el objeto, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ es la aceleración de la gravedad en la superfice terrrestre y t es el tiempo transcurrido desde que el objeto se lanza.

- a. Calcular la velocidad y la aceleración en cualquier instante.
- b. Si el objeto se lanza inicialmente a 50 km/h, ¿cuál será la altura máxima que alcanzará el objeto? ¿Cuál será su velocidad en ese momento?
- c. ¿En qué instante volverá a tocar la tierra el objeto? ¿Con qué velocidad?

Solución

- a. La velocidad es la tasa se variación instantánea con respecto al tiempo, es decir, la primera derivada de e, que vale, $e'(t) = v_0 gt$. Y la aceleración es la tasa de variación instantánea de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, la segunda derivada de e, que vale e''(t) = -g.
- b. Para ver en qué punto el objeto alcanza la altura máxima, estudiamos primero si la función tiene un máximo relativo. Calculamos los puntos críticos, tomando $v_0=50~{\rm km/h}=\frac{125}{9}~{\rm m/s}.$

$$e'(t) = \frac{125}{9} - 9.81t = 0 \Leftrightarrow t \approx 1.42 \mathrm{s}.$$

Para ver si se trata de un máximo relativo, estudiamos el signo de la segunda derivada en el punto. Como e''(t) = -9.81 < 0 la función es cóncava hacia abajo en todo \mathbb{R} , y en particular en $t \approx 1.42$, de manera que e tiene un máximo relativo en $t \approx 1.42$, que además es único. Como la función es continua en todo \mathbb{R} , el máximo relativo es también absoluto, y por tanto, la altura máxima que alcanzará el objeto es aproximadamente (1.42)=9.83 m. En ese instante, la velocidad del objeto será nula ya que se trata de un punto crítico y e'(1.42)=0.

c. Para ver cuándo el objeto vuelve a tocar el suelo basta con resolver la ecuación

$$e(t) = 50t - \frac{1}{2}9.81t^2 = 0 \Leftrightarrow t(50 - 4.905t) = 0 \Leftrightarrow t = 0 \text{ o } t \approx 2.83 \text{ s.}$$

Por tanto, el objeto volverá a tocar suelo a los 2.83 segundos aproximadamente. En ese instante la velocidad será $e'(2.83) = \frac{125}{9} - 9.81 \cdot 2.83 \approx -13.89$ m/s, que es la misma velocidad con la que se lanzó pero negativa.

Ejercicio 6.33. Una partícula se mueve a lo largo de la curva

$$\begin{cases} x = \operatorname{tg}(t), \\ y = t^2 - 2t + 3. \end{cases}$$

donde x e y están medidos en metros y el tiempo t en segundos.

- a. Hallar $\frac{dy}{dx}$ en t=0.b. Hallar la tangente a la trayectoria en el punto (0,3).

Solución

a. Aplicando la regla de la cadena se tiene que

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx}\frac{dx}{dt},$$

y en consecuencia,

$$\frac{dy}{dx}(t) = \frac{dy/dt}{dx/dt}(t) = \frac{2t-2}{1+\operatorname{tg}(t)^2}.$$

En el punto t = 0 tendremos

$$\frac{dy}{dx}(0) = \frac{-2}{1 + \operatorname{tg}(0)^2} = -2.$$

b. La ecuación de la recta tangente a la trayectoria en el punto $(x(t_0),y(t_0))$ correspondiente al instante t_0 , viene dada por la expresión

$$y-y(t_0)=\frac{dy}{dx}(t_0)(x-x(t_0)).$$

Como el punto (0,3) se alcanza precisamente en el instante t=0 tenemos que la ecuación de la recta tangente a la trayectoria en dicho instante es:

$$y - y(0) = \frac{dy}{dx}(0)(x - x(0)),$$

es decir,

$$y-3 = -2(x-0),$$

y simplificando obtenemos:

$$y = 3 - 2x.$$

Ejercicio 6.34. Las coordenadas paramétricas de un punto material lanzado bajo un ángulo respecto al horizonte son

$$\begin{cases} x = v_0 t, \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

donde $t \in \mathbb{R}^+$ es el tiempo contado a partir del instante en que el punto llega a la posición más alta, v_0 es la velocidad horizontal en el instante t=0 y g=9.81 m²/s es la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre. ¿En qué instante la magnitud de la velocidad horizontal será igual a la de la velocidad vertical? ¿Cuánto debería valer v_0 para que en dicho instante el punto haya recorrido 100 m horizontalmente? Calcular la ecuación de la recta tangente en dicho instante con el valor de v_0 calculado.

Solución

La velocidad horizontal es la derivada del espacio recorrido horizontalmente (componente x) con respecto al tiempo, es decir,

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(v_0 t) = v_0.$$

Del mismo modo, la velocidad vertical es la derivada del espacio recorrido verticalmente (componente y) en relación al tiempo,

$$\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}(-\frac{1}{2}gt^2) = -gt$$

Para ver en qué instante ambas magnitudes serán iguales, las igualamos y resolvemos la ecuación:

$$|\frac{dx}{dt}| = |\frac{dy}{dt}| \Leftrightarrow v_0 = gt \Leftrightarrow t = \frac{v_0}{g} = \frac{v_0}{9.81}s.$$

Para que en dicho instante el punto haya recorrido 100 m horizontalmente, debe cumplirse que $x(v_0/9.81)=100$ m, de lo que se deduce:

$$x(v_0/9.81) = v_0 \frac{v_0}{9.81} = \frac{v_0^2}{9.81} = 100 \Leftrightarrow v_0^2 = 981 \Leftrightarrow v_0 = +\sqrt{981} = 31.32 \text{ m/s}.$$

Por tanto, el instance en cuestión es $t = v_0/9.81 = 31.32/9.81 = 3.19 \text{ s}.$

Por último, la ecuación de la recta tangente en dicho instante, para el valor de v_0 calculado es:

$$y = y(3.19) + \frac{dy}{dx}(3.19)(x - x(3.19))$$

Ya hemos visto que x(3.19)=100, y que en dicho instante la velocidad horizontal y vertical coinciden, de manera que

$$\frac{dy}{dx}(3.19) = \frac{dy/dt}{dx/dt} = -1,$$

de modo que sólo nos queda calcular el espacio vertical recorrido en dicho instante,

$$y(3.19) = -\frac{1}{2}9.81 \cdot 3.19^2 = -49.91.$$

Sustituyendo en la ecuación anterior llegamos a la recta tangente:

$$y = -49.91 - (x - 100) \Leftrightarrow y = -x + 50.09.$$

Ejercicio 6.35. La cantidad de árboles en un ecosistema depende del tiempo según la función $a(t) = 100 \ln(t^2 + 1)$, y la cantidad de un determinado parásito de los árboles, también depende del tiempo según la función $p(t) = \sqrt[3]{t^2 + 2}$. Calcular la tasa de variación instantánea del número de parásitos en relación al número de árboles, en el instante en que el número de parásitos es 3.

Solución

$$\frac{da}{dp} = \frac{da/dt}{dp/dt} = \frac{\frac{200t}{t^2+1}}{\frac{2t}{3\sqrt[3]{(t^2+2)^2}}} = \frac{200t \cdot 3\sqrt[3]{(t^2+2)^2}}{2t(t^2+1)} = \frac{600t\sqrt[3]{(t^2+2)^2}}{2t^3+2t}.$$

El instante en el que el número de parásitos es 3 es

$$p(t) = \sqrt[3]{t^2 + 2} = 3 \Leftrightarrow t^2 + 2 = 27 \Leftrightarrow t^2 = 25 \Leftrightarrow t = \pm 5.$$

Como en el contexto del problema podemos suponer que el tiempo es positivo, el instante en el que el número de parásitos es 3 es t=5, y

$$\frac{da}{dp}(t=3) = \frac{600 \cdot 5\sqrt[3]{(5^2+2)^2}}{2 \cdot 5^3 + 2 \cdot 5} \approx 103.85 \text{ árboles/parásitos}.$$

Ejercicio 6.36. Dada la función $xy + e^x - \log y = 0$, calcular las ecuaciones de las rectas tangente y normal a ella en x=0.

Solución

Sustituyendo x = 0 en la ecuación de la curva implícita se tiene

$$0 \cdot y + e^0 - \ln(y) = 0 \Leftrightarrow \ln(y) = 1 \Leftrightarrow y = e.$$

Así pues, hay que calcular la ecuación de las rectas tangente y normal en el punto

La ecuación de la recta tangente en (0,e) es $y=e+\frac{dy}{dx}(x=0)(x-0)$. Para calcular $\frac{dy}{dx}$ tenemos que derivar implícitamente la ecuación de la curva.

$$(xy + e^x - \ln(y))' = (0)' \Leftrightarrow y + xy' + e^x - \frac{y'}{y} = 0$$
$$\Leftrightarrow xy' - \frac{y'}{y} = -y - e^x \Leftrightarrow y'(x - \frac{1}{y}) = -y - e^x$$
$$\Leftrightarrow y'\frac{xy - 1}{y} = -y - e^x \Leftrightarrow y' = \frac{(-y - e^x)y}{xy - 1},$$

que en el punto (0, e) vale

$$\frac{dy}{dx}(0,e) = \frac{(-e-e^0)e}{0e-1} = e^2 + e.$$

Así pues, la ecuación de la recta tangente a la curva implícita en el punto (0,e) es $y = e + (e^2 + e)x.$

Por otro lado, la ecuación de la recta normal a la curva implícita en el punto (0,e) es $y=e-\frac{1}{dy/dx(x=0)}(x-0)=e-\frac{x}{e^2+e}$.

Ejercicio 6.37. Suponiendo que la temperatura, T en grados centígrados, y el volumen, V en metros cúbicos, de un gas real encerrado en un contenedor de volumen variable están relacionados mediante la siguiente ecuación:

$$T^2(V^2-\pi^2)-V\cos(TV)=0.$$

- a. Calcular la derivada del volumen con respecto a la temperatura en el momento en el que el volumen es de π m³ y la temperatura es medio grado centígrado.
- b. ¿Cuál sería la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función que daría el volumen en función de la temperatura en el mismo punto del apartado anterior? Suponiendo que tanto la temperatura como el volumen son, a su vez, funciones de la presión, qué ecuación ligaría la derivada de la temperatura con respecto a la presión con la derivada del volumen con respecto a la presión.

a.
$$\frac{dV}{dT} = \frac{-2T(V^2 - \pi^2) - V^2 \sin(TV)}{2T^2V - \cos(TV) + TV \sin(TV)} \text{ y } \frac{dV}{dT}(V = \pi, T = 0.5) = -\pi \text{ m}^3/^{\circ}\text{C}.$$
b. Tangente:
$$V = \pi(-T + 1.5).$$

$$\mathrm{c.} \ \ 2T \tfrac{dT}{dP} (V^2 - \pi^2) + T^2 (2V \tfrac{dV}{dT}) - \tfrac{dV}{dT} \cos(VT) - V (-\sin(TV) (\tfrac{dT}{dP}V + T \tfrac{dV}{dP})) = 0.$$

Ejercicio 6.38. Un cuerpo se mueve en el plano a través de los puntos de coordenadas (x, y) relacionadas mediante la siguiente expresión:

$$2e^{xy}\operatorname{sen}(x) + y\operatorname{cos}(x) = 2.$$

- a. Calcular su posición cuando $x = \pi/2$.
- b. Calcular la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función cuando x = 0.

Solución

a. El punto (x,y) en el que se encontrará el cuerpo cuando x=0 cumple la ecuación del enunciado, de manera que sustituyendo x=0, se tiene

$$2e^0 \operatorname{sen}(0) + y \cos(0) = 2 \Leftrightarrow y = 2.$$

Por tanto el cuerpo se encontrará en la posición (0, 2).

b. Sabemos que la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de coordenadas (x_0, y_0) es:

$$y - y_0 = \frac{dy}{dx}(x_0)(x - x_0)$$

En nuestro caso, no tenemos la expresión explícita de la función y=f(x), pero sí que tenemos la expresión de partida que define a y como función de x de forma implícita. Suponiendo que y es función de x y derivando implícitamente con respecto a x, obtenemos:

$$2e^{xy}(y+xy')\sin(x) + 2e^{xy}\cos(x) + y'\cos(x) - y\sin(x) = 0$$

Y sacando como factor común y' y despejando, nos queda:

$$y' = \frac{-2e^{xy}y\sin(x) - 2e^{xy}\cos(x) + y\sin(x)}{2xe^{xy}\sin(x) + \cos(x)}$$

Y en el punto (0,2) vale

$$y'(0,2) = \frac{-2e^0\cos(0)}{\cos(0)} = -2.$$

Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente es:

$$y - 2 = -2(x - 0) \Leftrightarrow y = -2x + 2.$$

Ejercicio 6.39. Hallar la ecuación de la recta tangente y normal a la curva $x^2 + y^2 =$ 3xy-1 en los puntos en que x=1. Calcular también los extremos relativos y decir si son máximos o mínimos.

Solución

Consideremos y como función de x. Veamos primero los puntos de la curva en los que x = 1:

$$1^2 + y^2 = 3 \cdot 1 \cdot y - 1 \Leftrightarrow y^2 - 3y + 2 = 0.$$

Resolviendo la ecuación obtenemos dos soluciones y = 1 e y = 2, de modo que existen dos puntos para los que x = 1, que son el (1, 1) y el (1, 2).

Para calcular las ecuaciones de las rectas tangente y normal en estos puntos, necesitamos calcular la derivada dy/dx en dichos puntos. Derivamos implícitamente:

$$d(x^2 + y^2 = d(3xy - 1) \Leftrightarrow 2xdx + 2ydy = 3(dxy + xdy)$$
$$\Leftrightarrow (2x - 3y)dx + (2y - 3x)dy = 0,$$

de donde se deduce

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3y - 2x}{2y - 3x},$$

que en el punto (1,1) vale

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3 \cdot 1 - 2 \cdot 1}{2 \cdot 1 - 3 \cdot 1} = -1,$$

y en el punto (1,2) vale

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3 \cdot 2 - 2 \cdot 1}{2 \cdot 2 - 3 \cdot 1} = 4.$$

Así pues, la ecuación de la recta tangente en el punto (1,1) es

$$y - 1 = \frac{dy}{dx}(1, 1)(x - 1) \Leftrightarrow y = 2 - x,$$

y la ecuación de la recta normal es

$$y-1=-\frac{1}{dy/dx}(1,1)(x-1) \Leftrightarrow y=x,$$

mientras que la ecuación de la recta tangente en el punto (1,2) es

$$y - 2 = \frac{dy}{dx}(1,2)(x-1) \Leftrightarrow y = 4x - 2,$$

y la ecuación de la recta normal es

$$y-2=-\frac{1}{du/dx}(1,2)(x-1) \Leftrightarrow y=\frac{9-x}{4}.$$

Por otro lado, para calcular los extremos relativos, primero calculamos los puntos críticos, que son los que anulan la primera derivada:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3y - 2x}{2y - 3x} = 0 \Leftrightarrow 3y - 2x = 0 \Leftrightarrow y = 2x/3.$$

Pero además deben cumplir la ecuación de la curva implícita,

$$x^{2} + (2x/3)^{2} = 3x(2x/3) - 1 \Leftrightarrow x^{2} + 4x^{2}/9 = 2x^{2} - 1$$

 $\Leftrightarrow x^{2} = 9/5 \Leftrightarrow x = \pm 3/\sqrt{5}.$

Así pues, existen dos puntos críticos que son el $(3/\sqrt{5},2/\sqrt{5})$ y $(-3/\sqrt{5},-2/\sqrt{5})$. Para ver si son puntos de máximo o mínimo relativos, necesitamos calcular la segunda derivada en dichos puntos:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{3y - 2x}{2y - 3x} \right) = \frac{(3\frac{dy}{dx} - 2)(2y - 3x) - (2\frac{dy}{dx} - 3)(3y - 2x)}{(2y - 3x)^2}.$$

En el punto, $(3/\sqrt{5}, 2/\sqrt{5})$ la segunda derivada vale

$$\frac{d^2y}{dx^2}(3/\sqrt{5},2/\sqrt{5}) = \frac{(3\cdot 0 - 2)(2\frac{2}{\sqrt{5}} - 3\frac{3}{\sqrt{5}}) - (2\cdot 0 - 3)(3\frac{2}{\sqrt{5}} - 2\frac{3}{\sqrt{5}})}{(2\frac{2}{\sqrt{5}} - 3\frac{3}{\sqrt{5}})^2} = 2\sqrt{5},$$

que al ser positiva, indica que el punto $(3/\sqrt{5},2/\sqrt{5})$ es un punto de mínimo relativo

En el punto, $(-3/\sqrt{5}, -2/\sqrt{5})$ la segunda derivada vale

$$\frac{d^2y}{dx^2}(-3/\sqrt{5},-2/\sqrt{5}) = \frac{(3\cdot 0-2)(2\frac{-2}{\sqrt{5}}-3\frac{-3}{\sqrt{5}})-(2\cdot 0-3)(3\frac{-2}{\sqrt{5}}-2\frac{-3}{\sqrt{5}})}{(2\frac{-2}{\sqrt{5}}-3\frac{--3}{\sqrt{5}})^2} = -2\sqrt{5},$$

que al ser negativa, indica que el punto $(-3/\sqrt{5},-2/\sqrt{5})$ es un punto de máximo relativo.

Ejercicio 6.40. Dada la curva $x^2 - xy + y^2 = 3$.

- a. Calcular los posibles extremos relativos de y, considerando y como función implícita de x. ¿En qué puntos se alcanzan dichos valores?
- b. Analizar si lo puntos anteriores son máximos o mínimos haciendo uso de la derivada segunda.

Solución

a. Derivamos implícitamente la ecuación

$$\frac{d}{dx}(x^2 - xy + y^2) = \frac{d}{dx}3 = 0$$

Derivando el lado izquierdo tenemos

$$\begin{split} \frac{d}{dx}(x^2-xy+y^2) &= \frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(xy) + \frac{d}{dx}(y^2) = \\ &= 2x - (\frac{dx}{dx}y + x\frac{dy}{dx}) + 2y\frac{dy}{dx} = \\ &= 2x - y - x\frac{dy}{dx} + 2y\frac{dy}{dx} \\ &= 2x - y + (2y - x)\frac{dy}{dx} = 0 \end{split}$$

Los posibles extremos serán los puntos donde se anule la derivada, es decir, $\frac{dy}{dx} = 0$. Sustituyendo en la ecuación anterior tenemos

$$2x - y + (2y - x) \cdot 0 = 2x - y = 0 \Leftrightarrow y = 2x$$

Y sustituyendo ahora en la ecuación de la función tenemos

$$x^{2} - x \cdot 2x + (2x)^{2} = 3 \Leftrightarrow x^{2} - 2x^{2} + 4x^{2} = 3 \Leftrightarrow 3x^{2} = 3 \Leftrightarrow x = +1$$

Por tanto, los posibles puntos de extremo serán (1,2) y (-1,-2).

b. Para ver si los puntos anteriores son efectivamente extremos, calculamos la derivada segunda en dichos puntos.

$$\begin{split} \frac{d^2}{dx^2}(x^2 - xy + y^2) &= \frac{d}{dx} \left(\frac{d}{dx}(x^2 - xy + y^2) \right) = \\ &= \frac{d}{dx} \left(2x - y + (2y - x) \frac{dy}{dx} \right) = \\ &= \frac{d}{dx}(2x) - \frac{d}{dx}y + \left(\frac{d}{dx}(2y - x) \frac{dy}{dx} + (2y - x) \frac{d}{dx} \frac{dy}{dx} \right) = \\ &= 2 - \frac{dy}{dx} + \left(2\frac{dy}{dx} - \frac{dx}{dx} \right) \frac{dy}{dx} + (2y - x) \frac{d^2y}{dx^2} = \\ &= 2 - \frac{dy}{dx} + 2\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} + (2y - x) \frac{d^2y}{dx^2} \\ &= 2 - 2\frac{dy}{dx} + (2y - x + 2) \frac{d^2y}{dx^2} = 0 \end{split}$$

Para el primer punto tenemos que sustituir x = 1, y = 2 y $\frac{dy}{dx} = 0$, y queda

$$2 - 2 \cdot 0 + (2 \cdot 2 - 1 + 2)\frac{d^2y}{dx^2} = 0 \Leftrightarrow 2 + 5\frac{d^2y}{dx^2} = 0 \Leftrightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-2}{5},$$

que al ser negativo indica que el en el punto (1,2) hay un máximo relativo.

Para el segundo punto tenemos que sustituir $x=-1,\ y=-2$ y $\frac{dy}{dx}=0,$ y queda

$$2 - 2 \cdot 0 + (2 \cdot (-2) - (-1)1 + 2)\frac{d^2y}{dx^2} = 0 \Leftrightarrow 2 - \frac{d^2y}{dx^2} = 0 \Leftrightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = 2,$$

que al ser positivo indica que el en el punto (-1, -2) hay un mínimo relativo.

Ejercicio 6.41. Dada la función f(x) = sen(x), se pide:

- a. Obtener el polinomio de Taylor de tercer grado de f en el punto $a=\pi/6$ y usarlo para aproximar sen(1/2) dando una cota del error cometido.
- b. Dar una aproximación de sen(1/2) usando un el polinomio de Taylor de quinto grado en el punto a=0, acotando el error cometido.

Solución

a. La fórmula del polinomio de Taylor de tercer grado de f en el punto $a=\pi/6$ es

$$P_{f,\pi/6}^3(x) = f(\pi/6) + f'(\pi/6)(x - \pi/6) + \frac{f''(\pi/6)}{2}(x - \pi/6)^2 + \frac{f'''(\pi/6)}{3!}(x - \pi/6)^3.$$

Necesitamos calcular, por tanto, hasta la tercera derivada en el punto $a = \pi/6$.

$$\begin{array}{ll} f(x) = \mathrm{sen}(x) & f(\pi/6) = 0.5 \\ f'(x) = \mathrm{cos}(x) & f'(\pi/6) = \sqrt{3}/2 \\ f''(x) = -\mathrm{sen}(x) & f''(\pi/6) = -0.5 \\ f'''(x) = -\mathrm{cos}(x) & f'''(\pi/6) = -\sqrt{3}/2. \end{array}$$

Así pues, sustituyendo en la ecuación del polinomio anterior se llega a

$$P_{f,\pi/6}^3(x) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}(x - \pi/6) - \frac{1}{4}(x - \pi/6)^2 - \frac{\sqrt{3}}{12}(x - \pi/6)^3.$$

Sustituyendo en x=1/2 se tiene que $\mathrm{sen}(1/2)\approx P_{f,\pi/6}^3(1/2)=0.4794255322.$

El error cometido en la aproximación es el resto $R_{f,\pi/6}^3(1/2)$. Expresando el resto de Taylor en la forma de Lagrange se tiene

$$R_{f,\pi/6}^3(1/2) = \frac{f''''(x)}{4!} \left(\frac{1}{2} - \frac{\pi}{6}\right)^4 = \frac{\mathrm{sen}(x)}{24} \left(\frac{1}{2} - \frac{\pi}{6}\right)^4 \text{ con } x \in \left(\frac{1}{2} - \frac{\pi}{6}\right).$$

Como $|\operatorname{sen}(x)| \leq 1 \ \forall x \in \mathbb{R}$, se tiene que una cota del error cometido es

$$|R_{f,\pi/6}^3(1/2)| \le \frac{1}{24} \left(\frac{1}{2} - \frac{\pi}{6}\right)^4 = 6.46 \cdot 10^{-9}.$$

b. La fórmula del polinomio de Maclaurin de quinto grado de f es

$$P_{f,0}^3(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f''''(0)}{4!}x^4 + \frac{f'''''(0)}{5!}x^5$$

Calculando hasta la quinta derivada en 0 y sustituyendo en esta fórmula se tiene

$$P_{f,0}^5(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5.$$

Sustituyendo en x=1/2 se tiene que $\text{sen}(1/2)\approx P_{f,0}^5(1/2)=0.4794270833$, y podemos obtener una cota del error cometido de forma similar a la del apartado anterior, obteniendo $|R_{f,0}^5(1/2)|\leq 2.170\cdot 10^{-5}$.

Ejercicio 6.42. Calcular el polinomio de Maclaurin de tercer grado para la función $f(x) = \arcsin(x)$.



La fórmula del polinomio de Maclaurin de quinto grado de f es

$$P_{f,0}^3(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3.$$

Calculamos hasta la tercera derivada de f en a = 0.

$$\begin{split} f(x) &= \operatorname{arcsen}(x) & f(0) = 0 \\ f'(x) &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-1/2} & f'(0) = 1 \\ f''(x) &= x(1-x^2)^{-3/2} & f''(0) = 0 \\ f'''(x) &= (1-x^2)^{-3/2} + 3x^2(1-x^2)^{-5/2} & f'''(0) = 1. \end{split}$$

Así pues, sustituyendo en la fórmula anterior del polinomio se tiene

$$P_{f,0}^3(x) = x + \frac{1}{6}x^3.$$

Ejercicio 6.43. Calcular $\cos(1)$ con un error menor que 10^{-7} usando aproximaciones de Taylor.

•

Solución

Para calcular de forma aproximada $\cos(1)$ utilizaremos un polinomio de Maclaurin para la función $f(x) = \cos(x)$.

El resto del polinomio de Taylor de orden n de f en a=0 en la forma de Lagrange, para x=1 es

$$R_{f,0}^n(t) = \frac{f^{(n+1}(t)}{(n+1)!} 1^{n+1} = \frac{f^{(n+1}(t)}{(n+1)!} \text{ con } t \in [0,1].$$

Como

$$|f^{(n)}(t)| = \begin{cases} |\operatorname{sen}(t)| & \text{si } n = 2k+1\\ |\operatorname{cos}(t)| & \text{si } n = 2k \end{cases}, k \in \mathbb{N}$$

se tiene que $||f^{(n+1)}(t)| \leq 1 \ \forall t \in \mathbb{R}$, por lo que una cota del resto es $R^n_{f,0}(t) \leq 1/(n+1)!$. Probando con sucesivos valores de n, el primer valor que cumple que $R^n_{f,0}(t) \leq 1/(n+1)! \leq 10^{-7}$ es n=10, por lo que necesitamos calcular el polinomio de de Maclaurin de orden 10, que vale

$$P_{f,0}^{10}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{10}}{10!},$$

que para x = 1 vale

$$P_{f,0}^{10}(1) = 1 - \frac{1^2}{2!} + \frac{1^4}{4!} - \frac{1^6}{6!} + \frac{1^8}{8!} - \frac{1^{10}}{10!} \approx 0.5403023037919.$$

Ejercicio 6.44. Obtener polinomio de Maclaurin de grado 3 de las funciones sen(x) y tg(x), y utilizar los polinomios anteriores para calcular

$$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{tg}(x) - x}{x - \operatorname{sen}(x)}$$

Solución

La formula general para calcular el polinomio de Maclaurin de grado 3 de una función f(x) es:

$$P_0^3(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3.$$

Consideremos, en primer lugar, la función sen(x), y calculemos sus tres primeras derivadas en 0:

$$f(x) = sen(x) \qquad f(0) = sen(0) = 0,$$

$$f'(x) = cos(x) \qquad f'(0) = cos(0) = 1,$$

$$f''(x) = -sen(x) \qquad f'''(0) = -sen(0) = 0,$$

$$f'''(x) = -cos(x) \qquad f'''(0) = -cos(0) = -1.$$

Sustituyendo en la fórmula de arriba, llegamos al primer polinomio que buscamos:

$$P_0^3(x) = 0 + 1 \cdot x + \frac{0}{2!}x^2 + \frac{-1}{3!}x^3 = x - \frac{x^3}{6}.$$

Consideremos ahora la función tg(x) y calculemos sus tres primeras derivadas en 0:

$$\begin{array}{ll} g(x)=\mathrm{tg}(x) & g(0)=\mathrm{tg}(0)=0 \\ g'(x)=1+\mathrm{tg}(x)^2 & g'(0)=1+\mathrm{tg}(0)^20=1 \\ g''(x)=2\,\mathrm{tg}(x)+2\,\mathrm{tg}(x)^3 & g''(0)=2\,\mathrm{tg}(0)+2\,\mathrm{tg}(0)^3=0 \\ g'''(x)=2+8\,\mathrm{tg}(x)^2+6\,\mathrm{tg}(x)^4 & g'''(0)=2+8\,\mathrm{tg}(0)^2+6\,\mathrm{tg}(0)^4=2 \end{array}$$

Sustituyendo de nuevo en la fórmula de arriba, pero utilizando esta vez g(x) en lugar de f(x), llegamos al otro polinomio que buscamos:

$$Q_0^3(x) = 0 + 1 \cdot x + \frac{0}{2!}x^2 + \frac{2}{3!}x^3 = x + \frac{x^3}{3}$$

Finalmente, para calcular ahora el límite que nos piden, podemos sustituir sen(x) por $P_0^3(x)$ y tg(x) por $Q_0^3(x)$, teniendo en cuenta dichos polinomios se comportan de igual forma que las correspondientes funciones en un entorno del 0. Así pues, tenemos:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{tg}(x)-x}{x-\operatorname{sen}(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{Q_0^3(x)-x}{x-P_0^3(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x+\frac{x^3}{3}-x}{x-x+\frac{x^3}{6}}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^3}{3}}{\frac{x^3}{6}}=\lim_{x\to 0}\frac{6}{3}=2.$$

Ejercicio 6.45. La función C(t) da la concentración (en mg/dl) de un fármaco en el

torrente sanguíneo en función del tiempo (en horas):

$$C(t) = \frac{1}{1 + e^{-2t}}$$

- a. Calcular el polinomio de Maclaurin de orden 3.
- b. Utilizando el polinomio anterior, calcular aproximadamente la concentración del fármaco transcurridos 15 minutos.

Solución

a. La fórmula del polinomio de Maclaurin de orden 3 para la función C(t) es:

$$P_{C,0}^3(t) = C(0) + \frac{dC}{dt}(0)t + \frac{d^2C}{dt^2}(0)\frac{t^2}{2!} + \frac{d^3C}{dt^3}(0)\frac{t^3}{3!}$$

Necesitamos calcular las tres primeras derivadas:

$$\begin{split} \frac{dC}{dt} &= \frac{2e^{-2t}}{(1+e^{-2t})^2}, \\ \frac{d^2C}{dt^2} &= \frac{\frac{d}{dt}(2e^{-2t})(1+e^{-2t})^2 - 2e^{-2t}\frac{d}{dt}(1+e^{-2t})^2}{(1+e^{-2t})^4} = \\ &= \frac{-4e^{-2t}(1+e^{-2t})^2 - 2e^{-2t}2(1+e^{-2t})(-2e^{-2t})}{(1+e^{-2t})^4} = \frac{-4e^{-2t}+4e^{-4t}}{(1+e^{-2t})^3}, \\ \frac{d^3C}{dt^3} &= \frac{\frac{d}{dt}(-4e^{-2t}1+4e^{-4t})(1+e^{-2t})^3 - (-4e^{-2t}+4e^{-4t})\frac{d}{dt}(1+e^{-2t})^3}{(1+e^{-2t})^6} = \\ &= \frac{(8e^{-2t}-16e^{-4t})(1+e^{-2t})^3 - (-4e^{-2t}+4e^{-4t})3(1+e^{-2t})^2(-2e^{-2t})}{(1+e^{-2t})^6} = \\ &= \frac{(8e^{-2t}-16e^{-4t})(1+e^{-2t}) - (-4e^{-2t}+4e^{-4t})(-6e^{-2t})}{(1+e^{-2t})^4} = \\ &= \frac{(8e^{-2t}-8e^{-4t}-16e^{-6t}) - (24e^{-4t}-24e^{-6t})}{(1+e^{-2t})^4} = \\ &= \frac{8e^{-2t}-32e^{-4t}+8e^{-6t}}{(1+e^{-2t})^4}. \end{split}$$

Sustituyendo para t = 0 tenemos:

$$\begin{split} C(0) &= \frac{1}{1+e^{-2\cdot 0}} = \frac{1}{2}, \\ \frac{dC}{dt}(0) &= \frac{2e^{-2\cdot 0}}{(1+e^{-2\cdot 0})^2} = \frac{2}{2^2} = \frac{1}{2}, \\ \frac{d^2C}{dt^2}(0) &= \frac{-4e^{-2\cdot 0}+4e^{-4\cdot 0}}{(1+e^{-2\cdot 0})^3} = \frac{-4+4}{2^3} = 0, \\ \frac{d^3C}{dt^3}(0) &= \frac{(8e^{-2\cdot 0}-32e^{-4\cdot 0}+8e^{-6\cdot 0})}{(1+e^{-2\cdot 0})^4} = \frac{8-32+8}{16} = -1. \end{split}$$

Y por último, sustituyendo en la fórmula del polinomio anterior se tiene que

$$P_{C,0}^3(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}t + 0\frac{t^2}{2!} - 1\frac{t^3}{3!} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}t - \frac{1}{6}t^3.$$

b. La concentración del fármaco transcurridos 15 minutos (0.25 horas) es aproximadamente

$$C(0.25) \approx P_{C,0}^3(0.25) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}0.25 - \frac{1}{6}0.25^3 = 0.6223958333 \text{ mg/dl}.$$

7 Series de números reales

Ejercicio 7.1. Demostrar que cualquier sucesión puede expresarse como una serie.

Solución

Dada una sucesión $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, veamos cómo podemos expresarla como una serie. Para ello, basta con construir la sucesión de las diferencias de dos términos consecutivos, es decir, la sucesión $(d_n)_{n=1}^{\infty}$ dada por:

$$\begin{aligned} d_1 &= a_1 \\ d_2 &= a_2 - a_1 \\ d_3 &= a_3 - a_2 \\ &\vdots \\ d_{n+1} &= a_{n+1} - a_n \end{aligned}$$

Resulta sencillo comprobar que $a_n=\sum_{i=1}^n d_i$, por lo que la sucesión $(a_n)_{n=1}^\infty=\left(\sum_{i=1}^n d_i\right)_{n=1}^\infty=\sum d_n$.

Ejercicio 7.2. Demostrar que la serie $\sum \frac{9}{10^n}$ converge y calcular su límite.

Solución

Los primeros términos de la serie son

$$\sum_{i=1}^{1} \frac{9}{10^{i}} = \frac{9}{10} = 0.9$$

$$\sum_{i=1}^{2} \frac{9}{10^{i}} = \frac{9}{10} + \frac{9}{100} = 0.99$$

$$\sum_{i=1}^{3} \frac{9}{10^{i}} = \frac{9}{10} + \frac{9}{100} + \frac{9}{1000} = 0.999$$

$$\vdots$$

por lo que las sumas parciales cada vez están más cerca de 1 y se puede probar fácilmente que $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{9}{10^n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{9}{10^i}=1.$ Para ello, dado un $\varepsilon>0$, por la propiedad arquimediana se puede tomar $k\in\mathbb{N}$ con $\frac{1}{k}<\varepsilon$, de manera que $|\sum_{i=1}^{n}\frac{9}{10^i}-1|<\frac{1}{10^k}<\frac{1}{k}<\varepsilon\;\forall n\geq k.$

Ejercicio 7.3. Si $\sum_{i=1}^n a_n = \frac{n-1}{n+1}$, ¿cuál es el término general de la sucesión a_n ? Calcular $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Solución

Sea $A_n = \sum_{i=1}^n a_i$ la suma parcial de los n primeros términos de la sucesión $(a_n)_{n=1}^\infty$. Entones, el primer término de la sucesión es $a_1 = A_1 = \sum_{i=1}^1 a_i = \frac{1-1}{1+1} = 0$. Por otro lado, $A_n = A_{n-1} + a_n$ por lo que $a_n = A_n - A_{n-1} = \frac{n-1}{n+1} - \frac{n-2}{n} = \frac{2}{n(n+1)}$. Por último, $\sum_{n=1}^\infty a_n = \lim_{n \to \infty} A_n = \lim_{n \to \infty} \frac{n-1}{n+1} = 1$.

Ejercicio 7.4. Demostrar que una serie geométrica $\sum ar^n$ converge si y solo si |x| < 1.

Pista

Utilizar la igualdad $(1 + r + r^2 + \dots + r^n)(1 - r) = 1 - r^{n+1}$.

Solución

Usando la igualdad $(1+r+r^2+\cdots+r^n)(1-r)=1-r^{n+1}$ se tiene

$$\sum_{i=0}^{n} ar^{i} = a\frac{1-r^{n+1}}{1-r} = a\left(\frac{1}{1-r} - \frac{r^{n+1}}{1-r}\right).$$

Si |r|<1 entonces $\lim_{n\to\infty}\frac{r^{n+1}}{1-r}=0,$ de manera que

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \lim_{n \to \infty} \sum_{i=0}^n ar^i = \frac{a}{1-x}.$$

Si |r|>1, entonces $\lim_{n\to\infty}\frac{r^{n+1}}{1-r}=\infty$, y la serie no converge. Si r=1 entonces $\sum_{i=0}^n 1^i=n+1$ que tampoco converge, y si r=-1, se obtiene una sucesión de sumas alternada, ya que $\sum_{i=0}^{2n}(-1)^i=1$ y $\sum_{i=0}^{2n+1}(-1)^i=0$, por lo que la serie tampoco converge.

Ejercicio 7.5. Un enfermo crónico toma cada día una pastilla con 200 mg de un principio activo. Su cuerpo es capaz de metabolizar diariamente el 90% de la cantidad de principio

activo presente. ¿Qué cantidad de principio activo quedará en el cuerpo del enfermo tras n días tomando la pastilla? ¿Qué cantidad de principio activo quedará en el cuerpo del enfermo a largo plazo?

Solución

Sea A_n la cantidad de medicamento que queda en el cuerpo del enfermo tras n días tomando la pastilla. Veamos cuáles son las cantidades de principio activo que quedan en el cuerpo del enfermo los primeros días.

$$\begin{aligned} A_1 &= 0.1 \cdot 200 \text{ mg} \\ A_2 &= 0.1(200 + 0.1 \cdot 200) = 0.1 \cdot 200 + 0.1^2 \cdot 200 = A_1 + 0.1^2 \cdot 200 \text{ mg} \\ A_3 &= 0.1(200 + 0.1 \cdot 200 + 0.1^2 \cdot 200) = 0.1 \cdot 200 + 0.1^2 \cdot 200 + 0.1^3 \cdot 200 = A_2 + 0.1^3 \cdot 200 \text{ mg} \\ \vdots \\ A_n &= A_{n-1} + 0.1^n \cdot 200 \text{ mg} \end{aligned}$$

Por tanto, el término general de la sucesión que subyace a la serie es $a_n = A_n - A_{n-1} = 200 \cdot 0.1^n$, de manera que se trata de la serie geométrica $\sum 200 \cdot 0.1^n$, y, por el ejercicio anterior, como 0.1 < 1, la serie converge a $\sum_{n=1}^{\infty} 200 \cdot 0.1^n = 200 \sum_{n=1}^{\infty} 0.1^n = 200 \frac{1}{1-0.1} = 222.2222 \cdots$ mg.

Ejercicio 7.6. Cuando una persona gasta una cantidad de dinero en un bien o servicio, la persona que recibe el dinero directa o indirectamente, también gasta un porcentaje k de esa cantidad en otros bienes y servicios, mientras que ahorra el resto. En Economía, el valor $\frac{k}{100}$ se conoce como propensión marginal al consumo mientras que $1-\frac{k}{100}$ se conoce como propensión marginal al ahorro. Si una persona inicia el proceso gastando una cantidad x, qué cantidad total se habrá gastado después de n transacciones? ¿Hacia dónde converge el gasto cuando se realiza un número infinito de transacciones? ¿A largo plazo, cuál es el efecto multiplicador sobre el gasto inicial de una propensión marginal al consumo de 0.6?

Solución

Sea a_n el dinero total gastado en la transacción n. Veamos el total de dinero gastado en las primeras n transacciones.

$$a_0 = x$$

$$a_1 = x \frac{k}{100}$$

$$a_2 = x \left(\frac{k}{100}\right)^2$$

$$\vdots$$

$$a_n = x \left(\frac{k}{100}\right)^n$$

Por tanto, el dinero total gastado tras n transacciones será $\sum_{i=0}^{n} x \left(\frac{k}{100}\right)^{i}$, y como se trata de una serie geométrica, tal y como se ha visto en el Ejercicio 7.4, la suma vale

$$\sum_{i=0}^{n} x \left(\frac{k}{100}\right)^{i} = x \frac{1 - \left(\frac{k}{100}\right)^{n+1}}{1 - \frac{k}{100}}.$$

Como la razón es $\frac{k}{100}$ < 1, la serie converge y

$$\sum_{n=0}^{\infty} x \left(\frac{k}{100} \right)^n = \frac{x}{1 - \frac{k}{100}},$$

es decir, la cantidad inicial dividida por la propensión marginal al ahorro. Para una propensión marginal al consumo de 0.6 se tiene $\sum_{n=0}^{\infty} x \left(0.6\right)^n = \frac{x}{1-0.6} =$ 2.5x, así que se produce un efecto multiplicador del 2.5.

Ejercicio 7.7. Una cuenta de ahorro ofrece un 5% de interés anual. Una persona abre la cuenta de ahorro con un depósito de 2000€ y cada año que pasa hace un depósito de 1000€. Calcular la cantidad de dinero que habrá en la cuenta después de n años de forma cerrada. ¿Converge la serie asociada?

Solución

Sea A_n la cantidad de dinero en la cuenta tras n años. Veamos cuáles son las cantidades en la cuenta durante los primeros años.

$$\begin{split} A_1 &= 2000 \cdot 1.05 \mathfrak{C} \\ A_2 &= ((2000 \cdot 1.05) + 1000))1.05 \mathfrak{C} = 2000 \cdot 1.05^2 + 1000 \cdot 1.05 \mathfrak{C} \\ A_3 &= ((2000 \cdot 1.05^2 + 1000 \cdot 1.05) + 1000)1.05 \mathfrak{C} \\ &= 2000 \cdot 1.05^3 + 1000 \cdot 1.05^2 + 1000 \cdot 1.05 \mathfrak{C} \, \vdots \end{split}$$

A partir de aquí, se intuye que la suma parcial de orden n es

$$A_n = 2000 \cdot 1.05^n + \sum_{i=1}^{n-1} 1000 \cdot 1.05^i \in.$$

Como se trata de una serie geométrica, haciendo uso de la pista del Ejercicio 7.4, se puede concluir que

$$\begin{split} A_n &= 2000 \cdot 1.05^n + 1000 \frac{1.05^n - 1}{1.05 - 1} - 1000 \\ &= 2000 \cdot 1.05^n + 20000 (1.05^n - 1) - 1000 \\ &= 22000 \cdot 1.05^n - 21000 \in . \end{split}$$

Ejercicio 7.8. Supongamos un experimento aleatorio que consiste en repetir una prueba con dos posibles resultados (éxito y fracaso) hasta que se obtiene el primer éxito (por ejemplo tirar una moneda hasta que sale la primera cara). La distribución de la variable aleatoria que mide el número de repeticiones hasta obtener el primer éxito se conoce como distribución hipergeométrica y su función de probabilidad es

$$P(X = n) = (1 - p)^{n - 1}p,$$

donde p es la probabilidad de que ocurra éxito en cada repetición de la prueba.

Una de las condiciones que debe cumplir una función de probabilidad de una variable aleatoria es que la suma de las probabilidades de todos los posibles valores de la variable debe ser 1. Demostrar que la función de probabilidad de la variable hipergeométrica lo cumple.

•

Solución

El conjunto de posibles valores que puede tomar la variable aleatoria X es $\mathbb N$. Si consideramos la suma de las probabilidades de todos los posibles valores de la variable se tiene $\sum_{n=1}^{\infty} P(n) = \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{n-1}p = \sum_{n=0}^{\infty} (1-p)^n p$, que, al tratarse de una serie geométrica de razón (1-p) < 1, converge, y como se ha visto en el Ejercicio 7.4, la suma vale

$$\sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^n p = \frac{p}{1-(1-p)} = 1.$$

Por tanto, cumple la condición para ser una función de probabilidad.

Ejercicio 7.9. El conjunto de cantor es un subconjunto fractal del intervalo [0, 1] que se construye de manera recursiva eliminando en cada paso el tercio central de los intervalos que van resultando. El procedimiento sería el siguiente:

1. Quitar del intervalo [0,1] el intervalo abierto $\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$. 2. Quitar de los intervalos restantes, los intervalos $\left(\frac{1}{9},\frac{2}{9}\right)$ y $\left(\frac{7}{9},\frac{8}{9}\right)$. 3. Quitar de los intervalos restantes, los intervalos $\left(\frac{1}{27},\frac{2}{27}\right)$, $\left(\frac{7}{27},\frac{8}{27}\right)$, $\left(\frac{19}{27},\frac{20}{27}\right)$ y

Demostrar que la longitud total de todos los intervalos eliminados es 1, y que, a pesar de ello, el conjunto de Cantor tiene un número infinito de puntos. Se dice que este conjunto es un conjunto de medida nula, pero que ni es vacío ni numerable.

Solución

Sea a_n la longitud de los segmentos eliminados en la etapa n. Veamos cuál es la longitud de los segmentos eliminados en las primeras etapas.

En la primera etapa se quita el intervalo $\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$, y $a_1=\frac{1}{3}$. En la segunda etapa se quitan los intervalos $\left(\frac{1}{9},\frac{2}{9}\right)$ y $\left(\frac{7}{9},\frac{8}{9}\right)$, y por tanto, $a_n=2\frac{1}{9}$. En la tercera etapa se quitan los intervalos $\left(\frac{1}{27},\frac{2}{27}\right)$, $\left(\frac{7}{27},\frac{8}{27}\right)$, $\left(\frac{19}{27},\frac{20}{27}\right)$ y $\left(\frac{25}{27},\frac{26}{27}\right)$, y por tanto, $a_3 = 4\frac{1}{27}$.

En consecuencia, se deduce que $a_n = \frac{2^{n-1}}{3^n}$.

Así pues, la suma de las longitudes de los intervalos quitados es $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$, que, al ser una serie geométrica con razón $\frac{2}{3} < 1$, converge, y como se ha visto en el Ejercicio 7.4, su suma vale

$$\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{1}{3}\frac{1}{1-\frac{2}{3}} = 1.$$

Así pues, el conjunto de Cantor es de medida nula. Para ver que, a pesar de ello tiene infinitos números, basta con ver que contiene, entre otros, los números $\frac{1}{3^n}$ $\forall n \in \mathbb{N}.$

Ejercicio 7.10. Haciendo uso del polinomio de Taylor del logaritmo, demostrar que una serie armónica alternada $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ converge y calcular su suma.

Solución

El polinomio de Taylor de grado n de la función $f(x) = \ln(x)$ en el punto a = 1 es

$$\begin{split} P_{f,1}^n(x) &= 1(x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{2!}{3!}(x-1)^3 - \frac{3!}{4!}(x-1)^4 + \dots + (-1)^{n+1}\frac{(n-1)!}{n!}(x-1)^n \\ &= 1(x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 - \frac{1}{4}(x-1)^4 + \dots + (-1)^{n+1}\frac{1}{n}(x-1)^n \\ \text{y en } x = 2 \text{ se tiene} \end{split}$$

$$P^n_{f,1}(2) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i+1}}{i}$$

Por tanto, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}=\lim_{n\to\infty}P_{f,1}^n(2)=\ln(2).$

Ejercicio 7.11. Haciendo uso del polinomio de Maclaurin de la función exponencial, demostrar que una serie $\sum \frac{1}{n!}$ converge y calcular su suma.

Solución

El polinomio de Maclaurin de grado n de la función $f(x) = e^x$ es

$$P_{f,0}^n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

y en
$$x=1$$
 se tiene
$$P^n_{f,0}(1)=1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}$$

Por tanto, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = \lim_{n \to \infty} P_{f,0}^n(1) = e^1 = e.$

Ejercicio 7.12. Demostrar que las siguientes series divergen.

- a. $\sum \frac{n^2}{n+1}$
- b. $\sum \cos\left(\frac{1}{n}\right)$
- c. $\sum n \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right)$
- d. $\sum \frac{1}{2n}$

- a. Como $\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n+1}=\infty$, por la condición de convergencia, la serie $\sum \frac{n^2}{n+1}$ diverge.
- b. Como $\lim_{n\to\infty}\cos\left(\frac{1}{n}\right)=1\neq 0$, por la condición de convergencia, la serie

 $\sum \cos\left(\frac{1}{n}\right)$ diverge.

- c. Como $\lim_{n\to\infty}n\sin\left(\frac{1}{n}\right)=1\neq 0$, por la condición de convergencia, la serie $\sum n\sin\left(\frac{1}{n}\right)$ diverge.
- d. $\sum \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \sum \frac{1}{n}$ y como la serie armónica $\sum \frac{1}{n}$ diverge, la serie $\sum \frac{1}{2n}$ también.

Ejercicio 7.13. Demostrar que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$.

i Pista

Descomponer el término general de la sucesión subyacente a la serie en fraccione simples.

Solución

El término general de la sucesión se puede descomponer en fracciones simples de la siguiente manera $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, que es una serie telescópica, de modo que la suma parcial de los n primeros términos de la serie es

$$A_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Así pues,

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}=\lim_{n\to\infty}A_n=\lim_{n\to\infty}1-\frac{1}{n+1}=1.$$

Ejercicio 7.14. Estudiar la convergencia de las siguientes series telescópicas.

- a. $\sum \cos(n^2) \cos((n+1)^2)$
- b. $\sum \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n+1}\right)$
- c. $\sum \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$
- d. $\sum_{n\geq 2} \frac{2}{n^2-1}$

Solución

a. Como se trata de una serie telescópica, se tiene que la suma parcial de orden n es

$$\begin{split} A_n &= \sum_{i=1}^n \cos(i^2) - \cos((i+1)^2) \\ &= \cos(1) - \cos(2^2) + \cos(2^2) - \cos(3^2) + \dots + \cos(n^2) - \cos((n+1)^2) \\ &= \cos(1) - \cos((n+1)^2). \end{split}$$

Así pues,

$$\begin{split} \sum_{n=1}^{\infty} \cos(n^2) - \cos((n+1)^2) &= \lim_{n \to \infty} A_n = \lim_{n \to \infty} \cos(1) - \cos((n+1)^2) \\ &= \cos(1) - \lim_{n \to \infty} \cos((n+1)^2). \end{split}$$

Pero como no existe $\lim_{n\to\infty}\cos((n+1)^2)$, la serie no converge.

b. Como se trata de una serie telescópica, se tiene que la suma parcial de orden n es

$$\begin{split} A_n &= \sum_{i=1}^n \operatorname{sen}\left(\frac{1}{i}\right) - \operatorname{sen}\left(\frac{1}{i+1}\right) \\ &= \operatorname{sen}(1) - \operatorname{sen}\left(\frac{1}{2}\right) + \operatorname{sen}\left(\frac{1}{2}\right) - \operatorname{sen}\left(\frac{1}{3}\right) + \dots + \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right) - \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n+1}\right) \\ &= \operatorname{sen}(1) - \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n+1}\right). \end{split}$$

Así pues,

$$\begin{split} \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right) - \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n+1}\right) &= \lim_{n \to \infty} A_n = \lim_{n \to \infty} \operatorname{sen}(1) - \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n+1}\right) \\ &= \operatorname{sen}(1) - \lim_{n \to \infty} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n+1}\right) = \operatorname{sen}(1), \end{split}$$

y, por tanto, la serie converge a sen(1).

c. $\sum \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \sum \ln(n+1) - \ln(n)$ que de nuevo es una serie telescópica, por lo que su suma parcial de orden n es

$$\begin{split} A_n &= \sum_{i=1}^n \ln(i+1) - \ln(i) \\ &= \ln(2) - \ln(1) + \ln(3) - \ln(2) + \ln(4) - \ln(3) + \dots + \ln(n+1) - \ln(n) \\ &= \ln(n+1) - \ln(1) = \ln(n+1). \end{split}$$

Así pues,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n+1}{n} \right) = \lim_{n \to \infty} A_n = \lim_{n \to \infty} \ln(n+1) = \infty,$$

y, por tanto, la serie diverge.

d. $\sum_{n\geq 2}\frac{2}{n^2-1}=\sum_{n\geq 2}\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n+1}$, que también es una serie telescópica, cuya suma parcial de orden n es

$$\begin{split} A_n &= \sum_{i=2}^n \frac{1}{i-1} - \frac{1}{i+1} \\ &= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \\ &= 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} = \frac{3}{2} - \frac{1}{n+1}. \end{split}$$

Así pues,

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} = \lim_{n \to \infty} A_n = \lim_{n \to \infty} \frac{3}{2} - \frac{1}{n+1} = \frac{3}{2} - \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n+1} = \frac{3}{2},$$

y, por tanto, la serie converge a $\frac{3}{2}$.

Ejercicio 7.15. Estudiar la convergencia de las siguientes series comparándolas con otras conocidas.

- a. $\sum \frac{2n}{4n^3 n + 1}$
- b. $\sum \frac{\ln(n)}{n}$
- c. $\sum \frac{3^n}{2^n+1}$
- d. $\sum \frac{n+1}{\sqrt{n^3}}$
- e. $\sum \frac{e^{1/n}}{n}$
- f. $\sum \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right)$
- g. $\sum \frac{n+1}{n!}$
- h. $\sum \frac{n^n}{n!}$

Solución

a. $\frac{2n}{4n^3-n+1}>0\ \forall n\in\mathbb{N}$, por lo que se trata de una serie de términos positivos. Como $4n^3-n+1>4n^3-n>0\ \forall n\mathbb{N}$ se tiene que

$$\frac{2n}{4n^3-n+1}<\frac{2n}{4n^3-n}=\frac{2}{4n^2-1}=\frac{2}{(2n+1)(2n-1)}=\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\ \forall n\in\mathbb{N}.$$

Así pues, por el criterio de comparación de series, $\sum \frac{2n}{4n^3-n+1}$ converge sí $\sum \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}$ converge. Pero esta última serie es una serie telescópica, y como $\lim_{n \to \infty} \frac{1}{2n-1} = 0$, converge, de manera que $\sum \frac{2n}{4n^3-n+1}$ también converge.

- b. $\frac{\ln(n)}{n} \geq 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$, por lo que se trata de una serie de términos positivos. Como $\ln(n) > 1 \ \forall n \geq 3$, se tiene que $\frac{\ln(n)}{n} > \frac{1}{n} \ \forall n \geq 3$, y como $\sum \frac{1}{n}$ es la serie armónica, que diverge, por el criterio de la comparación de series, $\sum \frac{\ln(n)}{n}$ también diverge.
- c. $\frac{3^n}{2^n+1} > 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$ por lo que se trata de una serie de términos positivos. Como $2^n+1 > 2^n \ \forall n \in \mathbb{N}$, se tiene que $\frac{3^n}{2^n+1} < \frac{3^n}{2^n} = \left(\frac{3}{2}\right)^n \ \forall n \in \mathbb{N}$. Y como $\sum \left(\frac{3}{2}\right)^n$ diverge al ser una serie geométrica de razón $\frac{3}{2} > 1$, por el criterio de comparación de series se tiene que $\sum \frac{3^n}{2^n+1}$ también diverge.
- d. $\frac{n+1}{\sqrt{n^3}} > 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$ por lo que se trata de una serie de términos positivos. Por otro lado,

$$\sum \frac{n+1}{\sqrt{n^3}} = \sum \frac{n+1}{n^{3/2}} = \sum \left(\frac{n}{n^{3/2}} + \frac{1}{n^{3/2}}\right) = \sum \frac{1}{n^{1/2}} + \sum \frac{1}{n^{3/2}}.$$

Como $\sum \frac{1}{n^{1/2}}$ es una serie p con p<1, diverge, y por tanto, $\sum \frac{n+1}{\sqrt{n^3}}$ también diverge.

- e. $\frac{e^{1/n}}{n}>0 \ \forall n\in\mathbb{N}$ por lo que se trata de una serie de términos positivos. Como $e^{1/n}>1 \ \forall n\in\mathbb{N}$ se tiene que $\frac{e^{1/n}}{n}>\frac{1}{n} \ \forall n\in\mathbb{N}$, y como $\sum \frac{1}{n}$ es la serie armónica, que diverge, por el criterio de la comparación de series, $\sum \frac{e^{1/n}}{n}$ también diverge.
- f. $\operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right) > 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$ por lo que se trata de una serie de términos positivos. Haciendo el cambio de variable $x = \frac{1}{n}$, se tiene

$$\lim_{n \to \infty} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} = \lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} = 1,$$

al ser sen(x) y x infinitésimos equivalentes en 0. Así pues, por el criterio del cociente, se tiene que $\sum \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right)$ converge si y solo si $\sum \frac{1}{n}$ converge, pero $\sum \frac{1}{n}$ es la serie armónica, que diverge, y por tanto, $\sum \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right)$ también diverge.

g. $\frac{n+1}{n!} > 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$ por lo que se trata de una serie de términos positivos. Por otro lado, se tiene

$$\sum \frac{n+1}{n!} = \sum \frac{n}{n!} + \frac{1}{n!} = \sum \frac{1}{n-1!} + \sum \frac{1}{n!},$$

y como se ha visto en el Ejercicio 7.11, tanto $\sum \frac{1}{(n-1)!}$ como $\sum \frac{1}{n!}$ convergen, por lo que $\sum \frac{n+1}{n!}$ también converge.

h. $\frac{n^n}{n!} > 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$ por lo que se trata de una serie de términos positivos. Por otro lado, se tiene

$$\frac{n^n}{n!} = \frac{n}{n} \frac{n}{n-1} \frac{n}{n-2} \cdots \frac{n}{1} \ge n \ \forall n \in \mathbb{N}.$$

Y como $\sum n$ diverge, por el criterio de comparación de series, $\sum \frac{n^n}{n!}$ también diverge.

Ejercicio 7.16. Demostrar que si $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son dos series de términos positivos entonces se cumple que

- a. Si $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=0$ y $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ también converge.
- b. Si $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\infty$ y $\sum b_n$ diverge, entonces $\sum a_n$ también diverge.

Solución

- a. Supongamos que $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=0$. Entonces, para $\varepsilon=1$ existe $k\in\mathbb{N}$ tal que $\left|\frac{a_n}{b_n}\right|=\frac{a_n}{b_n}<1\ \forall n\geq k,$ y por tanto, $a_n< b_n\ \forall n\geq k.$ Así pues, por el criterio de comparación de series, si $\sum_{n\geq k}b_n$ converge, $\sum_{n\geq k}a_n$ también, y como un número finito de términos no influye en la convergencia de una serie, $\sum a_n$ converge.
- b. Supongamos que $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\infty$. Entonces, para $\varepsilon=1$ existe $k\in\mathbb{N}$ tal que $\left|\frac{a_n}{b_n}\right|=\frac{a_n}{b_n}>1\ \forall n\geq k$, y por tanto, $a_n>b_n\ \forall n\geq k$. Así pues, por el criterio de comparación de series, si $\sum_{n\geq k}b_n$ diverge, $\sum_{n\geq k}a_n$ también, y como un número finito de términos no influye en la convergencia de una serie, $\sum a_n$ diverge.

Ejercicio 7.17. Dada una serie de términos positivos $\sum a_n$ convergente, estudiar si las siguientes series convergen.

a.
$$\sum a_n^2$$

b.
$$\sum \frac{1}{a_n^3}$$

c.
$$\sum \ln(1+a_n)$$

d.
$$\sum \operatorname{sen}(a_n)$$

Solución

- a. Por el criterio de divergencia, como $\sum a_n$ converge, se tiene que $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$. Por otro lado, $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n^2}{a_n} = \lim_{n\to\infty} a_n = 0$, y por lo visto en el Ejercicio 7.16, como $\sum a_n$ converge, $\sum a_n^2$ también.
- b. $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^3}{a_n}=\lim_{n\to\infty}a_n^2=0$, ya que, según el apartado anterior $\sum a_n^2$ converge, y por lo visto en el Ejercicio 7.16, como $\sum a_n$ converge, $\sum a_n^3$ también. Finalmente, como $\sum a_n^3$ converge, la serie de los inversos $\sum a_n^{-3}$ diverge.
- c. Por el criterio de divergencia, como $\sum a_n$ converge, se tiene que $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, y haciendo el cambio de variable $x=a_n$, se tiene

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(1+a_n)}{a_n}=\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1,$$

ya que $\ln(1+x)$ y x son infinitésimos equivalentes en 0. Por tanto, por el criterio del cociente, $\sum \ln(1+a_n)$ también converge.

d. Por el criterio de divergencia, como $\sum a_n$ converge, se tiene que $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, y haciendo el cambio de variable $x=a_n$, se tiene

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\operatorname{sen}(a_n)}{a_n}=\lim_{x\to0}\frac{\operatorname{sen}(x)}{x}=1,$$

ya que sen(x) y x son infinitésimos equivalentes en 0. Por tanto, por el criterio del cociente, $\sum \text{sen}(a_n)$ también converge.

Ejercicio 7.18. Estudiar la convergencia de las siguientes series alternadas.

a.
$$\sum \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$$

b.
$$\sum (-1)^n e^{-n}$$

c.
$$\sum (-1)^n \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{n}\right)$$

d. $\sum (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$

Solución

- a. $\left(\frac{1}{2n-1}\right)_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión monótona decreciente, ya que $\frac{1}{2n-1}>\frac{1}{2(n+1)-1}=\frac{1}{2n+1}\ \forall n\in\mathbb{N}$. Como además $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n-1}=0$, por el criterio de la serie alternada se tiene que $\sum\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ converge.
- b. $(e^{-n})_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión monótona decreciente, ya que $e^{-n} > e^{-(n+1)} \ \forall n \in \mathbb{N}$. Como además $\lim_{n \to \infty} e^{-n} = 0$, por el criterio de la serie alternada se tiene que $\sum (-1)^n e^{-n}$ converge.
- c. $\left(\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{n}\right)\right)_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión monótona decreciente, ya que $\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{n}\right) > \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{n+1}\right) \, \forall n \geq 2$. Como además $\lim_{n \to \infty} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{n}\right) = 0$, por el criterio de la serie alternada se tiene que $\sum (-1)^n \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{n}\right)$ converge.
- d. Sea A_n la suma parcial de orden n de la serie $\sum (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt{n+1}} \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$. Si desarrollamos las primeras sumas parciales se tiene

$$\begin{split} A_1 &= \frac{-1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{1}} \\ A_2 &= \frac{-1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} = 1 - \frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \\ A_3 &= 1 - \frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{3}} = 1 - \frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{2}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} \\ A_3 &= 1 - \frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{2}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{4}} = 1 - \frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{2}{\sqrt{3}} - \frac{2}{\sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{5}} \\ &\vdots \\ A_n &= 1 + 2 \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \end{split}$$

Como la sucesión $\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)_{n=1}^{\infty}$ es monótona decreciente, ya que $\frac{1}{\sqrt{n}} > \frac{1}{\sqrt{n+1}}$ $\forall n \in \mathbb{N}$, y $\lim_{n \to \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$, por el criterio de la serie alternada se tiene que $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge, y por tanto, $\sum (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n}}\right) = 1 + 2\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ también converge.

Ejercicio 7.19. El movimiento de un muelle amortiguado con un peso colgado de él es oscilante. Si la posición que ocupa el peso en cada periodo de oscilación n viene dado por la serie $\sum (-1)^{n-1}e^{-n/2}$, ¿llegará a estabilizarse en una posición de equilibrio a largo plazo?

Solución

 $(e^{-n/2})_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión monótona decreciente, ya que $e^{-n/2}>e^{-(n+1)/2}\ \forall n\in\mathbb{N}.$ Como además $\lim_{n\to\infty}e^{-n/2}=0,$ por el criterio de la serie alternada se tiene que $\sum (-1)^{n-1}e^{-n/2}$ converge, así que el peso colgado del muelle se estabilizará a largo plazo en la posición $\sum (-1)^{n-1}e^{-n/2}.$

Ejercicio 7.20. Estudiar la convergencia absoluta de las siguientes series.

- a. $\sum \frac{(-2)^n}{n^2}$.
- b. $\sum \frac{n}{3^n}$
- c. $\sum \frac{\operatorname{sen}(n)}{n^2}$.
- d. $\sum \frac{(-1)^n}{\ln(n)}$
- e. $\sum \left(\frac{n^2+1}{2n^2-1}\right)^n$
- f. $\sum \frac{n!}{n^n}$

Solución

a. Como

$$\lim_{n \to \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \to \infty} \frac{\frac{2^{n+1}}{(n+1)^2}}{\frac{2^n}{n^2}} = \lim_{n \to \infty} \frac{2n^2}{(n+1)^2} = 2 > 1,$$

por el criterio de la razón, se tiene que $\sum \frac{(-2)^n}{n^2}$ diverge.

b. Como

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n+1}{3^{n+1}}}{\frac{n}{3^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{3n}=\frac{1}{3}<1,$$

por el criterio de la razón, se tiene que $\sum \frac{n}{3^n}$ es absolutamente convergente.

- c. Como $\left|\frac{\operatorname{sen}(n)}{n^2}\right| < \frac{1}{n^2} \ \forall n \in \mathbb{N}, \ y \sum \frac{1}{n^2} \ \text{converge al ser una serie} \ p \ \text{con} \ p = 2 > 1,$ por el criterio de comparación de series, $\sum \left|\frac{\operatorname{sen}(n)}{n^2}\right| \ \text{converge}, \ y \ \text{por tanto},$ $\sum \frac{\operatorname{sen}(n)}{n^2} \ \text{es} \ \text{absolutamente convergente}.$
- d. $\sum \left| \frac{(-1)^n}{\ln(n)} \right| = \sum \frac{1}{\ln(n)} \ \forall n > 1$, y como $\frac{1}{\ln(n)} > \frac{1}{n} \ \forall n > 1$, por el criterio de comparación de series, $\sum \frac{1}{\ln(n)}$ diverge ya que $\sum \frac{1}{n}$ diverge. Por tanto, $\sum \frac{(-1)^n}{\ln(n)}$ no es absolutamente converge.

e. Como

$$\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n^2+1}{2n^2-1}\right)^n} = \lim_{n \to \infty} \frac{n^2+1}{2n^2-1} = \frac{1}{2} < 1,$$

por el criterio de la razón, se tiene que $\sum \left(\frac{n^2+1}{2n^2-1}\right)^n$ es absolutamente convergente.

f. Como

$$\begin{split} \lim_{n \to \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \to \infty} \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}} = \lim_{n \to \infty} \frac{\frac{(n+1)n!}{(n+1)(n+1)^n}}{\frac{n!}{n^n}} \\ &= \lim_{n \to \infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} = \lim_{n \to \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{1}{e} < 1, \end{split}$$

por el criterio de la razón, se tiene que $\sum \frac{n!}{n^n}$ es absolutamente convergente.

Ejercicio 7.21. Demostrar que el radio de convergencia de una serie de potencias $\sum c_n x^n$ se puede calcular mediante las siguientes fórmulas

$$R = \frac{1}{\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{|c_n|}} \quad \text{o} \quad R = \lim_{n \to \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|.$$

Solución

Para probar la validez de la primera fórmula utilizaremos el criterio de la raíz para convergencia absoluta de series.

$$\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{|c_n x^n|} = |x| \lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{|c_n|} < 1 \Leftrightarrow |x| < \frac{1}{\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}.$$

Y para probar la validez de la segunda fórmula utilizaremos el criterio de la razón para la convergencia absoluta de series.

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{c_{n+1}x^{n+1}}{c_nx^n}\right|=|x|\lim_{n\to\infty}\left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right|<1\Leftrightarrow |x|<\frac{1}{\lim_{n\to\infty}\left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right|}=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{c_n}{c_{n+1}}\right|.$$

Ejercicio 7.22. Calcular el radio de convergencia y el dominio de convergencia puntual de las siguientes series de potencias.

- a. $\sum nx^n$
- b. $\sum \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt{n}}$
- c. $\sum n!(x-1)^n$
- d. $\sum \frac{(x-2)^n}{n^3}$
- e. $\sum \frac{n!(x-3)^n}{n^n}$
- f. $\sum \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right)(x+1)^n$

Solución

a. Aplicando el criterio de la razón se tiene que el radio de convergencia es

$$R = \lim_{n \to \infty} \left| \frac{n}{n+1} \right| = 1.$$

Para x=1 se tiene la serie $\sum n$, que diverge, y para x=-1 se tiene la serie $\sum (-1^n)n$, que es una serie alternada pero también diverge ya que $\lim_{n\to\infty} n=\infty$. Por tanto, el dominio de convergencia de la serie de potencias es (-1,1).

b. Aplicando el criterio de la razón se tiene que el radio de convergencia es

$$R = \lim_{n \to \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}{\frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n+1}}} \right| = \lim_{n \to \infty} \frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}} = 1.$$

Para x=1 se tiene la serie $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, que es una serie alternada que converge ya que $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}=0$, y para x=-1 se tiene la serie $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ que diverge al ser una serie p con $p\leq 1$. Por tanto, el dominio de convergencia de la serie de potencias es (-1,1].

c. Aplicando el criterio de la razón se tiene que el radio de convergencia es

$$R = \lim_{n \to \infty} \left| \frac{n!}{(n+1)!} \right| = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n+1} = 0.$$

Por tanto, la serie de potencias solo converge en x = 1.

d. Aplicando el criterio de la razón se tiene que el radio de convergencia es

$$R = \lim_{n \to \infty} \left| \frac{\frac{1}{n^3}}{\frac{1}{(n+1)^3}} \right| = \lim_{n \to \infty} \frac{(n+1)^3}{n^3} = 1.$$

Por tanto, la serie de potencias converge para |x-2| < 1, es decir, en (1,3). Para x=1 se tiene la serie $\sum \frac{(-1)^n}{n^3}$, que es una serie alternada que converge ya que $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^3}=0$, y para x=-1 se tiene la serie $\sum \frac{1}{n^3}$ que también converge al ser una serie p con p>1. Por tanto, el dominio de convergencia de la serie de potencias es [1,3].

e. Aplicando el criterio de la razón se tiene que el radio de convergencia es

$$R = \lim_{n \to \infty} \left| \frac{\frac{n!}{n^n}}{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}} \right| = \lim_{n \to \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n (n+1)} = \lim_{n \to \infty} \frac{(n+1)^n}{n^n}$$
$$= \lim_{n \to \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$$

Por tanto, la serie de potencias converge para |x-3| < e, es decir, en (3-e,3+e). Para x=3+e se tiene la serie $\sum \frac{n!e^n}{n^n}$ diverge ya que $\lim_{n\to\infty} \frac{n!e^n}{n^n} = \infty$, y para x=3-e se tiene la serie $\sum (-1)^n \frac{n!e^n}{n^n}$, que es una serie alternada que también diverge por la misma razón que la anterior. Por tanto, el dominio de convergencia de la serie de potencias es (3-e,3+e).

f. Aplicando el criterio de la razón se tiene que el radio de convergencia es

$$R = \lim_{n \to \infty} \left| \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right)}{\operatorname{sen}\left(\frac{1}{n+1}\right)} \right| = \lim_{n \to \infty} \left| \frac{\cos\left(\frac{1}{n}\right)\frac{-1}{n^2}}{\cos\left(\frac{1}{n+1}\right)\frac{-1}{(n+1)^2}} \right|$$

$$= \lim_{n \to \infty} \frac{(n+1)^2}{n^2} = 1$$
(L'Hôpital)

Por tanto, la serie de potencias converge para |x+1| < 1, es decir, en (-2,0). Para x=0 se tiene la serie $\sum \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right)$ que diverge según se vio en el Ejercicio 7.15, y para x=-2 se tiene la serie $\sum (-1)^n \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right)$, que es una serie alternada que converge al ser $\lim_{n\to\infty} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right)=0$. Por tanto, el dominio de convergencia de la serie de potencias es [-2,0).

Ejercicio 7.23. Demostrar que la serie de potencias $\sum \frac{x^n}{n!}$ es absolutamente convergente para cualquier $x \in \mathbb{R}$.

Demostrar también que la función $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ cumple la ecuación diferencial f'(x) = f(x). ¿Qué otras funciones conoces que la cumplen?

Demostrar finalmente que $f(x) = e^x$.

Como

$$\begin{split} \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| &= \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{x^n}{n!}} = \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{|xx^n|}{(n+1)n!}}{\frac{|x^n|}{n!}} \\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{|x|}{n+1} = 0 \ \forall x\in\mathbb{R}, \end{split}$$

por el criterio de la razón, se tiene que $\sum \frac{x^n}{n!}$ es absolutamente convergente $\forall x \in \mathbb{R}$. Sea $A_n(x)$ la función de la suma parcial de orden n de la serie anterior para cualquier $x \in \mathbb{R}$, es decir,

$$A_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

Entonces, su derivada vale

$$\begin{split} A_n'(x) &= (1)' + (x)' + \left(\frac{x^2}{2!}\right)' + \left(\frac{x^3}{3!}\right)' + \left(\frac{x^4}{4!}\right)' + \dots + \left(\frac{x^n}{n!}\right)' \\ &= 0 + 1 + \frac{2x}{2!} + \frac{3x^2}{3!} + \frac{4x^3}{4!} + \dots + \frac{nx^{n-1}}{n!} \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = A_{n-1}(x) \end{split}$$

Así pues, si tomamos la función $f(x)=\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}=\lim_{n\to\infty}A_n(x),$ su derivada vale

$$f'(x) = \lim_{n \to \infty} A'_n(x) = \lim_{n \to \infty} A_{n-1}(x) = \lim_{n \to \infty} A_n(x) = f(x).$$

Por tanto, la función $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ cumple la ecuación diferencial f'(x) = f(x). Otra función conocida que cumple esa ecuación diferencial es $g(x) = e^x$. Veamos que $f(x) = e^x$.

Ejercicio 7.24. Usar el resultado del ejercicio anterior para calcular la suma de la serie de potencias $\sum \frac{(x+2)^n}{(n+1)!}$.

Solución

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{(n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+2)^{n+1}}{(x+2)(n+1)!} = \frac{1}{x+2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{n!} = \frac{e^{x+2}-1}{x+2}.$$

Ejercicio 7.25. La distribución de Poisson es una de las distribuciones de probabilidad más importantes, ya que explica la probabilidad de que ocurra un número determinado de fenómenos puntuales en un soporte continuo (como por ejemplo el número de llamadas telefónicas que llegan a un servicio de atención al cliente en un intervalo de tiempo). Su función de probabilidad es

$$P(n) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!} \ \forall n \in \mathbb{N},$$

donde $\lambda > 0$ es su media.

Demostrar que esta función es una función de masa de probabilidad.

Solución

El conjunto de posibles valores que puede tomar la variable aleatoria X es $\mathbb{N} \cup \{0\}$. Si consideramos la suma de las probabilidades de todos los posibles valores de la variable se tiene

$$\sum_{n=0}^{\infty} P(n) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!} = e^{-\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{n!}.$$

Como se ha visto en el Ejercicio 7.23, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x \ \forall x \in \mathbb{R}$, en particular se tiene que $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{n!} = e^{\lambda}$, por lo que finalmente se tiene

$$\sum_{n=0}^{\infty} P(n) = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1,$$

y se cumple la condición para ser una función de probabilidad.

Ejercicio 7.26. Calcular la serie de Taylor de las siguientes funciones en los puntos dados.

- a. $f(x) = \cos(x)$ en $a = \pi$.
- b. $g(x) = \ln(x+1)$ en a = 0.
- c. $h(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ en a = 1.

Solución

a. Calculamos las primeras derivadas de f en π para llegar a la expresión de la derivada $n\text{-}\mathrm{\acute{e}sima}.$

$$f(x) = \cos(x) \qquad f(\pi) = \cos(\pi) = -1,$$

$$f'(x) = -\sin(x) \qquad f'(\pi) = -\sin(\pi) = 0,$$

$$f''(x) = -\cos(\pi) \qquad f''(\pi) = -\cos(\pi) = 1,$$

$$f'''(x) = \sin(x) \qquad f'''(\pi) = \sin(\pi) = 0$$

$$f''''(x) = \cos(x) \qquad f''''(\pi) = \cos(\pi) = -1.$$

Así pues, las derivadas se repiten en órdenes múltiplos de 4, y la expresión general de la derivada de orden n en π es

$$f^{(n)}(\pi) = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 2k+1, \ k \in \mathbb{N} \\ (-1)^{k+1} & \text{si } n = 2k, \ k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Por tanto, la serie de Taylor de f en π es

$$\sum \frac{f^{(n)}(\pi)}{n!} (x-\pi)^n = \sum \frac{(-1)^{k+1}}{(2k)!} (x-\pi)^{2k}.$$

b. Calculamos las primeras derivadas de g en 0 para llegar a la expresión de la derivada n-ésima.

$$\begin{split} g(x) &= \ln(x+1) & g(0) &= \ln(1) = 0, \\ g'(x) &= (x+1)^{-1} & g'(0) &= 1^{-1} = 1, \\ g''(x) &= -(x+1)^{-2} & g''(0) &= -(1)^{-2} = -1, \\ g'''(x) &= 2(x+1)^{-3} & g'''(0) &= 2(1)^{-3} = 2, \\ g''''(x) &= -3!(x+1)^{-4} & g''''(0) &= -3!(1)^{-4} = -3!. \end{split}$$

Así pues, la derivada de orden n en 0 es

$$q^{(n)}(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!$$

y sustituyendo en la fórmula de la serie de Taylor se tiene

$$\sum \frac{g^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{n!} x^n = \sum \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n.$$

c. Calculamos las primeras derivadas de h en 1 para llegar a la expresión de la derivada n-ésima.

$$\begin{split} h(x) &= \frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2} & h(1) = 1^{-1/2} = 1, \\ h'(x) &= -\frac{1}{2}x^{-3/2} & h'(1) = -\frac{1}{2}1^{-3/2} = -\frac{1}{2}, \\ h''(x) &= \frac{1}{2}\frac{3}{2}x^{-5/2} & h''(1) = \frac{1}{2}\frac{3}{2}1^{-5/2} = \frac{1}{2}\frac{3}{2}, \\ h'''(x) &= -\frac{1}{2}\frac{3}{2}\frac{5}{2}x^{-7/2} & h'''(1) = -\frac{1}{2}\frac{3}{2}\frac{5}{2}1^{-7/2} = -\frac{1}{2}\frac{3}{2}\frac{5}{2}. \end{split}$$

Así pues, la derivada de orden n en 1 es

$$h^{(n)}(1) = (-1)^n \frac{\prod_{i=1}^n (2i-1)}{2^n},$$

y sustituyendo en la fórmula de la serie de Taylor se tiene

$$\sum \frac{h^{(n)}(1)}{n!}(x-1)^n = \sum (-1)^n \frac{\prod_{i=1}^n (2i-1)}{2^n n!} (x-1)^n.$$

Ejercicio 7.27. Construir la serie de Maclaurin de la función $f(x) = (1+x)^k$ para cualquier $k \in \mathbb{R}$ y estudiar su dominio de convergencia. ¿Qué serie se obtiene cuando $k \in \mathbb{N}$?

Solución

Calculamos las primeras derivadas de f en 0 para llegar a la expresión de la derivada n-ésima.

$$\begin{split} f(x) &= (1+x)^k & f(0) &= 1^k = 1, \\ f'(x) &= k(1+x)^{k-1} & f'(0) &= k(1)^{k-1} = k, \\ f''(x) &= k(k-1)(1+x)^{k-2} & f''(0) &= k(k-1)(1)^{k-2} = k(k-1), \\ f'''(x) &= k(k-1)(k-2)(1+x)^{k-3} & f'''(0) &= k(k-1)(k-2)(1)^{k-3} = k(k-1)(k-2). \end{split}$$

Así pues, la derivada de orden n en 0 es

$$f^{(n)}(0) = k(k-1)(k-2)\cdots(k-n+1)$$

y sustituyendo en la fórmula de la serie de Taylor se tiene

$$\sum \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum \frac{k(k-1)(k-2)\cdots(k-n+1)}{n!} x^n.$$

Cuando $k \in \mathbb{N}$ se tiene que la derivada de orden k es

$$f^k(x) = k(k-1)\cdots(k-k+1)(1+x)^{k-k} = k!$$

y, a partir de aquí las siguientes derivadas se anulan, por lo que, al sustituir en la fórmula de las serie de Maclaurin se obtiene la suma finita

$$\sum \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{i=1}^k \frac{k(k-1)(k-2)\cdots(k-i+1)}{i!} x^i = \sum_{i=1}^k \binom{k}{i} x^i,$$

que es el desarrollo del binomio.

Ejercicio 7.28. Calcular la serie de Maclaurin de la función $f(x) = \arctan(x)$ y utilizarla para obtener una serie cuya suma sea π .

Solución

Calculamos las primeras derivadas de f en 0 para llegar a la expresión de la derivada n-ésima.

$$\begin{split} f(x)&=\arctan(x) & f(0)=\arctan(0)=0,\\ f'(x)&=\frac{1}{1+x^2}=(1+x^2)^{-1} & f'(0)=1^{-1}=1,\\ f''(x)&=-(1+x^2)^{-2}2x & f''(0)=-(1)^{-2}2\cdot 0=0,\\ f'''(x)&=2(1+x^2)^{-3}4x^2-2(1+x^2)^{-2} & f'''(0)=2(1)^{-3}4\cdot 0-2(1)^{-2}=-2.\\ f''''(x)&=-3!(1+x^2)^{-4}2^3x^3+4!(1+x^2)^{-3}x & f''''(0)=-3!(1)^{-4}2^3\cdot 0^3+4!(1)^{-3}0=0.\\ f'''''(x)&=4!(1+x^2)^{-5}2^4x^4-288(1+x^2)^{-5}x^2+4!(1+x^2)^{-3} & f''''(0)=4!. \end{split}$$

Así pues, la derivada de orden n en 0 es

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 2k, \, k \in \mathbb{N} \\ (-1)^k (2k)! & \text{si } n = 2k+1, \, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

y sustituyendo en la fórmula de la serie de Taylor se tiene

$$\sum \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum \frac{(-1)^k (2k)!}{(2k+1)!} x^{2k+1} = \sum (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$$

Se puede probar que el radio de convergencia de esta serie es $|x| \leq 1$, por lo que para x=1 se tiene que

$$\sum (-1)^k \frac{1^{2k+1}}{2k+1} = \sum \frac{(-1)^k}{2k+1} = \arctan(1) = \pi/4,$$

de manera que

$$4\sum \frac{(-1)^k}{2k+1} = \pi.$$

Ejercicio 7.29. Usando desarrollos de Taylor, calcular los siguientes límites.

- a. $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}$
- b. $\lim_{x\to 0} \frac{\arctan(x)-x}{x^3}$

Solución

a. El desarrollo de Maclaurin de la función $\ln(1+x)$ es $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$ con dominio de convergencia (-1,1]. Así que sustituyendo en el límite se tiene

$$\begin{split} \lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} &= \lim_{x \to 0} \frac{\left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}\right) - x}{x^2} = \lim_{x \to 0} \frac{\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}}{x^2} \\ &= \lim_{x \to 0} \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{n-2}}{n} = -1/2. \end{split}$$

b. El desarrollo de Maclaurin de la función $\operatorname{arctg}(x)$ es $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ con dominio de convergencia (-1,1). Así que sustituyendo en el límite se tiene

$$\begin{split} \lim_{x \to 0} \frac{\arctan(x) - x}{x^3} &= \lim_{x \to 0} \frac{\left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}\right) - x}{x^3} = \lim_{x \to 0} \frac{\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}}{x^3} \\ &= \lim_{x \to 0} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n-2}}{2n+1} = -1/3. \end{split}$$

8 Integrales de funciones

Ejercicio 8.1. Calcular las sumas inferior y superior de Riemann de las siguientes funciones en el intervalo [0,1], tomando particiones de igual tamaño con n puntos, desde n=2 hasta n=5.

a.
$$f(x) = 1 - x$$

b.
$$g(x) = x^2$$

c.
$$h(x) = e^{-x}$$

Solución

Tomaremos particiones de igual tamaño $P_n=\{x_0,x_1,\dots,x_n\}$ con $x_i=\frac{i}{n}$ para $i=0,1,\dots,n.$

| \overline{n} | $s(f,P_n)$ | $S(f, P_n)$ |
|----------------|------------|-------------|
| $\overline{2}$ | 0.25 | 0.75 |
| 3 | 1/3 | 2/3 |
| 4 | 0.375 | 0.625 |
| 5 | 0.4 | 0.6 |
| | | |

a.

| \overline{n} | $s(f, P_n)$ | $S(f, P_n)$ |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| $\frac{-}{2}$ | $\frac{0.125}{0.125}$ | $\frac{0.625}{0.625}$ |
| 3 | 0.125 0.1852 | 0.5185 |
| 4 | 0.2188 | 0.4687 |
| 5 | 0.24 | 0.44 |

b.

| \overline{n} | $s(f,P_n)$ | $S(f, P_n)$ |
|----------------|------------|-------------|
| $\overline{2}$ | 0.4872 | 0.8033 |
| 3 | 0.5326 | 0.7433 |
| 4 | 0.5564 | 0.7144 |
| 5 | 0.571 | 0.6974 |

c.

Ejercicio 8.2. Usar las sumas inferiores y superiores de Riemann para dar una aproximación del área contenida entre la gráfica de la función sen(x) y el eje x en el intervalo $[0, \pi/2]$, usando 4 rectángulos de igual base.

Solución

Tomando la partición $P = \{0, \pi/8, \pi/4, 3\pi/4, \pi/2\}$ se tiene

$$\begin{split} s(f,P) &= \mathrm{sen}(0)\frac{\pi}{8} + \mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{8}\right)\frac{\pi}{8} + \mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right)\frac{\pi}{8} + \mathrm{sen}\left(\frac{3\pi}{8}\right)\frac{\pi}{8} = 0.7908. \\ S(f,P) &= \mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{8}\right)\frac{\pi}{8} + \mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right)\frac{\pi}{8} + \mathrm{sen}\left(\frac{3\pi}{8}\right)\frac{\pi}{8} + \mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right)\frac{\pi}{8} = 1.1835. \end{split}$$

Ejercicio 8.3. Calcular la integral inferior y superior de Riemann de la función $f(x) = x^2$ en el intervalo [0,1]. ¿Es una función integrable Riemann?

i Pista

Usar las fórmulas $\sum_{n=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$ y $\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Para calcular las sumas inferiores y superiores de Riemann utilizaremos la partición $P_n=\{x_0,x_1,\dots,x_n\}$ con $x_i=\frac{i}{n}$ para $i=0,1,\dots,n.$ Como $f(x)=x^2$ es una función monótona creciente en [0,1], el mínimo en cada

subintervalo se alcanzará en el extremo inferior y el máximo en el superior.

$$\begin{split} s(f,P_n) &= \sum_{i=1}^n f(x_{i-1})(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{i-1}{n}\right)^2 \frac{1}{n} \\ &= \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n (i^2 - 2i + 1) = \frac{1}{n^3} \left(\sum_{i=1}^n i^2 - 2\sum_{i=1}^n i + \sum_{i=1}^n 1\right) \\ &= \frac{1}{n^3} \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 2\frac{n(n+1)}{2} + n\right) = \frac{2n^3 - 3n^2 + n}{6n^3} \\ S(f,P_n) &= \sum_{i=1}^n f(x_i)(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 \frac{1}{n} \\ &= \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{n^3} = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6n^3} \end{split}$$

Para calcular las integrales inferior y superior, basta con calcular el límite cuando $n \to \infty$ de las sumas inferiores y superiores, respectivamente.

$$\frac{\int_0^1 x^2 = \lim_{n \to \infty} s(f, P_n) = \lim_{n \to \infty} \frac{2n^3 - 3n^2 + n}{6n^3} = \frac{1}{3}}{\int_0^1 x^2 = \lim_{n \to \infty} S(f, P_n) = \lim_{n \to \infty} \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6n^3} = \frac{1}{3}}$$

Como $\int_0^1 x^2 = \int_0^1 x^2 = \frac{1}{3}$, la función $f(x) = x^2$ es integrable Riemann en [0,1] y $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$.



Ejercicio 8.4. Calcular la integral de Riemann de la función $f(x) = x^3 - 2x^2$ en el intervalo [0,1].

i Pista

Usar la fórmula $\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$

Solución

Aplicando la linealidad de la integral, se tiene que

$$\int_0^1 x^3 - 2x^2 \, dx = \int_0^1 x^3 \, dx - 2 \int_0^1 x^2 \, dx$$

Para calcular $\int_0^1 x^3 dx$ seguiremos el mismo procedimiento del ejercicio anterior. Tomando la partición $P_n = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ con $x_i = \frac{i}{n}$ para $i = 0, 1, \dots, n$. Como $f(x) = x^3$ es una función monótona creciente en [0,1], el mínimo en cada subintervalo se alcanzará en el extremo inferior y el máximo en el superior.

$$\begin{split} s(f,P_n) &= \sum_{i=1}^n f(x_{i-1})(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{i-1}{n}\right)^3 \frac{1}{n} \\ &= \frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n (i^3 - 3i^2 + 3i - 1) = \frac{1}{n^3} \left(\sum_{i=1}^n i^3 - 3\sum_{i=1}^n i^2 + 3\sum_{i=1}^n i - \sum_{i=1}^n 1\right) \\ &= \frac{1}{n^4} \left(\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 - 3\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 3\frac{n(n+1)}{2} - n\right) \\ &= \frac{n^4 - 2n^3 + n^2}{4n^4} \\ S(f,P_n) &= \sum_{i=1}^n f(x_i)(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^3 \frac{1}{n} = \frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n i^3 \\ &= \frac{1}{n^4} \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 = \frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{4n^4} \end{split}$$

Para calcular las integrales inferior y superior, basta con calcular el límite cuando $n \to \infty$ de las sumas inferiores y superiores, respectivamente.

$$\frac{\int_0^1 x^3 = \lim_{n \to \infty} s(f, P_n) = \lim_{n \to \infty} \frac{n^4 - 2n^3 + n^2}{4n^4} = \frac{1}{4}}{\int_0^1 x^2 = \lim_{n \to \infty} S(f, P_n) = \lim_{n \to \infty} \frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{4n^4} = \frac{1}{4}}$$

Como $\int_0^1 x^2 = \overline{\int_0^1} x^2 = \frac{1}{4}$, la función $f(x) = x^3$ es integrable Riemann en [0,1] y $\int_0^1 x^3\,dx = \frac{1}{4}.$ Así pues, utilizando el resultado del ejercicio anterior se tiene

$$\int_0^1 x^3 - 2x^2 \, dx = \int_0^1 x^3 \, dx - 2 \int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{4} - 2 \frac{1}{3} = \frac{-5}{12}$$



Ejercicio 8.5. Calcular la integral de Riemann de la función $f(x) = \frac{1}{x}$ en el intervalo [a, b].

i Pista

Usar la sucesión de particiones $(P_n)_{n=1}^\infty$ con $P_n=\{x_0,x_1,\dots,x_n\}$ con $x_i=a(1+c)^i$ para $i=1,\dots,n.$

Solución

Sea $P_n=\{x_0,x_1,\dots,x_n\}$ con $x_i=a(1+c)^i$ para $i=1,\dots,n$ una partición del intervalo [a,b]. Como el último punto de la partición debe ser b, se debe cumplir $a(1+c)^n=b$, de donde se deduce que $c=\left(\frac{b}{a}\right)^{1/n}-1$.

Calcularemos la suma superior de Riemann de f en el intervalo [a,b]. Como $f(x)=\frac{1}{x}$ es una función monótona decreciente, se alcanza el máximo en el extremo inferior de cada subintervalo. Por tanto, se tiene

$$\begin{split} S(f,P_n) &= \sum_{i=1}^n f(x_{i-1})(x_i-x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_{i-1}}(a(1+c)^i-a(1+c)^{i-1}) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{a(1+c)^{i-1}}(ca(1+c)^{i-1}) = \sum_{i=1}^n c = nc = n \left(\left(\frac{b}{a}\right)^{1/n} - 1 \right) \\ &= \frac{\left(\frac{b}{a}\right)^{1/n} - 1}{\frac{1}{n}} \end{split}$$

Para calcular la integral superior de Riemann, basta con calcular el límite de las sumas superiores cuando $n \to \infty$.

$$\begin{split} \overline{\int_a^b} f &= \lim_{n \to \infty} S(f, P_n) = \lim_{n \to \infty} \frac{\left(\frac{b}{a}\right)^{1/n} - 1}{\frac{1}{n}} \\ &= \lim_{x \to 0} \frac{\left(\frac{b}{a}\right)^x - 1}{x} \\ &= \lim_{n \to 0} \left(\frac{b}{a}\right)^x \ln\left(\frac{b}{a}\right) = \ln(b) - \ln(a). \end{split} \tag{L'Hôpital}$$

Del mismo modo se puede probar que $\underline{\int_a^b} f = \ln(b) - \ln(a)$, por lo que la función $f(x) = \frac{1}{x}$ es integrable Riemann en [a,b] y $\int_a^b \frac{1}{x} \, dx = \ln(b) - \ln(a)$.

Ejercicio 8.6. Demostrar que si f es una función integrable Riemann en un intervalo I = [a, b], se puede calcular $\int_a^b f(x) dx$ mediante sumas de Riemann tomando como altura de los rectángulos el valor de la función en cualquier punto de los subintervalos de la partición.

Solución

Si f es una función integrable en I=[a,b], por el criterio de integrabilidad de Riemann, dado $\varepsilon>0$ existe una partición $P=\{x_0,x_1,\ldots,x_n\}$ tal que $S(f,P)-s(f,P)<\varepsilon$, es decir, existe una sucesión de particiones $(P_n)_{n=1}^{\infty}$ tal que $\lim_{n\to\infty}S(f,P_n)-s(f,P_n)=0$.

que $\lim_{n\to\infty} S(f,P_n) - s(f,P_n) = 0$. Sea x_i^* cualquier valor del intervalo $[x_{i-1},x_i]$. Como $s(f,P_n) = \sum_{i=1}^n m_i(x_i-x_{i-1})$ con $m_i = \inf\{f(x): x \in [x_{i-1},x_i]\}$ y $S(f,P_n) = \sum_{i=1}^n M_i(x_i-x_{i-1})$ con $M_i = \sup\{f(x): x \in [x_{i-1},x_i]\}$, se cumple que

$$s(f,P_n) = \sum_{i=1}^n m_i(x_i-x_{i-1}) \leq \sum_{i=1}^n f(x_i^*)(x_i-x_{i-1}) \leq \sum_{i=1}^n M_i(x_i-x_{i-1}) = S(f,P_n)$$
 Por tanto,

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} s(f,P_n) = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*)(x_i-x_{i-1}) = \lim_{n\to\infty} S(f,P_n).$$

Ejercicio 8.7. Demostrar que $1 \le \int_{-1}^{1} \frac{1}{1+x^2} dx \le 2$.

Solución

Por las propiedades de la integral (ver corolario), sabemos que

$$m(b-a) \le \int_a^b f(x) \, dx \le M(b-a),$$

donde m y M son el mínimo y el máximo de la función f en el intervalo [a, b]. En el caso concreto del ejercicio se tiene que $f'(x) = \frac{-2x}{x^4 + 2x^2 + 1}$ que se solo se anula en x=0. Estudiando el signo de la derivada a la izquierda y la derecha del punto crítico se concluye fácilmente que f alcanza un máximo relativo en este punto y f(0) = 1. Por otro lado $f(-1) = f(1) = \frac{1}{2}$, por lo que se puede concluir que el mínimo absoluto de la función en [-1,1] es $m=\frac{1}{2}$ y el máximo absoluto M=1. Y aplicando el corolario anterior se tiene

$$\frac{1}{2}(1-(-1)) = 1 \le \int_a^b \frac{1}{1+x^2} \, dx \le 1(1-(-1)) = 2.$$

Ejercicio 8.8. Demostrar que si f es una función acotada en el intervalo [a,b] que es continua en [a,b] $\{c\}$, con $c \in [a,b]$, entonces f es integrable Riemann en [a,b]

Ejercicio 8.9. Calcular las siguientes integrales definidas

a.
$$\int_{1}^{2} x^4 - 2x \, dx$$

b.
$$\int_0^{\pi} \operatorname{sen}(x) \, dx$$

c.
$$\int_{-1}^{1} \frac{1}{1+x^2} dx$$

d.
$$\int_{-2}^{2} \sqrt{4-x^2} \, dx$$

e.
$$\int_1^e \ln(x) dx$$

f.
$$\int_{1}^{2} \frac{x+1}{x^3+x^2+x} dx$$

g.
$$\int_0^{\pi/2} \cos(x)^2 dx$$

h.
$$\int_{1}^{2} \frac{1+\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$$

i.
$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} e^x \cos(x) dx$$

j.
$$\int_0^{\pi/4} \frac{tg(x)^3}{\cos(x)^2} dx$$

a.
$$\int_1^2 x^4 - 2x \, dx = \left[\frac{x^5}{5} - x^2\right]_1^2 = \frac{16}{5}$$
.

b.
$$\int_0^{\pi} \operatorname{sen}(x) dx = [-\cos(x)]_0^{\pi} = 2.$$

c.
$$\int_{-1}^{1} \frac{1}{1+x^2} dx = \left[\operatorname{arctg} \right]_{-1}^{1} = \frac{\pi}{2}$$
.

d.
$$\int_{-2}^{2} \sqrt{4 - x^2} \, dx = \left[2 \arcsin\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{x}{2} \sqrt{4 - x^2} \right]_{-2}^{2} = 2\pi.$$

e.
$$\int_1^e \ln(x) dx = [x \ln(x) - x]_1^e = 1$$
.

f.
$$\int_1^2 \frac{x+1}{x^3+x^2+x} dx = \left[\ln|x| - \frac{1}{2}\ln|x^2+x+1| + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg}\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) \right]_1^2 \approx 0.0782.$$

g.
$$\int_0^{\pi/2} \cos(x)^2 dx = \left[\frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4}\right]_0^{\pi/2} \approx 0.8172.$$

h.
$$\int_1^2 \frac{1+\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = \left[x + 2\sqrt{x}\right]_1^2 = -2\sqrt{3} + 5.$$

i.
$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} e^x \cos(x) \, dx = \left[e^x \left(\frac{\sin(x) + \cos(x)}{2} \right) \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{e^{-\pi/2} + e^{\pi/2}}{2}.$$

j.
$$\int_0^{\pi/4} \frac{tg(x)^3}{\cos(x)^2} dx = \left[\frac{\operatorname{tg}(x)^4}{4}\right]_0^{\pi/4} = \frac{1}{4}.$$

Ejercicio 8.10. Calcular el área encerrada entre la gráfica de las siguientes funciones y el eje x en los intervalos dados.

a.
$$f(x) = \ln(\frac{x}{2})$$
 en [1, 2].

b.
$$g(x) = \cos(x)$$
 en $[0, 2\pi]$.

c.
$$h(x) = xe^{-x}$$
 en $[-1, 2]$.

d. $i(x) = \frac{x}{\sqrt{3-2x-x^2}}$ en [-1,1].

Solución

a.
$$\int_{1}^{2} \left| \ln \left(\frac{x}{2} \right) \right| \, dx = -\left[x \ln \left(\frac{x}{2} \right) - x \right]_{1}^{2} = 1 - \ln(2).$$

h

$$\int_0^{2\pi} |\cos(x)| \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos(x) \, dx - \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \cos(x) \, dx + \int_{3\pi/2}^{2\pi} \cos(x) \, dx$$
$$= \left[\sec(x) \right]_0^{\pi/2} - \left[\sec(x) \right]_{\pi/2}^{3\pi/2} + \left[\sec(x) \right]_{3\pi/2}^{2\pi} = 1 + 2 + 1.$$

C.

$$\begin{split} \int_{-1}^{2} |xe^{-x}| \, dx &= -\int_{-1}^{0} xe^{-x} \, dx + \int_{0}^{2} xe^{-x} \, dx \\ &= -\left[-e^{-x}(1+x) \right]_{-1}^{0} + \left[-e^{-x}(1+x) \right]_{0}^{2} = 1 + 1 - \frac{3}{e^{2}} = 2 - \frac{3}{e^{2}} \end{split}$$

d.

$$\begin{split} \int_{-1}^{1} \left| \frac{x}{\sqrt{3 - 2x - x^2}} \right| \, dx &= -\int_{-1}^{0} \frac{x}{\sqrt{3 - 2x - x^2}} \, dx + \int_{0}^{1} \frac{x}{\sqrt{3 - 2x - x^2}} \, dx \\ &= -\left[\sqrt{3 - 2x - x^2} - \arcsin\left(\frac{x + 1}{2}\right) \right]_{-1}^{0} \\ &+ \left[\sqrt{3 - 2x - x^2} - \arcsin\left(\frac{x + 1}{2}\right) \right]_{0}^{1} \\ &= \frac{\pi}{6} + \sqrt{3} - 2 - \frac{\pi}{3} + \sqrt{3} = \frac{-\pi}{6} + 2\sqrt{3} - 2 \end{split}$$

Ejercicio 8.11. Calcular el área comprendida entre las funciones f y g en los intervalos dados en los siguientes apartados:

a.
$$f(x)=\cos(x)$$
y $g(x)=-\cos(x)$ en $[0,2\pi].$

b.
$$f(x) = x^2 y g(x) = \sqrt{x} en [0, 2].$$

c.
$$f(x) = tg(x)$$
 y $g(x) = x$ en $[-1, 1]$.

d.
$$f(x) = 2^{-x}$$
 y $g(x) = \frac{x^2}{x^3+1}$ en $[0, 2]$.

a.

$$\begin{split} \int_0^{2\pi} |\cos(x) + \cos(x)| \, dx &= \int_0^{\pi/2} 2\cos(x) \, dx - \int_{\pi/2}^{3\pi/2} 2\cos(x) \, dx + \int_{3\pi/2}^{2\pi} 2\cos(x) \, dx \\ &= \left[2\sin(x) \right]_0^{\pi/2} - \left[2\sin(x) \right]_{\pi/2}^{3\pi/2} + \left[2\sin(x) \right]_{3\pi/2}^{2\pi} \\ &= 2 + 4 + 2 = 8 \end{split}$$

b.

$$\int_0^2 |x^2 - \sqrt{x}| \, dx = \int_0^1 \sqrt{x} - x^2 \, dx + \int_1^2 x^2 - \sqrt{x} \, dx$$

$$= \left[\frac{2}{3} \sqrt{x^3} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 + \left[\frac{x^3}{3} - \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \right]_1^2$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{4}{3} \sqrt{2} + 3 = \frac{-4\sqrt{2} + 10}{3}.$$

c.

$$\begin{split} \int_{-1}^{1} |\lg(x) - x| \, dx &= \int_{-1}^{0} x - \lg(x) \, dx + \int_{0}^{1} \lg(x) - x \, dx \\ &= \left[\frac{x^{2}}{2} + \ln|\cos(x)| \right]_{-1}^{1} + \left[-\frac{x^{2}}{2} - \ln|\cos(x)| \right]_{0}^{1} \\ &= 0.1156 + 0.1156 = 0.2313. \end{split}$$

d.

$$\begin{split} \int_0^2 \left| 2^{-x} - \frac{x^2}{1+x^3} \right| \, dx &= \int_0^1 2^{-x} - \frac{x^2}{1+x^3} \, dx + \int_1^2 \frac{x^2}{1+x^3} - 2^{-x} \, dx \\ &= \left[\frac{-2^{-x}}{\ln(2)} - \frac{\ln|x^3+1|}{3} \right]_0^1 + \left[\frac{\ln|x^3+1|}{3} + \frac{2^{-x}}{\ln(2)} \right]_1^2 \\ &= 0.4903 + 0.1407 = 0.631. \end{split}$$

Ejercicio 8.12. Calcular el área encerrada entre la parábola $y = 2x - x^2$ y la recta y = 2x - 1.

Igualando las dos ecuaciones obtenemos los puntos donde se cortan la parábola y la recta.

$$2x - x^2 = 2x - 1 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1.$$

Así pues, el área encerrada entre la parábola y la recta es

$$\begin{split} \int_{-1}^{1} |2x - x^2 - (2x - 1)| \, dx &= \int_{-1}^{1} -x^2 + 1 \, dx = \left[-\frac{x^3}{3} + x \right]_{-1}^{1} \\ &= -\frac{1}{3} + 1 - \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}. \end{split}$$

Ejercicio 8.13. Para evaluar un test diagnóstico se suele utilizar la curva ROC (Receiver Operating Characteristics) que resulta de representar la razón de verdaderos positivos (sensibilidad) frente a la razón de falsos positivos (1-especificidad) para los diferentes umbrales de positivo del test. Esta curva se representa en el cuadrante $[0,1] \times [0,1]$ y está siempre por encima de la recta y=x que representa un diagnóstico aleatorio. El área por debajo de la curva ROC se conoce como AUC (area under the curve), y cuanto mayor sea, mejor es el test diagnóstico.

Se dispone de dos test diagnósticos para detectar el virus SARS-CoV, el primero con una curva ROC $f(x) = \sqrt{x}$ y el segundo con una curva $g(x) = -x^2 + 2x$. ¿Qué test diagnóstico es mejor?

Solución

La medida AUC para el primer test diagnostico es

$$\int_0^1 \sqrt{x} \, dx = \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^1 = \frac{2}{3}.$$

Y para el segundo test diagnóstico es

$$\int_0^1 -x^2 + 2x \, dx = \left[-\frac{x^3}{3} + x^2 \right]_0^1 = -\frac{1}{3} + 1 = \frac{2}{3}.$$

Por tanto, ambos test tienen la misma AUC y desde este punto de vista serían iguales.

Ejercicio 8.14. La curva de Lorenz se utiliza en Economía para representar la distribución relativa de los ingresos o la riqueza de una población. Esta curva se representa

siempre en el cuadrante $[0,1] \times [0,1]$ del plano y cada punto (x,y) de la curva representa qué proporción de la riqueza total y acumula la proporción de la población x. De este modo, la bisectriz del (recta y=x) representa una distribución equitativa de la riqueza, y cuanto más se desvíe la curva de esta recta, mayor desigualdad habrá en el reparto de la riqueza.

Para medir la desigualdad en el reparto de la riqueza se suele utilizar el coeficiente Gini, que se define como el doble del área encerrada entre la recta y=x y la curva de Lorenz. En una población con una distribución equitativa de la riqueza, el coeficiente de Gini vale 0, mientras que en una población con la mayor desigualdad posible en el reparto de la riqueza, este coeficiente vale 1.

Si las curvas de Lorenz de dos poblaciones vienen dadas por las funciones $f(x)=x^2$ y $g(x)=1-\cos\left(x\frac{\pi}{2}\right)$, ¿qué población es más desigual?

Solución

Para la primera población el área entre la recta y = x y su curva de Lorenz es

$$\int_0^1 x - x^2 \, dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6},$$

por lo que su coeficiente Gini es $G_1=2\frac{1}{6}=\frac{1}{3}.$

Del mismo modo, para la segunda población se tiene

$$\int_0^1 x - \left(1 - \cos\left(x\frac{\pi}{2}\right)\right) dx = \left[\frac{x^2}{2}x + \frac{2}{\pi}\sin\left(x\frac{\pi}{2}\right)\right]_0^1 = \frac{1^2}{2} - 1 + \frac{2}{\pi} \approx 0.1366.$$

por lo que su coeficiente Gini es $G_2=2\left(\frac{-1}{2}+\frac{2}{\pi}\right)\approx 0.2732.$

Com $G_1 > G_2$ la primera población es un poco más desigual que la segunda.

Ejercicio 8.15. Encontrar el valor c tal que la recta y = c divide la región limitada por la parábola $y = x^2$, el eje x y la recta y = 4 en dos regiones con la misma área.

i Pista

Expresar x en función de y, e integrar con respecto a y.

Solución

El problema resulta más sencillo de resolver si se integra con respecto a y. Despejando x de la ecuación de la parábola se tiene que $x=\pm\sqrt{y}$, de manera que área encerrada entre la recta y=4 y la parábola $y=x^2$ es la misma que el área

encerrada entre las funciones \sqrt{y} y $-\sqrt{y}$ en el intervalo [0, 4], que vale

$$\int_0^4 \sqrt{y} - (-\sqrt{y}) \, dy = \int_0^4 2\sqrt{y} \, dy = \left[\frac{4}{3}x^{3/2}\right]_0^4 = \frac{4}{3}4^{3/2} = \frac{32}{3}$$

Así pues, tenemos que buscar la recta y=c que cumple que el área encerrada entre ella y la parábola es la mitad del área anterior, es decir, 16/3. Como el área encerrada entre la recta y=c y la parábola $y=x^2$ es igual que el área encerrada entre las funciones \sqrt{y} y $-\sqrt{y}$ en el intervalo [0,c], que vale

$$\int_0^c \sqrt{y} - (-\sqrt{y}) \, dy = \int_0^c 2\sqrt{y} \, dy = \left[\frac{4}{3}x^{3/2}\right]_0^c = \frac{4}{3}c^{3/2},$$

se tiene que cumplir que $\frac{4}{3}c^{3/2} = \frac{16}{3}$, es decir, $c^{3/2} = 4$, de donde se deduce $c = 4^{2/3}$.

Ejercicio 8.16. En geometría, la ecuación $y^2 = x^2(x+3)$ define una curva implícita conocida como la cúbica de Tschirnhausen. Calcular el área encerrada por esta curva.



Solución

La curva se puede expresar mediante dos ramas, una positiva y otra negativa, dadas por $y=\pm\sqrt{x^2(x+3)}$, que coinciden en x=-3 y x=0 ya que son los puntos donde se anula y. Así pues, podemos calcular el área encerrada por la curva, descomponiéndola en dos mitades, la positiva y la negativa.

La semiárea positiva se calcula mediante la siguiente integral

$$\begin{split} \int_{-3}^{0} \sqrt{x^2(x+3)} \, dx &= \int_{-3}^{0} x \sqrt{(x+3)} \, dx = \int_{0}^{3} (u-3) \sqrt{u} \, du \quad \text{(Cambio } u = x+3) \\ &= \int_{0}^{3} u^{3/2} - 3u^{1/2} \, du = \left[\frac{u^{5/2}}{5/2} - 3 \frac{u^{3/2}}{3/2} \right]_{0}^{3} \\ &= \frac{3^{5/2}}{5/2} - 3 \frac{3^{3/2}}{3/2} = -4.1569, \end{split}$$

por lo que el área total es $2 \cdot |-4.1569| = 8.3138$.

Ejercicio 8.17. La tasa de nacimientos de una población viene dada por la función $n(t) = 5000e^{0.03t}$ personas por año, mientras que la tasa de defunciones viene dada por la función $m(t) = 3500e^{0.02t}$ personas por año. Calcular el área comprendida entre n y m entre 0 y 5 años. ¿Qué representa esta área?

Como $n(t) \ge m(t) \ \forall t \ge 0$, el área comprendida entre la dos funciones en el intervalo [0,5] viene dada por la integral definida

$$\begin{split} \int_0^5 n(t) - m(t) \, dt &= \int_0^5 5000 e^{0.03t} - 3500 e^{0.02t} \, dt \\ &= 5000 \int_0^5 e^{0.03t} \, dt - 3500 \int_0^5 e^{0.02t} \, dt \\ &= \frac{5000}{0.03} [e^{0.03t}]_0^5 - \frac{3500}{0.02} [e^{0.02t}]_0^5 \\ &= \frac{5000}{0.03} (e^{0.03 \cdot 5} - e^0) - \frac{3500}{0.02} (e^{0.02 \cdot 5} - e^0) = 8567.4631 \end{split}$$

La integral de la tasa de nacimientos nos da el número de personas que han nacido en el periodo de 0 a 5 años y la integral de la tasa de defunciones nos da el número de personas fallecidas en ese mismo periodo, por lo que el área comprendida entre las dos funciones es el incremento de la población en ese periodo.

Ejercicio 8.18. Calcular el área de un círculo de radio r en coordenadas polares.

Solución

La curva que define una circunferencia de radio r en coordenadas polares es $f(\theta) = r$ con $\theta \in [0, 2\pi]$, que es una función constante. Por tanto, el área del círculo de radio r puede calcularse mediante la siguiente integral definida,

$$\int_0^{2pi} \frac{r^2}{2} r \, d\theta = \left[\frac{r^2}{2} \theta \right]_0^{2\pi} = \frac{r^2}{2} 2\pi = \pi r^2.$$

Ejercicio 8.19. Calcular el área encerrada por la curva polar $r = \cos(2\theta)$.

Solución

La curva $r=\cos(2\theta)$ tiene periodo 2π , por lo que hay que integrar la curva en el intervalo $[0,2\pi]$, de manera que el área encerrada por la curva es

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos(2\theta)^2}{2} d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta = \frac{1}{4} \left[\theta + \frac{\sin(2\theta)}{2} \right]_0^{2\pi}$$
$$= \frac{1}{4} 2\pi + \frac{\sin(4\pi)}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

Ejercicio 8.20. Calcular el área encerrada por las siguientes curvas polares $r = f(\theta)$ en los intervalo dados.

a.
$$f(\theta) = \theta^2$$
 para $\theta \in [-\pi, \pi]$.

b.
$$f(\theta) = e^{\theta/2}$$
 para $\theta \in [0, 2\pi]$

c.
$$f(\theta) = \sqrt{1 + \cos(4\theta)^2}$$
 para $\theta \in [0, 2\pi]$.

Solución

a.

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\theta^2}{2} \, d\theta = \frac{1}{2} \left[\frac{\theta^3}{3} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi^3}{3} - \frac{(-\pi)^3}{3} \right) = \frac{\pi^3}{3}$$

b.

$$\int_0^{2\pi} \frac{\left(e^{\theta/2}\right)^2}{2} \, d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} e^{\theta} \, d\theta = \frac{1}{2} \left[e^{\theta}\right]_0^{2\pi} = \frac{1}{2} (e^{2\pi} - 1).$$

c.

$$\begin{split} \int_0^{2\pi} \frac{\left(\sqrt{1+\cos(4\theta)^2}\right)^2}{2} \, d\theta &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 1 + \cos(4\theta)^2 \, d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left(\int_0^{2\pi} 1 \, d\theta + \int_0^{2\pi} \cos(4\theta)^2 \, d\theta \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\left[\theta\right]_0^{2\pi} + \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin(8\theta)}{16}\right]_0^{2\pi} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(2\pi + \frac{2\pi}{2} \right) = \frac{3\pi}{2}. \end{split}$$

Ejercicio 8.21. Calcular el área encerrada entre las curvas polares $r = 2 \operatorname{sen}(\theta)$ y $r = 1 + \operatorname{sen}(\theta)$.

Ejercicio 8.22. Calcular el área encerrada entre las siguientes curvas y el eje x en los intervalos dados.

a.
$$y = \frac{1}{1+x^2}$$
 en $(-\infty, \infty)$.

b.
$$y = \frac{\ln(x)}{x^2}$$
 en $[1, \infty)$.

c.
$$y = \frac{e^{1/x}}{x^3}$$
 en $(-\infty, 0]$.

Solución

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} \, dx = \lim_{t \to \infty} \left[\operatorname{arctg}(x) \right]_{-t}^t = \lim_{t \to \infty} \operatorname{arctg}(t) - \operatorname{arctg}(-t) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

b.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} \, dx = \lim_{t \to \infty} \left[-\frac{1}{x} - \frac{\ln(x)}{x} \right]_1^t = \lim_{t \to \infty} -\frac{1}{t} - \frac{\ln(t)}{t} + \frac{1}{1} + \frac{\ln(1)}{1} = 1.$$

c.

$$\int_{-\infty}^{0} \left| \frac{e^{1/x}}{x^3} \right| \, dx = -\lim_{t \to -\infty} \left[e^{1/x} - \frac{e^{1/x}}{x} \right]_t^{0^-} = -\left(\lim_{t \to 0^-} e^{1/t} - \frac{e^{1/t}}{t} - \lim_{n \to -\infty} e^{1/t} + \frac{e^{1/t}}{t} \right) = 1.$$

Ejercicio 8.23. Un criterio para estudiar la convergencia de una serie $\sum a_n$ es estudiar la integral impropia $\int_1^\infty a_n\,dn$. La serie converge si y solo si la integral es finita.

Usar este criterio para demostrar que la serie armónica $\sum \frac{1}{n}$ diverge y que las serie $\sum \frac{1}{n^2}$

¿Para qué valores de p la integral $\int_1^\infty \frac{1}{n^p} dn$ converge?

Solución

Para la serie armónica $\sum \frac{1}{n}$ se tiene

$$\int_{1}^{\infty}\frac{1}{n}\,dn=\lim_{t\rightarrow\infty}\left[\ln\left|n\right|\right]_{1}^{t}=\lim_{t\rightarrow\infty}\ln(t)-\ln(1)=\infty.$$

Por tanto, la serie armónica diverge.

Para la serie $\sum \frac{1}{n^2}$ se tiene

$$\int_{1}^{\infty} \frac{1}{n^{2}} dn = \lim_{t \to \infty} \left[\frac{-1}{n} \right]_{1}^{t} = \lim_{t \to \infty} \frac{-1}{t} - \frac{-1}{1} = 1,$$

y por tanto, la serie converge.

Veamos ahora para que valores de p la integral impropia de $\frac{1}{n^p}$ converge.

$$\int_{1}^{\infty} \frac{1}{n^{p}} dn = \int_{1}^{\infty} n^{-p} dn = \lim_{t \to \infty} \left[\frac{n^{-p+1}}{(-p+1)} \right]_{1}^{t}$$
$$= \frac{1}{-p+1} \lim_{t \to \infty} t^{-p+1} - 1^{-p+1} = \frac{1}{-p+1} \lim_{t \to \infty} t^{-p+1} - 1.$$

Este límite existe para p > 1 por lo que la integral impropia converge para esos valores de p.

Ejercicio 8.24. En Estadística, la distribución exponencial se utiliza para modelar el tiempo que tarda en ocurrir un evento en un proceso de Poisson, es decir, un proceso en el que ocurren fenómenos puntuales de marea continua e independiente a un ritmo constante λ . La función de densidad de probabilidad la distribución exponencial de parámetro λ es

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \ge 0\\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

- a. Comprobar que f es una función de densidad de probabilidad, es decir, que el área total encerrada entre su gráfica y el eje x es 1.
- b. Calcular la media de la distribución.
- c. Calcular la varianza de la distribución.

i Pista

La media de una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad f es $\mu=\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)\,dx$ y la varianza $\sigma^2=\int_{-\infty}^{\infty}x^2f(x)\,dx-\mu^2$.

a.

$$\begin{split} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \, dx &= \int_{-\infty}^{0} 0 \, dx + \int_{0}^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} \, dx \\ &= 0 + \lim_{t \to \infty} [-e^{-\lambda x}]_{0}^{t} = \lim_{t \to \infty} -e^{-t} - (-1) = 1. \end{split}$$

Luego, f(x) es una función de densidad de probabilidad.

b.

$$\begin{split} \mu &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) \, dx = \int_{-\infty}^{0} x \cdot 0 \, dx + \int_{0}^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} \, dx \\ &= 0 + \lim_{t \to \infty} \left[\frac{-\lambda x - 1}{\lambda e^{\lambda x}} \right]_{0}^{t} = \lim_{t \to \infty} \frac{-\lambda t - 1}{\lambda e^{\lambda t}} - \left(\frac{-\lambda \cdot 0 - 1}{\lambda e^{\lambda \cdot 0}} \right) = \frac{1}{\lambda} \end{split}$$

c.

$$\begin{split} \sigma^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) \, dx - \mu^2 = \int_{-\infty}^{0} x^2 \cdot 0 \, dx + \int_{0}^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} \, dx - \frac{1}{\lambda^2} \\ &= 0 + \lim_{t \to \infty} \left[\frac{-\lambda^2 x^2 - 2\lambda x - 2}{\lambda^2 e^{\lambda x}} \right]_{0}^{t} - \frac{1}{\lambda^2} \\ &= \lim_{t \to \infty} \frac{-\lambda^2 t^2 - 2\lambda t - 2}{\lambda^2 e^{\lambda t}} - \left(\frac{-\lambda^2 \cdot 0^2 - 2\lambda \cdot 0 - 2}{\lambda^2 e^{\lambda \cdot 0}} \right) - \frac{1}{\lambda^2} \\ &= \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2} \end{split}$$

Ejercicio 8.25. Una tomografía ofrece secciones transversales del cerebro de un paciente cada 1.5 cm. Las areas de cada una de las secciones transversales tomadas fueron

0, 32, 65, 115, 132, 147, 155, 141, 123, 93, 58, 0

Calcular de forma aproximada el volumen del cerebro.

Solución

Podemos calcular el volumen del cerebro de manera aproximada tomando secciones cilíndricas con base la sección transversal, cuya área es conocida, y altura la distancia entre las secciones consecutivas, en este caso 1.5 cm. Así se obtiene la siguiente suma de Riemann.

(32+65+115+132+147+155+141+123+93+58)*1.5=1591.5cm³.

Ejercicio 8.26. Calcular el volumen de la esta pirámide con base cuadrada de lado 2 y altura 2. Calcular a continuación el volumen de una pirámide de base cuadrada de lado l y altura h.

Solución

Calcularemos el volumen de la pirámide tomando secciones transversales con respecto al eje x en el intervalo [0,2]. El apotema de la pirámide está inscrito en la recta de ecuación $y=-\frac{1}{2}x+1$, por lo que, para cualquier $a\in[0,2]$, la intersección de la pirámide con el plano x=a es un cuadrado de lado $2(-\frac{a}{2}+1)=2-a$, y por tanto su área es $(2-a)^2$. Así pues, para calcular el volumen de la pirámide basta con integrar la función $f(x)=(2-x)^2$, que nos da el área de la sección transversal al eje x en x, en el intervalo [0,2].

$$\begin{split} \int_0^2 f(x) \, dx &= \int_0^2 (2-x)^2 \, dx = \int_0^2 x^2 - 4x + 4 \, dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x \right]_0^2 = \left(\frac{2^3}{3} - 2 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2 \right) = 8/3 \text{ unidades}^3. \end{split}$$

En general, para una pirámide de lado l y altura h, lo único que cambia es el intervalo de integración, que será [0,h], y la recta que define el apotema, que será $y = -\frac{l}{2h}x + \frac{l}{2}$, por lo que el área de las secciones transversales vendrá dado por la función

$$f(x) = \left(2\left(-\frac{lx}{2h} + \frac{l}{2}\right)\right)^2 = \left(-\frac{lx}{h} + l\right)^2 = \frac{l^2x^2}{h^2} - \frac{2l^2x}{h} + l^2.$$

Así pues, el volumen viene dado por la siguiente integral.

$$\int_0^h f(x) dx = \int_0^h \frac{l^2 x^2}{h^2} - \frac{2l^2 x}{h} + l^2 dx = \left[\frac{l^2 x^3}{3h^2} - \frac{l^2 x^2}{h} + l^2 x \right]_0^h$$
$$= \left(\frac{l^2 h^3}{3h^2} - \frac{l^2 h^2}{h} + l^2 h \right) = \frac{1}{3} l^2 h,$$

que efectivamente es la fórmula que da el volumen de una pirámide de base cuadrada con lado l y altura h.

Ejercicio 8.27. Calcular el volumen del sólido de revolución generado por la rotación al rededor del eje y del area comprendida entre las gráficas de las funciones f(x) = x y $g(x) = x^2$. Calcular también el volumen del sólido de revolución generado al rotar esa misma área alrededor de la recta x = 1.

Para ver los puntos donde se cortan las gráficas de las dos funciones resolvemos la ecuación que surge al igualarlas.

$$x = x^2 \Leftrightarrow x^2 - x = 0 \Leftrightarrow x(x-1) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ o } x = 1.$$

Para calcular el volumen del sólido de revolución que se obtiene al rotar alrededor del eje y la región comprendida entre las gráficas de f y q en el intervalo [0,1], utilizaremos sumas de Riemann de envoltorios cilíndricos. Para ello hay que calcular la siguiente integral

$$\begin{split} \int_0^1 2\pi x (f(x) - g(x)) \, dx &= \int_0^1 2\pi x (x - x^2) \, dx = 2\pi \int_0^1 x^2 - x^3 \, dx \\ &= 2\pi \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = 2\pi \left(\frac{1^3}{3} - \frac{1^4}{4} \right) = \pi/6. \end{split}$$

Si en lugar de rotar la región alrededor de la recta x=0 la rotamos alrededor de la recta x=1, lo único que cambia, al utilizar envoltorios cilíndricos es el radio del circulo de la base de los cilindros, que ahora será 1-x en lugar de x, por lo que el volumen del sólido de revolución generado viene dado por la integral

$$\begin{split} \int_0^1 2\pi (1-x) (f(x)-g(x)) \, dx &= \int_0^1 2\pi (1-x) (x-x^2) \, dx = 2\pi \int_0^1 x - 2x^2 + x^3 \, dx \\ &= 2\pi \left[\frac{x^2}{2} - 2\frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = 2\pi \left(\frac{1^2}{2} - 2\frac{1^3}{3} + \frac{1^4}{4} \right) = \pi/6. \end{split}$$

Así pues, se obtiene el mismo volumen.

Ejercicio 8.28. Calcular el volumen de este toro obtenido al rotar la circunferencia de ecuación $(x-2)^2+y^2=1$ alrededor del eje y. Calcular a continuación el volumen de un toro de radio mayor R y radio menor r.

Ejercicio 8.29. Calcular el volumen del sólido de revolución generado por la rotación al rededor del eje y del area comprendida entre las funciones f(x) = x + 1 y $g(x) = (x - 1)^2$.

Solución

Para ver los puntos donde se cortan las gráficas de las dos funciones resolvemos la ecuación que surge al igualarlas.

$$x+1=(x-1)^2 \Leftrightarrow x+1=x^2-2x+1 \Leftrightarrow x^2-3x=0 \Leftrightarrow x(x-3) \Leftrightarrow x=0 \text{ o } x=3.$$

Para calcular el volumen del sólido de revolución que se obtiene al rotar alrededor del eje y la región comprendida entre las gráficas de f y g en el intervalo [0,3], utilizaremos sumas de Riemann de envoltorios cilíndricos. Para ello hay que calcular la siguiente integral

$$\begin{split} \int_0^3 2\pi x (f(x) - g(x)) \, dx &= \int_0^3 2\pi x (x + 1 - (x - 1)^2) \, dx = 2\pi \int_0^3 3x^2 - x^3 \, dx \\ &= 2\pi \left[x^3 - \frac{x^4}{4} \right]_0^3 = 2\pi \left(3^3 - \frac{3^4}{4} \right) = \frac{27\pi}{2}. \end{split}$$

Ejercicio 8.30. Calcular el volumen del sólido de revolución generado por la rotación al rededor del eje x de la región comprendida entre las funciones $f(x) = \cos(x)$ y $g(x) = \sin(x)$ en el intervalo $[0, \pi/2]$. Calcular también el volumen del sólido de revolución generado al rotar la mima área alrededor del eje y.

Solución

Veamos primero en qué puntos se cortan las gráficas de las dos funciones.

$$\cos(x) = \sin(x) \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi \ k \in \mathbb{Z}.$$

En el intervalo de integración el único valor donde se cortan las gráficas de las dos funciones es en $x=\pi/4$. Es fácil comprobar que $f(x)>g(x) \ \forall x\in [0,\pi/4)$ y $f(x)< g(x) \ \forall x\in (\pi/4,\pi/2]$, por lo que tenemos que descomponer el intervalo de integración en estos dos subintervalos.

Para calcular el volumen del sólido de revolución generado por la rotación alrededor del eje x de la región comprendida entre $f(x) = \cos(x)$ y $g(x) = \sin(x)$ en el intervalo $[0, \pi/2]$ podemos utilizar sumas de Riemann de discos cilíndricos transversales al eje x. Para ello hay que calcular las siguientes integrales

$$\begin{split} \int_0^{\pi/4} \pi(f(x)^2 - g(x)^2) \, dx + \int_{\pi/4}^{\pi/2} \pi(g(x)^2 - f(x)^2) \, dx \\ &= \int_0^{\pi/4} \pi(\cos(x)^2 - \sin(x)^2) \, dx + \int_{\pi/4}^{\pi/2} \pi(\sin(x)^2 - \cos(x)^2) \, dx \\ &= \pi \int_0^{\pi/4} -\cos(2x) \, dx + \pi \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cos(2x) \, dx = \pi \left[\frac{-\sin(2x)}{2} \right]_0^{\pi/4} + \pi \left[\frac{\sin(2x)}{2} \right]_{\pi/4}^{\pi/2} \\ &= \frac{\pi}{2} (-\sin(2\pi/4)) + \sin(0) + \frac{\pi}{2} (\sin(2\pi/4) - \sin(2\pi/2)) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi. \end{split}$$

Ejercicio 8.31. Un helado tiene forma parabólica dada por la función $y = 9-x^2$ (en cm) y sus secciones transversales con respecto al eje y son cuadrados. ¿Cuál es el volumen del helado?

Solución

Como las secciones transversales con respecto al eje y son figuras regulares, en este caso cuadrados, calcularemos el volumen del helado integrando a lo largo del eje y las áreas de esos cuadrados. Para cualquier sección transversal en y=a, el semi-lado del cuadrado resultante es

$$a = 9 - x^2 \Leftrightarrow x^2 = 9 - a \Leftrightarrow x = \sqrt{9 - a}$$

por lo que el área de la sección transversal es

$$f(x) = 2\sqrt{9-x^2} = 4(9-x) = 36-4x.$$

Por otro lado, es fácil ver que el máximo de la curva $y=9-x^2$ es y=9 por lo que el intervalo de integración es [0,9]. Así pues, el volumen del helado viene dado por la siguiente integral

$$\int_0^9 36 - 4x \, dx = [36x - 2x^2]_0^9 = 36 \cdot 9 - 2 \cdot 9^2 = 162 \text{ cm}^3$$

Ejercicio 8.32. Un pluviómetro tiene la forma de un sólido de revolución obtenido al rotar la gráfica de la función $f(x) = x^3$ ($x \ge 0$) alrededor del eje y. ¿Cuál debe ser su altura para que sea capaz de almacenar 1 litro de agua?

Al rotar la gráfica de f alrededor del eje y, las secciones transversales con respecto al eje y del sólido de revolución generado serán círculos cuyo radio vendrá dado por la función inversa de y, $x = f^{-1}(y) = y^{1/3}$. Por tanto, para calcular el volumen del sólido de revolución podemos tomar discos cilíndricos, de manera que el volumen del pluviómetro de altura h viene dado por la integral

$$\int_0^h \pi f^{-1}(y)^2 \, dy = \pi \int_0^h y^{2/3} \, dy = \pi \left[\frac{y^{5/3}}{5/3} \right]_0^h = \frac{3\pi}{5} h^{5/3}.$$

Por consiguiente, para que el pluviómetro pueda almacenar 1 litro de agua, es decir $1000~{\rm cm}^3$, su altura debe ser

$$\frac{3\pi}{5}h^{5/3} = 1000 \Leftrightarrow h^{5/3} = \frac{5000}{3\pi} \Leftrightarrow h = \left(\frac{5000}{3\pi}\right)^{3/5} = 43.134 \text{ cm}.$$

Ejercicio 8.33. Calcular la longitud de una circunferencia de radio r centrada en el origen.

Solución

La ecuación de la circunferencia de radio r centrada en el origen es $x^2 + y^2 = r^2$, de donde se deduce que $y = \pm \sqrt{r^2 - x^2}$. Si tomamos la función correspondiente a la semicircunferencia positiva $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$, podemos calcular la longitud de la curva de la semicircunferencia con la siguiente integral

$$\begin{split} \int_{-r}^{r} \sqrt{1 + f'(x)^2} \, dx &= \int_{-r}^{r} \sqrt{1 + \left(\sqrt{r^2 - x^2}\right)^2} \, dx \\ &= \int_{-r}^{r} \sqrt{1 + \frac{x^2}{r^2 - x^2}} \, dx \\ &= \int_{-r}^{r} \sqrt{\frac{r^2}{r^2 - x^2}} \, dx = \int_{-r}^{r} \frac{r}{\sqrt{r^2 - x^2}} \, dx \\ &= \int_{-r}^{r} \frac{1}{\sqrt{\frac{r^2 - x^2}{r^2}}} \, dx = \int_{-r}^{r} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{r}\right)^2}} \, dx \\ &= \int_{-1}^{1} \frac{1}{\sqrt{1 - u^2}} r \, du \qquad \qquad \text{(Cambio } u = \frac{x}{r}\text{)} \\ &= r[\arccos(u)]_{-1}^1 = r\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \pi r. \end{split}$$

Y por tanto, la longitud de la circunferencia será el doble $2\pi r$.

Ejercicio 8.34. Calcular la longitud de las siguientes curvas en los intervalos dados

- a. $y = x^2$ en [0, 1].
- b. $y^2 = 4x^3$ en [0, 2].
- c. $y = \ln(\operatorname{sen}(x))$ en $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Solución

a. Tomando $f(x) = x^2$, la logitud de la curva de la gráfica de f en el intervalo [0,1] es

$$\int_{0}^{1} \sqrt{1 + f'(x)^{2}} \, dx = \int_{0}^{1} \sqrt{1 + (2x)^{2}} \, dx = \int_{0}^{1} \sqrt{1 + 4x^{2}} \, dx$$

$$= \int_{0}^{\arctan(2)} \sec(\theta) \frac{1}{2} \sec(\theta)^{2} \, d\theta = \frac{1}{2} \int_{0}^{\arctan(2)} \sec(\theta)^{3} \, d\theta \, (1)$$

$$= \left[\frac{1}{2} \frac{\sec(\theta) \tan(\theta) + \ln|\sec(\theta) + (tg)(\theta)|}{2} \right]_{0}^{\arctan(2)}$$

$$= \left[\frac{\sqrt{1 + 4x^{2}}2x + \ln(\sqrt{1 + 4x^{2}} + 2x)}{4} \right]_{0}^{1} \quad \text{(Deshacer 1)}$$

$$= \frac{\sqrt{1 + 4 \cdot 1^{2}}2 + \ln(\sqrt{1 + 4 \cdot 1^{2}} + 2)}{4}$$

$$= \frac{2\sqrt{5} + \ln(\sqrt{5} + 2)}{4} \approx 1.4789$$

- (1) Cambio $tg(\theta) = 2x$, $sec(\theta) = \sqrt{1 + 4x^2}$.
- (2) Ver integral secante cúbica.

b. $y^2=4x^3\Leftrightarrow y=\pm\sqrt{4x^3}=\pm2x^{3/2},$ así que tomaremos $f(x)=2x^{3/2}$ y calcularemos la longitud de rama positiva.

$$\begin{split} \int_0^1 \sqrt{1 + f'(x)^2} \, dx &= \int_0^1 \sqrt{1 + (3\sqrt{x})^2} \, dx = \int_0^1 \sqrt{1 + 9x} \, dx \\ &= \left[\frac{1}{9} \frac{(1 + 9x)^{3/2}}{3/2} \right]_0^1 = \frac{2}{27} (19^{3/2} - 1) \approx 6.0607. \end{split}$$

Por tanto, por simetría, la longitud de la curva será el doble $2 \cdot 6.0607 = 12.1213$.

c. Tomando $f(x) = \ln(\text{sen}(x))$, la logitud de la curva de la gráfica de f en el intervalo $[\pi/4, \pi/2]$ es

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} \sqrt{1 + f'(x)^2} \, dx = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sqrt{1 + \frac{\cos(x)^2}{\sin(x)^2}} \, dx = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sqrt{\frac{1}{\sin(x)^2}} \, dx$$

$$= \int_{\pi/4}^{\pi/2} \csc(x) \, dx = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \csc(x) \frac{\csc(x) + \cot(x)}{\csc(x) + \cot(x)} \, dx$$

$$= \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\csc(x)^2 + \csc(x) \cot(x)}{\csc(x) + \cot(x)} \, dx$$

$$= \int_{\pi/4}^{1} \frac{-1}{u} \, du$$

$$= [-\ln(u)]_{1+\sqrt{2}}^{1} = -\ln(1) + \ln(1 + \sqrt{2}) \approx 0.8814.$$
(1)

Ejercicio 8.35. Un tramo de una montaña rusa tiene la forma de la curva $y = \frac{1}{3}(x-3)\sqrt{x}$, donde x viene dado en decámetros. ¿Qué longitud tiene el rail del tramo desde el origen hasta el punto que alcanza la misma altura?

(1) Cambio $u = \csc(x) + \cot(x)$.

Solución

La longitud del rail es la longitud de la curva correspondiente a la gráfica de la función $f(x) = \frac{1}{3}(x-3)\sqrt{x}$. Resulta sencillo ver que las dos raíces de esta función son x=0 (el origen) y x=3, por lo que hay que el intervalo de integración es [0,3]. Para calcular la longitud de la curva correspondiente a la gráfica de f en este intervalo hay que calcular la siguiente integral

$$\begin{split} \int_0^3 \sqrt{1+f'(x)^2} \, dx &= \int_0^3 \sqrt{1+\left(\frac{1}{3}\left(\sqrt{x}+\frac{x-3}{2\sqrt{x}}\right)\right)^2} \, dx \\ &= \int_0^3 \sqrt{1+\frac{1}{9}\left(x+(x-3)+\frac{(x-3)^2}{4x}\right)} \, dx \\ &= \int_0^3 \sqrt{1+\frac{x^2-2x+1}{4x}} \, dx = \int_0^3 \sqrt{\frac{x^2+2x+1}{4x}} \, dx \\ &= \int_0^3 \frac{x+1}{2\sqrt{x}} \, dx = \frac{1}{2}\left(\int_0^3 x^{1/2} \, dx + \int_0^3 x^{-1/2} \, dx\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\left[\frac{x^{3/2}}{3/2}\right]_0^3 + \left[\frac{x^{1/2}}{1/2}\right]_0^3\right) = \left[\frac{x^{3/2}}{3} + x^{1/2}\right]_0^3 \\ &= \frac{3^{3/2}}{3} + \sqrt(3) = 2\sqrt{3} \approx 3.4641 \; \mathrm{Dm}. \end{split}$$

Ejercicio 8.36. Calcular la longitud de un cable eléctrico con forma de catenaria que cuelga entre dos postes separados 10 metros de distancia con una altura mínima sobre el suelo de 5 metros.

Nota: La ecuación que define una curva con forma de catenaria centrada en el eje y es $y = a \cosh\left(\frac{x}{a}\right)$, donde a es la altura mínima de la catenaria.

Solución

La longitud del cable eléctrico es la longitud de la curva correspondiente a la gráfica de la función $f(x) = 5\cosh(x/5)$ en el intervalo [-5,5], que viene dado por la integral

$$\begin{split} \int_{-5}^{5} \sqrt{1 + f'(x)^2} \, dx &= \int_{-5}^{5} \sqrt{1 + \operatorname{senh}(x/5)^2} \, dx \\ &= \int_{-5}^{5} \sqrt{\cosh(x/5)^2} \, dx = \int_{-5}^{5} \cosh(x/5) \, dx \\ &= [5 \operatorname{senh}(x/5)]_{-5}^{5} = 5 (\operatorname{senh}(1) - \operatorname{senh}(-1)) \\ &= 5 (e - e^{-1}) \approx 11.7520 \text{ m}. \end{split}$$

Ejercicio 8.37. Calcular la superficie de los sólidos de revolución obtenidos al girar las siguientes funciones alrededor del eje x en los intervalos dados.

a.
$$f(x) = 2\sqrt{1-x}$$
 en $[-1, 1]$.

c. $h(x) = e^x$ en [0, 1].

Solución

a. La superficie del sólido de revolución que se obtiene al rotar la gráfica de la función f(x) alrededor del eje x en el interavlo [-1,1], viene dada por la siguiente integral

$$\begin{split} \int_{-1}^{1} 2\pi f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} \, dx &= 2\pi \int_{-1}^{1} 2\sqrt{1 - x} \sqrt{1 + \left(\frac{-1}{\sqrt{1 - x}}\right)^2} \, dx \\ &= 2\pi \int_{-1}^{1} 2\sqrt{1 - x} \sqrt{1 + \frac{1}{1 - x}} \, dx \\ &= 2\pi \int_{-1}^{1} 2\sqrt{(1 - x)\left(1 + \frac{1}{1 - x}\right)} \, dx \\ &= 2\pi \int_{-1}^{1} 2\sqrt{2 - x} \, dx = 2\pi \left[\frac{-4}{3}(2 - x)^{3/2}\right]_{-1}^{1} \\ &= \frac{-8\pi}{3}(1 - 3^{3/2}) \approx 35.1536. \end{split}$$

b.

$$\begin{split} \int_{-1}^{1} 2\pi h(x) \sqrt{1 + h'(x)^2} \, dx &= 2\pi \int_{-1}^{1} e^x \sqrt{1 + e^{2x}} \, dx \\ &= 2\pi \int_{1}^{e} \sqrt{1 + u^2} \, du \qquad \text{(cambio } u = e^x\text{)} \\ &= 2\pi \int_{\pi/4}^{\arctan(e)} \sec(\theta)^3 \, d\theta \qquad \qquad (1) \\ &= 2\pi \frac{1}{2} [\sec(\theta) \operatorname{tg}(\theta) + \ln|\sec(\theta) + \operatorname{tg}(\theta)|]_{\pi/4}^{\arctan(e)} \\ &= \pi (\sec(\operatorname{arctg}(e)) \operatorname{tg}(\operatorname{arctg}(e)) + \ln|\sec(\operatorname{arctg}(e)) + \operatorname{tg}(\operatorname{arctg}(e))| - \sqrt{2} - \\ &= \pi (e\sqrt{1 + e^2} + \ln(e + \sqrt{1 + e^2}) - \sqrt{2} - \ln(\sqrt{2} + 1)) \approx 22.943. \end{split}$$

- (1) Cambio $tg(\theta) = u$, $sec(\theta) = \sqrt{1 + u^2}$.
- (2) Ver integral secante cúbica.

Ejercicio 8.38. Un depósito metálico tiene la forma del elipsoide que se obtiene al rotar la elipse $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ alrededor del eje x, con x en metros. Calcular la cantidad de chapa

metálica necesaria para construir el depósito. ¿Y si el depósito se construye rotando la elipse alrededor del eje y?

Solución

Para averiguar la cantidad de chapa necesaria para construir el depósito tenemos que calcular el área de la superficie del depósito.

De la ecuación de la elipse se tiene

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \Leftrightarrow y^2 = 1 - \frac{x^2}{4} \Leftrightarrow y = \pm \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}},$$

de manera que el depósito se genera al rotar alrededor del eje x la gráfica de la función $f(x) = \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}$ en el intervalo [-2, 2].

El área de la superficie del sólido de revolución que se obtiene al rotar la gráfica de f alrededor del eje x en el intervalo [a, b] viene dado por la integral

$$\int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} \, dx$$

Como

$$f'(x) = \frac{-x}{4\sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}},$$

sustituyendo en la integral anterior se tiene

$$\begin{split} \int_{-2}^{2} 2\pi f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} \, dx &= 2\pi \int_{-2}^{2} \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}} \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{4\sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}}\right)^2} \, dx \\ &= 2\pi \int_{-2}^{2} \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}} \sqrt{1 + \frac{x^2}{16\left(1 - \frac{x^2}{4}\right)}} \, dx \\ &= 2\pi \int_{-2}^{2} \sqrt{1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^2}{16}} \, dx \\ &= 2\pi \int_{-2}^{2} \sqrt{1 - \frac{3x^2}{4} + \frac{x^2}{16}} \, dx \\ &= 2\pi \int_{-2}^{2} \sqrt{1 - \frac{3x^2}{16}} \, dx \\ &= 2\pi \int_{-2}^{2} \sqrt{1 - \frac{3x^2}{4}} \, dx \\ &= 2\pi \int_{-2}^{2} \sqrt{4 - \frac{3x^2}{16}} \, dx \\ &= \frac{\pi}{2} \int_{-2}^{2} \sqrt{4^2 - (\sqrt{3}x)^2} \, dx \\ &= \frac{\pi}{2} \int_{-2}^{2} \sqrt{4^2 - (\sqrt{3}x)^2} \, dx \\ &= \frac{\pi}{2} \int_{-2}^{1} \sqrt{4 \cos(\sqrt{3}x)^2} \, dx \\ &= \frac{8\pi}{3} \int_{-2\pi \cos(-\sqrt{3}x)}^{2\pi \cos(-\sqrt{3}x)} \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \, d\theta \\ &= \frac{8\pi}{\sqrt{3}} \int_{-2\pi \cos(-\sqrt{3}x)}^{2\pi \cos(-\sqrt{3}x)} \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \, d\theta \\ &= \frac{8\pi}{\sqrt{3}} \int_{-2\pi \cos(-\sqrt{3}x)}^{2\pi \cos(-\sqrt{3}x)} \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \, d\theta \\ &= \frac{8\pi}{\sqrt{3}} \left[\frac{\theta}{2} + \frac{1}{4} \sin(2\theta) \right]_{-2\pi \cos(-\sqrt{3}x)}^{2\pi \cos(-\sqrt{3}x)} \\ &= \frac{8\pi}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{2} \arcsin(\sqrt{3}x) + \frac{1}{2} \sin(\arcsin(\sqrt{3}x)) \cos(\arcsin(\sqrt{3}x)) - \frac{1}{2} \arcsin(\frac{\pi}{\sqrt{3}}x) \right) \\ &= \frac{8\pi}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{2} \arcsin(\sqrt{3}x) + \frac{1}{2} \sin(\arcsin(\sqrt{3}x)) \cos(\arcsin(\sqrt{3}x)) - \frac{1}{2} \arcsin(\frac{\pi}{\sqrt{3}}x) \right) \\ &= \frac{8\pi}{\sqrt{3}} \left(\arcsin(\sqrt{3}x) + \frac{1}{2} \sin(\arcsin(\sqrt{3}x)) \cos(\arcsin(\sqrt{3}x)) \right) \cos(\arcsin(\sqrt{3}x)) \\ &= \frac{8\pi}{\sqrt{3}} \left(\arcsin(\sqrt{3}x) + \frac{1}{2} \sin(\arcsin(\sqrt{3}x)) \cos(\arcsin(\sqrt{3}x)) \cos(\arcsin(\sqrt{3}x)) \right) \\ &= \frac{8\pi}{\sqrt{3}} \left(\arcsin(\sqrt{3}x) + \frac{1}{2} \sin(\arcsin(\sqrt{3}x)) \cos(\arcsin(\sqrt{3}x)) \right) \cos(\arcsin(\sqrt{3}x)) \\ &= \frac{8\pi}{\sqrt{3}} \left(\arcsin(\sqrt{3}x) + \frac{1}{2} \sin(\arcsin(\sqrt{3}x)) \cos(\arcsin(\sqrt{3}x)) \cos(\arcsin(\sqrt{3}x)) \right) \\ &= \frac{8\pi}{\sqrt{3}} \left(\arcsin(\sqrt{3}x) + \frac{1}{2} \sin(\arcsin(\sqrt{3}x)) \cos(\arcsin(\sqrt{3}x)) \right) \cos(\arcsin(\sqrt{3}x)) \\ &= \frac{8\pi}{\sqrt{3}} \left(\arcsin(\sqrt{3}x) + \frac{1}{2} \sin(\arcsin(\sqrt{3}x) + \frac{1}{2} \sin(\arcsin(\sqrt{3}x)) \cos(\arcsin(\sqrt{3}x)) \right) \cos(\arcsin(\sqrt{3}x) + \frac{1}{2} \sin(\arcsin(\sqrt{3}x)) \cos(\arcsin(\sqrt{3}x)) \cos(\arcsin(\sqrt{3}x)) \right] \\ &= \frac{8\pi}{\sqrt{3}} \left(\arcsin(\sqrt{3}x) + \frac{1}{2} \sin(\arcsin(\sqrt{3}x) + \frac{1}{2} \sin(\arcsin(\sqrt{3}x) + \frac{1}{2} \sin(\arcsin(\sqrt{3}x)) \cos(\arcsin(\sqrt{3}x) + \frac{1}{2} \sin(\arcsin(\sqrt{3}x) + \frac{1}{2} \sin(\arcsin(\sqrt{3}x)) \cos(\arcsin(\sqrt{3}x) + \frac{1}{2} \sin(\arcsin(\sqrt{3}x) + \frac{1}{2}$$

(1) Cambio $x = \frac{4}{\sqrt{3}\operatorname{sen}(\theta)}$

Ejercicio 8.39. Calcular el área de la superficie de este toro obtenido al rotar la circunferencia de ecuación $(x-2)^2 + y^2 = 1$ alrededor del eje y. Calcular a continuación la superficie de un toro de radio mayor R y radio menor r.

Solución

Calcularemos directamente la superficie de un toro con radio mayor R y radio menor r, que tiene ecuación

$$(x-R)^2 + y^2 = r^2 \Leftrightarrow y^2 = r^2 - (x-R)^2 \Leftrightarrow y = \pm \sqrt{r^2 - (x-R)^2}$$

donde la rama positiva corresponde al semi-toro positivo y la negativa al semi-toro negativo. Por simetría, para calcular el área de la superficie del toro basta con calcular el área de las superficie del semi-toro positivo y multiplicarla por 2. El área de la superficie del sólido de revolución que se obtiene al rotar la gráfica de una función f alrededor del eje y en un intervalo [a,b] viene dado por la integral

$$\int_a^b 2\pi x \sqrt{1 + f'(x)^2} \, dx$$

En este caso, tomando $f(x) = \sqrt{r^2 - (x - R)^2}$, se tiene que

$$f'(x) = \frac{R - x}{\sqrt{r^2 - (x - R)^2}} = \frac{R - x}{f(x)}$$

у

$$\begin{split} \sqrt{1+f'(x)^2} &= \sqrt{1+\left(\frac{R-x}{f(x)}\right)^2} = \sqrt{\frac{f(x)^2+(x-R)^2}{f(x)^2}} \\ &= \sqrt{\frac{r^2}{f(x)^2}} = \frac{r}{f(x)} = \frac{r}{\sqrt{r^2-(x-R)^2}} \end{split}$$

Así pues, sustituyendo en la integral anterior se tiene

$$\begin{split} \int_{R-r}^{R+r} 2\pi x \sqrt{1+f'(x)^2} \, dx &= \int_{R-r}^{R+r} 2\pi x \frac{r}{\sqrt{r^2-(x-R)^2}} \, dx \\ &= 2\pi r \int_{R-r}^{R+r} \frac{x}{\sqrt{r^2-(x-R)^2}} \, dx \\ &= 2\pi r \int_{-1}^{1} \frac{ur+R}{\sqrt{r^2-(ur)^2}} r \, du \qquad \text{(Cambio } u = \frac{x-R}{r}\text{)} \\ &= 2\pi r \int_{-1}^{1} \frac{ur+R}{\sqrt{1-u^2}} \, du \\ &= 2\pi r \left(\int_{-1}^{1} \frac{ur}{\sqrt{1-u^2}} \, du + \int_{-1}^{1} \frac{R}{\sqrt{1-u^2}} \right) \\ &= 2\pi r \left(r[-\sqrt{1-u^2}]_{-1}^1 + R[\arccos(u)]_{-1}^1 \right) \\ &= 2\pi r R \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = 2\pi^2 r R. \end{split}$$

Por tanto, el área de las superficie del toro es el doble, $4\pi^2 rR$.

Ejercicio 8.40. Se lanza una pelota verticalmente desde la ventana de un edificio situada a 20 m sobre el suelo con una velocidad inicial de 10 m/s. ¿A qué distancia del suelo estará la pelota transcurridos 3 segundos? ¿Qué distancia habrá recorrido hasta ese instante?

Solución

La posición que ocupa la pelota en cada instante t viene dada por la integral de la velocidad v(t), $\int_0^t v(t) dt$, pero, a su vez, la velocidad en cada instante viene dada por la integral de la aceleración. En este caso la aceleración que sufre la pelota es la de la fuerza de la gravedad, que es constante y negativa, por lo que tenemos

$$v(t) = v(0) + \int_0^t g \, dx = v(0) + [g]_0^t = v(0) + gt.$$

Por tanto, el espacio en cada instante t es

$$s(t) = s(0) + \int_0^t v(0) + gx \, dx = s(0) + \left[v(0)x + g\frac{x^2}{2}\right]_0^t = s(0) + v(0)t + g\frac{t^2}{2}.$$

Como la posición en el instante inicial es s(0) = 20m, la velocidad inicial es v(0) = $10 \text{ m/s y } g = -9.81 \text{ m/s}^2$, sustituyendo en la expresión anterior se tiene

$$s(t) = 20 + 10t - 9.81 \frac{t^2}{2}.$$

Así pues, la posición de la pelota a los 3 segundos es

$$s(3) = 20 + 10 \cdot 3 - 9.81 \frac{3^2}{2} = 5.855 \text{ m}.$$

Para calcular la distancia recorrida hasta los 3 segundos tenemos que descomponer la región de integración en los intervalos donde la velocidad es positiva y los intervalos donde es negativa, y calcular la integral por separado. Para ello obtenemos el instante donde la velocidad se anula

$$v(t) = v(0) + gt = 10 - 9.81t = 0 \Leftrightarrow t = \frac{10}{9.81} = 1.0194 \text{ s.}$$

Por tanto, la velocidad es positiva en el intervalo [0, 1.0194] y negativa en el intervalo [1.0194, 3], de manera que la distancia recorrida hasta los 3 segundos es

$$\begin{split} \int_0^3 |10 - 9.81t| \, dt &= \int_0^{1.0194} 10 - 9.81t \, dt - \int_{1.0194}^3 10 - 9.81t \, dt \\ &= \left[10t - 9.81 \frac{t^2}{2} \right]_0^{1.0194} - \left[10t - 9.81 \frac{t^2}{2} \right]_{1.0194}^3 \\ &= 10 \cdot 1.0194 - 9.81 \frac{1.0194^2}{2} - \left(10 \cdot 3 - 9.81 \frac{3^2}{2} - 10 \cdot 1.0194 + 9.81 \frac{1.0194^2}{2} \right) \\ &= 5.0968 + 19.2418 = 24.3387 \text{ m.} \end{split}$$

Ejercicio 8.41. Un vehículo se mueve con una aceleración dada por la función a(t) = $10\cos(2t)$. Suponiendo que el vehículo parte de un estado de reposo en la posición 0, ¿cuál será la distancia neta recorrida por el vehículo en el intervalo de $[0,\pi]$? ¿Y la distancia total?

Solución

Calculamos primero la velocidad en cada instante t.

$$\begin{split} v(t) &= v(0) + \int_0^t a(x) \, dx = 0 + \int_0^t 10 \cos(2x) \, dx = 5[\sin(2x)]_0^t \\ &= 5(\sin(2t) - \sin(0)) = 5 \sin(2t). \end{split}$$

Y ahora calculamos la distancia neta recorrida.

$$\int_0^\pi v(t)\,dt = \int_0^\pi 5\sin(2t)\,dt = -\frac{5}{2}[\cos(2x)]_0^\pi = -\frac{5}{2}(\cos(2\pi)-\cos(0)) = 0.$$

Es decir, la distancia neta recorrida en el intervalo $[0,\pi]$ es nula y, por tanto, el vehículo vuelve a la posición inicial en el instante π .

Para calcular la distancia neta, debemos descomponer el intervalo de integración en los subintervalos donde la velocidad es positiva y los subintervalos donde es negativa, y calcular la integral por separado. Para ello, obtenemos primero los valores donde la velocidad es nula.

$$v(t) = 5 \operatorname{sen} 2t = 0 \Leftrightarrow t = \frac{\operatorname{arcsen}(0)}{2} = \pi/2.$$

Así pues, la velocidad es positiva en el intervalo $[0, \pi/2]$ y negativa en le intervalo $[\pi/2,\pi]$, de manera que a distancia total recorrida por el vehículo en el intervalo $[0, 2\pi]$ es

$$\begin{split} \int_0^\pi |v(t)| \, dt &= \int_0^{\pi/2} v(t) \, dt - \int_{\pi/2}^\pi v(t) \, dt = \int_0^{\pi/2} 5 \operatorname{sen}(2t) \, dt - \int_{\pi/2}^\pi 5 \operatorname{sen}(2t) \, dt \\ &= -\frac{5}{2} [\cos(2t)]_0^{\pi/2} + \frac{5}{2} [\cos(2t)]_{\pi/2}^\pi \\ &= -\frac{5}{2} (\cos(\pi) - \cos(0)) + \frac{5}{2} (\cos(2\pi) - \cos(\pi)) \\ &= -\frac{5}{2} (-4) = 10. \end{split}$$

Ejercicio 8.42. La ley de Hooke establece que la fuerza necesaria para estirar un muelle es proporcional a la distancia de estiramiento, es decir, cumple la ecuación

$$F = kx$$

donde x es la distancia de estiramiento desde la posición natural del muelle, y k es una constante de proporcionalidad que es propia del tipo de muelle.

Si al aplicar una fuerza de 3 N se consigue comprimir el muelle una distancia de 0.1 m desde su posición natural, ¿qué trabajo se realiza al estirar el muelle 0.2 m desde su posición natural?



Solución

Como al aplicar una fuerza de 3 N el muelle se comprime 0.1 m, aplicando la ley de Hooke se puede calcular la constante de proporcionalidad del muelle.

$$3 \text{ N} = k0.1 \text{ m} \Leftrightarrow k = \frac{3 \text{ N}}{0.1 \text{ m}} = 30 \text{ N/m}.$$

Así pues, la fuerza ejercida por el muelle a una distancia x de su posición natural viene dada por la función F(x) = 30x, y el trabajo realizado al estirarlo 0.2 m es

$$\int_0^{0.2} F(x) dx = \int_0^{0.2} 30x dx = 30 \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{0.2} = 30 \frac{0.2^2}{2} = 0.6 \text{ J}.$$

Ejercicio 8.43. ¿Qué trabajo se realiza al lanzar un cohete de 50 toneladas desde la superficie de la tierra a una órbita situada a 100 km sobre la superficie terrestre? Nota: Debe tenerse en cuenta que la aceleración de la gravedad disminuye con la altura según la fórmula

$$g_h = g_0 \left(\frac{R}{R+h}\right)^2,$$

donde g_h es la aceleración de la gravedad a una altura h m sobre la superficie terrestre, $g_0 = 9.81 \text{ m/s}^2$ es la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre, y R = 6371 km es el radio de la Tierra.



Solución

Ejercicio 8.44. Un depósito con forma de cono invertido de radio 2 m y altura 5 m está lleno de agua. ¿Qué trabajo se realiza al vaciar el tanque por arriba? Nota: La densidad del agua es de $\delta = 1000 \text{ kg/m}^3$.

Solución

En este caso, aunque la aceleración de la gravedad es constante, el volumen de agua a cada altura y es distinto, por lo que su masa y la fuerza necesaria para elevarla será distinta.

Siguiendo la misma estrategia de las sumas de Riemann, podemos descomponer el intervalo [0,5] de la altura del depósito en subintervalos de igual amplitud de acuerdo a una partición $P_n=\{y_0=0,y_1,\ldots,y_n=5\}$, y considerar, para cada subintervalo $[y_{i-1},y_i]$ el cilindro de radio $x_i=f(y_i)$, donde f(y) es la función de la generatriz del cono, y altura $\Delta y=y_i-y_{i-1}$. Como la ecuación de la recta que define la generatriz del cono es $y=\frac{5}{2}x$, expresando x en función de y se tiene que $x_i=\frac{2}{5}y_i$, de manera que el volumen del cilindro correspondiente al intervalo $[x_{i-1},x_i]$ es

$$V_i = \pi \left(\frac{2}{5}y_i\right)^2 \Delta y = \frac{4}{25}\pi y_i^2 \Delta y.$$

Teniendo en cuenta la densidad del agua, la masa de este cilindro de agua es

$$M_{i} = \delta V_{i} = 1000 \frac{4}{25} \pi y_{i}^{2} \Delta y = 160 \pi y_{i}^{2} \Delta y,$$

y por panto, la fuerza que hay que aplicar para elevar esa masa es

$$F_i = gM_i = 9.81 \cdot 160\pi y_i^2 \Delta y = 1569\pi y_i^2 \Delta y_i$$

Como el agua de este sector cilíndrico hay que subirla una distancia $5 - y_i$, el trabajo realizado al elevar este cilindro de agua hasta el desagüe del tanque es

$$W_i = (5 - y_i)1569\pi y_i^2 \Delta y = 1569\pi (5y_i^2 - y_i^3) \Delta y.$$

Por tanto, el trabajo realizado al elevar todos los cilindros de agua de la partición viene dado por la suma de Riemann

$$\sum_{i=1}^{n} W_i$$

lo que nos da una aproximación del trabajo real realizado al vaciar el depósito. A medida que tomemos más subintervalos, en el límite cuando n tiende a ∞ , esta suma de Riemann se transforma en la integral definida

$$\int_0^5 1569\pi (5y^2 - y^3) \, dy,$$

que nos dará el trabajo necesario para vaciar el tanque. Así pues, resolviendo la integral se tiene

$$W = \int_0^5 1569\pi 5y^2 - y^3 \, dy, = 1569\pi \left[5\frac{y^3}{3} - \frac{y^4}{4} \right]_0^5$$
$$= 1569\pi \left(5\frac{5^3}{3} - \frac{5^4}{4} \right) = 256727.02 \text{ J.}$$

Ejercicio 8.45. Un depósito con forma de sólido de revolución generado al rotar la gráfica de la función $f(x) = \frac{x^2}{2}$ alrededor del eje y en el intervalo de 0 a 4 m, contiene 100000 l de aceite con una densidad de $\delta = 900 \text{ kg/m}^3$. ¿Qué trabajo se realiza al vaciar el depósito por arriba?

Solución

El problema es similar al anterior, pero ahora, el radio de los sectores circulares viene dado por la función $y = \frac{x^2}{2}$, de manera que $x = \sqrt{2y}$.

Tal y como vimos en el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución, el volumen almacenado en el depósito hasta una altura h es

$$V(h) = \int_0^h \pi \sqrt{2y^2} \, dy = \pi \int_0^h 2y \, dy = \pi [y^2]_0^h = \pi h^2 \text{ m}^3.$$

Por tanto, si el volumen almacenado es de $100~\mathrm{m}^3$ de aceite, el nivel del depósito es

$$V(h) = \pi h^2 = 100 \Leftrightarrow h = \sqrt{\frac{100}{\pi}} = 5.6419 \text{ m}.$$

Por tanto, siguiendo la misma estrategia del problema anterior, el trajo total realizado al vaciar el depósito por arriba, viene dado por la integral definida

$$\begin{split} W &= \int_0^{5.6419} g \delta \pi \sqrt{2y}^2 (8-y), dy, = \int_0^{5.6419} 9.81 \cdot 900 \pi 2y (8-y), dy, \\ &= 17658 \pi \int_0^{5.6419} 8y - y^2, dy, = 17658 \pi \left[8 \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^{5.6419} \\ &= 17658 \pi \left(8 \frac{5.6419^2}{2} - \frac{5.6419^3}{3} \right) \approx 3742383 \text{ J}. \end{split}$$

Ejercicio 8.46. Una varilla varilla metálica de 20 m de longitud, tiene una densidad $f(x) = \text{sen}(\pi x) + 1$ a una distancia x de su extremo izquierdo. Calcular su centro de masas.

Solución

Para calcular el centro de masas de una varilla con densidad variable f(x) tenemos que dividir su momento y su masa, es decir, calcular el cociente de integrales

$$\bar{x} = \frac{\int_0^{20} x f(x) \, dx}{\int_0^{20} f(x) \, dx},$$

así que procedemos a calcular estas dos integrales,

$$\int_0^{20} f(x) dx = \int_0^{20} \sin(\pi x) + 1 dx = \frac{-1}{\pi} [\cos(\pi x)]_0^{20} + [x]_0^{20}$$
$$= \frac{-1}{\pi} (\cos(20\pi) - \cos(0)) + 20 = 20$$

у

$$\begin{split} \int_0^{20} x f(x) \, dx &= \int_0^{20} x (\operatorname{sen}(\pi x) + 1) \, dx = \int_0^{20} x \operatorname{sen}(\pi x) \, dx + \int_0^{20} x \, dx \\ &= \frac{1}{\pi^2} [\operatorname{sen}(\pi x)]_0^{20} - \frac{1}{\pi} [x \cos(\pi x)]_0^{20} + \frac{1}{2} [x^2]_0^{20} \qquad \text{(partes)} \\ &= \frac{1}{\pi^2} (\operatorname{sen}(20\pi) - \operatorname{sen}(0)) - \frac{1}{\pi} (20 \cos(20\pi) - 0 \cos(0)) + \frac{20^2}{2} \\ &= -\frac{20}{\pi} + 200 \approx 193.6338 \end{split}$$

Por tanto, se tiene

$$\bar{x} = \frac{\int_0^{20} x f(x) dx}{\int_0^{20} f(x) dx}, = \frac{193.6338}{20} = 9.6817.$$

Ejercicio 8.47. Calcular el centroide del sector circular definido por la ecuación $x^2 + y^2 = 1$ en el primer cuadrante.

Solución

En primer lugar expresamos y en función de x, de manera que se obtiene $y=\pm\sqrt{1-x^2}$. Como estamos interesados en la región del primer cuadrante, tomamos la raíz positiva, es decir, la función que delimita la región es $f(x)=\sqrt{1-x^2}$. Para calcular el centro de masas una región plana con densidad constante f(x) tenemos que calcular las coordenadas del centroide por separado. Para calcular la primera coordenada del centroide tenemos que calcular el cociente de integrales

$$\bar{x} = \frac{\int_0^1 x f(x) \, dx}{\int_0^1 f(x) \, dx},$$

así que procedemos a calcular estas dos integrales. Calculamos primero la integral del denominador que se corresponde con el area encerrada entre la gráfica de la función y el eje x en el intervalo [0,1].

$$\begin{split} \int_0^1 f(x) \, dx &= \int_0^1 \sqrt{1 - x^2} \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos(\theta)^2 \, d\theta \qquad \text{(cambio } x = \sin(\theta)) \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \, d\theta = \frac{1}{2} \left[x + \frac{\sin(2\theta)}{2} \right]_0^{\pi/2} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\sin(\pi)}{2} - \frac{\sin(0)}{2} \right) = \frac{\pi}{4} \approx 0.7854. \end{split}$$

Y ahora calculamos la integral del numerador que se corresponde con el momento de la región con respecto al eje y.

$$\int_0^{20} x f(x) dx = \int_0^1 x \sqrt{1 - x^2} dx = -\frac{1}{2} \int_1^0 u^{1/2} du \qquad \text{(cambio } u = 1 - x^2\text{)}$$

$$= \frac{-1}{2} \left[\frac{u^{3/2}}{3/2} \right]_1^0 = \frac{-1}{3} [u^{3/2}]_1^0 = \frac{-1}{3} (0 - 1) = \frac{1}{3}$$

Por tanto, se tiene

$$\bar{x} = \frac{\int_0^1 x f(x) \, dx}{\int_0^1 f(x) \, dx} = \frac{1/3}{\pi/4} = \frac{4}{3\pi} \approx 0.4244.$$

Y para calcular la segunda coordenada del centroide tenemos que calcular el cociente de integrales

$$\bar{y} = \frac{\int_0^1 f(x)^2 dx}{2 \int_0^1 f(x) dx},$$

La integral del denominador ya la hemos calculado previamente, así que queda calcular la integral del numerador.

$$\int_0^{20} f(x)^2 dx = \int_0^1 (\sqrt{1 - x^2})^2 dx = \int_0^1 1 - x^2 dx = \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_0^1$$
$$= \left(1 - \frac{1^3}{3} \right) = \frac{2}{3}$$

Por tanto, se tiene

$$\bar{y} = \frac{\int_0^1 f(x)^2 dx}{2\int_0^1 f(x) dx} = \frac{2/3}{2\pi/4} = \frac{4}{3\pi} \approx 0.4244.$$

Así pues, el centroide es el punto de coordenadas $(\frac{4}{3\pi}, \frac{4}{3\pi})$. Como se observa las dos coordenadas son iguales, algo que tiene sentido desde un punto de vista geométrico.

Ejercicio 8.48. Calcular el centroide de la región encerrada por la recta y = x y la curva $y = x^2$.

•

Solución

En primer lugar calculamos los valores de x en los que las gráficas de ambas funciones se cortan, resolviendo la ecuación que resulta de igualar sus ecuaciones.

$$x = x^2 \Leftarrow x^2 - x = 0 \Leftarrow x(x - 1) = 0 \Leftarrow x = 0 \text{ o } x = 1.$$

Así pues se trata de calcular el centroide de la región comprendida entre las gráficas de f(x) = x y $g(x) = x^2$ en el intervalo [0,1].

Para calcular el centro de masas una región plana con densidad constante f(x) tenemos que calcular las coordenadas del centroide por separado. Para calcular la primera coordenada del centroide tenemos que calcular el cociente de integrales

$$\bar{x} = \frac{\int_0^1 x(f(x) - g(x)) \, dx}{\int_0^1 f(x) - g(x) \, dx},$$

así que procedemos a calcular estas dos integrales. Calculamos primero la integral del denominador que se corresponde con el área encerrada entre las gráficas de las dos funciones.

$$\int_0^1 x - x^2 \, dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \left(\frac{1^2}{2} - \frac{1^3}{3} \right) = \frac{1}{6}.$$

Ahora calculamos la integral del numerador que se corresponde con el momento de la región con respecto al eje y.

$$\int_0^1 x(x-x^2) \, dx = \int_0^1 x^2 - x^3 \, dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \left(\frac{1^3}{3} - \frac{1^4}{4} \right) = \frac{1}{12}.$$

Por tanto, la primera coordenada del centroide es

$$\bar{x} = \frac{\int_0^1 x(f(x) - g(x)) dx}{\int_0^1 f(x) - g(x) dx} = \frac{1/12}{1/6} = \frac{1}{2} = 0.5.$$

Y para calcular la segunda coordenada del centroide tenemos que calcular el cociente de integrales

$$\bar{y} = \frac{\int_0^1 f(x)^2 - g(x)^2 dx}{2 \int_0^1 f(x) - g(x) dx},$$

La integral del denominador ya la hemos calculado previamente, así que queda calcular la integral del numerador.

$$\int_0^1 x^2 - (x^2)^2 \, dx = \int_0^1 x^2 - x^4 \, dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \left(\frac{1^3}{3} - \frac{1^5}{5} \right) = \frac{2}{15}.$$

Por tanto, se tiene

$$\bar{y} = \frac{\int_0^1 f(x)^2 - g(x)^2 dx}{2 \int_0^1 f(x) - g(x) dx} = \frac{2/15}{2/6} = \frac{2}{5} = 0.4.$$

Así pues, el centroide es el punto de coordenadas (0.5, 0.4).

Ejercicio 8.49. El teorema de Pappus establece que si una región plana está a un lado de una recta l, el volumen de revolución generado al rotar la región alrededor de la recta l coincide con el producto del area de la región y la distancia recorrida por su centroide en la rotación. Dar una demostración del teorema para el caso particular en el que la región plana está delimitada por dos funciones f(x) y g(x) en un intervalo [a,b] y el eje de rotación es el eje y.

Section 1

Solución

Aplicando el método de los envoltorios cilíndricos para calcular el volumen del sólido de revolución que se obtiene al rotar la región comprendida entre las gráficas de f y g en el intervalo [a,b] alrededor del eje g se tiene

$$V = \int_{a}^{b} 2\pi x (f(x) - g(x)) \, dx = 2\pi \int_{a}^{b} x (f(x) - g(x)) \, dx$$

Ahora bien, como la primera coordenada del centroide se calcula mediante el cociente de integrales

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x(f(x) - g(x)) \, dx}{\int_a^b f(x) - g(x) \, dx},$$

de aquí se deduce que

$$\int_a^b x(f(x)-g(x))\,dx = \bar x \int_a^b f(x) - g(x)\,dx.$$

Así pues, el volumen es

$$2\pi \int_a^b x (f(x) - g(x)) \, dx = 2\pi \bar{x} \int_a^b f(x) - g(x) \, dx,$$

donde $2\pi\bar{x}$ es la distancia recorrida por el centroide en una rotación completa alrededor del eje y, y $\int_a^b f(x) - g(x)\,dx$ es el área de la región encerrada entre las gráficas de f y g en el intervalo [a,b].

Ejercicio 8.50. Calcular el valor medio de la función $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ en el intervalo [-1,1].

Solución

Para calcular el valor medio de una función en el intervalo [-1,1] tenemos que calcular la siguiente integral

$$\begin{split} \bar{f}[-1,1] &= \frac{1}{1-(-1)} \int_{-1}^{1} f(x) \, dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2} \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos(\theta)^2 \, d\theta = \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1+\cos(2\theta)}{2} \, d\theta \qquad \text{(cambio } x = \sin(\theta)\text{)} \\ &= \frac{1}{4} \left[x + \frac{\sin(2\theta)}{2} \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\sin(\pi)}{2} + \frac{\pi}{2} - \frac{\sin(-\pi)}{2} \right) = \frac{\pi}{4}. \end{split}$$

Ejercicio 8.51. Se deja caer una pelota desde la terraza de un edificio situada a una altura de 25 m. Suponiendo que no hubiese rozamiento, ¿cuál es la velocidad media de la pelota desde su lanzamiento hasta que toca el suelo?

Solución

La única fuerza que actúa sobre la pelota es la fuerza de la gravedad, que podemos suponer con una aceleración constante $g=-9.81~\mathrm{m/s^2}$. Según las fórmulas de cinemática, la posición que ocupa la pelota en cada instante t viene dada por la expresión

$$s(t) = s(0) + \int_0^t v(x) dx,$$

donde s(0) es la posición inicial, en este caso 25 m, y v(x) es la función velocidad, que, a su vez, se obtiene mediante la expresión

$$v(t) = v(0) + \int_0^t a(x) dx,$$

donde v(0) es la velocidad inicial, en este caso 0 m/s, y a(x) es la función aceleración, que en este caso es constante g = -9.81 m/s², de manera que se tiene

$$v(t) = \int_0^t -9.81 \, dx = -9.81 [x]_0^t = -9.81t,$$

y sustituyendo en la expresión de la posición de la pelota se tiene

$$s(t) = 25 + \int_0^t -9.81x \, dx, = 25 - 9.81 \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^t = 25 - 4.905t^2.$$

Igualando la posición a 0 obtenemos el tiempo que tarda la pelota en alcanzar el suelo.

$$s(t) = 0 \Leftrightarrow 25 - 4.905t^2 = 0 \Leftrightarrow t^2 = \frac{25}{4.905} = 5.0968 \Leftrightarrow t = \sqrt{5.0968} = 2.2576 \text{ s}.$$

Así pues, tenemos que calcular la velocidad media en el intervalo [0, 2.2576]. El valor medio de la función velocidad en ese intervalo viene dado por la siguiente expresión

$$\bar{v}[0, 2.2576] = \frac{1}{2.2576} \int_0^{2.2576} v(x) dx = \frac{1}{2.2576} \int_0^{2.2576} -9.81x dx$$
$$= \frac{-9.81}{2.2576} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{2.2576} = \frac{-9.81}{2.2576} \frac{2.2576^2}{2} = -11.0735 \text{ m/s}.$$

9 Funciones vectoriales

Ejercicio 9.1. Emparejar las siguientes funciones vectoriales con las trayectorias de más abajo.

Unable to display output for mime type(s): text/html

```
a. \mathbf{f}(t) = (\text{sen}(t), \cos(t), t/4)
```

b.
$$\mathbf{g}(t) = (\frac{t}{2} + 2, 2t - 1, t + 1)$$

c.
$$\mathbf{h}(t) = (\cos(2t), \sin(t), \cos(t))$$

d.
$$\mathbf{i}(t) = (t\cos(t), t, t\sin(t))$$

Solución

La gráfica A corresponde a $\mathbf{g}(t)$.

La gráfica B corresponde a $\mathbf{f}(t)$.

La gráfica C corresponde a $\mathbf{i}(t)$.

La gráfica D corresponde a $\mathbf{h}(t)$.

Ejercicio 9.2. Determinar la función vectorial cuya trayectoria coincide de la intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 2$ y el plano 2x - z = 1.

Solución

Como la proyección del cilindro de ecuación $x^2+y^2=2$ sobre el plano xy es una circunferencia, podemos parametrizarla de la manera habitual haciendo $x=\mathrm{sen}(t)$ e $y=\mathrm{cos}(t)$ con $0\leq t\leq 2\pi$.

Por otro lado, de la ecuación del plano se deduce que z = 1 + 2x, y sustituyendo la parametrización anterior se tiene $z = 1 + 2 \operatorname{sen}(t)$.

Así pues, la función vectorial que resulta es

$$\mathbf{f}(t) = \text{sen}(t)\mathbf{i} + \cos(t)\mathbf{j} + (1 + 2\text{sen}(t)) \quad 0 \le t \le 2\pi.$$

Ejercicio 9.3. Dos aviones vuelan siguiendo las trayectorias dadas por las funciones vectoriales $\mathbf{f}(t) = t^2\mathbf{i} + (2t+1)\mathbf{j} + t^3\mathbf{j}$ y $\mathbf{g}(t) = t - 2\mathbf{i} + \frac{t}{2}\mathbf{j} + 3t + 10\mathbf{j}$. ¿Se cortan sus trayectorias? ¿Llegarán a chocar en algún momento?

Solución

Para ver si las trayectorias de los dos aviones se cortan deben existir instantes t_1 y t_2 tales que $f(t_1) = f(t_2)$, es decir,

$$t_1^2 = t_2 - 2$$

$$2t_1 + 1 = \frac{t_2}{2}$$

$$t_1^3 = 3t_2 + 10$$

Despejando t_2 en la primera ecuación se tiene $t_2=t_1^2+2$ y sustituyendo en la segunda llegamos a

$$2t_1 + 1 = \frac{t_1^2 + 2}{2} \Leftrightarrow \frac{t_1^2}{2} - 2t_1 = 0 \Leftrightarrow t_1 \left(\frac{t_1}{2} - 2\right) = 0 \Leftrightarrow t_1 = 0 \text{ o } t_1 = 4.$$

Para $t_1=0$ se tiene que $t_2=0^2+2=2$, que no cumplen la tercera ecuación, ya que $0^3=0\neq 3\cdot 2+10=16$. Y para $t_1=4$ se tiene que $t_2=4^2+2=18$, que sí cumple la tercera ecuación, ya que $4^3=64=3\cdot 18+10$.

Así pues, para $t_1 = 4$ y $t_2 = 18$ se tiene que $(f)(4) = (16, 9, 64) = \mathbf{g}(18)$, por lo que las trayectorias de (f) y (g) se cortan en le punto (16, 9, 64). Sin embargo, los aviones no llegan a colisionar ya que para ello los dos aviones deberían estar en ese punto en el mismo instante.

Ejercicio 9.4. Dadas dos funciones vectoriales \mathbf{f} y \mathbf{g} en \mathbb{R}^n , demostrar que si existen su límites cuando $t \to a$, entonces se cumplen las siguientes propiedades:

- a. $\lim_{t \to a} \mathbf{f}(t) + \mathbf{g}(t) = \lim_{t \to a} \mathbf{f}(t) + \lim_{t \to a} \mathbf{g}(t).$
- b. $\lim_{t \to a} c\mathbf{f}(t) = c \lim_{t \to a} \mathbf{f}(t) \ \forall c \in \mathbb{R}.$
- c. $\lim_{t \to a} \mathbf{f}(t) \cdot \mathbf{g}(t) = \lim_{t \to a} \mathbf{f}(t) \cdot \lim_{t \to a} \mathbf{g}(t)$.
- d. $\lim_{t \to a} \mathbf{f}(t) \times \mathbf{g}(t) = \lim_{t \to a} \mathbf{f}(t) \times \lim_{t \to a} \mathbf{g}(t)$.

Solución

Ejercicio 9.5. Calcular los siguientes límites de funciones vectoriales.

a.
$$\lim_{t \to 0} \left(t^2 e^{-t}, \frac{\operatorname{tg}(t)}{t} \right).$$

b.
$$\lim_{t \to \infty} \left(\frac{t^2 + 2t}{2t^2 - 1}, t \cos(t^{-1}), \frac{\sin(t^2)}{t} \right)$$
.

Solución

$$\lim_{t\to 0}\left(t^2e^{-t},\frac{\operatorname{tg}(t)}{t}\right)=\left(\lim_{t\to 0}t^2e^{-t},\lim_{t\to 0}\frac{\operatorname{tg}(t)}{t}\right)=(0,1).$$

b.

$$\begin{split} \lim_{t\to\infty} \left(\frac{t^2+2t}{2t^2-1}, t\cos(t^{-1}), \frac{\sin(t^2)}{t}\right) &= \left(\lim_{t\to\infty} \frac{t^2+2t}{2t^2-1}, \lim_{t\to\infty} t\cos(t^{-1}), \lim_{t\to\infty} \frac{\sin(t^2)}{t}\right) \\ &= \left(\frac{1}{2}, \infty, 0\right) \end{split}$$

Ejercicio 9.6. Calcular la derivada de las siguientes funciones vectoriales

a.
$$\mathbf{f}(t) = \left(t^2 e^{-t}, \frac{\operatorname{tg}(t)}{t}\right).$$

b.
$$\mathbf{g}(t) = \left(\frac{t^2 + 2t}{2t^2 - 1}, t\cos(t^{-1}), \frac{\sin(t^2)}{t}\right).$$

Solución

$$\mathbf{f}'(t) = \left((t^2 e^{-t})', \left(\frac{\operatorname{tg}(t)}{t} \right)' \right) = \left(-t^2 e^{-t} + 2t e^{-t}, \frac{\operatorname{tg}(t)^2 + 1}{t} - \frac{\operatorname{tg}(t)}{t^2} \right)$$
a.

$$\begin{split} \mathbf{g}'(t) &= \left(\left(\frac{t^2 + 2t}{2t^2 - 1} \right)', (t\cos(t^{-1}))', \left(\frac{\sin(t^2)}{t} \right)' \right) \\ &= \left(\frac{4t^3 + 8t^2}{(2t^2 - 1)^2}, \cos(t^{-1}) + \frac{\sin(t^{-1})}{t}, 2\cos(t^2) - \frac{\sin(t^2)}{t^2} \right) \end{split}$$

Ejercicio 9.7. Una partícula se mueve a lo largo de una curva $y = \cos(2x+1)$, siendo $x = t^2 + 1$ y t el tiempo en segundos. ¿Con qué velocidad está desplazándose respecto a las direcciones vertical y horizontal cuando t = 2 s?

9

Solución

Velocidad horizontal: $\frac{dx}{dt} = 2t$ y en el instante t = 2, $\frac{dx}{dt}(t = 2) = 4$. Velocidad vertical: $\frac{dy}{dt} = -\sin(2t^2 + 3)4t$ y en el instante t = 2, $\frac{dy}{dt} = -8\sin(11)$.

Ejercicio 9.8. Un punto se mueve en el plano siguiendo una trayectoria

$$\begin{cases} x = \operatorname{tg}(t), \\ y = t^2 - 2t + 3. \end{cases}$$

- a. Hallar $\frac{dy}{dx}$ en t = 0.
- b. Hallar la tangente a la trayectoria en el punto (0,3).

•

Solución

Se trata de la ecuación paramétrica de una función vectorial en el plano real.

a. Aplicando la regla de la cadena se tiene que

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx}\frac{dx}{dt},$$

en consecuencia,

$$\frac{dy}{dx}(t) = \frac{dy/dt}{dx/dt}(t) = \frac{2t - 2}{1 + \operatorname{tg}(t)^2}.$$

En el punto t = 0 tendremos

$$\frac{dy}{dx}(0) = \frac{-2}{1 + \operatorname{tg}(0)^2} = -2.$$

b. La ecuación de la recta tangente a la trayectoria en el punto $(x(t_0),y(t_0))$ correspondiente al instante t_0 , viene dada por la expresión

$$y-y(t_0)=\frac{dy}{dx}(t_0)(x-x(t_0)).$$

Como el punto (0,3) se alcanza precisamente en el instante t=0 tenemos que la ecuación de la recta tangente a la trayectoria en dicho instante es:

$$y - y(0) = \frac{dy}{dx}(0)(x - x(0)),$$

es decir,

$$y-3 = -2(x-0),$$

y simplificando obtenemos:

$$y = 3 - 2x.$$

Ejercicio 9.9. Una partícula se mueve a lo largo de la curva

$$\begin{cases} x = 2\operatorname{sen}(t), \\ y = \sqrt{3}\cos(t), \end{cases}$$

donde x e y están medidos en metros y el tiempo t en segundos.

- a. Hallar la ecuación de la rectas tangente y normal a la trayectoria en el punto (1,3/2).
- b. ¿Con qué velocidad se mueve la partícula respecto a las direcciones vertical y horizontal en dicho punto?

Solución

Sea $\mathbf{f}(t) = (2\operatorname{sen}(t), \sqrt{3}\cos(t)).$

a. La partícula pasa por el punto (1,3/2) en el instante $t=\pi/6$, por lo que hay que calcular la ecuación de las rectas tangente y normal en ese instante.

La derivada de la función vectorial es

$$\mathbf{f}'(t) = (2\cos(t), -\sqrt{3}\sin(t)),$$

y en el instante $t = \pi/6$ vale

$$\mathbf{f}'(\pi/6) = (2\cos(\pi/6), -\sqrt{3}\sin(\pi/6)) = \left(\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

Por tanto, la ecuación vectorial de la recta tangente a la trayectoria de \mathbf{f} en ese instante es

$$\left(1, \frac{3}{2}\right) + t\left(\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \left(1 + \sqrt{3}t, \frac{3 - \sqrt{3}t}{2}\right),$$

y la de la recta normal

$$\left(1, \frac{3}{2}\right) + t\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{3}\right) = \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}t, \frac{3}{2} + \sqrt{3}t\right).$$

b. La velocidad con la que se mueve con respecto a la dirección horizontal es $\frac{dx}{dt}(\pi/6)=x'(\pi/6)=\sqrt{3}$ m/s, y con respecto a la dirección vertical $\frac{dy}{dt}(\pi/6)=$ $y'(\pi/6) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ m/s.

Ejercicio 9.10. Determinar el ángulo con el que se cortan las trayectorias de las funciones vectoriales $\mathbf{f}(t) = (2t+1, \sqrt{t}, t^2)$ y $\mathbf{g}(t) := \left(\frac{t^2+6}{2}, e^{2t}, \cos(t)\right)$ en el punto (3, 1, 1).

Solución

El ángulo con el que se cortan dos trayectorias es el ángulo que forman sus vectores tangentes en el punto de corte.

La primera función pasa por el punto (3,1,1) en t=1, mientras que la segunda pasa por este mismo punto en t=0.

El vector tangente de $\mathbf{f}(t)$ es

$$\mathbf{f}'(t) = \left((2, \frac{1}{2\sqrt{t}}, 2t \right),$$

que en t = 1 vale $\mathbf{f}'(1) = (2, 1/2, 2)$.

Por otro lado, el vector tangente de $\mathbf{g}(t)$ es

$$\mathbf{g}'(t) = (t, 2e^{2t}, -\sin(t)),$$

que en t = 0 vale $\mathbf{g}'(0) = (0, 2, 0)$.

Para obtener el ángulo θ que forman estos dos vectores, de la fórmula del producto escalar tenemos

$$\cos(\theta) = \frac{(2,1/2,2)(0,2,0)}{|(2,1/2,2)||(0,2,0)|} = \frac{2 \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 2 + 2 \cdot 0}{(2^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2^2)(0^2 + 2^2 + 0^2)} = \frac{1}{33},$$

de donde se deduce que $\theta = \arccos(33) = 1.5405$ rad.

Ejercicio 9.11. Una trayectoria pasa por el punto (3,6,5) en el instante t=0 con velocidad i-k. Hallar la ecuación del plano normal y de la recta tangente en ese instante.

Solución

Plano normal: x - z + 2 = 0. Recta tangente: (3+t, 6, 5-t).

Ejercicio 9.12. Una partícula sigue la trayectoria

$$\begin{cases} x = e^t, \\ y = e^{-t}, \\ z = \cos(t), \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

hasta que se sale por la tangente en el instante t=0. ¿Dónde estará en el instante t=3?

Solución

Recta tangente: (1 + t, 1 - t, 1). Posición en el instante t = 3: (4, -2, 1).

Ejercicio 9.13. Un móvil sigue la trayectoria en el espacio real dada por una función vectorial $\mathbf{f}(t)$ con módulo constante. ¿Cómo es la trayectoria que describe? Demostrar que su vector velocidad es ortogonal al vector posición.

Solución

Supongamos que $|\mathbf{f}(t)| = c \ \forall t \in \mathbb{R}$. Resulta sencillo ver el tipo de trayectoria que seguirá el móvil si pasamos a coordenadas esféricas. Al ser el módulo constante, independientemente del ángulo, la trayectoria estará inscrita en la esfera centrada en el origen de radio c.

Para ver que su vector velocidad es ortogonal al vector de posición, se tiene que

$$\mathbf{f}(t) \cdot \mathbf{f}(t) = |\mathbf{f}(t)|^2 = c^2,$$

que al ser constante, tendrá derivada nula, y por tanto,

$$(\mathbf{f}(t) \cdot \mathbf{f}(t))' = \mathbf{f}(t)' \cdot \mathbf{f}(t) + \mathbf{f}(t) \cdot \mathbf{f}'(t) = 2\mathbf{f}(t)' \cdot \mathbf{f}(t) = 0.$$

Así pues, el vector velocidad $\mathbf{f}'(t)$ y el vector posición $\mathbf{f}(t)$ son ortogonales ya que su producto escalar es nulo.

Ejercicio 9.14. Calcular la longitud de las trayectorias de las siguientes funciones vectoriales en los intervalos dados.

- a. $\mathbf{f}(t) = (t^2, \frac{t^3}{3}) \ t \in [0, 1].$
- b. $\mathbf{g}(t) = (2\operatorname{sen}(t), \frac{t}{2}, 2\cos(t)) \ t \in [-1, 1].$
- c. $\mathbf{h}(t) = (\text{sen}(t), \ln(\cos(t)), \cos(t)) \ t \in [0, \pi/4].$

Solución

a. $\mathbf{f'}(t) = (2t, t^2)$ y la longitud de la trayectoria de $\mathbf{f}(t)$ para $t \in [0, 1]$ es

$$\begin{split} \int_0^1 |\mathbf{f}'(t)| \, dt &= \int_0^1 \sqrt{(2t)^2 + (t^2)^2} \, dt = \int_0^1 \sqrt{t^4 + 4t^2} \, dt \\ &= \int_0^1 \sqrt{t^2(t^2 + 4)} \, dt = \int_0^1 t \sqrt{t^2 + 4} \, dt \\ &= \int_4^5 \frac{1}{2} \sqrt{u} \, du = \left[\frac{u^{3/2}}{3} \right]_4^5 \qquad (u = t^2 + 4) \\ &= \frac{5^{3/2}}{3} - \frac{4^{3/2}}{3} \approx 1.0601. \end{split}$$

b. $\mathbf{g}'(t)=(2\cos(t),\frac{1}{2},-2\sin(t))$ y la longitud de la trayectoria de $\mathbf{g}(t)$ para $t\in[-1,1]$ es

$$\begin{split} \int_{-1}^{1} |\mathbf{g}'(t)| \, dt &= \int_{-1}^{1} \sqrt{(2\cos(t))^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + (-2\sin(t))^2} \, dt \\ &= \int_{-1}^{1} \sqrt{\frac{1}{4} + 4(\cos(t)^2 + \sin(t)^2)} \, dt = \int_{-1}^{1} \sqrt{\frac{1}{4} + 4} \, dt \\ &= \int_{-1}^{1} \sqrt{\frac{17}{4}} \, dt = \left[\frac{\sqrt{17}}{2}t\right]_{-1}^{1} = \frac{\sqrt{17}}{2} + \frac{\sqrt{17}}{2} = \sqrt{17}. \end{split}$$

c. $\mathbf{h}'(t) = (\cos(t), - \operatorname{tg}(t), - \operatorname{sen}(t))$ y la longitud de la trayectoria de $\mathbf{h}(t)$ para $t \in [0, \pi/4]$ es

$$\int_{0}^{\pi/4} |\mathbf{h}'(t)| dt = \int_{0}^{\pi/4} \sqrt{\cos(t)^{2} + (-\lg(t))^{2} + (-\sec(t))^{2}} dt
= \int_{0}^{\pi/4} \sqrt{1 + \lg(t)^{2}} dt = \int_{0}^{\pi/4} \sqrt{\sec(t)^{2}} dt
= \int_{0}^{\pi/4} \sec(t) dt = \int_{0}^{\pi/4} \sec(t) \frac{\sec(t) + \lg(t)}{\sec(t) + \lg(t)} dt
= \int_{1}^{1 + \frac{2}{\sqrt{2}}} \frac{1}{u} du = [\ln|u|]_{1}^{1 + \frac{2}{\sqrt{2}}}
= \ln\left|\frac{2}{\sqrt{2} + 1}\right| - \ln|1| \approx 0.8814.$$
(1)

(1) Cambio de variable $u = \sec(t) + \operatorname{tg}(t)$.

Ejercicio 9.15. Demostrar, usando la fórmula de la longitud de una trayectoria, que la longitud de la gráfica de una función real f(x) para $a \le x \le b$ es

$$\int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} \, dx.$$

Ejercicio 9.16. Dar una parametrización de una espiral de radio r centrada en el eje z, que de n vueltas completas y la distancia entre cada dos vueltas consecutivas sea $h\pi$. Deducir una fórmula para calcular su longitud. Utilizar la fórmula obtenida para calcular la cantidad de alambre necesario para construir la espiral de un cuaderno de 30 cm de altura con radio 1 cm y distancia entre cada dos vueltas consecutivas $\frac{\pi}{4}$.

Solución

Una parametrización de esta espiral viene dada por la función $\mathbf{f}(t)=(r\cos(t),r\sin(t),\frac{h}{2}t)$, con derivada $\mathbf{f}'(t)=(-r\sin(t),r\cos(t),\frac{h}{2})$, por lo que su longitud en el intervalo $t\in[a,b]$ es

$$\begin{split} \int_a^b |\mathbf{f}'(t)| \, dt &= \int_a^b \sqrt{(-r \sin(t))^2 + (r \cos(t))^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2} \, dt \\ &= \int_a^b \sqrt{r^2 + \frac{h^2}{4}} \, dt = \left\lceil \frac{\sqrt{h^2 + 4r^2}}{2} t \right\rceil^b = \frac{\sqrt{h^2 + 4r^2}}{2} (b - a). \end{split}$$

Como la altura del cuaderno viene dada por la componente z de la función vectorial, se tiene que

$$\frac{1/4}{2}t = 30 \Leftrightarrow t = 30 * 8 = 240$$

por lo que la espiral del cuaderno es la trayectoria recorrida por la función vectorial en el intervalo $t \in [0, 240]$, que según la fórmula anterior es

$$\frac{\sqrt{\frac{1}{4^2}+4}}{2}(240-0) = \frac{\sqrt{65}}{8}240 \approx 241.8677 \text{ cm}.$$

Ejercicio 9.17. Construir la parametrización de la longitud de arco de las trayectorias de las siguientes funciones vectoriales para t > 0.

- a. $\mathbf{f}(t) = (3t + 1, 1 2t)$.
- b. $\mathbf{g}(t) = (e^t \operatorname{sen}(t), e^t \cos(t), 1)$

Solución

a. $\mathbf{f}'(t) = (3, -2)$ y su módulo vale $|\mathbf{f}'(t)| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}$, por lo que su función longitud de arco para t > 0 es

$$s(t) = \int_0^t |\mathbf{f}'(x)| \, dx = \int_0^t \sqrt{13} \, dx = [\sqrt{13}x]_0^t = \sqrt{13}t.$$

Tomando la inversa de la función longitud de arco $t = \frac{s}{\sqrt{13}}$ y haciendo el cambio de variable en $\mathbf{f}(t)$, llegamos a la parametrización de longitud de arco

$$\tilde{\mathbf{f}}(s) = \left(\frac{3s}{\sqrt{13}} + 1, 1 - \frac{2s}{\sqrt{13}}\right).$$

Ejercicio 9.18. Calcular la curvatura de las trayectorias de las siguientes funciones vectoriales en los puntos dados:

a.
$$\mathbf{f}(t) = (t^2, \ln(t))$$
 en $t = 1$

b.
$$\mathbf{g}(t) = (\text{sen}(2t), 3\cos(t), e^t) \text{ en } t = 0.$$

Ejercicio 9.19. Calcular la curvatura de un círculo de radio r.

Solución

Podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que el círculo está centrado en el origen de coordenadas, por lo que una parametrización suya es la función vectorial $\mathbf{f}(t) = (r\cos(t), r\sin(t))$.

La derivada de esta función vectorial es $\mathbf{f}'(t) = (-r \operatorname{sen}(t), r \cos(t))$ y el vector tangente unitario

$$\begin{split} \mathbf{T}(t) &= \frac{\mathbf{f}'(t)}{|\mathbf{f}'(t)|} = \frac{(-r \operatorname{sen}(t), r \operatorname{cos}(t))}{\sqrt{(-r \operatorname{sen}(t))^2 + (r \operatorname{cos}(t))^2}} \\ &= \frac{(-r \operatorname{sen}(t), r \operatorname{cos}(t))}{\sqrt{r^2 (\operatorname{sen}(t)^2 + \operatorname{cos}(t)^2)}} = \frac{(-r \operatorname{sen}(t), r \operatorname{cos}(t))}{r} \\ &= (-\operatorname{sen}(t), \operatorname{cos}(t)). \end{split}$$

Por tanto, aplicando la fórmula de la curvatura de una trayectoria, se tiene

$$\begin{split} \kappa(t) &= \frac{|\mathbf{T}'(t)|}{|\mathbf{f}'(t)|} = \frac{|(-\cos(t), -\sin(t))|}{|(-r\sin(t), r\cos(t))|} \\ &= \frac{\sqrt{(-\cos(t))^2 + (-\sin(t))^2}}{\sqrt{(-r\sin(t))^2 + (r\cos(t))^2}} = \frac{1}{r}. \end{split}$$

Es decir, la curvatura de un círculo es el inverso de su radio.

Ejercicio 9.20. Usar la fórmula de la curvatura de la trayectoria de una función vectorial para obtener una fórmula para calcular la curvatura de la gráfica de una función real f(x).

Solución

Dada una función real y = f(x) podemos representar la trayectoria de su gráfica mediante la función vectorial $\mathbf{f}(t) = (t, f(t), 0)$ en el espacio real. En tal caso, según la fórmula de la curvatura de una trayectoria en el espacio real, su curvatura es

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)|}{|\mathbf{f}'(t)|^3}.$$

Así pues, necesitamos la primera y la segunda derivada de la función vectorial, que son $\mathbf{f}'(t) = (1, f'(t), 0)$ y $\mathbf{f}''(t) = (0, f''(t), 0)$ respectivamente, y su producto vectorial es

$$\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t) = \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & f'(t) & 0 \\ 0 & f''(t) & 0 \end{bmatrix} = f''(t)\mathbf{j}$$

Por tanto,

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)|}{|\mathbf{f}'(t)|^3} = \frac{|f''(t)|}{(1 + f''(t)^2)^{3/2}}.$$

Ejercicio 9.21. Las coordenadas paramétricas de un punto material lanzado bajo un ángulo respecto al horizonte son

$$\begin{cases} x = v_0 t, \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

donde $t \in \mathbb{R}^+$ es el tiempo contado a partir del instante en que el punto llega a la posición más alta, v_0 es la velocidad horizontal en el instante t=0 y g=9.8 m²/s es la aceleración de la gravedad. ¿En qué instante la magnitud de la velocidad horizontal será igual a la de la velocidad vertical? ¿Cuánto debería valer v_0 para que en dicho instante el punto haya recorrido 100 m horizontalmente? Calcular la ecuación de la recta tangente en dicho instante con el valor de v_0 calculado.

Solución

La velocidad horizontal es la derivada del espacio recorrido horizontalmente (componente x) con respecto al tiempo, es decir,

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(v_0 t) = v_0.$$

Del mismo modo, la velocidad vertical es la derivada del espacio recorrido verticalmente (componente y) en relación al tiempo,

$$\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}(-\frac{1}{2}gt^2) = -gt$$

Para ver en qué instante ambas magnitudes serán iguales, las igualamos y resolvemos la ecuación:

$$\left|\frac{dx}{dt}\right| = \left|\frac{dy}{dt}\right| \Leftrightarrow v_0 = gt \Leftrightarrow t = \frac{v_0}{q} = \frac{v_0}{9.8}.$$

Para que en dicho instante el punto haya recorrido 100 m horizontalmente, debe cumplirse que $x(v_0/9.8) = 100$, de lo que se deduce:

$$x(v_0/9.8) = v_0 \frac{v_0}{9.8} = \frac{v_0^2}{9.8} = 100 \Leftrightarrow v_0^2 = 980 \Leftrightarrow v_0 = +\sqrt{980} = 31.3.$$

Por tanto, el instance en cuestión es $t = v_0/9.8 = 31.3/9.8 = 3.19$.

Por último, la ecuación de la recta tangente en dicho instante, para el valor de v_0 calculado es:

$$y = y(3.19) + \frac{dy}{dx}(3.19)(x - x(3.19))$$

Ya hemos visto que x(3.19) = 100, y que en dicho instante la velocidad horizontal y vertical coinciden, de manera que

$$\frac{dy}{dx}(3.19) = \frac{dy/dt}{dx/dt} = -1,$$

de modo que sólo nos queda calcular el espacio vertical recorrido en dicho instante, que es

$$y(3.19) = -\frac{1}{2}9.8 \cdot 3.19^2 = -49.86.$$

Sustituyendo en la ecuación anterior llegamos a la recta tangente:

$$y = -49.86 - (x - 100) \Leftrightarrow y = -x + 50.14.$$

Ejercicio 9.22. Una avión parte de la posición $\mathbf{f}(0) = (1,1,1)$ con velocidad inicial $\mathbf{v}(0) = (0, 1, -2)$ y aceleración $\mathbf{a}(t) = t^2 \mathbf{i} - \frac{1}{2} \mathbf{j} + 2 \mathbf{k}$. Determinar el vector velocidad y el vector posición en cada instante.

Ejercicio 9.23. Calcular la rapidez máxima y mínima con la que se mueve una partícula cuya posición viene dada por la función vectorial $\mathbf{f}(t) = \cos(2t)\mathbf{i} + \sin(t)\mathbf{j} + \cos(t)\mathbf{k}$ en el intervalo $[0,\pi)$.

Solución

El vector velocidad vale

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{f}'(t) = (-2\operatorname{sen}(2t), \cos(t), -\operatorname{sen}(t)),$$

y la rapidez con la que se mueve la partícula es su módulo

$$|\mathbf{v}(t)| = \sqrt{(-2 \operatorname{sen}(2t))^2 + \cos(t)^2 + (-\operatorname{sen}(t))^2} = \sqrt{4 \operatorname{sen}(2t)^2 + 1}.$$

Para ver cuándo la rapidez es máxima o mínima tenemos que calcular la derivada de esta función e igualarla a cero para obtener sus puntos críticos.

$$|\mathbf{v}(t)|' = \frac{8\sin(2t)\cos(2t)}{\sqrt{4\sin(2t)^2 + 1}} = 0 \Leftrightarrow \sin(2t)\cos(2t) = 0.$$

Por tanto la derivada se anula si sen(2t) = 0 o cos(2t) = 0, que en el intervalo $[0, \pi)$ se cumple para t = 0, $t = \pi/4$, $t = \pi/2$ y $t = 3\pi/4$.

Para ver si en cada uno de estos instantes hay un máximo, mínimo o punto de inflexión, estudiamos el signo de la derivada en instantes próximos anteriores y posteriores.

- En instantes anteriores a t = 0 sen(2t) < 0 y cos(2t) > 0 por lo que $|\mathbf{v}(t)|' < 0$, y en instantes posteriores sen(2t) > 0 y cos(2t) > 0 por lo que $|\mathbf{v}(t)|' > 0$, y por tanto, hay un mínimo relativo en t = 0.
- En instantes anteriores a $t = \pi/4 \operatorname{sen}(2t) > 0$ y $\operatorname{cos}(2t) > 0$ por lo que $|\mathbf{v}(t)|' > 0$, y en instantes posteriores $\operatorname{sen}(2t) > 0$ y $\operatorname{cos}(2t) < 0$ por lo que $|\mathbf{v}(t)|' < 0$, y por tanto, hay un máximo relativo en t = 0.
- En instantes anteriores a $t = \pi/2 \operatorname{sen}(2t) > 0$ y $\operatorname{cos}(2t) < 0$ por lo que $|\mathbf{v}(t)|' < 0$, y en instantes posteriores $\operatorname{sen}(2t) < 0$ y $\operatorname{cos}(2t) < 0$ por lo que $|\mathbf{v}(t)|' > 0$, y por tanto, hay un mínimo relativo en t = 0.
- En instantes anteriores a $t = 3\pi/4 \operatorname{sen}(2t) < 0$ y $\cos(2t) < 0$ por lo que $|\mathbf{v}(t)|' > 0$, y en instantes posteriores $\operatorname{sen}(2t) < 0$ y $\cos(2t) > 0$ por lo que $|\mathbf{v}(t)|' < 0$, y por tanto, hay un máximo relativo en t = 0.

Ejercicio 9.24. Calcular las componentes tangencial y normal del vector aceleración de las siguientes funciones vectoriales.

a.
$$f(t) = (2\cos(t), \sin(2t))$$
.
b. $g(t) = (3t^2, 2t^3, \ln(t))$.

Ejercicio 9.25. Calcular la fuerza necesaria para que la partícula de masa m se mueva con posición dada por la función vectorial $g(t) = (3t, \ln(t), t^2)$. ¿Cómo se interpreta este vector?

•

Solución

El vector velocidad es

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{f}'(t) = \left(3, \frac{1}{t}, 2t\right),\,$$

y el vector aceleración es

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{f}''(t) = \left(0, \frac{-1}{t^2}, 2\right).$$

Por tanto, la fuerza necesaria para imprimir esta aceleración a una partícula de masa m en cada instante t es

$$\mathbf{F}(t) = m\mathbf{a}(t) = \left(0, \frac{-m}{t^2}, 2m\right).$$

Esto quiere decir que no hay que aplicar fuerza en el sentido del eje x, una fuerza inversamente proporcional al cuadrado del tiempo en la dirección opuesta al eje y y una fuerza constante del doble de la masa en la dirección del eje z.

Ejercicio 9.26. Se aplica una fuerza de 2 N a una pelota de 100 g en el sentido de la bisectriz del plano yz. Si la pelota parte del origen de coordenadas con una velocidad inicial $\mathbf{v}_0 = 2\mathbf{i} - \mathbf{j}$ m/s, ¿qué posición y con qué rapidez se moverá la pelota en cada instante?

Solución

Un vector con la dirección de la bisectriz del plano yz es (0,1,1), de manera que un vector unitario en esa dirección será $\mathbf{u}=\left(0,\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, y como la intensidad de la fuerza es 2 N, se tiene que el vector fuerza es

$$\mathbf{F}(t) = \left(0, \frac{2}{\sqrt{2}}, \frac{2}{\sqrt{2}}\right) = (0, \sqrt{2}, \sqrt{2}).$$

Como por la segunda ley de Newton $\mathbf{F}(t) = m\mathbf{a}(t)$, se tiene que

$$\mathbf{a}(t) = \frac{\mathbf{F}(t)}{m} = \frac{(0,\sqrt{2},\sqrt{2})}{0.1} = (0,10\sqrt{2},10\sqrt{2}).$$

Integrando el vector aceleración obtenemos el vector velocidad

$$\mathbf{v}(t) = \int \mathbf{a}(t) dt = \int (0, 10\sqrt{2}, 10\sqrt{2}) dt = (0, 10\sqrt{2}t, 10\sqrt{2}t) + C.$$

Como en el instante t=0 la velocidad es \mathbf{v}_0 , se tiene que

$$\mathbf{v}(0) = (0, 10\sqrt{2} \cdot 0, 10\sqrt{2} \cdot 0) + C = (0, 0, 0) + C = C = \mathbf{v}_0,$$

por lo que el vector velocidad es

$$\mathbf{v}(t) = (0, 10\sqrt{2}t, 10\sqrt{2}t) + \mathbf{v}_0 = (0, 10\sqrt{2}t, 10\sqrt{2}t) + (1, -1, 0) = (1, 10\sqrt{2}t - 1, 10\sqrt{2}t).$$

Ahora integrando el vector velocidad obtenemos el vector de posición de la pelota.

$$\mathbf{f}(t) = \int \mathbf{v}(t) \, dt = \int (1, 10\sqrt{2}t - 1, 10\sqrt{2}t) \, dt = (t, 5\sqrt{2}t^2 - t, 5\sqrt{2}t^2) + C$$

Como la pelota parte del origen de coordenadas, f(0) = (0, 0, 0), por lo que

$$\mathbf{f}(0) = (0, 5\sqrt{2} \cdot 0^2 - 0, 5\sqrt{2} \cdot 0^2) + C = (0, 0, 0) + C = C = (0, 0, 0),$$

por lo que, finalmente, el vector de posición es $\mathbf{f}(t)=(t,5\sqrt{2}t^2-t,5\sqrt{2}t^2)$ m, y su rapidez

$$|\mathbf{v}(t)| = \sqrt{1^2 + (10\sqrt{2}t - 1)^2 + (10\sqrt{2}t)^2}.$$

Ejercicio 9.27. Un atleta lanza la jabalina con un ángulo θ sobre la horizontal y una velocidad inicial \mathbf{v}_0 . Suponiendo que la única fuerza que actúa sobre ella es la de la gravedad, ¿qué distancia horizontal alcanzará la jabalina? ¿Qué valor de θ maximiza la distancia horizontal recorrida?

Ejercicio 9.28. La cantidad de árboles en un ecosistema, a, depende del tiempo según la expresión

$$a(t) = 100 \ln(t^2 + 1),$$

y la cantidad de un determinado parásito de los árboles, p, que también depende del tiempo, viene dada por

$$p(t) = \sqrt[3]{t^2 + 2}.$$


- a. Calcular el número de parásitos cuando el número de árboles sea 500.
- b. La derivada del número de parásitos con respecto al número de árboles cuando el número de parásitos sea 3.





Solución


10 Funciones de varias variables

Ejercicio 10.1. Emparejar las siguientes funciones de dos variables con sus curvas de nivel.









- a. $f(x,y) = \cos(x)\sin(y)$
- b. g(x, y) = xy
- c. h(x,y) = 2x + y
- d. $i(x,y) = 3x^2 + y^2$

Solución

La gráfica A corresponde a i(x, y).

La gráfica B corresponde a g(x, y).

La gráfica C corresponde a f(x, y).

La gráfica D corresponde a h(x, y).

Ejercicio 10.2. La asimilación de CO₂ de una planta depende de la temperatura ambiente (t) y de la intensidad de la luz (l), según la función

$$f(t,l) = ctl^2,$$

donde c es una constante.

Estudiar cómo evoluciona la asimilación de CO₂ para distintas intensidades de luz, cuando se mantiene la temperatura constante. Estudiar también cómo evoluciona para distintas temperaturas cuando se mantiene la intensidad de la luz constante.

 $\frac{\partial f}{\partial l}(t,l) = 2ctl \text{ y } \frac{\partial f}{\partial t}(t,l) = cl^2.$

Ejercicio 10.3. Calcular el gradiente de la función

$$f(x,y,z) = \log \frac{\sqrt{x}}{yz} + \arcsin(xz).$$

🕊 Solución

$$\nabla f(x,y,z) = \left(\frac{z}{\sqrt{1-x^2z^2}} + \frac{1}{2x}, \frac{-1}{y}, \frac{x}{\sqrt{1-x^2\,z^2}} - \frac{1}{z}\right)$$

Ejercicio 10.4. Una nave espacial está en problemas cerca del sol. Se encuentra en la posición (1,1,1) y la temperatura de la nave cuando está en la posición (x,y,z) viene dada por $T(x,y,z)=e^{-x^2-2y^2-3z^2}$ donde x,y,z se miden en metros. ¿En qué dirección debe moverse la nave para que la temperatura decrezca lo más rápidamente posible?

Solución

Debe moverse en la dirección $-\nabla f(1,1,1) = e^{-6}(2,4,6)$.

Ejercicio 10.5. Supongamos que la cantidad de agua almacenada en un pantano al final del año hidrológico, A en hectómetros cúbicos, viene dada por la función

$$A(p,t,c) = \sqrt{\frac{p^3}{t-1} - c^2 e^{cpt}}$$

donde p es la precipitación en litros/m² caída durante el año hidrológico, t es la temperatura media del año hidrológico en °C y c el consumo debido a abastecimiento de poblaciones cercanas y riego, en hectómetros cúbicos.

- a. Calcular el gradiente de la cantidad de agua almacenada.
- b. Suponiendo que hubiese algún año en el que el consumo fuese nulo, ¿qué condición tendría que cumplir la temperatura para que la derivada del agua almacenada con respecto a la temperatura fuese igual a la derivada con respecto a la precipitación?



Ejercicio 10.6. La variable aleatoria bidimensional (X,Y) con función de densidad

$$f(x,y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_x\sigma_y}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{(x-\mu_x)^2}{\sigma_x^2} + \frac{(y-\mu_y)^2}{\sigma_y^2}\right)}$$

se conoce como normal bidimensional con X e Y independientes, de parámetros = (μ_x, μ_y) y = (σ_x, σ_y) .

Calcular el gradiente de f e interpretarlo. ¿En qué punto se anula el gradiente? ¿Qué conclusiones sacas? ¿Cuál es la tasa de crecimiento de f cuando $x \to \infty$?

Solución

$$\nabla f(x,y) = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_x\sigma_y}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{(x-\mu_x)^2}{\sigma_x^2} + \frac{(y-\mu_y)^2}{\sigma_y^2}\right)}\left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x^2}, \frac{y-\mu_y}{\sigma_y^2}\right).$$

El gradiente se anula en $(x=\mu_x,y=\mu_y)$ y $\lim_{x\to\infty}f(x,y)=0.$

Ejercicio 10.7. La ecuación diferencial parcial

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0,$$

se conoce como ecuación de Laplace y se aplica a multitud de fenómenos relacionadas con la conducción de calor, el flujo de fluidos o el potencial eléctrico.

a. Comprobar que la función $u(x,y,z)=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ satisface la ecuación de Laplace.

- b. ¿Existe algún punto en el que el crecimiento de la función sea nulo?
- c. Si fijamos z=1, calcular $\frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial u^2}$.

Solución

a. Para comprobar que u(x,y,z) satisface la ecuación de Laplace calculamos las tres derivadas parciales segundas que intervienen en la ecuación. Comenzando con las derivadas parciales con respecto a la variable x, obtenemos:

$$\begin{split} u(x,y,z) &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \left(x^2 + y^2 + z^2\right)^{-1/2} \\ \frac{\partial u}{\partial x} &= -\frac{1}{2} \left(x^2 + y^2 + z^2\right)^{-3/2} 2x = -x \left(x^2 + y^2 + z^2\right)^{-3/2} \end{split}$$

$$\frac{\partial^{2} u}{\partial x^{2}} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-x \left(x^{2} + y^{2} + z^{2} \right)^{-3/2} \right) = -\left(x^{2} + y^{2} + z^{2} \right)^{-3/2} + 3x^{2} \left(x^{2} + y^{2} + z^{2} \right)^{-5/2}$$

e igualmente para las variables y y z, tenemos:

$$\begin{split} \frac{\partial u}{\partial y} &= -y \left(x^2 + y^2 + z^2 \right)^{-3/2} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= - \left(x^2 + y^2 + z^2 \right)^{-3/2} + 3y^2 \left(x^2 + y^2 + z^2 \right)^{-5/2} \\ \frac{\partial u}{\partial z} &= -z \left(x^2 + y^2 + z^2 \right)^{-3/2} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} &= - \left(x^2 + y^2 + z^2 \right)^{-3/2} + 3z^2 \left(x^2 + y^2 + z^2 \right)^{-5/2} \end{split}$$

Por lo tanto:

$$\begin{split} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} &= -3\left(x^2 + y^2 + z^2\right)^{-3/2} + 3\left(x^2 + y^2 + z^2\right)\left(x^2 + y^2 + z^2\right)^{-5/2} = \\ &= -3\left(x^2 + y^2 + z^2\right)^{-3/2} + 3\left(x^2 + y^2 + z^2\right)^{-3/2} = 0 \end{split}$$

a. Una condición necesaria para que el crecimiento de una función de varias variables en un punto sea nulo es que el gradiente en dicho punto se anule, y el gradiente se anula si se anulan sus tres componentes:

$$\vec{\nabla} u = \vec{0} \Leftrightarrow \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}\right) = (0, 0, 0)$$

Por lo tanto, tenemos un sistema no lineal de tres ecuaciones con tres incógnitas:

$$-x(x^{2} + y^{2} + z^{2})^{-3/2} = 0$$
$$-y(x^{2} + y^{2} + z^{2})^{-3/2} = 0$$
$$-z(x^{2} + y^{2} + z^{2})^{-3/2} = 0$$

Y teniendo en cuenta que el término $(x^2+y^2+z^2)$, por tratarse de una suma de cuadrados, únicamente puede ser 0 si x=y=z=0; y a igual conclusión llegamos si suponemos que es distinto de 0, ya que entonces la primera ecuación implica que necesariamente x=0, la segunda implica que y=0, y la tercera implica que z=0. Por lo tanto, concluimos que el único punto en el que el crecimiento puede ser nulo es (x,y,z)=(0,0,0), pero dicho punto no pertenece al dominio de definición de la función (tendríamos un cero como denominador de una fracción), por lo que no hay ningún punto en el que la función presente un crecimiento nulo.

a. Suponiendo z=1, la función resultante presenta únicamente dos variables:

$$u(x, y, 1) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1}} = (x^2 + y^2 + 1)^{-1/2}$$

La derivada propuesta es:

$$\frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial y^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) \right) \right)$$

en donde, como ya sabemos, se puede cambiar el orden de derivación sin que afecte al resultado final, aunque nunca el número total de derivadas con respecto a cada variable.

Operando como ya hicimos en los cálculos previos de las derivadas segundas, obtenemos:

$$\begin{split} \frac{\partial u}{\partial y} &= -y \left(x^2 + y^2 + 1\right)^{-3/2} \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right) &= \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\left(x^2 + y^2 + 1\right)^{-3/2} + 3y^2 \left(x^2 + y^2 + 1\right)^{-5/2} \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) &= \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y^2} = 3x \left(x^2 + y^2 + 1\right)^{-5/2} - 15y^2 x \left(x^2 + y^2 + 1\right)^{-7/2} \end{split}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y^2} \right) = \frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial y^2} =$$

$$= 3 \left(x^2 + y^2 + 1 \right)^{-5/2} - 15 \left(x^2 + y^2 \right) \left(x^2 + y^2 + 1 \right)^{-7/2} + 105 x^2 y \left(x^2 + y^2 + 1 \right)^{-9/2}$$

Ejercicio 10.8. Tenemos dos objetos de masas m_1 y m_2 unidas por una cuerda que pasa a través de una polea como la de la siguiente figura.




Figura 10.1: Polea


Si $m_1 \geq m_2$, la aceleración de m_1 viene dada por la ecuación

$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}g,$$

siendo g la aceleración de la gravedad.

Demostrar que se cumple la ecuación

$$m_1\frac{\partial a}{\partial m_1}+m_2\frac{\partial a}{\partial m_2}=0.$$



Ejercicio 10.9. La relación que modeliza el potencial eléctrico V de un punto del plano en función de su distancia, es $V = \log D$, donde $D = \sqrt{x^2 + y^2}$.

- a. Calcular el gradiente de V.
- b. Hallar la dirección de máxima variación del potencial eléctrico en el punto (x,y) $(\sqrt{3},\sqrt{3}).$
- c. Calcular la matriz Hessiana y el Hessiano de V en el punto anterior.
- d. Si nos movemos a lo largo de la curva y = x + 1, cuál será el mínimo potencial alcanzado?

Solución

a.
$$\nabla V(x,y) = \left(\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{y}{x^2+y^2}\right)$$
.

b.
$$\nabla V(\sqrt{3}, \sqrt{3}) = \sqrt{3}/6(1, 1)$$
.

$$HV(x,y) = \left(\begin{array}{ccc} \frac{y^2 - x^2}{y^4 + 2x^2y^2 + x^4} & \frac{-2xy}{y^4 + 2x^2y^2 + x^4} \\ \frac{-2xy}{y^4 + 2x^2y^2 + x^4} & \frac{x^2 - y^2}{y^4 + 2x^2y^2 + x^4} \end{array} \right), \quad \left(\begin{array}{cc} 0 & -1/6 \\ -1/6 & 0 \end{array} \right), \quad \mathbf{y} \ |H(\sqrt{3}, \sqrt{3})| = -1/36.$$

d. El potencial máximo se alcanza en (x = -1/2, y = 1/2) y vale V(-1/2, 1/2) =

Ejercicio 10.10. La Quimiotaxis es el movimiento de los organismos dirigido por un gradiente de concentración, es decir, en la dirección en la que la concentración aumenta con más rapidez. El moho del cieno Dictyoselium discoideum muestra este comportamiento. En esta caso, las amebas unicelulares de esta especie se mueven según el gradiente de concentración de una sustancia química denominada adenosina monofosfato (AMP cíclico). Si suponemos que la expresión que da la concentración de AMP cíclico en un punto de coordenadas (x, y, z) es:

$$C(x,y,z) = \frac{4}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^4 + 1}}$$

y se sitúa una ameba de moho del cieno en el punto (-1,0,1), ¿en qué dirección se moverá la ameba?

Solución

$$(4/\sqrt{27}, 0, -8/\sqrt{27}).$$

Ejercicio 10.11. Se han diseñado unas cápsulas con forma piramidal con base un rectángulo de lados a=3 cm, b=4 cm, y altura h=6 cm.

- a. ¿Cómo deben cambiar las dimensiones de la cápsula para que el volumen aumente lo más rápidamente posible? ¿Cuál sería la tasa de variación del volumen si cambian las dimensiones de la cápsula en la proporciones anteriores?
- b. Si se empiezan a cambiar las dimensiones de la cápsula de manera que el lado mayor del rectángulo disminuye la mitad de lo que aumenta el lado menor, y la altura aumenta el doble de lo que aumenta el lado menor, ¿cuál sería la tasa de variación del volumen de la cápsula en las condiciones anteriores?

Solución

- a. $\nabla V(3,4,6) = (8,6,4)$ y el volumen aumentará $|\nabla V(3,4,6)| = 10.7703$ cm³/s si cambiamos las dimensiones de la cápsula siguiendo esta dirección.
- b. Derivada direccional de V en (3,4,6) siguiendo la dirección del vector ${\bf u}=(1,-1/2,2)\colon V_{\bf u}'(3,4,6)=5.6737$ cm³/s.

Ejercicio 10.12. Una barra de metal de un metro de largo se calienta de manera irregular y de forma tal que a x metros de su extremo izquierdo y en el instante t minutos, su temperatura en grados centígrados esta dada por $H(x,t) = 100e^{-0.1t} \operatorname{sen}(\pi x t)$ con $0 \le x \le 1$.

- a. Calcular $\frac{\partial H}{\partial x}(0.2,1)$ y $\frac{\partial H}{\partial x}(0.8,1)$. ¿Cuál es la interpretación práctica (en términos de temperatura) de estas derivadas parciales? Explicar por qué cada una tiene el signo que tiene.
- b. Calcular la matriz hessiana de H.

Solución

a. La derivada parcial de H con respecto a x es

$$\frac{\partial H}{\partial x}(x,t) = 100e^{-0.1t}\cos(\pi x t)\pi t$$

y en los puntos que nos piden vale

$$\frac{\partial H}{\partial x}(0.2, 1) = 100e^{-0.1}\cos(0.2\pi)\pi = 229.9736$$

$$\frac{\partial H}{\partial x}(0.8, 1) = 100e^{-0.1}\cos(0.8\pi)\pi = -229.9736$$

La derivada parcial $\frac{\partial H}{\partial x}(x_0,t_0)$ indica la variación instantánea que experimenta la temperatura con respecto a la variación de la distancia al extremo izquierdo en el punto. El signo de la derivada parcial indica si la variación de la temperatura es creciente (aumenta la temperatura) o decreciente (disminuye). Así en el punto (0.2,1) la temperatura aumentará a razón de 229.9736 grados centígrados por cada metro que nos alejemos del extremo izquierdo de la barra de metal, mientras que en el (0.8,1) la temperatura disminuirá a razón de 229.9736 grados centígrados por cada metro que nos alejemos del extremo izquierdo de la barra de metal.

b. Para calcular la matriz Hessiana necesitamos las derivadas parciales de segundo orden:

$$\frac{\partial H}{\partial t}(x,t) = 100 \left(\frac{\partial}{\partial x} e^{-0.1t} \operatorname{sen}(\pi x t) + e^{-0.1t} \frac{\partial}{\partial x} \operatorname{sen}(\pi x t) \right) =$$

$$= 100 \left(-0.1 e^{-0.1t} \operatorname{sen}(\pi x t) + e^{-0.1t} \cos(\pi x t) \pi x \right) =$$

$$= 100 e^{-0.1t} \left(-0.1 \operatorname{sen}(\pi x t) + \pi x \cos(\pi x t) \right),$$

$$\frac{\partial^2 H}{\partial x^2}(x,t) = \frac{\partial}{\partial x} \left(100 e^{-0.1t} \pi t \cos(\pi x t) \right) = 100 e^{-0.1t} \pi t \left(-\operatorname{sen}(\pi x t) \pi t \right) =$$

$$= -100 e^{-0.1t} \pi^2 t^2 \operatorname{sen}(\pi x t),$$

$$\frac{\partial^2 H}{\partial t \partial x}(x,t) = \frac{\partial}{\partial t} \left(100 e^{-0.1t} \pi t \cos(\pi x t) \right) =$$

$$= 100 \left(\frac{\partial}{\partial t} e^{-0.1t} \pi t \cos(\pi x t) + e^{-0.1t} \left(\frac{\partial}{\partial t} (\pi t) \cos(\pi x t) + \pi t \frac{\partial}{\partial t} \cos(\pi x t) \right) \right) =$$

$$= 100 \left(-0.1 e^{-0.1t} \pi t \cos(\pi x t) + e^{-0.1t} \left(\pi \cos(\pi x t) - \pi t \operatorname{sen}(\pi x t) \pi x \right) \right) =$$

$$= 100 e^{-0.1t} \left(-0.1 \pi t \cos(\pi x t) + \pi \cos(\pi x t) - \pi^2 x t \operatorname{sen}(\pi x t) \right) =$$

$$= 100 e^{-0.1t} \left((-0.1 \pi t + \pi) \cos(\pi x t) - \pi^2 x t \operatorname{sen}(\pi x t) \right),$$

$$\begin{split} \frac{\partial^2 H}{\partial x \partial t}(x,t) &= \frac{\partial^2 H}{\partial t \partial x}(x,t) \quad (\text{igualdad de las derivadas cruzadas por el teorema de Schwartz}) \\ \frac{\partial^2 H}{\partial t^2}(x,t) &= \frac{\partial}{\partial t} \left(100e^{-0.1t} \left(-0.1 \sin(\pi x t) + \pi x \cos(\pi x t)\right)\right) = \\ &= 100 \left(\frac{\partial}{\partial t} e^{-0.1t} \left(-0.1 \sin(\pi x t) + \pi x \cos(\pi x t)\right) + \\ &+ e^{0.1t} \left(\frac{\partial}{\partial t} \left(-0.1 \sin(\pi x t)\right) + \frac{\partial}{\partial t} \left(\pi x \cos(\pi x t)\right)\right)\right) = \\ &= 100 \left(-0.1e^{-0.1t} \left(-0.1 \sin(\pi x t) + \pi x \cos(\pi x t)\right) + \\ &+ e^{0.1t} \left(-0.1 \cos(\pi x t) \pi x - \pi x \cos(\pi x t) \pi x\right)\right) = \\ &= 100e^{-0.1t} \left(0.01 \sin(\pi x t) - 0.1\pi x \cos(\pi x t) - 0.1\pi x \cos(\pi x t) - \pi^2 x^2 \cos(\pi x t)\right) = \\ &= 100e^{-0.1t} \left(0.01 \sin(\pi x t) - \left(0.2 + \pi^2 x^2\right) \cos(\pi x t)\right). \end{split}$$

Así pues, la matriz Hessiana es

$$\begin{pmatrix} -100e^{-0.1t}\pi^2t^2\sin(\pi xt) & 100e^{-0.1t}\left((-0.1\pi t + \pi)\cos(\pi xt) - \pi^2xt\sin(\pi xt)\right) \\ 100e^{-0.1t}\left((-0.1\pi t + \pi)\cos(\pi xt) - \pi^2xt\sin(\pi xt)\right) & 100e^{-0.1t}\left(0.01\sin(\pi xt) - (0.2 + \pi^2x^2)\cos(\pi xt)\right) \end{pmatrix}$$

Ejercicio 10.13. ¿En qué direcciones se anulará la derivada direccional de la función

$$f(x,y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

en el punto P = (1, 1)?



En la dirección $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$.

Ejercicio 10.14. ¿Existe alguna dirección en la que la derivada direccional en el punto P = (1, 2) de la función $f(x, y) = x^2 - 3xy + 4y^2$ valga 14?

Solución

No.

Ejercicio 10.15. La derivada direccional de una función f en un punto P es máxima en la dirección del vector (1,1,-1) y su valor es $2\sqrt{3}$. ¿Cuánto vale la derivada direccional de f en P en la dirección del vector (1, 1, 0)?

Solución

 $2\sqrt{2}$.

Ejercicio 10.16. Dado el campo escalar

$$f(x, y, z) = x^2 - y^2 + xyz^3 - zx,$$

- a. Calcular la derivada direccional de f en (1,2,3) a lo largo del vector unitario $\mathbf{u}=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0).$
- b. ¿En qué dirección es máxima la derivada direccional de f en el punto anterior? Obtener el valor de dicha derivada direccional.



- a. $15\sqrt{2}$.
- b. La derivada direccional es máxima en la dirección del gradiente (53,23,53) y vale $\sqrt{6147}$.

Ejercicio 10.17. En el ajuste de regresión de una recta y = a + bx, se suele utilizar la técnica de mínimos cuadrados que consisten en buscar los valores de a y b que hacen mínima la función

$$f(a,b) = \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i)^2,$$

donde el sumatorio abarca a todos los pares de la muestra (x_i,y_i) para $i=1,\ldots,n,$ siendo n el tamaño de la muestra.

Demostrar que esta función alcanza el mínimo en el punto

$$a = \bar{y} - b\bar{x} \quad \text{ y } b = \frac{s_{xy}}{s_x^2}.$$

•

Solución

Ejercicio 10.18. Obtener la ecuación del plano tangente y de la recta normal a la superficie de ecuación xyz = 8 en el punto (4, -2, -1).

Solución

Recta normal l:(4+2t,-2-4t,-1-8t).Plano tangente $\pi:2x-4y-8z+24=0.$

Ejercicio 10.19.

Solución