EXAMEN DE CÁLCULO

 1° Farmacia y Biotecnología Modelo A 17 de enero de 2022

Nombre: DNI: Grupo:

Duración: 1 hora.

(3,5 pts.) 1. El ozono (O_3) de la atmósfera se trasforma en oxígeno (O_2) mediante la siguiente reacción química:

$$2O_3 \rightarrow 3O_2$$

Se observó experimentalmente que la velocidad con la que varía la cantidad de oxígeno es inversamente proporcional a la cantidad de oxígeno existente. Si en un determinado lugar hay inicialmente 10 g de oxígeno, y tras una hora esta cantidad de oxígeno se duplica,

- a) ¿Qué cantidad de oxígeno habrá tras 5 horas?
- b) ¿Cuánto tiempo ha de trascurrir para que haya 1 kg de oxígeno?
- (3,5 pts.) 2. Para analizar la tolerancia de hipoxemia de los mamíferos, en un laboratorio unas ratas son sometidas a condiciones extremas con niveles variables de oxígeno. Las ratas se encuentras en una habitación cuyo nivel de oxígeno (en %) en una posición cualquiera (x,y) es

$$O(x,y) = \frac{1}{10}x^2y^2e^{x-y}$$

Para que las ratas sobrevivan, deben al canzar posiciones en las que el nivel de oxígeno sea superior al $18\,\%.$

- a) La rata A se encuentra en la posición (3,2). Si no se mueve, justifica razonadamente si la rata sobrevivirá
- b) ¿Qué dirección debe tomar la rata A para que el nivel de oxígeno aumente lo más rápidamente posible? En dicha dirección, ¿con qué ritmo aumenta el nivel de oxígeno?
- c) La rata B se encuentra en el punto (2,2). Si empieza a moverse de manera que y disminuye el doble de lo que aumenta x, ¿qué variación instantánea experimentará el nivel de oxígeno?
- (3 pts.) 3. Dos insectos empiezan a moverse desde un mismo punto siguiendo trayectorias perpendiculares. Si el primer insecto se mueve a una velocidad de 3 cm/s y el segundo a un velocidad de 4 cm/s, ¿a qué velocidad cambia la distancia entre ambos a los 2 segundos de iniciar su movimiento? ¿Y a los 3 segundos?

Nota: La distancia entre ambos es la longitud de la hipotenusa del triangulo rectángulo que tiene por catetos las trayectorias recorridas por los insectos.