

EXAMEN DE ESTADÍSTICA

2º Fisioterapia

Modelo A

4 de marzo de 2020

Nombre:

DNI:

Grupo:

Duración: 1 hora.

- (5 pts.) 1. En un estudio sobre la reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA) se evaluó el tiempo de recuperación postoperatorio según los pacientes hayan sido sometidos a una sutura meniscal o no. Los resultados aparecen en la siguiente tabla:

```
<< echo = FALSE, results = tex >>= print(xtable(data, align = c("c", "c", "r", "r"), auto = T), tabular.environment = "table")
```

Se pide:

- Dibujar el polígono de frecuencias relativas acumuladas de la muestra de pacientes sin sutura meniscal.
- ¿Hay datos atípicos en el número de meses postoperatorios para pacientes sin sutura meniscal?
- ¿En cuál de los dos grupos es más representativa la media del número de meses postoperatorios?
- ¿Se puede asumir que la muestra de pacientes con sutura meniscal proviene de una población normal? Justifique la respuesta.
- ¿Qué valor es relativamente mayor, 5 meses para un paciente sin sutura meniscal o 6 meses para un paciente con sutura meniscal?

Usar las siguientes sumas para los cálculos:

Sin sutura meniscal: $\sum x_i n_i = 334$ meses, $\sum x_i^2 n_i = 12842$ meses², $\sum (x_i - \bar{x})^3 n_i = -765,98$ meses³ y $\sum (x_i - \bar{x})^4 n_i = 41254,33$ meses⁴.Con sutura meniscal: $\sum y_i n_i = 159073$ meses, $\sum y_i^2 n_i = 4966773651$ meses², $\sum (y_i - \bar{y})^3 n_i = 12651902944243,1$ meses³ y $\sum (y_i - \bar{y})^4 n_i = 841023097756133888$ meses⁴.

- (5 pts.) 2. La siguiente tabla muestra la evolución del número de contagios por coronavirus desde que se detectó el virus:

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Días | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 |
| Contagios | 282 | 846 | 2798 | 7818 | 14557 | 20630 | 31481 | 37558 | 43103 |

- Dibujar el diagrama de dispersión del número de contagios en función del número de días transcurridos.
- ¿Qué modelo de regresión es mejor para predecir el número de contagios en función del número de días transcurridos, el lineal o el exponencial?
- ¿Cuántos contagios se esperan transcurridos 100 días según el mejor de los anteriores modelos? ¿Es fiable la predicción?
- Si el número de muertes está relacionado linealmente con el número de contagios, con un coeficiente de determinación lineal 0,99, ¿cuánto aumentará o disminuirá el número de contagios por cada muerte más, si se sabe que por cada contagio más hay 0,022 muertes más.

Usar las siguientes sumas para los cálculos:

 $\sum x_i = 334$ días, $\sum \log(x_i) = 32,3517$ log(días), $\sum y_j = 159073$ contagios, $\sum \log(y_j) = 80,3657$ log(contagios),

$$\begin{aligned} \sum x_i^2 &= 12842 \text{ días}^2, \sum \log(x_i)^2 = 116,6525 \log(\text{días})^2, \sum y_j^2 = 4966773651 \text{ contagios}^2, \sum \log(y_j)^2 = \\ &743,3009 \log(\text{contagios})^2, \\ \sum x_i y_j &= 6842750 \text{ días} \cdot \text{contagios}, \sum x_i \log(y_j) = 3086,808 \text{ días} \cdot \log(\text{contagios}), \sum \log(x_i) y_j = 597633,103 \\ &\log(\text{días}) \text{ contagios}, \sum \log(x_i) \log(y_j) = 291,8911 \log(\text{días}) \log(\text{contagios}). \end{aligned}$$