EXAMEN DE ESTADÍSTICA

$2^{\underline{o}}$ Fisioterapia	Modelo A	26 de marzo de 2019
$2^{\underline{o}}$ Fisioterapia	$f Modelo \ A$	26 de marzo de 201

Nombre: DNI: Grupo:

Duración: 1 hora y 15 minutos.

(5 pts.) 1. Se ha medido el tiempo de espera para que un medicamento A haga efecto en un grupo de 150 pacientes, obteniéndose los siguientes resultados:

Tiempo	Pacientes
(0, 5]	5
(5, 10]	15
(10, 15]	32
(15, 20]	36
(20, 30]	42
(30, 60]	20

Se pide:

- a) ¿Existen datos atípicos en la muestra? Justificar la respuesta.
- b) ¿Cuál fue el tiempo de espera mínimo para el 20 % de los pacientes que más esperaron?
- c) ¿Cuál fue el tiempo medio de espera? ¿Es muy representativa esta medida?
- d) ¿Podemos suponer que la muestra proviene de una población normal?
- e) Si tomamos otro grupo de pacientes tratados con el medicamento A cuya media fue 18 min con una desviación típica de 15 min, ¿en cuál de los dos grupos sería más alto un tiempo de espera de 25 min?

Usar las siguientes sumas para los cálculos: $\sum x_i = 3105$ min, $\sum x_i^2 = 83650$ min², $\sum (x_i - \bar{x})^3 = 206851,65$ min³ y $\sum (x_i - \bar{x})^4 = 8140374,96$ min⁴.

- (1,5 pts.) 2. Al analizar la regresón lineal entre dos variables X e Y se obtuvo $\bar{x}=7$ y $r^2=0,9$. Si la ecuación de la recta de regresión de Y sobre X es y-x=1, calcular
 - a) La media de Y.
 - b) La ecuación de la recta de regresión de X sobre Y.
 - c) ¿Qué valor predice este modelo cuando x=6? ¿Y cuando y=10?
- (3,5 pts.) 3. En cierto club de tenis se ha registrado la edad (X) y la estatura (Y) de las diez jugadoras que componen el primer equipo juvenil femenino.

- a) ¿Qué modelo de regresión se ajusta mejor a estos datos, el logarítmico o el lineal?
- b) ¿Qué estatura predice el mejor de los dos modelos anteriores para una edad de 12.5 años?

Usar las siguientes sumas para los cálculos:

$$\sum x_i = 135 \text{ años}, \sum \log(x_i) = 25,7908 \log(\text{años}), \sum y_j = 1555 \text{ cm}, \sum \log(y_j) = 50,4358 \log(\text{cm}),$$

$$\sum x_i^2 = 1905 \text{ años}^2, \sum \log(x_i)^2 = 67,0001 \log(\text{años})^2, \sum y_j^2 = 243191 \text{ cm}^2, \sum \log(y_j)^2 = 254,4404 \log(\text{cm})^2,$$

 $\sum x_i y_j = 21303 \text{ años cm}, \sum x_i \log(y_j) = 682,9473 \text{ años log(cm)}, \sum \log(x_i) y_j = 4035,0697 \log(\text{años)cm}, \\ \sum \log(x_i) \log(y_j) = 130,2422 \log(\text{años}) \log(\text{cm}).$