

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Rango

El número de direcciones independientes



Qué es el rango

El rango $rk(A)$ es el número de columnas linealmente independientes de A -y resulta ser también el de filas independientes.

$$rk(A) = rk(A^T)$$

Se lee contando pivotes tras la eliminación gaussiana:

1	2	1
0	1	3
0	0	0

$$rk = 2$$



Obs. Dos pivotes (agua) y una fila nula dan rango 2.

El rango es una dimensión

Las columnas de A generan un subespacio –la imagen de A – y su dimensión es exactamente el rango:

$$\dim(\operatorname{im} A) = \operatorname{rk}(A)$$

Obs. Lo mismo vale por filas. Por eso el rango mide cuánta información no redundante carga la matriz.



Qué te dice el rango

Invertible: $A_{n \times n}$ es regular $\iff \text{rk}(A) = n$.

Resoluble: $Ax = b$ tiene solución $\iff \text{rk}(A) = \text{rk}([A \mid b])$.

Núcleo: las soluciones de $Ax = 0$ forman un subespacio de dimensión $n - \text{rk}(A)$.

Rango completo

El rango nunca pasa de $\min(m, n)$. Cuando lo alcanza, la matriz tiene rango completo:

$$\text{rk}(A) = \min(m, n)$$

Obs. Si se queda corto, es deficiente: hay columnas (o filas) que son combinación de las demás



-redundancia pura.



¿Tus datos tienen rango completo o les sobran columnas?

Forma parte de la serie

Matemáticas para Machine Learning.

Guarda esto y sígueme para las siguientes en
asanchezyali.com

