## **Численное решение уравнений с частными производными** методом конечных разностей

Оператор конечных разностей Основная идея (суть) метода сеток Замена дифференциального уравнения разностным Устойчивость решения Методы решения систем линейных алгебраических уравнений Неустранимая погрешность при решении СЛАУ Число обусловленности матрицы

1. Применяя метод сеток, найти решение уравнения Лапласа

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0,$$

для данной области G и при заданном граничном условии. Выбрать шаг сетки h=1.

2. Вычислить число обусловленности матрицы A (матрицы коэффициентов СЛАУ), используя две нормы

$$\|A\|_{c} = \max_{i=1,n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$$

$$\|A\|_{1} = \max_{j=1,n} \sum_{i=1}^{n} |a_{ij}|$$

Сделать вывод.

Obnacmb G
 apahushoe ycrobue

 1. 
$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} \le 1$$
,  $U(x,y)|_{\Gamma} = |x| + |y|$ ;

 2.  $x^2 + y^2 \le 16$ ,  $U(x,y)|_{\Gamma} = |x| + 2|y|$ ;

 3.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} \le 1$ ,  $U(x,y)|_{\Gamma} = |x||y|$ ;

 4.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} \le 1$ ,  $U(x,y)|_{\Gamma} = 2|x| + |y|$ ;

 5.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} \le 1$ ,  $U(x,y)|_{\Gamma} = 0.5|x| + |y|$ ;

 6.  $x^2 + y^2 \le 16$ ,  $U(x,y)|_{\Gamma} = 2|x| + 0.5|y|$ ;

 7.  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} \le 1$ ,  $U(x,y)|_{\Gamma} = 0.5|x| + 0.5|y|$ ;

 9.  $x^2 + y^2 \le 16$ ,  $U(x,y)|_{\Gamma} = 0.5|x| + 2|y|$ ;

 10.  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} \le 1$ ,  $U(x,y)|_{\Gamma} = 0.5|x| + |y|$ ;

 11.  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} \le 1$ ,  $U(x,y)|_{\Gamma} = 0.5|x| + 0.5|y|$ ;

 12.  $x^2 + y^2 \le 16$ ,  $U(x,y)|_{\Gamma} = 0.5|x| + 0.5|y|$ ;

13. 
$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} \le 1$$
,  $U(x, y)|_{\Gamma} = 0.5|x| + |y|$ ;

14. 
$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} \le 1$$
,  $U(x, y)|_{\Gamma} = |x| + 0.5|y|$ ;

15. 
$$x^2 + y^2 \le 25$$
,  $U(x, y)|_{\Gamma} = 0.5|x| + 0.5|y|$ .

16. 
$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} \le 1$$
,  $U(x, y)|_{\Gamma} = |x| + 2|y|$ ;

17. 
$$x^2 + y^2 \le 16$$
,  $U(x, y)|_{\Gamma} = |x| + |y|$ ;

18. 
$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} \le 1$$
,  $U(x, y)|_{\Gamma} = 0.5|x| + 0.5|y|$ ;

19. 
$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} \le 1$$
,  $U(x, y)|_{\Gamma} = |x| + 0.5|y|$ ;

20. 
$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} \le 1$$
,  $U(x, y)|_{\Gamma} = 0.5|x| + |y|$ ;

21. 
$$x^2 + y^2 \le 16$$
,  $U(x, y)|_{\Gamma} = |x||y|$ ;

22. 
$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} \le 1$$
,  $U(x, y)|_{\Gamma} = 0.5|x| + |y|$ ;

23. 
$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} \le 1$$
,  $U(x, y)|_{\Gamma} = 0.5|x| + |y|$ ;

24. 
$$x^2 + y^2 \le 25$$
,  $U(x, y)|_{\Gamma} = 0.5|x| + 2|y|$ ;

25. 
$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} \le 1$$
,  $U(x, y)|_{\Gamma} = 2|x| + 0.5|y|$ ;

26. 
$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} \le 1$$
,  $U(x, y)|_{\Gamma} = 0.5|x||y|$ ;

27. 
$$x^2 + y^2 \le 16$$
,  $U(x, y)|_{\Gamma} = 0.5|x| + 0.5|y|$ ;

28. 
$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} \le 1$$
,  $U(x, y)|_{\Gamma} = |x| + |y|$ ;

29. 
$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} \le 1$$
,  $U(x, y)|_{\Gamma} = 2|x| + |y|$ ;

30. 
$$x^2 + y^2 \le 16$$
,  $U(x, y)|_{\Gamma} = |x||y|$ .