

ЛИНЕЙНЫЕ НЕОДНОРОДНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

1. Интегрирование ЛНДУ с постоянными коэффициентами и специальной правой частью

Пример 1. Найти общее решение ЛНДУ $y'' - 6y' = 36x$.

Решение. Общее решение ЛНДУ равно $y_{он} = y_{оо} + y_{чн}$.

Найдем $y_{оо}$ - общее решение ЛОДУ

$$y'' - 6y' = 0,$$

соответствующего данному ЛНДУ. Составляем характеристическое уравнение ЛОДУ:

$$\lambda^2 - 6\lambda = 0$$

и находим его корни: $\lambda_1 = 6, \lambda_2 = 0$. Общее решение ЛОДУ имеет вид

$$y_{оо} = C_1 + C_2 e^{6x}.$$

Найдем $y_{чн}$. Поскольку многочлен в правой части ЛНДУ имеет степень $n = 1$ и контрольная постоянная $\alpha + \beta i = 0 + 0i = 0$ совпадает с одним корнем характеристического уравнения, частное решение ЛНДУ ищем в виде многочлена 1-ой степени общего вида, умноженного на x :

$$y_{чн} = x(Ax + B) = Ax^2 + Bx.$$

Тогда

$$y' = 2Ax + B, y'' = 2A.$$

Подставляя в исходное ЛНДУ, имеем:

$$2A - 6(2Ax + B) = 36x \Rightarrow -12Ax + (2A - 6B) = 36x.$$

Приравниваем коэффициенты при x и свободные члены, получим

$$\begin{cases} -12A = 36 \\ 2A - 6B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -3 \\ B = -1 \end{cases} \Rightarrow y_{чн} = -3x^2 - x.$$

Тогда общее решение ЛНДУ имеет вид $y_{он} = C_1 + C_2 e^{6x} - 3x^2 - x$.

Пример 2. Найти общее решение ЛНДУ $y'' + 5y' + 6y = 18x^2 - 1$.

Решение. Общее решение ЛНДУ равно $y_{он} = y_{оо} + y_{чн}$.

Найдем $y_{оо}$ - общее решение ЛОДУ

$$y'' + 5y' + 6 = 0,$$

соответствующего данному ЛНДУ. Составляем характеристическое уравнение ЛОДУ:

$$\lambda^2 + 5\lambda + 6 = 0$$

и находим его корни: $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -3$. Общее решение ЛОДУ имеет вид $y_{oo} = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-3x}$.

Найдем $y_{чн}$. Поскольку многочлен в правой части ЛНДУ имеет степень 2 и контрольная постоянная $\alpha + \beta i = 0 + 0i = 0$ не совпадает ни с одним корнем характеристического уравнения, частное решение ЛНДУ ищем в виде многочлена 2-ой степени общего вида (умножать не надо):

$$y_{чн} = y = Ax^2 + Bx + C.$$

Подставляя в исходное ЛДУ, имеем:

$$y'' + 5y' + 6y = 2A + 5(2Ax + B) + 6(Ax^2 + Bx + C) = 18x^2 - 1.$$

Приравнявая коэффициенты при различных степенях x , для нахождения коэффициентов A, B и C , получаем систему

$$\begin{cases} 6A = 18, \\ 10A + 6B = 0, \\ 2A + 5B + 6C = -1, \end{cases}$$

решая которую, получаем $A = 3, B = -5, C = 3$ и $y_H = 3x^2 - 5x + 3$.

Общее решение ЛНДУ имеет вид $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-3x} + 3x^2 - 5x + 3$.

Пример 3. Найти общее решение ЛНДУ $y'' - 6y' + 9y = 4e^{3x}$.

Решение. Общее решение ЛНДУ равно $y_{он} = y_{oo} + y_{чн}$.

Найдем y_{oo} - общее решение ЛОДУ

$$y'' - 6y' + 9 = 0,$$

соответствующего данному ЛНДУ. Составляем характеристическое уравнение ЛОДУ:

$$\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0$$

и находим его корни: $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda = 3$. Общее решение ЛОДУ имеет вид $y_{oo} = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x}$.

Найдем $y_{чн}$. Поскольку многочлен в правой части ЛНДУ имеет степень $n = 0$ и контрольная постоянная $\alpha + \beta i = 3 + 0i = 3$ совпадает ни с двумя корнями характеристического уравнения, частное решение ЛНДУ ищем в виде

$$y_{чн} = Ax^2 e^{3x}.$$

Тогда $y' = 2Axe^{3x} + 3Ax^2e^{3x}$, $y'' = 2Ae^{3x} + 12Axe^{3x} + 9Ax^2e^{3x}$. Подставляя в исходное ЛНДУ, имеем:

$$2Ae^{3x} + 12Axe^{3x} + 9Ax^2e^{3x} - 6(2Axe^{3x} + 3Ax^2e^{3x}) + 9Ax^2e^{3x} = 4e^{3x} \Rightarrow 2A = 4 \Rightarrow A = 2$$

. Следовательно $y_{\text{хн}} = 2x^2e^{3x}$. Тогда общее решение ЛНДУ имеет вид $y_{\text{он}} = C_1e^{3x} + C_2xe^{3x} + 2x^2e^{3x}$.

Пример 4. Найти общее решение ЛНДУ $y'' + y' - 2y = -20\sin(2x)$.

Решение. Общее решение ЛНДУ равно $y_{\text{он}} = y_{\text{оо}} + y_{\text{чн}}$.

Найдем $y_{\text{оо}}$ - общее решение ЛОДУ

$$y'' + y' - 2y = 0,$$

соответствующего данному ЛНДУ. Составляем характеристическое уравнение ЛОДУ:

$$\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$$

и находим его корни: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2$. Общее решение ЛОДУ имеет вид $y_{\text{оо}} = C_1e^x + C_2e^{-2x}$.

Найдем $y_{\text{чн}}$. Поскольку в правой части ЛНДУ контрольная постоянная $\alpha + \beta i = 0 + 2i = 2i$ не совпадает ни с одним корнем характеристического уравнения, частное решение неоднородного ЛДУ ищем в виде

$$y = A\cos(2x) + B\sin(2x).$$

Подставляя в исходное ЛНДУ, имеем:

$$y'' + y' - 2y = -4A\cos(2x) - 4B\sin(2x) - 2A\sin(2x) + 2B\cos(2x) - 2(A\cos(2x) + B\sin(2x)) \equiv -20\sin(2x).$$

Приравнявая коэффициенты при $\sin 2x$ и $\cos 2x$, для нахождения коэффициентов A и B , получаем систему

$$\begin{cases} -4A + 2B - 2A = 0, \\ -4B - 2A - 2B = -20, \end{cases}$$

решая которую, получаем $A = 1, B = 3$ и $y_{\text{н}} = \cos(2x) + 3\sin(2x)$.

Общее решение неоднородного ЛДУ имеет вид $y = C_1e^x + C_2e^{-2x} + \cos(2x) + 3\sin(2x)$.

Пример 5. Найти общее решение ЛНДУ $y'' + 4y = 2\cos 3x$.

Решение. Общее решение ЛНДУ равно $y_{\text{он}} = y_{\text{оо}} + y_{\text{чн}}$.

Найдем $y_{\text{оо}}$ - общее решение ЛОДУ

$$y'' + 4y = 0,$$

соответствующего данному ЛНДУ. Составляем характеристическое уравнение ЛОДУ:

$$\lambda^2 + 4 = 0$$

и находим его корни: $\lambda_1 = 2i, \lambda_2 = -2i$. Общее решение ЛОДУ имеет вид $y_{oo} = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$.

Найдем $y_{чн}$. Поскольку в правой части ЛНДУ контрольная постоянная $\alpha + \beta i = 0 + 3i = 3i$ не совпадает с корнями характеристического уравнения, частное решение ЛНДУ ищем в виде

$$y_{чн} = A \cos 3x + B \sin 3x.$$

Тогда $y' = -3A \sin 3x + 3B \cos 3x$, $y'' = -9A \cos 3x - 9B \sin 3x$. Подставляя в исходное ЛНДУ, имеем:

$$-9A \cos 3x - 9B \sin 3x + 4A \cos 3x + 4B \sin 3x = 2 \cos 3x$$

$$-5A \cos 3x - 5B \sin 3x = 2 \cos 3x$$

Приравнявая коэффициенты при $\cos 3x$ и $\sin 3x$, получим

$$\begin{cases} -5A = 2 \\ -5B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -0,4 \\ B = 0 \end{cases} \Rightarrow y_{чн} = -0,4 \cos 3x.$$

Тогда общее решение ЛНДУ имеет вид $y_{он} = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x - 0,4 \cos 3x$.

Пример 6. Найти частное решение уравнения с начальными условиями

$$\begin{cases} y'' - 2y' + y = (x-1)e^x, \\ y(0) = 1, \\ y'(0) = 3. \end{cases}$$

Решение. Общее решение ЛНДУ равно $y_{он} = y_{oo} + y_{чн}$.

Найдем y_{oo} - общее решение ЛОДУ

$$y'' - 2y' + y = 0,$$

соответствующего данному ЛНДУ. Составляем характеристическое уравнение ЛОДУ:

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$$

и находим его корни: $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$. Общее решение ЛОДУ имеет вид $y(x) = C_1 e^x + C_2 x e^x$.

Найдем $y_{чн}$. Поскольку многочлен, стоящий при e^x в правой части ЛНДУ, имеет степень $n = 1$ и контрольная постоянная

$\alpha + \beta i = 1 + 0 \cdot i = 1$ совпадает с двумя корнями характеристического уравнения, частное решение ЛНДУ ищем в виде многочлена 1-ой степени общего вида, умноженного на e^x и на x^2 :

$$y_{\text{чн}} = x^2(Ax + B)e^x = (Ax^3 + Bx^2)e^x.$$

Тогда его производные

$$y' = (3Ax^2 + 2Bx)e^x + (Ax^3 + Bx^2)e^x = (Ax^3 + (3A + B)x^2 + 2Bx)e^x,$$

$$\begin{aligned} y'' &= (3Ax^2 + 2(3A + B)x + 2B)e^x + (Ax^3 + (3A + B)x^2 + 2Bx)e^x = \\ &= (Ax^3 + (6A + B)x^2 + (6A + 4B)x + 2B)e^x. \end{aligned}$$

Подставляя в исходное уравнение, получаем:

$$\begin{aligned} &(Ax^3 + (6A + B)x^2 + (6A + 4B)x + 2B)e^x - \\ &- 2(Ax^3 + (3A + B)x^2 + 2Bx)e^x + (Ax^3 + Bx^2)e^x = (x - 1)e^x \end{aligned}$$

Вынесем за скобку в левой части равенства множитель $e^x \neq 0$ и сократим на него обе части равенства. Коэффициенты при степенях x будут:

$$x^3(A - 2A + A) + x^2(6A + B - 2(3A + B) + B) + x(6A + 4B - 4B) + 2B = x - 1$$

или

$$6Ax + 2B = x - 1.$$

Совершенно закономерно, что при старших степенях, в данном случае при x^3 и x^2 , коэффициенты обращаются в нуль.

Сравнивая коэффициенты при одинаковых степенях x , получим систему уравнений

$$\begin{cases} 6A = 1, \\ 2B = -1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{6}, \\ B = -\frac{1}{2}. \end{cases}$$

Следовательно, частное решение будет иметь вид

$$y_{\text{чн}} = \left(\frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} \right) e^x, \text{ а общее решение неоднородного уравнения –}$$

$$y_{\text{он}} = C_1 e^x + C_2 x e^x + \left(\frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} \right) e^x.$$

Для определения постоянных нужно найти производную общего решения:

$$y' = C_1 e^x + C_2 e^x + C_2 x e^x + \left(\frac{x^2}{2} - x \right) e^x + \left(\frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} \right) e^x.$$

Тогда, подставляя значение $x=0$ и используя начальные условия, получим систему уравнений

$$\begin{cases} y(0) = 1 = C_1, \\ y'(0) = 3 = C_1 + C_2. \end{cases}$$

Откуда $C_1 = 1$, $C_2 = 2$ и частное решение неоднородного дифференциального уравнения, удовлетворяющее начальным условиям, будет иметь вид:

$$y = e^x + 2x e^x + \left(\frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} \right) e^x.$$

2. Вид частного решения ЛНДУ с постоянными коэффициентами и специальной правой частью

Пример 7. Указать общий вид (с неопределенными коэффициентами) частного решения ЛНДУ $y'' + y = f(x)$, если:

а) $f(x) = x^3$, б) $f(x) = \frac{x}{e^{2x}}$, в) $f(x) = (x+1)\cos x + x^2 \sin x$.

Решение. Составляем характеристическое уравнение $\lambda^2 + 1 = 0$ соответствующего ЛОДУ и находим его корни: $\lambda_1 = i, \lambda_2 = -i$. Тогда:

а) поскольку контрольная постоянная $\alpha + \beta i = 0 + 0i = 0$ не совпадает ни с одним корнем характеристического уравнения, частное решение ЛНДУ ищется в виде $y = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$;

б) поскольку контрольная постоянная $\alpha + \beta i = -2 + 0i = -2$ не совпадает ни с одним корнем характеристического уравнения, частное решение ЛНДУ ищется в виде $y = e^{-2x}(Ax + B)$;

в) поскольку $\nu = \max\{m; n\} = \max\{1; 2\} = 2$ и контрольная постоянная $\alpha + \beta i = 0 + 1 \cdot i = i$ совпадает с одним корнем характеристического уравнения, частное решение неоднородного ЛДУ ищется в виде $y = x[(A_1 x^2 + A_2 x + A_3)\cos x + (B_1 x^2 + B_2 x + B_3)\sin x]$.

Пример 8. Определить общий вид частных решений неоднородного дифференциального уравнения $y'' + 4y' + 3y = f(x)$ при различных правых частях:

- а) $e^{3x}(x^3 - 1)$; б) $e^{-3x} \sin 2x$; в) $xe^{-3x} - e^{3x}(x^2 + x)$;
 г) $x^2 e^{-3x} + xe^{-x}$; д) $2e^{-3x} + \cos 3x$.

Решение. Корни характеристического уравнения $\lambda_1 = -3$ и $\lambda_2 = -1$.
 Общее решение однородного уравнения $y(x) = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{-x}$.

а) Так как многочлен, стоящий при e^{3x} в правой части ЛНДУ, имеет степень 3 и контрольная постоянная $\alpha + \beta i = 3 + 0 \cdot i = 3$ не равняется ни одному из корней характеристического уравнения, то частное решение ЛНДУ ищется в виде многочлена 3-ой степени общего вида, умноженного на e^{3x} :

$$y^* = e^{3x}(A_0 + A_1 x + A_2 x^2 + A_3 x^3).$$

б) Комплексное число, характеризующее правую часть $\alpha + \beta i = -3 + 2i$ не совпадает с корнями характеристического уравнения, поэтому частное решение будет:

$$y^* = e^{-3x}(A_0 \cos 2x + B_0 \sin 2x).$$

в) Правая часть уравнения состоит из двух слагаемых, соответственно частное решение ЛНДУ

$$y^* = y_1^* + y_2^*,$$

где y_1^* — частное решение, которое соответствует первому слагаемому, а y_2^* — второму слагаемому правой части. Для первого слагаемого $\alpha + \beta i = -3 + 0 \cdot i = -3 = \lambda_1$, поэтому в частном решении следует домножить на x :

$$y_1^* = x(A_0 + A_1 x)e^{-3x}.$$

Для второго слагаемого контрольная постоянная $\alpha + \beta i = 3 + 0 \cdot i = 3$ не равная ни одному из корней характеристического уравнения, поэтому решение будет:

$$y_2^* = (B_0 + B_1 x + B_2 x^2)e^{3x}.$$

Следовательно, $y^* = y_1^* + y_2^* = x(A_0 + A_1 x)e^{-3x} + (B_0 + B_1 x + B_2 x^2)e^{3x}$.

г) Решение имеет вид:

$$y^* = y_1^* + y_2^*,$$

где для первого слагаемого y_1^* величина $\alpha + \beta i = -3 + 0 \cdot i = -3 = \lambda_1$ и частное решение будет:

$$y_1^* = x(A_0 + A_1x + A_2x^2)e^{-3x},$$

для второго слагаемого y_2^* величина $\alpha + \beta i = -1 + 0 \cdot i = -1 = \lambda_2$ и частное решение:

$$y_2^* = x(B_0 + B_1x)e^{-x}.$$

$$\text{Тогда } y^* = y_1^* + y_2^* = x(A_0 + A_1x + A_2x^2)e^{-3x} + x(B_0 + B_1x)e^{-x}.$$

д) Снова $y^* = y_1^* + y_2^*$. Для y_1^* число $\alpha + \beta i = -1 + 0 \cdot i = -1 = \lambda_2$. Тогда $y_1^* = xA_0e^{-x}$.

Для y_2^* комплексное число, характеризующее правую часть, $\alpha + \beta i = 0 + 3 \cdot i = 3i$ не совпадает с корнями характеристического уравнения. Значит, $y_2^* = B_0 \cos 3x + D_0 \sin 3x$.

$$\text{Следовательно, } y^* = y_1^* + y_2^* = xA_0e^{-x} + B_0 \cos 3x + D_0 \sin 3x.$$

Пример 9. Найти общий вид частных решений ЛНДУ $y''' + 4y' = f(x)$ при различных правых частях:

$$\text{а) } 3x + 5; \quad \text{б) } x \cos 2x; \quad \text{в) } x^2 \sin x.$$

Решение. Характеристическое уравнение данного ЛНДУ 3-го порядка имеет вид

$$\lambda^3 + 4\lambda = 0,$$

его корни $\lambda_1 = 0$, $\lambda_{2,3} = \pm 2i$. Общее решение будет:

$$y(x) = C_1 + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x.$$

а) $f(x) = 3x + 5$. Так как величина $\alpha + \beta i = 0 + 0 \cdot i = 0 = \lambda_1$ совпадает с одним из корней характеристического уравнения, то частное решение будет:

$$y^* = (A_0 + A_1x)x.$$

б) $f(x) = x \cos 2x$, так как число $\alpha + \beta i = 0 + 2 \cdot i = 2i$, характеризующее правую часть, равно одному из корней характеристического уравнения, то частное решение будет:

$$y^* = x((A_0 + A_1x) \cos 2x + (B_0 + B_1x) \sin 2x).$$

в) $f(x) = x^2 \sin x$, так как $\alpha + \beta i = 0 + 1 \cdot i = i$ не совпадает ни с одним из корней характеристического уравнения, то частное решение будет:

$$y^* = (A_0 + A_1 x + A_2 x^2) \cos x + (B_0 + B_1 x + B_2 x^2) \sin x.$$

3. Метод вариации произвольных постоянных

Пример 10. Найти общее решение ЛНДУ $y'' + y = \operatorname{tg} x$.

Решение. Составляем характеристическое уравнение соответствующего ЛОДУ: $\lambda^2 + 1 = 0$ и находим его корни: $\lambda_1 = i, \lambda_2 = -i$. Определяем фундаментальную систему

$$y_1(x) = \sin x, \quad y_2(x) = \cos x$$

и общее решение ЛОДУ:

$$y_{OO}(x) = C_1 \sin x + C_2 \cos x.$$

В соответствии с методом вариации произвольных постоянных, ищем частное решение неоднородного ЛДУ в виде

$$y_H(x) = C_1(x) \sin x + C_2(x) \cos x,$$

где

$$\begin{cases} C_1'(x) \cdot \sin x + C_2'(x) \cdot \cos x = 0, \\ C_1'(x) \cdot \cos x + C_2'(x) \cdot (-\sin x) = \operatorname{tg} x \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} C_1'(x) = \sin x, \\ C_2'(x) = -\frac{\sin^2 x}{\cos x}, \end{cases}$$

откуда

$$C_1(x) = -\cos x, \quad C_2(x) = \sin x + \ln \left| \frac{\sin x - 1}{\sin x + 1} \right|.$$

Тогда

$$y_H(x) = C_1(x) \sin x +$$

$$+ C_2(x) \cos x = (-\cos x) \sin x + \left(\sin x + \ln \left| \frac{\sin x - 1}{\sin x + 1} \right| \right) \cos x = \cos x \cdot \ln \left| \frac{\sin x - 1}{\sin x + 1} \right|$$

и общее решение исходного ЛДУ имеет вид

$$y = y_{OO}(x) + y_H(x) = C_1 \sin x + C_2 \cos x + \cos x \cdot \ln \left| \frac{\sin x - 1}{\sin x + 1} \right|.$$