



Southwest Petroleum University  
西南石油大学



# 第二章 参数估计

## § 1 点估计和估计量的求法

理学院



## ● 预习提纲

---

1. 什么叫做参数估计？
2. 矩法是如何进行参数估计的？
3. 什么是最大似然估计法？



➤ 本次课教学目的:

- 掌握点估计的几种方法并会进行参数估计

➤ 重点难点:

- 利用矩法进行参数估计
- 最大似然估计法的应用

## 2.1.1 什么叫参数估计？

例如若想了解某学校全体学生的月平均消费金额这一总体的数量特征，有哪些方法？

方法1：对全体师生做普查——描述统计，操作难度大

方法2：抽取部分师生做样本，进行抽样调查，根据样本的数量特征推断总体的数量特征——推断统计（参数估计+假设检验）

**参数估计**：用样本的统计量去估计总体的(未知)参数。

如：用样本均值  $\bar{x}$  估计总体均值  $\mu$

用样本方差  $s^2$  估计总体方差  $\sigma^2$



用样本的估计量直接去估计总体参数的值，这一过程称为“**点估计**”。例如，通过样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 构造某个统计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 作为参数 $\theta$ 的估计，称这样的估计为参数的点估计。

**1. 估计量** 用于估计总体参数的随机变量；

➤ 例如样本均值就是总体均值 $\mu$ 的一个估计量。

**2. 估计值** 估计参数时计算出来的统计量的具体值；

**3.** 一般情况下，参数用 $\theta$ 表示，估计量用 $\hat{\theta}$ 表示

**4. 点估计的方法** { **矩估计法**  
**最大似然估计法**



## 2.1.2 矩法

### 1. 什么是矩法?

由大数定律知, 当总体的 $k$ 阶原点矩存在时, 样本的 $k$ 阶原点矩依概率收敛于总体的 $k$ 阶原点矩。

用样本的 $k$ 阶原点矩作为总体的 $k$ 阶原点矩的估计量, 建立含待估计参数的方程, 从而可解出待估计参数。

### 2. 如何进行矩估计?

当 $n$ 充分大时, 令

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k = EX^k = \mu_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) \quad (k=1, 2, \dots, m)$$

解此 $m$ 个方程得到  $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$  的估计值  $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_m$  称为矩估计值。

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$$

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$$





**例1:** 设总体X的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自于总体X的样本,  $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本值, 求参数 $\theta$ 的矩估计。

**解:** 先求总体矩

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot \theta x^{\theta-1} dx = \theta \int_0^1 x^{\theta} dx = \frac{\theta}{\theta+1} x^{\theta+1} \Big|_0^1 = \frac{\theta}{\theta+1}$$

$$\text{解之: } \theta = \frac{E(X)}{1-E(X)} \quad \text{令} \quad A_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

$$\hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}} \quad \text{为}\theta\text{的矩估计量,} \quad \hat{\theta} = \frac{\bar{x}}{1-\bar{x}} \quad \text{为}\theta\text{的矩估计值。}$$



**例2:** 设总体X的概率密度为:

$$f(x, \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}, \quad -\infty < x < +\infty, \quad \theta > 0$$

求 $\theta$ 的矩估计量。

**解法1:**  $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}} dx = 0$

一阶矩中并不含 $\theta$ , 无法求解, 因此需继续求总体的二阶原点矩。

$$EX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}} dx = \frac{1}{\theta} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x}{\theta}} dx = \theta^2 \Gamma(3) = 2\theta^2$$

$$\text{即 } A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 = 2\theta^2, \text{ 由此可得 } \hat{\theta} = \sqrt{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2} = \sqrt{A_2/2}, \quad \theta > 0$$

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx \quad (s > 0)$$

$$\Gamma(n+1) = n!$$





解法2:

$$E|X| = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \cdot \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}} dx = \frac{1}{\theta} \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x}{\theta}} dx = \theta \Gamma(2) = \theta$$

即  $\theta = E|X|$  用  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$  替换  $E|X|$  即可得:

$$\theta \text{ 的另一矩估计量为 } \hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$$

由此可见，总体不一定存在适当阶的矩，且矩估计并不唯一。

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx \quad (s > 0)$$



# 矩法的优缺点



Southwest Petroleum University  
西南石油大学

## ★ 优点:

- 1、不依赖总体的分布，简便易行；
- 2、只要 $n$ 充分大，精确度也能达到较高水平。

## ☪ 缺点:

- 1、要求总体的某个 $k$ 阶矩存在；
- 2、要求未知参数能写为总体的原点矩的函数形式。



## 2.1.3 最大似然估计法

首先我们来看生活中一个有趣的现象：

某位大学生与一位猎人一起外出打猎，一只野兔从前方窜过。只听到一声枪响，野兔应声倒下。如果要你推测，是谁打中的呢？你会如何思考呢？

一般地，我们都会这样想，只打一枪便打中，猎人由于长期打猎，他命中兔子的概率一般大于这位同学命中的概率。看来这一枪很大可能都是猎人射中的。

如能使事件发生的概率最大化，则事件最有可能发生，这也便是最大似然估计法的基本思想了。



**定义1.1:** (1) 设随机变量 $X$ 的概率密度函数为 $f(x, \theta)$ , 其中 $\theta$ 为未知参数( $f$ 为已知函数).  $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的观察值, 则称

$$L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

为 $X$ 关于样本观察值  $x_1, x_2, \dots, x_n$  的**似然函数**。

(2) 若 $X$ 是离散型随机变量, 似然函数定义为

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i)$$

**定义1.2:** 如果**似然函数**  $L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$  在  $\theta = \hat{\theta}$  时**达到最大值**, 则称  $\hat{\theta}$  是参数 $\theta$ 的**最(极)大似然估计(量)**。



# 求解方法

➤ 为求最大似然估计量, 应解以下似然方程组:

$$\frac{\partial}{\partial \theta_i} L(\theta; x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \quad i = 1, 2, \dots, k \quad \theta = (\theta_1, \dots, \theta_k)$$

➤ 因函数的对数和函数本身同时取得最大值, 为计算方便, 常先对 $L$ 取对数再求导, 改写似然方程组为:

$$\frac{\partial}{\partial \theta_i} \ln L(\theta; x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \quad i = 1, 2, \dots, k \quad \theta = (\theta_1, \dots, \theta_k)$$

➤ 求解步骤: (1)构造 $L(\theta; x_1, x_2, \dots, x_n)$ ;

(2)计算 $\ln L(\theta; x_1, x_2, \dots, x_n)$ ;

(3)求导 $\frac{\partial}{\partial \theta_i} \ln L(\theta; x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ ;

(4)解方程组.



## 离散母体分布情形

**例3:** 设总体 $X$ 服从参数为 $\lambda$ 的泊松分布, 即 $X$ 有分布列:

$$p(k; \lambda) = P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots$$

$\lambda$ 是未知参数,  $\lambda \in (0, +\infty)$ , 试求 $\lambda$ 的极大似然估计。

**解:** (1) 样本的似然函数为

$$\begin{aligned} L(\lambda) &= L(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda) = p(x_1; \lambda) p(x_2; \lambda) \cdots p(x_n; \lambda) \\ &= \frac{\lambda^{x_1}}{x_1!} e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x_2}}{x_2!} e^{-\lambda} \cdots \frac{\lambda^{x_n}}{x_n!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{x_1! x_2! \cdots x_n!} e^{-n\lambda} \end{aligned}$$

$$x_i \in \{0, 1, 2, \dots\}, i = 1, 2, \dots, n$$





$$(2) \ln L(\lambda) = \ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda)$$

$$= -n\lambda + \left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \ln \lambda - \sum_{i=1}^n \ln(x_i!)$$

$$(3) \frac{\partial}{\partial \lambda} \ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda) = -n + \left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \frac{1}{\lambda}$$

$$\text{令 } \frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = 0$$

$$(4) \text{ 得 } \lambda = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$$

$$\text{因此 } \hat{\lambda}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$



## 连续母体分布情形

**例4:** 设总体 $X$ 服从参数为 $\lambda$ 的指数分布, 即有概率密度

$$f(x, \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, (\lambda > 0)$$

试求 $\lambda$ 的极大似然估计.

**解:** (1) 似然函数为:

$$L = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda) = \lambda^n \prod_{i=1}^n e^{-\lambda x_i} = \lambda^n \exp(-\lambda \sum_{i=1}^n x_i)$$

(2) 取对数  $\ln L = n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i$



(3) 由 
$$\frac{d \ln L}{d \lambda} = \frac{d}{d \lambda} (n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i) = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i$$

令 
$$\frac{d \ln L}{d \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

(4) 
$$\Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i} = \frac{1}{\bar{x}}$$

改写为 
$$\lambda = \hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{x}}$$

所以  $\hat{\lambda}$  是  $\lambda$  的最大似然估计。



## ● 思考题

1. 设  $x_1, x_2, \dots, x_n$  为正态总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的一个样本值，求： $\mu$  和  $\sigma^2$  的极大似然估计。（例2.1.5）

**求解思路：**若总体  $X$  的概率密度为  $f(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ ，其中  $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$  为未知参数， $x_1, x_2, \dots, x_n$  为样本观察值，此时似然函数为：

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$$

求解方程组 
$$\frac{\partial \ln L(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)}{\partial \theta_i} = 0, i = 1, 2, \dots, k$$

即可得到极大似然估计  $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_k$



## ● 思考题答案



Southwest Petroleum University  
西南石油大学

解：似然函数为

$$\begin{aligned} L(x_1, \dots, x_n; \mu, \sigma^2) &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2} (x_i - \mu)^2\right] \\ &= \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{\frac{n}{2}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right] \end{aligned}$$

$$\ln L = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

$$\text{解方程组} \begin{cases} \frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0 \\ \frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0 \end{cases}$$



## ● 思考题答案



Southwest Petroleum University  
西南石油大学

$$\text{得 } \hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu})^2$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$= s^2$$





思考：例2.1.7





# 小结

## ➤ 最大似然估计法的优点:

1. 充分利用总体分布的函数信息, 克服了矩法的某些不足
2. 得到的估计量的精度一般较高

## ➤ 最大似然估计法的缺点:

要求必须知道总体的分布函数形式



## 2.1.4 用子样中位数估计正态母体的参数

**定理：** 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是独立同分布随机变量，且每一随机变量服从**正态分布**  $N(\mu, \sigma^2)$ 。若  $me$  是  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的**中位数**，则对任意的  $x$ ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \sqrt{\frac{2n}{\pi}} (me - \mu) \leq x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

该定理表明：当  $n$  很大时， $\sqrt{\frac{2n}{\pi}} (me - \mu)$  近似服从标准正态分布，因而  $me$  近似服从正态分布  $N(\mu, \frac{\pi}{2n})$ 。所以， $n$  很大时可取  $\hat{\mu} = me$ 。



Southwest Petroleum University  
西南石油大学



*Thank you!*