

# **Definitionen und Sätze der HM 1 & 2**

Julian Molt

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>KAPITEL 1</b>	<b>GRUNDLAGEN DER MATHEMATIK</b>	<b>SEITE 4</b>
1.1	Elementare Logik	4
1.2	Naive Mengenlehre	4
1.3	Relationen und Funktionen	4
1.4	Die Zahlenbereiche	4
1.5	Die komplexen Zahlen	4
1.6	Zur Faktorisierung von Polynomen	4
1.7	Anwendungen	4
<b>KAPITEL 2</b>	<b>GRUNDLAGEN DER ANALYSIS</b>	<b>SEITE 5</b>
2.1	Grenzwerte in $\mathbb{Q}$ , Vollständigkeit	5
2.2	Die reellen Zahlen	6
2.3	Grenzwerte in $\mathbb{R}$	7
2.4	Maximum, Minimum, Infimum, Supremum	7
2.5	Die Zahl $e$	8
2.6	Reihen	8
2.7	Zur Struktur der Räume $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{C}^n$	9
2.8	Metrische Räume	10
2.9	Zur Topologie im $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{C}^n$	10
2.10	Die Exponentialfunktion – Die Formel von EULER	11
2.11	Grenzwerte von Funktionen	12
2.12	Stetigkeit	13
2.13	Stetige reelle Funktionen einer reellen Variablen	13
2.14	Kompaktheit	14
<b>KAPITEL 3</b>	<b>ZUR DIFFERENZIALRECHNUNG FÜR FUNKTIONEN EINER VAR.</b>	<b>SEITE 15</b>
3.1	Differenzialquotient und Ableitung	15
3.2	Die Landau-Symbole $\mathcal{o}$ und $\mathcal{O}$	15
3.3	Regeln für das Rechnen mit Ableitungen	15
3.4	Die Sätze von FERMAT, ROLLE: Die Formel von CAUCHY und LAGRANGE	16
3.5	Der Hauptsatz der Differenzialrechnung	17
3.6	Höhere Ableitungen	17
3.7	Der Satz von TAYLOR	17
3.8	Anwendungen: Monotonie und Extremwerte	18
3.9	Konvexität und Konkavität	18
3.10	Unbestimmtheiten vom Typ $0/0$ bzw. $\infty/\infty$	18

<b>KAPITEL 4</b>	<b>INTEGRALRECHNUNG</b>	<b>SEITE 20</b>
4.1	Das RIEMANN-Integral	20
4.2	Wichtige Eigenschaften des RIEMANN-Integrals	21
4.3	Die Formel von NEWTON und LEIBNIZ – Die Stammfunktion	21
4.4	Partielle Integration, Substitution der Integrationsvariablen	22
4.5	Zur Integration rationaler Funktionen	22
4.6	Die Mittelwertsätze der Integralrechnung	22
4.7	Das Restglied in der Formel von TAYLOR	22
4.8	Numerische Verfahren der Integration	23
4.9	Einige Anwendungen der Differenzial- und Integralrechnung	23
4.10	Flächen, Volumina	24
<b>KAPITEL 5</b>	<b>LINEARE ALGEBRA</b>	<b>SEITE 25</b>
5.1	Matrizen – Grundlagen	25
5.2	Quadratische Matrizen	25
5.3	$\mathbb{R}^n$ bzw. $\mathbb{C}^n$ als Raum der Spaltenvektoren	26
5.4	Permutationen	26
5.5	Determinanten	26
5.6	Inverse Matrizen	26
5.7	Der Rang einer Matrix	27
5.8	Determinante	29
5.9	Das Spektrum. Eigenvektoren. Resolvente.	29
5.10	Ähnlichkeit von Matrizen	30
5.11	Orthogonale und unitäre Matrizen	30
5.12	Symmetrische und Hermitesche Matrizen	30
5.13	Wechsel des Koordinatensystems – Basiswechsel	31
5.14	Direkte und orthogonale Summen von Unterräumen	32
5.15	Orthogonale Projektionen	33
5.16	Selbstadjungierte Operatoren und quadratische Formen	33
5.17	Stetige lineare Operatoren	34
<b>KAPITEL 6</b>	<b>ZUR DIFF.-RECHNUNG FÜR FUNKTIONEN MEHRERER VAR. —</b>	<b>SEITE 35</b>
6.1	Differenzierbarkeit	35
6.2	Produkt- und Kettenregel	36
6.3	Hauptsatz der Differenzialrechnung	36
6.4	Ableitungen höherer Ordnung	36
6.5	Der Satz von TAYLOR	37
6.6	Extremwerte von Funktionen mit mehreren Veränderlichen	37
6.7	Der Satz über implizite Funktionen	38
6.8	Umkehrfunktion	38
6.9	Darstellung von Gradient und LAPLACE in verschiedenen Koordinatensystemen	38
6.10	Extremwerte unter Nebenbedingungen	38

KAPITEL 7	FUNKTIONENFOLGEN	SEITE
7.1	Doppelfolgen, Gleichmäßigkeit	40
7.2	Funktionenfolgen	41
7.3	Die Folge der Ableitungen	41
7.4	Funktionenreihen	41
7.5	Potenzreihen	42
7.6	Der Fixpunktsatz von BANACH	42

# Grundlagen der Mathematik

## 1.1 Elementare Logik

## 1.2 Naive Mengenlehre

## 1.3 Relationen und Funktionen

## 1.4 Die Zahlenbereiche

## 1.5 Die komplexen Zahlen

## 1.6 Zur Faktorisierung von Polynomen

### Satz 1.6.1 Hauptsatz der Algebra

Jedes Polynom über  $\mathbb{C}$  vom Grad  $\deg P > 1$  besitzt mindestens eine Nullstelle  $z \in \mathbb{C}$  (in der komplexen Ebene).

## 1.7 Anwendungen

# Grundlagen der Analysis

## 2.1 Grenzwerte in $\mathbb{Q}$ , Vollständigkeit

### Definition 2.1.1

Eine Folge  $a$  aus  $A$  ist eine Funktion  $a: \mathbb{N} \rightarrow A$ .

Man schreibt:

$$\begin{aligned}a(1) &= a_1 \in A, \dots, \\a(k) &= a_k \in A, \dots, \\a &= (a_k)_{k=1}^{\infty} = (a_1, a_2, a_3, \dots)\end{aligned}$$

- Gleiche Werte können mehrfach angenommen werden.
- Die Anordnung ist wichtig.

### Definition 2.1.2: Grenzwert

Man nennt  $r \in \mathbb{Q}$  Grenzwert einer Folge rationaler Zahlen  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  genau dann, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_{\varepsilon} \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N_{\varepsilon} : d(a_n, r) < \varepsilon$$

Man schreibt dann

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ oder kurz } a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} r$$

Eine Folge ist konvergent, wenn sie einen Grenzwert besitzt.

Eine Folge ist divergent, wenn sie keinen Grenzwert besitzt.

### Definition 2.1.3

Eine Folge rationaler Zahlen  $a = (a_n)_{n=1}^{\infty}$  ist beschränkt, genau dann, wenn

$$\exists C > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} : |a_n| \leq C$$

### Satz 2.1.1

Jede konvergente Folge ist beschränkt.

### Satz 2.1.2

Wenn eine Folge  $(a_n)_{n=1}^{\infty}$  gegen  $r$  konvergiert, dann konvergiert jede Teilfolge von  $a$  gegen denselben Grenzwert  $r$ .

### Satz 2.1.3

Wenn eine Folge  $(a_k)_{k=1}^{\infty}$  konvergiert, dann ist der Grenzwert eindeutig bestimmt.

**Definition 2.1.4: CAUCHY-Folge, Fundamentalfolge**

$(a_n)_{n=1}^{\infty}$  ist eine CAUCHY-Folge, genau dann, wenn

$$\forall_{\varepsilon>0} \quad \exists_{N_{\varepsilon} \in \mathbb{N}} \quad \forall_{n,m \geq N_{\varepsilon}} : \quad d(a_n, a_m) < \varepsilon$$

in  $\mathbb{Q}$   $d(a_n, a_m) = |a_n - a_m|$

**Satz 2.1.4**

Jede konvergente Folge ist eine CAUCHY-Folge.

## 2.2 Die reellen Zahlen

**Definition 2.2.1: Grundrechenarten auf  $\mathbb{R}$** 

$$\begin{aligned} r, s &\in \mathbb{R} \\ r &= \left[ (r_k)_{k=1}^{\infty} \right] \quad (r_k)_{k=1}^{\infty} \in \text{CF}(\mathbb{Q}) \\ s &= \left[ (s_k)_{k=1}^{\infty} \right] \quad (s_k)_{k=1}^{\infty} \in \text{CF}(\mathbb{Q}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r + s &\stackrel{\text{def}}{=} \left[ (r_k + s_k)_{k=1}^{\infty} \right]_{\sim} \\ r \cdot s &\stackrel{\text{def}}{=} \left[ (r_k \cdot s_k)_{k=1}^{\infty} \right]_{\sim} \end{aligned}$$

**Definition 2.2.2: Ordnung auf  $\mathbb{R}$** 

$r, s$  stehen für approximierte Folgen.

$$(r_k) \in r$$

$$(s_k) \in s$$

$$r < s \quad \stackrel{\text{def}}{\iff} \quad \exists_{p,q \in \mathbb{Q}: p < q} \quad \exists_{N \in \mathbb{N}} \quad \forall_{n \geq N} : \quad r_n \leq p \leq q \leq s_n$$

**Satz 2.2.1**

Für beliebige  $r, s \in \mathbb{R}$  gilt immer genau einer der folgenden Fälle:

$$r < s$$

$$r = s$$

$$r > s$$

## 2.3 Grenzwerte in $\mathbb{R}$

### Definition 2.3.1: Monotonie

$(a_n), a_n \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$

Monoton wachsend  $(a_n) \uparrow$

$$a_n \leq a_{n+1} \text{ für alle } n \in \mathbb{N}$$

Streng monoton wachsend  $(a_n) \uparrow\uparrow$

$$a_n < a_{n+1} \text{ für alle } n \in \mathbb{N}$$

Monoton fallend  $(a_n) \downarrow$

$$a_n \geq a_{n+1} \text{ für alle } n \in \mathbb{N}$$

Streng monoton fallend  $(a_n) \downarrow\downarrow$

$$a_n > a_{n+1} \text{ für alle } n \in \mathbb{N}$$

### Satz 2.3.1

Jede monotone beschränkte Folge reeller Zahlen besitzt einen Grenzwert in  $\mathbb{R}$

## 2.4 Maximum, Minimum, Infimum, Supremum

### Definition 2.4.1: Maximum, Minimum

Sei  $M \subset \mathbb{R}$ . Wir sagen  $a \in \mathbb{R}$  ist das

Maximum von  $M$

$$(a = \max M) \stackrel{\text{def}}{\iff} (a \in M) \wedge (\forall_{x \in M}: x \leq a)$$

Minimum von  $M$

$$(a = \min M) \stackrel{\text{def}}{\iff} (a \in M) \wedge (\forall_{x \in M}: x \geq a)$$

### Definition 2.4.2

Eine Menge  $M \subset \mathbb{R}$  ist beschränkt, wenn  $C > 0$  existiert, sodass

$$|x| \leq C \text{ für alle } x \in M$$

### Definition 2.4.3

Sei  $M \subset \mathbb{R}, M \neq \emptyset$ .

Menge der oberen Schranken von  $M$

$$M_+ = \{y \in \mathbb{R}: \forall_{x \in M}: x \leq y\}$$

Menge der unteren Schranken von  $M$

$$M_- = \{y \in \mathbb{R}: \forall_{x \in M}: y \leq x\}$$



### Definition 2.4.4

Für  $M \subset \mathbb{R}$  nennen wir  $a \in \mathbb{R}$  das Supremum von  $M \Leftrightarrow a = \sup M = \min M_+$ , bzw. das Infimum von  $M \Leftrightarrow a = \inf M = \max M_-$ .  
Falls  $\inf M$  bzw.  $\sup M$  existieren, dann sind diese eindeutig bestimmt.

### Satz 2.4.1 Satz von Supremum und Infimum

Ist  $M \neq \emptyset$  nach oben beschränkt, dann existiert  $a = \sup M$ .  
Ist  $M \neq \emptyset$  nach unten beschränkt, dann existiert  $a = \inf M$ .

## 2.5 Die Zahl e

### Satz 2.5.1

Die Folge  $(x_n)$  konvergiert in  $\mathbb{R}$ .

### Definition 2.5.1

$$e := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

### Satz 2.5.2

$$x_n < e < x_n + \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{n} \quad n \in \mathbb{N}$$

### Satz 2.5.3

e ist irrational.

### Satz 2.5.4

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

## 2.6 Reihen

### Definition 2.6.1

Man sagt, dass die Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  konvergiert, falls  $(S_n)_{n=1}^{\infty}$  konvergiert.  
Man setzt dann

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

Sonst divergiert die Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ .

### Satz 2.6.1 Doppelreihen

$$a_{m,n} > 0 \quad m, n \in \mathbb{N}$$

Folgende Reihen konvergieren gleichzeitig und sind gleich:

$$\sum_{(m,n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}} = \sum_{m=1}^{\infty} \left( \sum_{n=1}^{\infty} a_{m,n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \sum_{m=1}^{\infty} a_{m,n} \right)$$

### Definition 2.6.2

Die Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  konvergiert absolut, falls

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$$

konvergiert.

### Satz 2.6.2

Jede absolut konvergente Reihe konvergiert.

### Satz 2.6.3

$\prod_{k=1}^{\infty} a_k$  konvergiert genau dann, wenn die Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} \ln(a_k)$  konvergiert, wobei

$$\ln \left( \prod_{k=1}^{\infty} a_k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \ln(a_k)$$

### Definition 2.6.3

Eine Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  konvergiert nach CESARO gegen  $S$  genau dann, wenn

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (S_1 + \dots + S_n)$$

## 2.7 Zur Struktur der Räume $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{C}^n$

### Definition 2.7.1

Eine Menge  $V$  nennt man Vektorraum über den Körper  $\mathbb{K}$ , falls die Operationen

$$\begin{aligned} +: V \times V &\rightarrow V \\ \cdot: \mathbb{K} \times V &\rightarrow V \end{aligned}$$

existieren mit folgenden Eigenschaften:

### Definition 2.7.2: Reelles Skalarprodukt

Sei  $V$  ein Vektorraum über  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ . Dann nennt man  $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  mit den Eigenschaften (1)<sub>S $\mathbb{R}$</sub>  - (3)<sub>S $\mathbb{R}$</sub>  ein (reelles) Skalarprodukt auf  $V$ .

### Definition 2.7.3: Komplexes Skalarprodukt

Sei  $V$  ein Vektorraum über  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ . Dann nennt man  $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{C}$  mit den Eigenschaften (1)<sub>S $\mathbb{C}$</sub>  - (3)<sub>S $\mathbb{C}$</sub>  ein (komplexes) Skalarprodukt auf  $V$ .

## 2.8 Metrische Räume

### Definition 2.8.1: $\varepsilon$ -Umgebung

$(M, d)$  metrischer Raum

$$U_\varepsilon(x) = \{y \in M : d(x, y) < \varepsilon\} \quad x \in M, \varepsilon > 0$$

### Definition 2.8.2: Grenzwert einer Folge

$x_n \in M$

$y \in M$

$(M, d)$  metrischer Raum

$$y = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N_\varepsilon \in \mathbb{N}} \forall_{n \geq N_\varepsilon} : \underbrace{d(x_n, y) < \varepsilon}_{x_n \in U_\varepsilon(y)}$$

### Satz 2.8.1

Falls  $(x_n)$  in  $(M, d)$  konvergiert, so ist  $y = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  eindeutig bestimmt.

### Satz 2.8.2

Jede konvergente Folge ist beschränkt, d.h. die Menge der Folgenglieder ist beschränkt.

### Definition 2.8.3: CAUCHY-Folge, Fundamentalfolge

$(M, d)$  metrischer Raum

$x_n \in M$

$n \in M$

$$(x_n) \in \text{CF}(M, d) \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N_\varepsilon \in \mathbb{N}} \forall_{n, m \geq N_\varepsilon} : d(x_n, x_m) < \varepsilon$$

### Satz 2.8.3

Jede konvergente Folge ist eine Cauchy-Folge. Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht.

### Definition 2.8.4

Ein metrischer Raum  $(M, d)$  ist vollständig, g.d.w. jede CAUCHY-Folge einen Grenzwert in  $M$  besitzt.

## 2.9 Zur Topologie im $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{C}^n$

### Definition 2.9.1: Häufungspunkt einer Menge

$(M, d)$  metrischer Raum

Sei  $X \subset M$ . Wir nennen  $x_0 \in M$  Häufungspunkt von  $X$  g.d.w.

$$\forall_{\varepsilon > 0} : U_\varepsilon(x_0) \cap (X \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset$$

### Definition 2.9.2: Isolierter Punkt

Sei  $X \subset M$ . Wir nennen  $x_0 \in X$  einen isolierten Punkt von  $X$  g.d.w.

$$\exists_{\varepsilon > 0}: U_\varepsilon(x_0) \cap (X \setminus \{x_0\}) = \emptyset$$

### Definition 2.9.3

Wir nennen  $x_0 \in M$

- inneren Punkt von  $X$

$$\exists_{\varepsilon > 0}: U_\varepsilon(x_0) \subset X$$

- äußeren Punkt zu  $X$

$$\exists_{\varepsilon > 0}: U_\varepsilon(x_0) \subset (M \setminus X)$$

- Randpunkt von  $X$

$$\forall_{\varepsilon > 0}: (U_\varepsilon(x_0) \cap X \neq \emptyset) \wedge (U_\varepsilon(x_0) \cap (M \setminus X) \neq \emptyset)$$

$\text{int } X$  Menge der inneren Punkte

$\text{ext } X$  Menge der äußeren Punkte

$\partial X$  Menge der Randpunkte

### Definition 2.9.4

Eine Menge  $X \subset M$  heißt offen, g.d.w.

$$X = \text{int } X$$

### Definition 2.9.5

Eine Menge  $X \subset M$  heißt abgeschlossen g.d.w.

$$X = \text{int } X \cup \partial X$$

### Satz 2.9.1

$X \subset M$  ist offen in  $(M, d)$ , g.d.w.  $M \setminus X$  abgeschlossen in  $(M, d)$  ist.

## 2.10 Die Exponentialfunktion – Die Formel von EULER

Sei im Folgenden

$$t_n(z) = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{z^k}{k!}, \quad z \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{N}$$

### Satz 2.10.1

Die Folge  $(t_n(z))_{n \in \mathbb{N}}$  ist für jedes  $z \in \mathbb{C}$   $n \rightarrow \infty$  konvergent.

**Definition 2.10.1**

$\exp: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

$$\exp(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} t_n(z) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$$

Bzw. mit den Vereinbarungen  
 $0! = 1, z^0 = 1$  (auch für  $z = 0$ )

$$\exp(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$$

**Satz 2.10.2**

Für alle  $z, w \in \mathbb{C}$  gilt:

$$\exp(z + w) = \exp(z) \cdot \exp(w)$$

**Satz 2.10.3**

Für  $z \in \mathbb{C}$  mit  $|z| < 1$  gilt:

$$|\exp(z) - 1 - z| \leq |z|^2$$

bzw:

$$\exp(z) = 1 + z + R(z)$$

mit  $|R(z)| \leq |z|^2$  für  $|z| < 1$   
 ( $R(z)$  ist der Rest von  $z$ )

**Definition 2.10.2**

$$e^x = \exp(x) \quad x \in \mathbb{R}$$

## 2.11 Grenzwerte von Funktionen

**Definition 2.11.1:  $\varepsilon$ - $\delta$ -Definition**

$y_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  g.d.w.

$$\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{\delta > 0}: f\left(X \cap \overset{\circ}{U}_{\delta}(x_0)\right) \subset U_{\varepsilon}(y_0)$$

**Definition 2.11.2: Folgendefinition**

$y_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  g.d.w. für jede Folge  $(x_n)_{n=1}^{\infty}$  mit  $x_n \in X \setminus \{x_0\}, x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_0$  gilt:

$$y_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$$

**Satz 2.11.1**

Die letzten beiden Definitionen sind äquivalent zueinander.

## 2.12 Stetigkeit

### Definition 2.12.1

$f$  ist im Punkt  $x_0$  stetig, g.d.w.

1.  $x_0 \in \text{iso}(X)$  oder
2.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$  für  $x_0 \in \text{acc}(X)$

### Definition 2.12.2: $\varepsilon$ - $\delta$ -Definition

$f: X \subset M_1 \rightarrow M_2$  ist stetig in  $x_0 \in X \Leftrightarrow$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: f(X \cap U_\delta(x_0)) \subset U_\varepsilon(f(x_0))$$

### Definition 2.12.3: Folgendefinition

$f: X \subset M_1 \rightarrow M_2$  stetig in  $x_0 \in X$

$\Leftrightarrow$  für jede Folge  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  mit  $x_n \in X$ ,  $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_0$  gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$$

### Definition 2.12.4

$f: X \subset M_1 \rightarrow M_2$  ist stetig auf  $X$ , wenn  $f$  in jedem Punkt  $x_0 \in X$  stetig ist.

### Satz 2.12.1

Sei  $X = M_1$ , dann ist  $f(X = M_1 \rightarrow M_2)$  stetig auf  $X = M_1$  g.d.w. das Urbild  $f^{-1}(U)$  von jeder in  $M_2$  offenen Menge  $U \subset U_2$  in  $M_2$  ist.

## 2.13 Stetige reelle Funktionen einer reellen Variablen

### Satz 2.13.1 Satz von BOLZANO und CAUCHY

$f: [a, b] \xrightarrow{\text{stetig}} \mathbb{R}$   
 $a < b, f(a) \cdot f(b) < 0$

$$\Rightarrow \exists C \in ]a, b[ : f(C) = 0$$

### Definition 2.13.1: Monotonie

$f \uparrow$  (monoton wachsend)

$f \uparrow \uparrow$  (streng monoton wachsend)

$f \downarrow$  (monoton fallend)

$f \downarrow \downarrow$  (streng monoton fallend)

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

## 2.14 Kompaktheit

### Definition 2.14.1: Häufungspunkt einer Folge

Wir nennen  $y \in M$  Häufungspunkt einer Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , falls eine Teilfolge  $(a_j)_{j \in \mathbb{N}}$  existiert, welche gegen  $y$  konvergiert.

### Definition 2.14.2: Kompaktheit

$(M, d)$  metrischer Raum,  $K \subset M$

$K$  ist (folgen)kompakt, g.d.w. jede Folge aus  $K$  mindestens einen Häufungspunkt aus  $K$  enthält.

### Satz 2.14.1 BOLZANO-WEIERSTRASS

$(M, d) = (\mathbb{K}^m, d_{|\cdot|})$

Für eine Menge  $K \subset \mathbb{K}^m$  gilt Kompaktheit, g.d.w. Beschränktheit und Abgeschlossenheit gelten.

### Satz 2.14.2

Wenn  $K \subset M_1$  kompakt  $f: K \subset M_1 \rightarrow M_2$  auf  $K$  stetig ist, dann ist  $f(K)$  kompakt in  $M_2$

### Satz 2.14.3 WEIERSTRASS

$f: K \subset M_1 \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und  $K \subset M_1$  kompakt

$\Rightarrow f$  ist beschränkt und nimmt einen Minimalwert und einen Maximalwert an.

### Satz 2.14.4

$f: K \subset M_1 \xrightarrow{\text{stetig}} M_2$

$K \subset M_1$  kompakt

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta = \delta_\varepsilon > 0 \quad \forall x_0 \in K$$

# Zur Differenzialrechnung für Funktionen einer Var.

## 3.1 Differenzialquotient und Ableitung

### Definition 3.1.1: Differenzialquotient

$$\varphi(f, x_0, h) = \frac{1}{h}(f(x_0 + h) - f(x_0)) \quad h \neq 0$$

### Definition 3.1.2

$f$  ist im Punkt  $x_0$  differenzierbar g.d.w.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \varphi(f, x_0, h) = F \in \mathbb{R}$$

existiert.

### Definition 3.1.3

Wir nennen  $f$  in  $z_0$  differenzierbar g.d.w.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \varphi(f, z_0, h) = f'(z_0) \in \mathbb{C}$$

existiert.

## 3.2 Die Landau-Symbole $\mathcal{O}$ und $\mathcal{O}$

### Definition 3.2.1: LANDAU-Symbole

$f \stackrel{x \rightarrow x_0}{=} \mathcal{O}(g)$  g.d.w.

$$\exists_{\delta > 0} \exists_{C \in \mathbb{R}} \forall_{x \in U_\delta(x_0) \cap X}: \|f(x)\| \leq C \cdot |g(x)|$$

$f \stackrel{x \rightarrow x_0}{=} \mathcal{O}(g)$  g.d.w.

$$\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{\delta_\varepsilon > 0} \forall_{x \in U_{\delta_\varepsilon}(x_0) \cap X}: \|f(x)\| \leq \varepsilon \cdot |g(x)|$$

## 3.3 Regeln für das Rechnen mit Ableitungen

### Satz 3.3.1

$f, f_1, f_2, g$  differenzierbar im Punkt  $x_0 \in \text{int}(X)$

$\Leftrightarrow$  Dann existieren folgende Ableitungen in  $x_0$ :

1.  $(f_1 \pm f_2)'(x_0) = f_1'(x_0) \pm f_2'(x_0)$

2.  $(\alpha \cdot f)'(x_0) = \alpha \cdot f'(x_0) \quad \alpha \in \mathbb{K}$



$$3. (g \cdot f)'(x_0) = g'(x_0) \cdot f(x_0) + g(x_0) \cdot f'(x_0)$$

### Satz 3.3.2 Kettenregel

$$(f \circ \psi)(y) = f(\psi(y))$$

$$\left. \frac{d(f \circ \psi)}{dy} \right|_{y=y_0} = \left. \frac{d\psi}{dy} \right|_{y=y_0} \cdot \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0=\psi(y_0)}$$

### Satz 3.3.3 Quotientenregel

$$f, g: X \rightarrow \mathbb{K}; x_0 \in \text{int}(X)$$

$$g(x) \neq 0 \text{ für } x \in X$$

$f$  und  $g$  sind in  $x_0$  differenzierbar

$$\Rightarrow \left. \frac{d}{dx} \left( \frac{f}{g} \right) \right|_{x=x_0} = \frac{f'(x_0) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{(g(x_0))^2}$$

### Satz 3.3.4 Ableitung der Umkehrfunktion

$$f: X \rightarrow Y \text{ bijektiv}$$

$$x_0 \in \text{int}(X)$$

$$y_0 \in \text{int}(Y)$$

$$f \text{ in } x_0 \text{ differenzierbar; } f'(x_0) \neq 0$$

$$f^{-1} \text{ ist in } y_0 = f(x_0) \text{ stetig}$$

$$\Rightarrow \left. \frac{df^{-1}}{dy} \right|_{y=y_0} = \frac{1}{\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0}}$$

## 3.4 Die Sätze von FERMAT, ROLLE: Die Formel von CAUCHY und LAGRANGE

### Satz 3.4.1 FERMAT

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$a < c < b, f \text{ ist in } c \text{ differenzierbar}$$

$$f(c) = \max_{x \in [a, b]} f(x) \text{ oder}$$

$$f(c) = \min_{x \in [a, b]} f(x)$$

$$\Rightarrow f'(c) = 0$$

### Satz 3.4.2 ROLLE

$$f: [a, b] \xrightarrow{\text{stetig}} \mathbb{R}$$

$$a < b$$

$$f \text{ differenzierbar in } ]a, b[$$

$$f(a) = f(b)$$

$$\Rightarrow \exists_{c \in ]a, b[} : f'(c) = 0$$

### Satz 3.4.3 CAUCHY

$$a < b$$

$$f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ stetig}$$

$f, g$  auf  $]a, b[$  differenzierbar  
 $g'(x) \neq 0$  für  $]a, b[$

$$\Rightarrow \exists_{c \in ]a, b[} : \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

### Satz 3.4.4 Mittelwertsatz der Differenzialrechnung (Formel von LAGRANGE)

$f: [a, b] \xrightarrow{\text{stetig}} \mathbb{R}$ , in  $]a, b[$  differenzierbar

$$\Rightarrow \exists_{c \in ]a, b[} : f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

## 3.5 Der Hauptsatz der Differenzialrechnung

### Satz 3.5.1 Hauptsatz der Differenzialrechnung

$\mathbb{K} = \mathbb{R}$  oder  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ,  $n \in \mathbb{N}$

$f: [a, b] \xrightarrow{\text{stetig}} \mathbb{K}^n$  in  $]a, b[$  differenzierbar.

$$\Rightarrow \|f(b) - f(a)\| \leq \sup_{x \in ]a, b[} \|f'(x)\| \cdot |b - a|$$

## 3.6 Höhere Ableitungen

### Satz 3.6.1 Satz von LEIBNIZ

$f: X \rightarrow \mathbb{K}^m, g: X \rightarrow \mathbb{K}$

$X$  offen,  $x_0 \in X$ ,  $f$  und  $g$  sind in  $x_0$

Dann existiert:

$$(g \cdot f)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot g^{(n-k)}(x_0) \cdot f^{(k)}(x_0)$$

## 3.7 Der Satz von TAYLOR

### Satz 3.7.1 TAYLOR

$f: ]a, b[ = X \rightarrow \mathbb{K}^n$  bzw.

$f: X \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^n$

$X$  offen,  $x_0 \in X$

Sei  $f$  im Punkt  $x_0$   $m$ -fach differenzierbar, dann gilt

$$f(x_0 + h) \stackrel{h \rightarrow 0}{\approx} \underbrace{f(x_0) + \sum_{k=1}^m \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} h^k}_{=T_m(x_0, h)} + o(h^m)$$

### 3.8 Anwendungen: Monotonie und Extremwerte

#### Satz 3.8.1

1.  $f \uparrow \Leftrightarrow f'(x) \geq 0$  für alle  $x \in ]a, b[$
2.  $f \uparrow\uparrow \Leftrightarrow f'(x) > 0$  für alle  $x \in ]a, b[$  und es gibt keine  $\alpha, \beta \in ]a, b[$  mit  $\alpha < \beta$  und  $f'(x) = 0$  für alle  $x \in ]\alpha, \beta[$

### 3.9 Konvexität und Konkavität

#### Definition 3.9.1

$f: ]a, b[ \rightarrow \mathbb{R}$  ist konvex g.d.w. für alle  $a < x_1 < x_2 < b$  und alle  $t \in [0, 1]$  gilt mit  $x(t) = t \cdot x_1 + (1 - t) \cdot x_2$

$$f(x(t)) \leq t \cdot f(x_1) + (1 - t) \cdot f(x_2)$$

$f$  ist konkav g.d.w.  $-f$  konvex ist.

#### Satz 3.9.1

Ist  $f: ]a, b[$  konvex (bzw. konkav), dann ist  $f$  stetig.

#### Satz 3.9.2

Sei  $f: ]a, b[ \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar

1.  $f$  ist konvex  $\Leftrightarrow f' \uparrow$  auf  $]a, b[$
2.  $f$  ist konkav  $\Leftrightarrow f' \downarrow$  auf  $]a, b[$

#### Satz 3.9.3

Sei  $f: ]a, b[ \rightarrow \mathbb{R}$  2-fach differenzierbar in  $]a, b[$

1.  $f$  ist konvex  $\Leftrightarrow f''(x) \geq 0$  für alle  $x \in ]a, b[$
2.  $f$  ist konkav  $\Leftrightarrow f''(x) \leq 0$  für alle  $x \in ]a, b[$

#### Satz 3.9.4

$f: ]a, b[$  2-fach differenzierbar in  $c \in ]a, b[$  in  $c$  liegt Wendepunkt vor

$$\Rightarrow f''(c) = 0$$

### 3.10 Unbestimmtheiten vom Typ 0/0 bzw. $\infty/\infty$

#### Satz 3.10.1 BERNOULLI, L'HOSPITAL

$f, g: ]a, b[ \rightarrow \mathbb{R}$  in  $\mathbb{R}$  differenzierbar

$g(x) \neq 0, g'(x) \neq 0$  für  $x \in ]a, b[$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

Es existiere  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A$$

**Satz 3.10.2** Unbestimmtheiten vom Typ  $\frac{\infty}{\infty}$

$f, g: ]a, b[ \xrightarrow{\text{db.}} \mathbb{R}$

$g'(x) \neq 0$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$

Es existiere  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A$$

# Integralrechnung

## 4.1 Das RIEMANN-Integral

### Definition 4.1.1: RIEMANN-Integral

Wir nennen  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  Riemann-integrierbar, falls ein  $I \in \mathbb{R}$  existiert, sodass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum (f; \delta^{(n)}; \Xi^{(n)}) = I$$

Man schreibt

$$I = \int_a^b f(x) \, dx$$

### Satz 4.1.1 Struktur des Raumes $R[a, b]$

$$f, g \in R[a, b]$$

$$[c, d] \subset [a, b]$$

$$\alpha \in \mathbb{R}$$

$$(1) \quad f + g \in R[a, b]$$

$$(2) \quad \alpha \cdot f \in R[a, b]$$

$$(3) \quad |f|_{[c, d]} \in R[a, b]$$

$$(4) \quad f|_{[c, d]} \in R[c, d]$$

$$(5) \quad f \cdot g \in R[a, b]$$

### Satz 4.1.2

Ändert man  $f \in R[a, b]$  in endlich vielen Punkten ab, dann ist die neue Funktion ebenfalls Riemann-integrierbar.

### Definition 4.1.2: Erweiterung

$$f: \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\int_a^a f(x) \, dx \stackrel{\text{def}}{=} 0$$

### Definition 4.1.3: Erweiterung (gerichtetes Integral)

Sei  $a \leq b$

$$\int_a^b f(x) \, dx \stackrel{\text{def}}{=} - \int_b^a f(x) \, dx$$

## 4.2 Wichtige Eigenschaften des RIEMANN-Integrals

### Definition 4.2.1: RIEMANN-Integral für komplexwertige Funktionen

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$$

$$f(x) = f_R(x) + i f_I(x)$$

mit

$$f_R(x) = \Re f(x)$$

$$f_I(x) = \Im f(x)$$

$$f \in R[a, b]$$

$$\Leftrightarrow f_R \in R[a, b] \wedge f_I \in R[a, b]$$

und es gilt:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b f_R(x) \, dx + i \int_a^b f_I(x) \, dx$$

## 4.3 Die Formel von NEWTON und LEIBNIZ – Die Stammfunktion

### Satz 4.3.1 NEWTON, LEIBNIZ

$$F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad a < b$$

(1)  $F$  stetig auf  $[a, b]$

(2)  $F$  differenzierbar auf  $]a, b[$

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(3) \quad f(x) = \begin{cases} 0 & x = a \vee x = b \\ F'(x) & x \in ]a, b[ \end{cases}$$

Es sei  $f \in R[a, b]$  Dann gilt

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b$$

### Definition 4.3.1

$$F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

Wir nennen  $F$  Stammfunktion von  $f$ , falls (1), (2) erfüllt sind und (3)'  $f(x) = F'(x)$ ,  $x \in [a, b]$

### Satz 4.3.2 Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung

Wenn  $f \in R[a, b]$  eine Stammfunktion  $F$  besitzt, dann gilt

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

### Satz 4.3.3 DARBOUX

Sei  $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar in  $]a, b[$  und  $f(x) = F'(x)$  für  $x \in ]a, b[$ . Dann besitzt  $f$  keine Sprungstelle in  $]a, b[$

#### Satz 4.3.4 Existenz einer Stammfunktion

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

Sei  $f$  in  $]a, b[$  stetig und auf  $[a, b]$  beschränkt.

Dann ist  $(y \in [a, b])$

$$F(y) = F(a) + \int_a^y f(x) \, dx$$

eine Stammfunktion von  $f$  auf  $[a, b]$

### 4.4 Partielle Integration, Substitution der Integrationsvariablen

### 4.5 Zur Integration rationaler Funktionen

### 4.6 Die Mittelwertsätze der Integralrechnung

#### Satz 4.6.1 Erster Mittelwertsatz

$f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

$f, g$  stetig auf  $[a, b]$ ,  $g(x) \geq 0$  für  $x \in [a, b]$

$$\Rightarrow \exists_{\xi \in [a, b]}: \int_a^b f(x) \cdot g(x) \, dx = f(\xi) \cdot \int_a^b g(x) \, dx$$

#### Satz 4.6.2 Zweiter Mittelwertsatz

$f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

$g \in R[a, b]$

(1)  $f \downarrow$  und  $f(x) \geq 0$ ,  $x \in [a, b]$

$$\Rightarrow \exists_{\xi \in [a, b]}: \int_a^b f(x) \cdot g(x) \, dx = f(a) \cdot \int_a^b g(x) \, dx$$

(2)  $f \uparrow$  und  $f(x) \leq 0$ ,  $x \in [a, b]$

$$\Rightarrow \exists_{\xi \in [a, b]}: \int_a^b f(x) \cdot g(x) \, dx = f(b) \cdot \int_a^b g(x) \, dx$$

(3)  $f$  monoton

$$\Rightarrow \exists_{\xi \in [a, b]}: \int_a^b f(x) \cdot g(x) \, dx = f(a) \cdot \int_a^{\xi} g(x) \, dx + f(b) \cdot \int_{\xi}^b g(x) \, dx$$

### 4.7 Das Restglied in der Formel von TAYLOR

#### Satz 4.7.1

Sei  $f$  in  $I_h(x_0)$   $(m+1)$ -fach differenzierbar und  $f^{(m+1)}$  sei stetig auf  $I_h(x_0)$

$$\Rightarrow r_m(x_0, h) = \frac{h^{m+1}}{m!} \cdot \int_0^1 f^{(m+1)}(x_0 + th)(1-t)^m \, dt$$

## 4.8 Numerische Verfahren der Integration

### Satz 4.8.1

Sei  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

- in  $]a, b[$   $(n + 1)$ -fach differenzierbar
- $f, f', \dots, f^{(n)}, f^{(n+1)}$  stetig und stetig auf  $[a, b]$  fortsetzbar.

Dann existiert zu jedem  $x \in [a, b]$  (mindestens) einen Punkt  $\xi \in [a, b]$  mit

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \cdot (x - x_0) \cdot \dots \cdot (x - x_n)$$

## 4.9 Einige Anwendungen der Differenzial- und Integralrechnung

### Definition 4.1

$\varphi$  erzeugt eine Kurve der Klasse  $C^p$ ,  $p \in \mathbb{N}$ , falls zudem

- (1)  $\varphi$   $p$ -fach stetig differenzierbar, Ableitungen stetig in Randpunkt fortsetzbar.
- (2)  $\dot{\varphi}(t) \neq 0$  für  $t \in ]a, b[$

$$\exists \lim_{t \rightarrow a, b} \dot{\varphi} \neq 0$$

Wobei  $\dot{\varphi}(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt}$

### Definition 4.9.1

$\varphi$  erzeugt eine rektifizierbare Kurve der Länge  $L$  g.d.w.

$$\sup_{\delta} l(\delta) = L < \infty.$$

### Satz 4.9.1

Die Abbildung  $\varphi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  erzeugt eine Kurve der Klasse  $C^1$ . Dann

- (1) erzeugt  $\varphi$  eine rektifizierbare Kurve.

$$(2) \quad L = \int_a^b \|\dot{\varphi}(t)\| dt$$

### Definition 4.9.2

$K(s) = \|\kappa(s)\|$  Krümmung

$R(s) = \frac{1}{K(s)}$  Krümmungsradius



## 4.10 Flächen, Volumina

### Definition 4.10.1

Wir nennen  $\Omega$  quadrierbar, falls  $S_*(\Omega) = S^*(\Omega)$  und setzen  $A(\Omega) = S_*(\Omega) = S^*(\Omega)$

### Satz 4.10.1

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig

$a \leq b, f(x) \geq 0$  für  $x \in [a, b]$

$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (a \leq x \leq b) \wedge (0 \leq y \leq f(x))\}$

$\Rightarrow \Omega$  quadrierbar

$$A(\Omega) = \int_a^b f(x) \, dx$$

### Satz 4.10.2

$0 \leq \varphi \leq \beta \leq 2\pi$

$(r, \varphi)$  Polarkoordinaten in  $\mathbb{R}^2$

$f(\varphi) \geq 0$  für  $\varphi \in [\alpha, \beta]$

$\Omega = \{(r, \varphi) \mid 0 \leq r \leq f(\varphi) \wedge \varphi \in [\alpha, \beta]\}$

$f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig

$$\Rightarrow A(\Omega) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} (f(\varphi))^2 \, d\varphi$$

# Lineare Algebra

## 5.1 Matrizen – Grundlagen

### Definition 5.1.1

Eine Matrix vom Typ  $(m, n)$  ist ein rechteckiges Schema von Zahlen aus  $\mathbb{K}$ , wobei  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  oder  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ .

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad m, n \in \mathbb{N}$$
$$= (a_{ij})_{\substack{i=1, \dots, n \\ j=1, \dots, m}}$$

## 5.2 Quadratische Matrizen

### Definition 5.2.1

$$[A, B] = AB - BA \quad (\text{Kommutator})$$
$$\{A, B\} = AB + BA \quad (\text{Antikommutator})$$

Wir sagen, dass  $A$  und  $B$  kommutieren  $\Leftrightarrow [A, B] = 0_n \Leftrightarrow AB = BA$ .  
 $A$  und  $B$  antikommutieren  $\Leftrightarrow \{A, B\} = 0_n$

### Satz 5.2.1

Sei  $A \in M^n(\mathbb{K})$ , sodass  $A$  mit jedem  $B \in M^n(\mathbb{K})$  kommutiert. Dann ist  $A = \alpha \cdot 1_n$  für gewisses  $\alpha \in \mathbb{K}$ .

### Definition 5.2.2: Spur einer quadratischen Matrix

$$\text{Sp } A = \text{sp } A = \text{Tr } A = \text{tr } A = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

### Satz 5.2.2

$A \in M^{m,n}, B \in M^{n,m}$

Dann ist  $AB \in M^m, BA \in M^n$  und  $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$ .

### Satz 5.2.3

Für  $\sigma, \tau \in S_n$  gilt immer

$$\varepsilon(\sigma\tau) = \varepsilon(\sigma) \cdot \varepsilon(\tau)$$

### 5.3 $\mathbb{R}^n$ bzw. $\mathbb{C}^n$ als Raum der Spaltenvektoren

### 5.4 Permutationen

### 5.5 Determinanten

#### Definition 5.5.1

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \cdot (a)_{\sigma} = \sum_K \varepsilon(K) a_{1k_1} \cdot \dots \cdot a_{nk_n}$$

#### Satz 5.5.1 Entwicklungssatz (LAPLACE)

$$A = (a_{ij})_{i=1, \dots, n}^{j=1, \dots, n}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{l1} & \dots & a_{lk} & \dots & a_{ln} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nk} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{j=1}^n (-1)^{l+j} \cdot a_{lj} \cdot M_{lj} \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+k} \cdot a_{ik} \cdot M_{ik} \end{aligned}$$

### 5.6 Inverse Matrizen

#### Definition 5.6.1

Sei  $A \in M^{m,n}$ .

Man nennt  $B_L \in M^{n,m}$  linksinvers zu  $A$

$$\Leftrightarrow B_L \cdot A = \mathbb{1}_n \in M^{n,n}.$$

Man nennt  $B_R \in M^{n,m}$  rechtsinvers zu  $A$

$$\Leftrightarrow A \cdot B_R = \mathbb{1}_m \in M^{m,m}.$$

#### Satz 5.6.1

Sei  $A \in M^n$ , also  $m = n$ . Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- (1)  $A$  besitzt eine linksinverse Matrix  $B_L$ .
- (2)  $A$  besitzt eine rechtsinverse Matrix  $B_R$ .
- (3)  $A$  besitzt eine inverse Matrix  $A^{-1}$ .
- (4)  $\det A \neq 0$ .

### Definition 5.6.2

Man nennt  $A \in M^n$

- regulär, falls  $\det A \neq 0$
- singulär, falls  $\det A = 0$

$A \in M^n$  invertierbar  $\Leftrightarrow$  regulär.

### Satz 5.6.2

Sei  $A \in M^n$  regulär.

Dann besitzt (\*) für jede beliebige rechte Seite genau eine Lösung.

$$\mathbb{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A^{-1} \cdot \mathbb{f} = A^{-1} \cdot \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}$$

## 5.7 Der Rang einer Matrix

### Definition 5.7.1

$A \in M^{m,n}$  besitzt den Rang  $r = r(A) \geq 1$ , falls es eine Minor  $\tilde{A}$  der Ordnung  $r$  gibt, mit  $\det \tilde{A} \neq 0$ , und falls für alle Minoren der Ordnungen  $> r$  deren Determinanten gleich null sind.

### Definition 5.7.2

Ein System von Spalten(vektoren)  $\mathbb{x}, \dots, \mathbb{x}_k$  nennt man linear unabhängig, falls

$$\alpha_1 \mathbb{x}_1 + \dots + \alpha_k \mathbb{x}_k = \mathbb{0}_n \Leftrightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$$

Analog: Zeilen(vektoren)

Sonst: linear abhängig

### Definition 5.7.3

Der Spaltenrang  $r_s(A)$  von  $A \in M^{m,n}$  ist die größtmögliche Anzahl linear unabhängiger Spalten von  $A$ .

### Definition 5.7.4

Der Zeilenrang  $r_z(A)$  von  $A \in M^{m,n}$  ist die größtmögliche Anzahl linear unabhängiger Zeilen von  $A$ .

### Satz 5.7.1 Satz vom Rang

$$r(A) = r_z(A) = r_s(A)$$

### Definition 5.7.5

Die Dimension eines Vektorraums ist die größtmögliche Anzahl linear unabhängiger Vektoren aus diesem Raum.

**Definition 5.7.6: Lineare Hülle**

$$\{\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_k f_k : \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}\} = V\{f_1, \dots, f_k\} = \bigvee_{j=1}^k \{f_j\}$$

lineare Hülle des Systems  $\{f_1, \dots, f_k\}$

**Satz 5.7.2**

$\{f_1, \dots, f_k\} \subset E$  linear unabhängig  
 $k \in \mathbb{N}, \bigvee_{j=1}^k f_j = E$

$$\Rightarrow \dim E = k$$

**Satz 5.7.3**

$\dim E = k \in \mathbb{N}$   
 $\{f_1, \dots, f_k\}$  linear unabhängig

$$\Rightarrow E = V\{f_1, \dots, f_k\}$$

**Definition 5.7.7**

$\{f_1, \dots, f_k\}$  ist eine Basis in  $E$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \{f_1, \dots, f_k\} \text{ linear unabhängig} \\ \bigvee_{j=1}^k \{f_j\} = E \text{ vollständig} \end{cases}$$

**Definition 5.7.8**

Man nennt  $L \subset E$  einen Unterraum von  $E$ , falls

$$\left. \begin{array}{l} \forall f, g \in L \\ \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha f + \beta g \in L$$

**Satz 5.7.4 Dimensionssatz**

$A \in M^{m,n}$

$$\dim \ker(A) = \dim W(A) = \dim \ker(A) + r(A) = n$$

**Satz 5.7.5**

$A \cdot x = f$  ist für jedes  $f \in \mathbb{K}^n$  lösbar, genau dann wenn

$$r(A) = m.$$

## 5.8 Determinante

## 5.9 Das Spektrum. Eigenvektoren. Resolvente.

### Definition 5.9.1: Charakteristisches Polynom

$$d_A(\lambda) = \det(A - \lambda \mathbb{1})$$

### Definition 5.9.2

$\mu_1, \dots, \mu_k$  Eigenwerte von  $A$   
 $\tau_1, \dots, \tau_k$  Algebraische Vielfachheit

### Definition 5.9.3

$\sigma(A) = \{\mu_1, \dots, \mu_k\} \subset \mathbb{C}$  Spektrum von  $A$ .

### Definition 5.9.4

$\kappa = \dim E_\mu$  geometrische Vielfachheit des Eigenwerts  $\mu$ .

### Definition 5.9.5

$\rho(A) = \mathbb{C} \setminus \sigma(A)$  Resolventenmenge.

$$\begin{aligned} \mu \in \rho(A) &\Leftrightarrow d_A(\lambda) = \det(A - \mu \mathbb{1}) \neq 0 \\ &\Leftrightarrow A - \mu \mathbb{1} \text{ invertierbar} \\ &\Leftrightarrow \text{Es existiert } (A - \mu \mathbb{1})^{-1} \end{aligned}$$

### Definition 5.9.6

$\mu \in \rho(A)$

$$\Gamma_\mu(A) = (A - \mu \mathbb{1})^{-1}$$

Resolvente von  $A$  im Punkt  $\mu \in \rho(A)$ .

$$\Gamma_\mu(A): \rho(A) = \mathbb{C} \setminus \sigma(A) \rightarrow M^{n,n}$$

### Definition 5.9.7

Für  $A \in M^s$  und  $p(z) = c_n z^n + \dots + c_1 z + c_0$   $c_k, z \in \mathbb{C}$   
sei

$$\begin{aligned} p(A) &= c_n A^n + \dots + c_1 A + c_0 \mathbb{1} \\ p: M^s &\rightarrow M^s \end{aligned}$$

### Definition 5.9.8

Eine Matrix  $B \in M^{n,n}$  heißt diagonalisierbar, genau dann, wenn sie zu einer Diagonalmatrix ähnlich ist. Das heißt, es gibt  $A = \text{diag}\{a_1, \dots, a_n\}$  und es gibt  $X \in M^{n,n}, \det X \neq 0$ , sodass

$$B = X^{-1} A X$$

**Definition 5.9.9**

$$f: \sigma(A) \rightarrow \mathbb{C}$$

$$f(A) := \text{diag}\{f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_n)\}$$

**Definition 5.9.10**

$$f: \sigma(B) \rightarrow \mathbb{C}$$

$$B = X^{-1} \cdot \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\} X$$

$$f(B) = X^{-1} \cdot \text{diag}\{f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_n)\} X$$

## 5.10 Ähnlichkeit von Matrizen

## 5.11 Orthogonale und unitäre Matrizen

**Definition 5.11.1**

$$x \perp y \Leftrightarrow \langle x, y \rangle = 0 \text{ orthogonal}$$

**Definition 5.11.2**

Ein Vektor  $x \in \mathbb{K}$  heißt normiert, falls  $\|x\| = 1$ .

**Definition 5.11.3**

Ein System von Vektoren  $\{y_1, \dots, y_k\}$  heißt orthonormiert (ON), genau dann, wenn

$$\langle y_j, y_l \rangle = \delta_{jl} \quad j, l = 1, \dots, k$$

ONS System von orthonormalen Vektoren.

Bildet ein ONS eine Basis im  $\mathbb{K}^n$ , spricht man von einer Orthonormalbasis (ONB).

## 5.12 Symmetrische und Hermitesche Matrizen

**Definition 5.12.1**

$$\mathbb{K} = \mathbb{R}$$

Wir nennen  $A \in M^n$  symmetrisch, genau dann, wenn  $A = A^T$ .

**Definition 5.12.2**

$$\mathbb{K} = \mathbb{C}$$

Wir nennen  $A \in M^n$  hermitisch (bzw. selbstadjungiert), genau dann, wenn  $A = A^*$ .

**Satz 5.12.1**

Sei  $A = A^T$  (falls  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ) bzw.  $A = A^*$  (falls  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ). Es seien  $\lambda_1, \lambda_2$  Eigenwerte von  $A$ , und  $x_1, x_2$  zugehörige Eigenvektoren. Aus  $\lambda_1 \neq \lambda_2$  folgt dann

$$\langle x_1, x_2 \rangle = 0, \text{ d.h. } x_1 \perp x_2.$$

**Definition 5.12.3** $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 

Man nennt  $A \in M^n(\mathbb{R})$  orthogonal diagonalisierbar, genau dann, wenn eine orthogonale Matrix  $Y \in M^n(\mathbb{R})$  existiert, sodass

$$Y^T = Y^{-1}AY = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}.$$

**Definition 5.12.4** $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 

Man nennt  $A \in M^n(\mathbb{C})$  unitär diagonalisierbar, genau dann, wenn eine unitäre Matrix  $Y \in M^n(\mathbb{C})$  existiert, sodass

$$Y^* = Y^{-1}AY = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}.$$

**Satz 5.12.2** $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 

Jede symmetrische Matrix  $A \in M^n(\mathbb{R})$  besitzt eine ONB aus Eigenwerten im  $\mathbb{R}^n$  und ist somit orthogonal diagonalisierbar.

 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 

Jede hermitesche Matrix  $A \in M^n(\mathbb{C})$  besitzt eine ONB aus Eigenwerten im  $\mathbb{C}^n$  und ist somit unitär diagonalisierbar.

**Satz 5.12.3 Spektralsatz für unitäre Matrizen**

Unitäre Matrizen sind unitär diagonalisierbar.

## 5.13 Wechsel des Koordinatensystems – Basiswechsel

**Satz 5.13.1**

$A \in M^n$  ist unitär diagonalisierbar, falls

$$AA^* = A^*A.$$

Solche Matrizen nennt man normal.

**Definition 5.13.1**

$$A \in M^{n,n}(\mathbb{C}) \text{ normal} \Leftrightarrow AA^* = A^*A.$$

**Satz 5.13.2**

$A \in M^n$  ist genau dann unitär diagonalisierbar, wenn  $A$  normal ist.

**Satz 5.13.3**

Zwei normale Matrizen  $A$  und  $B$  kommutieren genau dann, wenn sie eine gemeinsame ONB von Eigenvektoren besitzen.



## 5.14 Direkte und orthogonale Summen von Unterräumen

### Definition 5.14.1

$$F + G := \{h \in V: h = f + g, f \in F, g \in G\}$$

$F + G$  ist ein Unterraum:

$$\begin{aligned} h_1 &= f_1 + g_1, h_2 = f_2 + g_2 \\ \Rightarrow h &= \alpha h_1 + \beta h_2 = \underbrace{(\alpha f_1 + \beta f_2)}_{f \in F} + \underbrace{(\alpha g_1 + \beta g_2)}_{g \in G} \end{aligned}$$

### Definition 5.14.2

Wir nennen  $H = F + G$  eine direkte Summe von Unterräumen, wenn für jedes  $h \in H$  die Darstellung  $h = f + g$ ,  $f \in F$ ,  $g \in G$  eindeutig ist:

$$H = F \dot{+} G$$

### Satz 5.14.1

$F, G \subset V$  Unterräume

$H = F + G$  (im Allgemeinen nicht direkt)

$$\Rightarrow \dim(F + G) + \dim(F \cap G) = \dim F + \dim G$$

### Definition 5.14.3

$$H = F_1 + \dots + F_m = \{h \in V: h = f_1 + \dots + f_m, f_j \in F_j, j = 1, \dots, m\}$$

Falls die Zerlegung  $h = f_1 + \dots + f_m$  für jedes  $h \in H$  eindeutig ist, dann nennt man die Summe direkt.

$$H = F_1 \dot{+} F_2 \dot{+} \dots \dot{+} F_m$$

### Definition 5.14.4

$$F \perp G \Leftrightarrow f \perp g \quad \forall f \in F, g \in G$$

Sind  $F, G$  Unterräume von  $V$  und  $F \perp G$

$$H = F + G = F \oplus G = F \dot{+} G$$

### Satz 5.14.2

Jede Matrix  $A \in M^n$  mit einem Eigenwert  $\lambda$  der algebraischen Vielfachheit  $\tau = n$  und der geometrischen Vielfachheit  $\kappa = 1$  lässt sich in der Form

$$A = X^{-1} J^{(n)}(\lambda) X$$

mithilfe einer regulären Matrix  $X \in M^n$  darstellen.

## 5.15 Orthogonale Projektionen

### Definition 5.15.1

$\xi_k = \langle x, f_k \rangle$ ,  $k = 1, \dots, n$  nennt man die FOURIER-Koeffizienten von  $x$  bzgl. der ONB  $\mathbb{f}$ .

### Satz 5.15.1

$x \in V$

$\xi_j = \langle x, f_j \rangle$ ,  $j = 1, \dots, s$

Es gilt immer:

$$\left\| x - \sum_{j=1}^s \beta_j f_j \right\| \geq \left\| x - \sum_{j=1}^s \xi_j f_j \right\|$$

### Satz 5.15.2

Für jedes  $y = \beta_1 f_1 + \dots + \beta_s f_s \in F$  gilt

$$\|x - y\| \geq \|x - x_F\|$$

### Satz 5.15.3 Projektionssatz

Sei  $F \subset V$  ein Unterraum. Dann existiert für jedes  $x \in V$  genau eine Zerlegung  $x = x_F + x_G$  mit  $x_F \in F$  und  $x_G \perp F$ .

### Definition 5.15.2

$P_F: V \rightarrow F$  mit  $P_F x = x_F$  nennt man die orthogonale Projektion auf  $F$ .

### Definition 5.15.3

$G = \{g \in V: g \perp F\} = F^\perp$  nennt man das orthogonale Komplement zu  $F$ .

## 5.16 Selbstadjungierte Operatoren und quadratische Formen

### Satz 5.16.1

Zu jeder sesqui-linearen Form  $a$  existiert genau eine lineare Abbildung  $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ , so, dass (\*) gilt.

### Definition 5.16.1

Der zu  $\mathcal{A}$  adjungierte Operator  $A^*$  ist durch  $a^*$  gegeben:

$$\langle A^* x, y \rangle = a^*[x, y] = \overline{a[y, x]}.$$

Mit  $\langle A^* x, y \rangle = \langle x, \mathcal{A} y \rangle$  und  $\overline{a[y, x]} = \overline{\langle \mathcal{A} y, x \rangle}$ :

$$\langle x, \mathcal{A} y \rangle = \overline{\langle \mathcal{A} y, x \rangle}.$$

## 5.17 Stetige lineare Operatoren

### Definition 5.17.1

$E, F$  Vektorräume über  $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$  mit Normen  $\|\cdot\|_E$  und  $\|\cdot\|_F$ .

$F: E \rightarrow F$  linear.

Ein linearer Operator  $T: E \rightarrow F$  heißt beschränkt, genau dann, wenn

$$\exists_{C>0} \quad \forall_{x \in E}: \quad \|Tx\|_F \leq C \cdot \|x\|_E.$$

### Satz 5.17.1

Folgende Aussagen sind äquivalent:

- (1)  $T$  ist von  $E$  nach  $F$  beschränkt.
- (2)  $T$  ist in  $0_E$  stetig.
- (3)  $T$  ist auf  $E$  stetig.

### Definition 5.17.2

$\mathcal{L}(E, F)$  sei die Menge aller stetigen linearen Abbildungen  $T: E \rightarrow F$ .

### Satz 5.17.2 Operatornorm

$\mathcal{L}(E, F)$  ist ein Vektorraum über  $\mathbb{K}$ .

$$\|T\|_{\mathcal{L}(E, F)} = \sup_{x \in E, x \neq 0} \frac{\|Tx\|_F}{\|x\|_E}$$

ist eine Norm auf  $\mathcal{L}(E, F)$ . Sind  $E$  und  $F$  vollständig, dann ist auch  $\mathcal{L}(E, F)$  vollständig.

# Zur Diff.-rechnung für Funktionen mehrerer Var.

## 6.1 Differenzierbarkeit

### Definition 6.1.1: Partielle Ableitung in $x_j$ -Richtung

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x_j} \right|_{x=x^{(0)}} = \left. \frac{d(f(x^{(0)} + t e_j))}{dt} \right|_{t=0} = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{f(x_1^{(0)}, \dots, x_{j-1}^{(0)}, x_j^{(0)} + \tau, x_{j+1}^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})}{\tau}$$

### Definition 6.1.2

$f$  ist im Punkt  $x^{(0)} \in U$  (FRÉCHET)-differenzierbar, genau dann, wenn  $A \in \mathcal{L}(E, F)$  mit

$$f(x^{(0)} + h) = f(x^{(0)}) + A \cdot h + o(h), \quad h \rightarrow 0_E.$$

Dann ist  $df|_{x=x^{(0)}} = A$ .

### Definition 6.1.3

Die Richtungsableitung  $Df(x^{(0)})h$  ist gegeben als

$$Df(x^{(0)})h = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x^{(0)} + th) - f(x^{(0)})}{t} = \left. \frac{d}{dt} f(x^{(0)} + th) \right|_{t=0}.$$

(jeweils für fixiertes  $h$ )

### Satz 6.1.1

Wenn  $f: U \subset E \rightarrow F$  in  $x^{(0)} \in U$  FRÉCHET-differenzierbar ist, dann existieren alle Richtungsableitungen  $Df(x^{(0)})h$  (für alle  $h \in E$ ).

### Definition 6.1.4

$f$  ist in  $x^{(0)} \in U$  schwach differenzierbar (GÂTEAUX-differenzierbar), genau dann, wenn

- (1)  $Df(x^{(0)})h$  existiert für alle  $h \in E$ .
- (2)  $Df(x^{(0)})h$  ist linear in  $h$ .
- (3)  $Df(x^{(0)})h$  ist stetig in  $h$ .

$$f'_s(x^{(0)})h = Df(x^{(0)})h; \quad f'_s(x^{(0)}) \in \mathcal{L}(E, F)$$

### Satz 6.1.2

Wenn  $f$  in  $x^{(0)}$  FRÉCHET-differenzierbar ist, dann ist  $f$  in  $x^{(0)}$  schwach differenzierbar und  $f'_s(x^{(0)}) = f'(x^{(0)})$ .

### Satz 6.1.3

$$\begin{aligned} x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_j}(x), \quad j = 1, \dots, n \text{ stetig in } x^{(0)} &\Rightarrow \exists f'_s(x^{(0)}) \\ x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_j}(x), \quad j = 1, \dots, n \text{ stetig in } B_\varepsilon(x^{(0)}) &\Rightarrow \exists f'(x^{(0)}) \end{aligned}$$

## 6.2 Produkt- und Kettenregel

### Satz 6.2.1

$f: U \rightarrow F$  und  $\alpha: U \rightarrow \mathbb{R}$  seien in  $x^{(0)} \in U$  FRÉCHET-differenzierbar. Dann ist  $\alpha \cdot f: U \rightarrow F$  in  $x^{(0)}$  FRÉCHET-differenzierbar.

$$(\alpha f)'(x^{(0)}) = \alpha(x^{(0)})f'(x^{(0)}) + f(x^{(0)})\alpha'(x^{(0)})$$

### Satz 6.2.2

$f$  sei in  $x^{(0)} \in U$  FRÉCHET-differenzierbar.

$g$  sei in  $y^{(0)} \in V$  FRÉCHET-differenzierbar.

$\Rightarrow$  Dann ist  $g \circ f: U \rightarrow G$  FRÉCHET-differenzierbar.

## 6.3 Hauptsatz der Differenzialrechnung

### Satz 6.3.1

$f$  sei auf  $\overline{ab}$  GÂTEAUX-differenzierbar.

Dann gilt:

$$\begin{aligned} (1) \quad \|f(b) - f(a)\|_F &\leq \sup_{x \in \overline{ab}} \left( \|f'_s(a)\|_{\mathcal{L}(E,F)} \cdot \|b - a\|_E \right) \\ (2) \quad \|f(b) - f(a) - f'_s(a)(b - a)\|_F &\leq \sup_{x \in \overline{ab}} \left( \|f'_s(x) - f'_s(a)\|_{\mathcal{L}(E,F)} \cdot \|b - a\| \right) \end{aligned}$$

## 6.4 Ableitungen höherer Ordnung

### Definition 6.4.1

Ist  $g$  in  $x^{(0)} \in U$  partiell in  $x_k$  differenzierbar, dann sei

$$\frac{\partial g(x^{(0)})}{\partial x_k} = \left( \frac{\partial}{\partial x_k} \left( \frac{\partial f}{\partial x_j} \right) \right) \Big|_{x=x^{(0)}} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j} \Big|_{x=x^{(0)}}.$$

### Satz 6.4.1 Symmetriesatz

Wenn in  $U$  beide partiellen Ableitungen

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j} \text{ und } \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k}$$

existieren, und beide stetig sind, dann gilt auf  $U$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k}.$$

### Definition 6.4.2

Wenn  $f'(\cdot)$  in  $x^{(0)} \in U$  FRÉCHET-differenzierbar ist, dann sei

$$f''(x^{(0)}) = (f'(\cdot))'|_{x=x^{(0)}} \in \mathcal{L}(E, \mathcal{L}(E, F))$$

## 6.5 Der Satz von TAYLOR

## 6.6 Extremwerte von Funktionen mit mehreren Veränderlichen

### Definition 6.6.1

$f$  nimmt in  $x^{(0)}$  ein  
lokales Maximum an

$$\Leftrightarrow \exists_{\varepsilon>0} \forall_{x \in U, \|x-x^{(0)}\|<\varepsilon: f(x) \leq f(x^{(0)})$$

lokales Maximum an

$$\Leftrightarrow \exists_{\varepsilon>0} \forall_{x \in U, \|x-x^{(0)}\|<\varepsilon: f(x) \geq f(x^{(0)})$$

### Satz 6.6.1 Notwendiges Kriterium

$f: U \subset E \rightarrow \mathbb{R}$  nehme in den inneren Punkten  $x^{(0)} \in U$  einen lokalen Extremwert an. Wenn die Richtungsableitung  $Df(x^{(0)})h$  existiert, so muss dann

$$Df(x^{(0)})h = 0$$

gelten.

## 6.7 Der Satz über implizite Funktionen

### Definition 6.7.1: Lokale Auflösbarkeit

$$(x^{(0)}, y^{(0)}) \in W$$

$$\Phi(x^{(0)}, y^{(0)}) = 0$$

$\Phi(x, y) = 0$  ist lokal in einer Umgebung von  $(x^{(0)}, y^{(0)})$  zu  $y = f(x)$  auflösbar, genau dann, wenn

$$\exists_{\varepsilon>0} \exists_{\delta>0} \exists f: U_{\varepsilon}(x^{(0)}) \rightarrow U_{\delta}(y^{(0)})$$

$$U_{\varepsilon}(x^{(0)}) \times U_{\delta}(y^{(0)}) \subset W$$

$$(1) \quad \forall_{x \in U_{\varepsilon}(x^{(0)})}: \quad \Phi(x, f(x)) = 0$$

$$(2) \quad \forall_{(x,y) \in U_{\varepsilon}(x^{(0)}) \times U_{\delta}(y^{(0)})}: \quad \Phi(x, y) = 0 \quad \Rightarrow \quad y = f(x)$$

### Satz 6.7.1 zu impliziten Funktionen

$W \subset \mathbb{R}_x^m \times \mathbb{R}_y^n$  offen

$$(x^{(0)}, y^{(0)}) \in W$$

$$\Phi: W \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$\Phi(x^{(0)}, y^{(0)}) = 0$$

$\Phi$  sei aus der Klasse  $C^p$ ,  $p \geq 1$  (d.h. alle partiellen Ableitungen bis zur Ordnung  $p$  existieren und sind stetig).

$\Phi'_y(x^{(0)}, y^{(0)})$  ist invertierbar

$\Rightarrow \quad \Phi$  ist lokal zu  $y = f(x)$  auflösbar und  $f$  ist von der Klasse  $C^p$ .

## 6.8 Umkehrfunktion

### Definition 6.8.1

$f: U \rightarrow V$  ist ein  $C^p$ -Diffeomorphismus genau dann, wenn

- $f: U \rightarrow V$  bijektiv
- $f, f^{-1}$  aus der Klasse  $C^p$

### Satz 6.8.1

idk

## 6.9 Darstellung von Gradient und LAPLACE in verschiedenen Koordinatensystemen

## 6.10 Extremwerte unter Nebenbedingungen

### Definition 6.10.1: LAGRANGE-Funktion

$$\mathcal{L}(x, y; \lambda) = f(x, y) - \lambda \cdot F(x, y)$$

$\lambda$  : LAGRANGE-Faktor

**Definition 6.10.2**

$$(1) \quad F(\tilde{x}^{(0)}) = \mathbb{0}_n$$

$$(2) \quad \exists_{\varepsilon > 0} \quad \forall_{\tilde{x} \in U_\varepsilon(\tilde{x}^{(0)}, F(\tilde{x}) = \mathbb{0}_n) : \quad f(\tilde{x}^{(0)}) \geqslant f(\tilde{x}) \text{ bzw. } f(\tilde{x}^{(0)}) \leqslant f(\tilde{x})$$



# Funktionenfolgen

## 7.1 Doppelfolgen, Gleichmäßigkeit

### Definition 7.1.1: Doppelfolge

$a: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow M$

also:

$$(a_{m,n})_{m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}} = (a_{m,n})$$

### Definition 7.1.2

$A(\cdot)$  Aussageform, Eigenschaft

$X$  Variablenmenge

$A$  ist für alle  $x \in X$  punktweise erfüllt, genau dann, wenn

$$\forall_{x \in X}: A(x) \text{ wahr}$$

Dabei können die Parameter, die in  $A$  eingehen von  $x$  abhängen.

### Definition 7.1.3

$A$  ist gleichmäßig bzgl.  $x \in X$  erfüllt, genau dann, wenn  $\forall_{x \in X}: A(x)$  wahr ist, und wenn die Parameter, welche in  $A$  eingehen, unabhängig von  $x$  gewählt werden können.

### Satz 7.1.1 Satz über das Vertauschen von Grenzwerten

$(M, d)$  vollständiger metrischer Raum

$a: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow M$

$$(1) \quad \forall_{n \in \mathbb{N}} \quad \exists \lim_{m \rightarrow \infty} a_{m,n} = v_n$$

$$(2) \quad \forall_{m \in \mathbb{N}} \quad \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_{m,n} = u_m$$

Einer dieser beiden Grenzwerte werde gleichmäßig angenommen.

$\Rightarrow$

- $(u_m)$  und  $(v_n)$  konvergieren
- $\lim_{m \rightarrow \infty} u_m = \lim_{n \rightarrow \infty} v_n$

Damit darf ich unter der zusätzlichen Annahme der Gleichmäßigkeit eines der Grenzwerte die doppelten Grenzwerte vertauschen:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left( \lim_{n \rightarrow \infty} a_{m,n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \lim_{m \rightarrow \infty} a_{m,n} \right)$$

## 7.2 Funktionenfolgen

$(M, d) = (\mathbb{R}, |\cdot|)$ ,  $I \subset \mathbb{R}$ ,  $I \neq \emptyset$

$f, f_n: I \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$

$(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  Funktionenfolge

### Definition 7.2.1

$f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f$  punktweise bzgl.  $x \in I$  genau dann, wenn

$$\forall_{x \in I} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$

d.h.

$$\forall_{x \in I} \forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N(\varepsilon, x)} \forall_{n > N}: |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

### Definition 7.2.2

$f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f$  gleichmäßig bzgl.  $x \in I$  genau dann, wenn

$$\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N(\varepsilon)} \forall_{x \in I} \forall_{n \geq N(\varepsilon)}: |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

### Satz 7.2.1

$f_n: I \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $x_0 \in I$

$$(1) \forall_{n \in \mathbb{N}} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = \varphi_n$$

$$(2) f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f, f: I \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n$$

## 7.3 Die Folge der Ableitungen

### Satz 7.3.1

$f_n \in C^1([a, b], \mathbb{R})$ ,  $\varphi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

$f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f$  punktweise für alle  $x \in [a, b]$

$f'_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \varphi$  gleichmäßig bzgl.  $x \in [a, b]$

$\Rightarrow f \in C^1([a, b], \mathbb{R})$  und  $\varphi = f'$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{df_n}{dx} = \frac{d}{dx} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$$

## 7.4 Funktionenreihen

$f_n: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$ ,  $x \in I$

### Definition 7.4.1

Die Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$  konvergiert punktweise für alle  $x \in I$  genau dann, wenn

$$S_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} S(x) =: \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$$

punktweise konvergiert.

### Definition 7.4.2

Die Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$  konvergiert gleichmäßig bzgl.  $x \in I$  genau dann, wenn

$$S_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x).$$

### Satz 7.4.1

$f_n \in C([a, b], \mathbb{R})$ ,  $n \in \mathbb{N}$  und  $S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$  konvergiere gleichmäßig.

Dann ist  $S \in C([a, b], \mathbb{R})$

## 7.5 Potenzreihen

## 7.6 Der Fixpunktsatz von BANACH

$(M, d)$  metrischer Raum,  $M \neq \emptyset$

### Definition 7.6.1

Man nennt  $T: M \rightarrow M$  eine Kontraktion, wenn ein  $\alpha < 1$  existiert, sodass für alle  $x, y \in M$

$$d(Tx, Ty) \leq \alpha \cdot d(x, y).$$

### Satz 7.6.1

Sei  $(M, d)$  vollständig und  $T: M \rightarrow M$  eine Kontraktion. Dann gibt es genau ein  $\tilde{x} \in M$ , sodass

$$\underbrace{\tilde{x} = T\tilde{x}}_{\text{Fixpunkt}}.$$

$f(x)$

$f(x)$

$f(x)$