

Álgebra Linear

Douglas Smigly

MAT5730

2º semestre de 2019

Conteúdo

Informações da Disciplina	5
1 Espaços vetoriais	7
1.1 Definições Iniciais	7
1.2 Base e Dimensão	8
1.3 Subespaços	12
1.4 Coordenadas	15
2 Transformações Lineares	17
2.1 Definições	17
2.2 Espaço Dual	18
2.3 Espaço Bidual	19
2.4 Anuladores	20
2.5 Transpostas	21
2.6 Espaços Quocientes	22
3 Determinantes	25
3.1 Formas Multilineares	25
3.2 Determinantes	27
4 Formas Canônicas	31
4.1 Espectro de um Operador	31
4.1.1 Autovalores e Autovetores	31
4.1.2 Polinômio Característico	31
4.1.3 Polinômio Minimal	35
4.2 Restrições de Operadores	36
4.2.1 Subespaços Invariantes	36
4.2.2 Subespaços Cíclicos	38
4.3 Teoremas de Cayley-Hamilton	39
4.3.1 Teorema de Cayley-Hamilton Usual	39
4.3.2 Teorema de Cayley Hamilton ao Avesso	39
4.4 Decomposições Primárias	40
4.4.1 Decomposição Primária Geral	40
4.4.2 Decomposição Primária para Minimais	41
4.4.3 Decomposição Primária para Característicos	42
4.5 Critérios de Diagonalização	43
4.5.1 Diagonalização Usual	43
4.5.2 Diagonalização Simultânea de Vários Operadores	43
4.6 Triangularização de Matrizes	43
4.6.1 Triangularização Usual	43
4.6.2 Triangularização Simultânea de Vários Operadores	44
4.6.3 Quase Triangularização	45
4.7 Decomposições Cíclicas	45

CONTEÚDO

CONTEÚDO

4.7.1	Espaços Primários	45
4.7.2	Decomposição Cíclica em Divisores Elementares	48
4.7.3	Decomposição Cíclica em Fatores Invariantes	49
4.8	Formas Racionais de Matrizes	50
4.8.1	Matrizes Companheiras	50
4.8.2	Forma Racional para Divisores Elementares	50
4.8.3	Forma Racional para Fatores Invariantes	51
4.9	Formas de Jordan de Matrizes	52
4.9.1	Forma de Jordan Usual	52
4.9.2	Forma de Jordan Generalizada	54
4.9.3	Forma de Jordan Real	55
4.10	Espaços Indecomponíveis	56
4.10.1	Espaços Cíclicos	56
4.10.2	Espaços Indecomponíveis	56
4.10.3	Teorema de Cauchy	57
5	Espaços com Produto Interno	59
5.1	Definições e Exemplos	59
5.2	Matriz de Gramm	60
5.3	Espaços Normados	61
5.4	Ortogonalidade	62
5.5	Funcionais Lineares	62
5.6	Transformação Adjunta	64
5.7	Operadores Unitários	65
5.8	Operadores Normais	68
5.9	Formas Canônicas	69
5.9.1	Caso dos Números Complexos	69
5.9.2	Caso dos Números Reais	69
5.10	Operadores Positivos	71
5.11	Matriz de Gram	71
6	Formas Bilineares	75
6.1	Definições e Exemplos	75
6.2	Formas Não Degeneradas	76
6.3	Formas Quadráticas	78
6.4	Produto Tensorial	78
6.5	Extensão Escalar	79
7	Mecânica Quântica	81
7.1	Postulados	81
7.2	Princípio da Incerteza	83

Informações da Disciplina

Informações Básicas

Essas são as notas de aula de Álgebra Linear (MAT5730), as aulas acontecem na sala B-134 às terças 10h e às quintas 8h.

Informações do Professor

O professor é o Ivan Shestakov, sua sala é a 290-A e o seu e-mail é shestak@ime.usp.br

Bibliografia

- [1] Flávio Coelho and Mary Lilian Lourenço. *Um Curso de Álgebra Linear*. Edusp, 2001.
- [2] Werner H. Greub. *Multilinear Algebra*. Springer, 1978.
- [3] Werner H. Greub. *Linear Algebra*. Springer, 1981.
- [4] Kenneth Hoffman and Ray Kunze. *Linear Algebra*. Prentice Hall, 1971.
- [5] Steven Roman. *Advanced Linear Algebra*. Springer, 2005.

Avaliação

A nota final da disciplina será a média aritmética de P1, P2, e P3. Todos os alunos poderão fazer a prova sub para substituir a menor das suas notas (Sub aberta). As datas das provas são as seguintes:

Prova	Data
P1	10-09
P2	15-10
P3	12-11
SUB	19-11

Outras Informações

- (i) Teremos listas, que não contarão para a nota
- (ii) As listas serão publicadas em
- (iii) Não haverá monitoria

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

Capítulo 1

Espaços vetoriais

1.1 Definições Iniciais

Definição 1.1. Um **grupo abeliano** é um conjunto X munido do seguinte:

- $+: X \times X \rightarrow X$,
- $0 \in X$,
- $-: X \rightarrow X$,

satisfazendo as seguintes propriedades:

- Para $x, y, z \in X$ então $(x + y) + z = x + (y + z)$,
- Para $x, y \in X$ então $x + y = y + x$,
- Para $x \in X$ então $x + 0 = x$,
- Para $x \in X$ então $x + (-x) = 0$.

Definição 1.2. Um **corpo** é um grupo abeliano $(K, +, 0, -)$ munido do seguinte:

- $\cdot: K \times K \rightarrow K$,
- $1 \in K$,
- $\cdot^{-1}: K \setminus \{0\} \rightarrow K$,

satisfazendo as seguintes propriedades:

- Para $x, y, z \in K$ então $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$,
- Para $x, y \in K$ então $x \cdot y = y \cdot x$,
- Para $x \in K$ então $x \cdot 1 = x$,
- Para $x \in K \setminus \{0\}$ então $x \cdot x^{-1} = 1$,
- Para $x, y, z \in K$ então $x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$.

Definição 1.3. Dado K um corpo, um **espaço vetorial sobre K** é um grupo abeliano $(V, +, 0, -)$ munido do seguinte:

- $\cdot: K \times V \rightarrow V$,

satisfazendo as seguintes propriedades:

- Para $a, b \in K$ e $x \in V$ então $(a \cdot b) \cdot x = a \cdot (b \cdot x)$,
- Para $x \in V$ então $x \cdot 1 = x$,
- Para $a \in K$ e $x, y \in V$ então $a \cdot (x + y) = (a \cdot x) + (a \cdot y)$,
- Para $a, b \in K$ e $x \in V$ então $(a + b) \cdot x = (a \cdot x) + (b \cdot x)$.

1.2 Base e Dimensão

Durante o restante deste capítulo, sempre adotaremos K como sendo um corpo qualquer.

Definição 1.4. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K . Seja I um conjunto e $v : I \rightarrow V$ uma função. Uma **combinação linear** de v é um elemento $u \in V$ tal que existam um conjunto finito $J \subseteq I$ e uma função $\alpha : J \rightarrow K$ tais que:

$$u = \sum_{i \in J} \alpha_i v_i.$$

Dizemos que v **gera** V se e só se todo elemento de V é combinação linear de v .

Definição 1.5. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K . Dizemos que um conjunto $S \subseteq V$ **gera** V se e só se a função $v : S \rightarrow V$ dada por $\forall s \in S : v_s = s$ gera V .

Proposição 1.6. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K e sejam I um conjunto e $v : I \rightarrow V$ uma função. Então v gera V se e somente se a imagem $S = \{v_i : i \in I\}$ gera V .

Demonstração. Temos o seguinte:

- Se v gera V , então para $x \in V$ existem um conjunto finito $J \subseteq I$ e uma função $\alpha : J \rightarrow K$ tais que:

$$x = \sum_{i \in J} \alpha_i v_i,$$

aí seja $T = v[J]$, e seja:

$$\forall s \in T : J_s = \{i \in J : v_i = s\};$$

e seja $\beta : T \rightarrow K$ a função dada por:

$$\forall s \in T : \beta_s = \sum_{i \in J_s} \alpha_i,$$

então T é finito, aí temos:

$$x = \sum_{i \in J} \alpha_i v_i = \sum_{s \in T} \sum_{i \in J_s} \alpha_i v_i = \sum_{s \in T} \sum_{i \in J_s} \alpha_i s = \sum_{s \in T} \beta_s s;$$

logo S gera V .

- Se S gera V , então para $x \in V$ existem um conjunto finito $T \subseteq S$ e uma função $\beta : T \rightarrow K$ tais que:

$$x = \sum_{s \in T} \beta_s s,$$

aí existe uma função $i : T \rightarrow I$ tal que:

$$\forall s \in T : v_{i_s} = s,$$

aí seja $J = \text{Im}(i)$, então J é finito e i é uma bijeção de T a J e sua inversa é $u = v \upharpoonright J$, aí seja $\alpha = \beta \circ u$, então:

$$x = \sum_{s \in T} \beta_s s = \sum_{j \in J} \beta_{u_j} u_j = \sum_{j \in J} \alpha_j u_j = \sum_{j \in J} \alpha_j v_j;$$

logo v gera V . □

Definição 1.7. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K e seja I um conjunto e seja $v : I \rightarrow V$ uma função. Dizemos que v é **linearmente independente** se e só se para todo conjunto finito $J \subseteq I$ e toda função $\alpha : J \rightarrow K$, então temos a implicação:

$$\sum_{i \in J} \alpha_i v_i = 0 \quad \Rightarrow \quad \forall i \in J : \alpha_i = 0.$$

Dizemos que v é **linearmente dependente** se e só se v não é linearmente independente.

Definição 1.8. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K e seja $S \subseteq V$ um conjunto. Dizemos que S é **linearmente independente** se e só se a função $v : S \rightarrow V$ dada por $\forall s \in S : v_s = s$ é linearmente independente. Dizemos que S é **linearmente dependente** se e só se não é linearmente independente.

Exemplo 1.9. Se V é um espaço vetorial sobre um corpo K e $u \in V$ é um elemento não nulo, então a função $v : \{0, 1\} \rightarrow V$ dada por $v_0 = u$ e $v_1 = u$ é linearmente **dependente**, mas o conjunto $\{v_0, v_1\} = \{u\}$ é linearmente **independente**.

Definição 1.10. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K e seja I um conjunto. Uma **base de V ordenada por I** é uma função $b : I \rightarrow V$ tal que:

- (i) b é linearmente independente.
- (ii) b gera V .

Definição 1.11. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K . Uma **base de V** é um conjunto $B \subseteq V$ tal que:

- (i) B é linearmente independente.
- (ii) B gera V .

Teorema 1.12. Seja V um espaço vetorial e sejam $I \subseteq V$ linearmente independente e $S \subseteq V$ gerador de V tais que $I \subseteq S$. Então existe uma base B de V tal que

$$I \subseteq B \subseteq S.$$

Demonstração. Consideremos o conjunto:

$$\mathcal{M} := \{M \subseteq S \mid M \text{ é linearmente independente e } I \subseteq M\}$$

Então (\mathcal{M}, \subseteq) é um conjunto parcialmente ordenado indutivo (ou seja, todo subconjunto totalmente ordenado possui uma cota superior). De fato, $I \in \mathcal{M}$, o que nos mostra que $\mathcal{M} \neq \emptyset$, e para subconjunto totalmente ordenado não vazio $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{M}$ então $\bigcup \mathcal{C} \in \mathcal{M}$.

Logo, pelo Lema de Zorn, \mathcal{M} possui um elemento maximal B . Vamos provar que esse elemento maximal é de fato uma base para V .

- (i) B é linearmente independente: segue da definição de \mathcal{M} .
- (ii) B gera V : Suponha por absurdo que B não gera V . Então existe $v \in S$ que não é combinação linear de elementos de B , aí $B \cup \{v\}$ é linearmente independente e $I \subseteq B \cup \{v\} \subseteq S$. Então $B \cup \{v\} \in \mathcal{M}$, uma contradição, pois B já é um elemento maximal de \mathcal{M} e obviamente $B \subseteq B \cup \{v\}$. Logo B gera V . Portanto, B é uma base de V e $I \subseteq B \subseteq S$. \square

O resultado acima mostra que todo espaço vetorial tem base, bastando para isso tomar $I = \emptyset$ e $S = V$.

Corolário 1.13. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K , seja $I \subseteq V$ um conjunto linearmente independente e seja $S \subseteq V$ um conjunto que gere V . Então

- (i) O espaço V tem uma base;
- (ii) Existe uma base B de V tal que $I \subseteq B$;
- (iii) Existe uma base B de V tal que $B \subseteq S$.

Lema 1.14. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K . Sejam (v_1, \dots, v_n) uma sequência linearmente independente e (u_1, \dots, u_m) uma sequência que gera V . Então $n \leq m$.

Sublema 1.15. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K . Uma sequência (v_1, \dots, v_m) é linearmente dependente se e somente se existem i e uma sequência $(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})$ tais que

$$v_i = \sum_{j=1}^{i-1} \alpha_j v_j.$$

Demonstração do Sublema. Se (v_1, \dots, v_m) é linearmente dependente, então existe uma sequência $(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ não identicamente nula tal que:

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i v_i = 0.$$

Seja i o maior índice tal que $\alpha_i \neq 0$. Então segue que

$$\begin{aligned} \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_i v_i &= 0 \\ \iff \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{i-1} v_{i-1} &= -\alpha_i v_i \\ \iff v_i &= -\sum_{j=1}^{i-1} \frac{\alpha_j}{\alpha_i} v_j. \end{aligned} \quad \square$$

Demonstração do Lema. Primeiro, listamos os dois conjuntos de vetores: o conjunto gerador seguido do conjunto linearmente independente:

$$u_1, \dots, u_m; v_1, \dots, v_n$$

Então movemos o primeiro vetor v_1 para a esquerda da primeira lista:

$$v_1, u_1, \dots, u_m; v_2, \dots, v_n$$

Como u_1, \dots, u_m gera V , v_1 é combinação linear dos u_i 's. Isso implica que podemos remover um dos u_i 's, que indexando se necessário pode ser u_1 , da primeira lista, e ainda temos um conjunto gerador:

$$v_1, u_2, \dots, u_m; v_2, \dots, v_n$$

Note que o primeiro conjunto dos vetores ainda gera V e o segundo conjunto ainda é linearmente independente.

Agora repetimos o processo, movendo v_2 da segunda lista para a primeira lista:

$$v_1, v_2, u_2, \dots, u_m; v_3, \dots, v_n$$

Como antes, os vetores na primeira lista são linearmente dependentes, já que eles geravam V antes da inclusão de v_2 . Entretanto, como os v_i 's são linearmente independentes, qualquer combinação linear não trivial dos vetores na primeira lista que valha 0 deve envolver pelo menos um dos u_i 's. Portanto, podemos remover este vetor, que novamente reindexando se necessário pode ser u_2 e ainda temos um conjunto gerador:

$$v_1, v_2, u_3, \dots, u_m; v_3, \dots, v_n$$

Mais uma vez, o primeiro conjunto dos vetores gera V e o segundo conjunto é linearmente independente.

Agora, if $m < n$, então este processo eventualmente esgotará os u_i 's e nos levará à lista

$$v_1, v_2, \dots, v_m; v_{m+1}, \dots, v_n$$

em que v_1, v_2, \dots, v_m geram V , o que claramente não é possível pois v_n não é combinação linear dos v_1, v_2, \dots, v_m . Portanto $n \leq m$. \square

Observação 1.16. Com o lema, também podemos mostrar que, se existe um conjunto gerador finito, então podemos mostrar que todo conjunto linearmente independente é finito.

De fato, se existirem uma sequência geradora (u_1, \dots, u_m) e um conjunto linearmente independente infinito S , então podemos pegar $m + 1$ vetores distintos e assim formar uma sequência linearmente independente (v_1, \dots, v_{m+1}) , contradizendo o lema 1.14.

Vamos relembrar o que fizemos até aqui com um exemplo:

Exemplo 1.17. Considere $V = \mathbb{R}^4$ um \mathbb{R} -espaço vetorial. Sejam os vetores:

$$\begin{aligned} v_1 &= (1, 0, 0, 0) \\ v_2 &= (0, 1, 0, -1) \\ v_3 &= (0, 0, 1, -1) \\ v_4 &= (1, -1, 0, 0) \\ v_5 &= (1, 2, 1, 0) \end{aligned}$$

Considere $I = \{v_1, v_2\}$ e $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$. Observe que I é LI; de fato,

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = 0 \Rightarrow \alpha_1 (1, 0, 0, 0) + \alpha_2 (0, 1, 0, -1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \\ -\alpha_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = 0$$

Ademais, tomando $v = (x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4$, temos que

$$(x - z + w + y)v_1 + (z - w - \varepsilon)v_2 + (z - \varepsilon)v_3 + (z - w - y + \varepsilon)v_4 + \varepsilon v_5 = v,$$

para todo $\varepsilon \in \mathbb{R}$. Logo, S gera V .

Então, existe uma base B de \mathbb{R}^4 tal que

$$\{v_1, v_2\} \subseteq B \subseteq \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$$

De fato, esta base é $B = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, pois percebe-se que

$$v_5 = \frac{5}{2}v_1 + \frac{1}{2}v_2 - \frac{1}{2}v_3 - \frac{3}{2}v_4$$

Para trabalhar com a cardinalidade das bases, utilizaremos alguns fatos conhecidos, enunciados na próxima proposição:

Proposição 1.18. Se λ e μ são cardinais, então:

- Se $\lambda \leq \mu$ e $\mu \leq \lambda$, então $\lambda = \mu$. (Teorema de Cantor-Bernstein)
- Se λ e μ são infinitos, então

$$\lambda + \mu = \lambda\mu = \max\{\lambda, \mu\}.$$

Teorema 1.19. Seja V um espaço vetorial, então duas bases quaisquer têm o mesmo cardinal.

Demonstração. Sejam B e C bases de V .

- Se B ou C são finitos, então pela observação 1.16 podemos inferir que B e C são ambos finitos e assim aplicar o lema 1.14.
- Se B e C são infinitos. Para $u \in C$ existem um conjunto finito $I_u \subseteq B$ e uma função $\alpha_u : I_u \rightarrow K$ tais que $u = \sum_{i \in I_u} (\alpha_u)_i i$. Seja $I \subseteq \bigcup_{u \in C} I_u \subseteq B$. Então I gera V , assim $I = C$. Desse modo:

$$|B| = |I| = \left| \bigcup_{u \in C} I_u \right| \leq \sum_{u \in C} |I_u| \leq \aleph_0 \cdot |C| = |C|,$$

assim $|B| \leq |C|$. Analogamente $|C| \leq |B|$. Portanto $|B| = |C|$.

□

Definição 1.20. Dizemos que a **dimensão** de um espaço vetorial é a cardinalidade de sua base.

1.3 Subespaços

Definição 1.21. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K . Um **subespaço** de V é um conjunto $W \subseteq V$ tal que:

- $0 \in W$,
- Para $x, y \in W$ então $x + y \in W$,
- Para $a \in K$ e $x \in W$ então $ax \in W$.

Proposição 1.22. Seja V um espaço vetorial e seja \mathcal{W} um conjunto de subespaços. Então $\bigcap \mathcal{W}$ é um subespaço de V .

Definição 1.23. Se S é subconjunto de V , definimos:

$$\langle S \rangle = \left\{ \sum_{v \in I} \alpha_v v \mid I \subseteq S \text{ e } I \text{ é finito e } \alpha \in K^I \right\}$$

e chamamos de **subespaço gerado** por S .

Proposição 1.24. Se S é subconjunto de V , então:

$$\langle S \rangle = \bigcap \{W \mid W \text{ é subespaço de } V \text{ e } S \subseteq W\}.$$

Demonstração. Seja:

$$T = \bigcap \{W \mid W \text{ é subespaço de } V \text{ e } S \subseteq W\}.$$

Para $x \in \langle S \rangle$, então existem um conjunto finito $I \subseteq S$ e uma função $\alpha : I \rightarrow K$ tal que:

$$x = \sum_{v \in I} \alpha_v v,$$

ai para todo subespaço W tal que $S \subseteq W$, então para todo $v \in I$ temos $v \in S$, ai $v \in W$; ai por indução finita temos $x \in W$; logo $x \in T$. Portanto $\langle S \rangle \subseteq T$.

Além disso, temos o seguinte:

- $\emptyset \subseteq S$ e \emptyset é finito e $\emptyset \in K^\emptyset$ e:

$$0 = \sum_{v \in \emptyset} \emptyset_v v,$$

ai $0 \in \langle S \rangle$.

CAPÍTULO 1. ESPAÇOS VETORIAIS

1.3. SUBESPAÇOS

- Para $x, y \in \langle S \rangle$, então existem conjuntos finitos $I, J \subseteq S$ e funções $\alpha \in K^I$ e $\beta \in K^J$ tais que:

$$x = \sum_{u \in I} \alpha_u u, \quad y = \sum_{v \in J} \beta_v v,$$

aí sendo $L = I \cup J$ então $L \subseteq S$ e L é finito, e também sendo $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta} : L \rightarrow K$ dadas por:

$$\tilde{\alpha}_l = \begin{cases} \alpha_l & \text{se } l \in I \\ 0 & \text{se } l \notin I \end{cases}, \quad \tilde{\beta}_l = \begin{cases} \beta_l & \text{se } l \in J \\ 0 & \text{se } l \notin J \end{cases},$$

e sendo $\gamma : L \rightarrow K$ dada por $\gamma_l = \tilde{\alpha}_l + \tilde{\beta}_l$, então:

$$x + y = \sum_{l \in L} \gamma_l l,$$

aí $x + y \in \langle S \rangle$.

- Para $a \in K$ e $x \in \langle S \rangle$, então existem conjunto finito $I \subseteq S$ e $\alpha \in K^I$ tais que:

$$x = \sum_{v \in I} \alpha_v v,$$

aí sendo $\beta : I \rightarrow K$ dada por $\beta_v = a\alpha_v$, então:

$$ax = \sum_{v \in I} \beta_v v,$$

aí $ax \in \langle S \rangle$.

- Para $s \in S$, então $\{s\} \subseteq S$ e $\{s\}$ é finito, e considerando a função $\alpha : \{s\} \rightarrow K$ dada por $\alpha_s = 1$, então:

$$s = \sum_{v \in \{s\}} \alpha_v v,$$

aí $S \subseteq \langle S \rangle$.

Logo $\langle S \rangle$ é um subespaço de V tal que $S \subseteq \langle S \rangle$, aí $T \subseteq \langle S \rangle$. □

A intersecção de subespaços sempre é um subespaço, mas o mesmo não acontece com a união de subespaços.

Proposição 1.25. Se A e B são subespaços de V tais que $A \not\subseteq B$ e $B \not\subseteq A$, então $A \cup B$ não é subespaço de V .

Demonstração. Nesse caso, existe $a \in A$ tal que $a \notin B$ e existe $b \in B$ tal que $b \notin A$. Seja $c = a + b$. Então:

- Se $c \in A$, $b = c - a \in A$, o que é impossível.
- Se $c \in B$, $a = c - b \in B$, o que é impossível.

Logo, concluímos que $c \notin A \cup B$, absurdo. □

Portanto concluímos que $A \cup B$ é um subespaço se e somente se $A \subseteq B$ ou $B \subseteq A$.

Observação 1.26. Seja $K = F_2 = \{0, 1\}$, e tome $V = K^2$. Então,

$$V = \langle (0, 1) \rangle \cup \langle (1, 0) \rangle \cup \langle (1, 1) \rangle$$

Na verdade, V só pode ser escrito como união de um número finito de subespaços próprios se K for um corpo finito, conforme a seguinte proposição.

Proposição 1.27. Um espaço vetorial V sobre um corpo infinito K não pode ser escrito como união de um número finito de subespaços próprios.

Demonstração. Suponhamos que $V = S_1 \cup \dots \cup S_n$, em que podemos assumir que:

$$S_1 \not\subseteq S_2 \cup \dots \cup S_n,$$

Seja $w \in S_1 \setminus (S_2 \cup \dots \cup S_n)$ e seja $v \notin S_1$. Considere o conjunto infinito:

$$A = \{rw + v \mid r \in K\},$$

que é a “reta” passando por v e paralela a w . Queremos mostrar que cada S_i contém no máximo um vetor do conjunto infinito A , o que será uma contradição ao fato de que $V = S_1 \cup \dots \cup S_n$. Isto provará o teorema.

Se $rw + v \in S_1$ para algum $r \neq 0$, então $w \in S_1$ implicará $v \in S_1$, contrário às hipóteses. Agora, suponha que $r_1w + v \in S_1$ e $r_2w + v \in S_1$, para algum $i \geq 2$, em que $r_1 \neq r_2$. Então:

$$(r_1 - r_2)w = (r_1w + v) - (r_2w + v) \in S_i,$$

aí $w \in S_i$, que também contradiz as hipóteses. □

Apesar de não podermos trabalhar com a união, podemos realizar a soma de subespaços, e esta sim é um subespaço:

Definição 1.28. Sejam $W_i \subseteq V$, $i \in I$, subespaços de V . Definimos:

$$\sum_{i \in I} W_i = \{w_{i_1} + \dots + w_{i_k} \mid k \in \mathbb{N}, w_i \in W_i\}.$$

Pode-se mostrar que o conjunto:

$$\sum_{i \in I} W_i$$

é subespaço de V .

Definição 1.29. Uma soma:

$$\sum_{i \in I} W_i$$

é dita uma **soma direta** se para todo $i \in I$ tivermos:

$$W_i \cap \left(\sum_{j \neq i} W_j \right) = 0.$$

Teorema 1.30. Para subespaço A de V , então existe subespaço $B \subseteq V$ tal que $V = A \oplus B$.

Demonstração. Seja E uma base de A . Então existe uma base G de V tal que $E \subseteq G$, aí seja $F = G \setminus E$, e seja B o subespaço gerado por F . Então é fácil ver que $V = A \oplus B$. □

Teorema 1.31.

$$\dim(A + B) + \dim(A \cap B) = \dim(A) + \dim(B).$$

Demonstração. Seja E base de $A \cap B$. Então existe F tal que $B \cap F = \emptyset$ e $E \cup F$ seja base de A e existe G tal que $A \cap G = \emptyset$ e $E \cup G$ seja base de B . Então $E \cup F \cup G$ é base de $A + B$. Daí:

$$\dim(A + B) + \dim(A \cap B) = |E| + |F| + |G| + |E| = |E| + |F| + |E| + |G| = \dim(A) + \dim(B)$$

□

Exemplo 1.32. Considere novamente $V = \mathbb{R}^4$. Sejam

$$W_1 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid y + z + t = 0\},$$

$$W_2 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = 0 \text{ e } z - 2t = 0\}.$$

Então W_1 e W_2 são subespaços de V . Assim, $W_1 + W_2$ e $W_1 \cap W_2$ são subespaços de V . Vamos encontrar bases para eles.

Note que:

$$\begin{aligned} W_1 &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid y + z + t = 0\} \\ &= \{(x, y, z, -y - z) \in \mathbb{R}^4 \mid x, y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(x, 0, 0, 0) + (0, y, 0, -y) + (0, 0, z, -z) : x, y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, -1), (0, 0, 1, -1) \rangle \end{aligned}$$

Verifica-se também que $(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, -1), (0, 0, 1, -1)$ são linearmente independentes. Logo, $B_1 = \{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, -1), (0, 0, 1, -1)\}$ é base para W_1 .

Analogamente, mostra-se que $B_2 = \{(1, -1, 0, 0), (0, 0, 2, 1)\}$ é base para W_2 .

Agora, para determinar uma base de $W_1 + W_2$, podemos escalonar a matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \cdots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Portanto, o conjunto

$$\mathcal{B} = \{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, -1), (0, 0, 1, -1), (1, -1, 0, 0)\}$$

é base de $W_1 + W_2$.

Para determinar uma base de $W_1 \cap W_2$, basta resolver o sistema

$$\begin{cases} y + z + t = 0 \\ x + y = 0 \\ z - 2t = 0 \end{cases}$$

Assim, $W_1 \cap W_2 = \langle (3, -3, 2, 1) \rangle$.

Observe que

$$\dim(W_1 \cap W_2) + \dim(W_1 + W_2) = 1 + 4 = 5 = 3 + 2 = \dim(W_1) + \dim(W_2).$$

Como $\dim(W_1 + W_2) = 4$, temos que $W_1 + W_2 = V = \mathbb{R}^4$.

Observe também que, como $\dim(W_1 \cap W_2) = 1$, a soma $W_1 + W_2$ não é direta.

1.4 Coordenadas

Definição 1.33. Seja V um espaço vetorial de dimensão finita. Seja B uma base de V . Então para $v \in V$ existe um único $\alpha : B \rightarrow K$ tal que

$$v = \sum_{b \in B} \alpha_b b,$$

e chamamos esse α de $[v]_B$.

Capítulo 2

Transformações Lineares

2.1 Definições

Definição 2.1. Sejam U e V espaços vetoriais sobre um corpo K . Uma **transformação linear** é uma função $T : U \rightarrow V$ tal que

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$$

para quaisquer $\alpha, \beta \in K$ e $u, v \in V$. Além disso, denotamos o conjunto das transformações lineares de U a V por $\mathcal{L}(U, V)$.

Teorema 2.2. Sejam U e V espaços vetoriais sobre K , seja B uma base de U e $f : B \rightarrow V$ uma função. Então existe uma única transformação linear $T \in \mathcal{L}(U, V)$ tal que $\forall b \in B : T(b) = f(b)$.

Definição 2.3. Seja $T \in \mathcal{L}(U, V)$. Definimos $\text{Ker}(T) = \{u \in U : T(u) = 0\}$. Definimos $\text{Rank}(T) = \dim(\text{Im}(T))$.

Proposição 2.4. Seja $T \in \mathcal{L}(U, V)$. Então:

- $\text{Ker}(T)$ é um subespaço de U .
- $\text{Im}(T)$ é um subespaço de V .
- T é injetora se e só se $\text{Ker}(T) = 0$.
- Se T é bijetora, então $T^{-1} \in \mathcal{L}(V, U)$.

Teorema 2.5. Seja $\mathcal{L}(U, V)$, seja B uma base de $\text{Ker}(T)$, e seja C um conjunto tal que $T[C]$ seja base de $\text{Im}(T)$. Então $B \cup C$ é base V .

Demonstração. Para $v \in V$ então $T(v) \in \text{Im}(T)$, então existem um conjunto finito $F \subseteq C$ e $\alpha : F \rightarrow K$ tais que:

$$T(v) = \sum_{w \in F} \alpha_w T(w),$$

assim:

$$T\left(v - \sum_{w \in F} \alpha_w w\right) = 0,$$

aí:

$$v - \sum_{w \in F} \alpha_w w \in \text{Ker}(T),$$

assim existem um conjunto finito $E \subseteq B$ e função $\beta : E \rightarrow K$ tais que:

$$v - \sum_{w \in F} \alpha_w w = \sum_{u \in E} \beta_u u,$$

ai:

$$v = \sum_{u \in E} \beta_u u + \sum_{w \in F} \alpha_w w.$$

Por outro lado, para subconjunto finito $E \subseteq B \cup C$ e função $\alpha : E \rightarrow K$ tais que:

$$\sum_{e \in E} \alpha_e e = 0,$$

então:

$$\sum_{e \in E \cap C} \alpha_e T(e) = 0,$$

ai:

$$\forall e \in E \cap C : \alpha_e = 0,$$

ai:

$$\sum_{e \in E \setminus C} \alpha_e e = 0,$$

ai:

$$\forall e \in E \setminus C : \alpha_e = 0,$$

portanto:

$$\forall e \in E : \alpha_e = 0.$$

□

Teorema 2.6 (Teorema do Núcleo-Imagem). Seja $T \in \mathcal{L}(U, V)$. Então

$$U = \text{Ker}(T) \oplus \text{Im}(T)$$

Corolário 2.7.

$$\dim V = \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T)).$$

Definição 2.8. Se $T \in \mathcal{L}(U, V)$ é bijetora, dizemos que T é um **isomorfismo** de U a V .

Proposição 2.9. $T \in \mathcal{L}(U, V)$ é isomorfismo se e somente se T^{-1} também o é.

Proposição 2.10. Dois espaços vetoriais U e V são isomorfos se e somente se quaisquer duas bases B de U e C de V possuem a mesma cardinalidade.

Teorema 2.11. Para espaços vetoriais U e V , então U é isomorfo a V se e só se $\dim(U) = \dim(V)$.

2.2 Espaço Dual

Definição 2.12. Seja V um espaço vetorial sobre K . Denotamos $V^* = \mathcal{L}(V, K)$. O espaço V^* chama-se o **espaço dual** de V . Os elementos de V chamam-se **funcionais lineares**.

Se $\dim(V) = n$, então $\dim(V^*) = n \cdot 1 = n$, ai V e V^* são isomorfos.

Teorema 2.13. Seja V um espaço vetorial com $\dim(V) = n$ e $B = (v_1, \dots, v_n)$ uma base de V . Então existe uma base $B^* = (f_1, \dots, f_n)$ de V^* tal que $f_i(v_j) = \delta_{i,j}$ para quaisquer i, j . Além disso:

$$\forall v \in V : v = \sum_{i=1}^n f_i(v) v_i$$

e:

$$\forall f \in V^* : f = \sum_{i=1}^n f(v_i) f_i.$$

Demonstração. Para $i = 1, \dots, n$, existe uma única função linear $f_i : V \rightarrow K$ tal que:

$$f_i(v_j) = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

Sejam $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ tais que:

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i f_i = 0.$$

Para $j = 1, \dots, n$, aplicando este funcional para o vetor $v_j \in B$, então:

$$0 = 0(v_j) = \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i(v_j) = \alpha_j,$$

ou seja, $\alpha_j = 0$. Portanto B^* é linearmente independente.

Além disso, para $v \in V$ existem $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ tais que:

$$v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i,$$

aí para $i = 1, \dots, n$ temos:

$$f_i(v) = \alpha_i f_i(v_i) = \alpha_i;$$

logo:

$$f(v) = \sum_{i=1}^n \alpha_i f(v_i) = \sum_{i=1}^n f(v_i) f_i(v).$$

□

Definição 2.14. A base B^* chama-se a **base dual** da base B .

Podemos estender o estudo do espaço dual para espaços vetoriais quaisquer.

Definição 2.15. Seja B uma base de V , então para cada $a \in B$ definimos a transformação linear $f_a \in V^*$ por $f_a(b) = \delta_{a,b}$.

Nesse caso, podemos adaptar facilmente o argumento na demonstração do teorema 2.13 para mostrar que $(f_a)_{a \in B}$ é linearmente independente em V^* e para todo $v \in V$ existe um conjunto finito $F \subseteq B$ tal que:

$$v = \sum_{b \in F} f_b(v) b.$$

2.3 Espaço Bidual

Definição 2.16. Seja V um espaço vetorial sobre K . O espaço $V^{**} = (V^*)^*$ chama-se o **espaço bidual** do espaço V .

Definição 2.17. Para $v \in V$, definamos $\varphi_v : V^* \rightarrow K$ assim:

$$\forall f \in V^* : \varphi_v(f) = f(v).$$

Então $\varphi_v \in V^{**}$.

Proposição 2.18. $\varphi \in \mathcal{L}(V, V^{**})$ e φ é injetora.

Demonstração. Seja B uma base de V . Para $v \in \text{Ker}(\varphi)$, então $\varphi_v = 0$, aí temos $\forall b \in B : f_b(v) = \varphi_v(f_b) = 0$, aí existe um conjunto finito $F \subseteq B$ tal que:

$$v = \sum_{b \in F} f_b(v)b,$$

aí $v = 0$. □

Corolário 2.19. Se $\dim(V)$ é finita, então $\varphi : V \rightarrow V^{**}$ é um isomorfismo.

Demonstração.

$$\dim(V) = \dim(V^*) = \dim(V^{**}).$$

□

Observação 2.20. Nesse caso φ é um isomorfismo natural, ou seja, não depende da escolha de uma base.

Corolário 2.21. Se $\dim(V)$ é finita, então toda base de V^* é a base dual para uma base de V .

Demonstração. Seja $C = (f_1, \dots, f_n)$ uma base de V^* . Consideremos a base dual $C^* = (g_1, \dots, g_n)$ de V^{**} . Mas φ é sobrejetora, então existem $v_1, \dots, v_n \in V$ tais que para todo i tenhamos $g_i = \varphi_{v_i}$, assim:

$$f_i(v_j) = \varphi_{v_j}(f_i) = g_j(f_i) = \delta_{j,i} = \delta_{i,j},$$

logo $C = (f_1, \dots, f_n)$ é base dual da base (v_1, \dots, v_n) de V . □

2.4 Anuladores

Definição 2.22. Seja V um espaço vetorial e seja $S \subseteq V$ um subconjunto. Então definimos:

$$S^0 = \{f \in V^* \mid \forall s \in S : f(s) = 0\}.$$

O conjunto S^0 chama-se o **anulador** de S .

Proposição 2.23. S^0 é um subespaço de V .

Teorema 2.24. Seja V um espaço de dimensão finita e $W \subseteq V$ um subespaço. Então:

$$\dim(V) = \dim(W) + \dim(W^0).$$

Demonstração. Seja $\dim(V) = n$ e $\dim(W) = m$. Escolhemos uma base (v_1, \dots, v_m) de W e completemo-la até uma base $(v_1, \dots, v_m, v_{m+1}, \dots, v_n)$ de V . Consideremos a base dual (f_1, \dots, f_n) de V^* . Mostraremos que (f_{m+1}, \dots, f_n) é uma base de W^0 . É claro que para todo $i = m+1, \dots, n$ temos $f_i \in W^0$. Seja $f \in W^0$, então:

$$f = \sum_{i=1}^n f(v_i)f_i = \sum_{i=m+1}^n f(v_i)f_i.$$

□

Teorema 2.25. Se $\dim(V)$ é finita e $V = U \oplus W$, então $V^* = U^0 \oplus W^0$ e $U^0 \cong W^*$ e $W^0 \cong U^*$.

Demonstração. Seja $B = B_U \cup B_W$ base de V , em que B_U é base de U e B_W é base de W . Então a base dual é $B^* = B_U^* \cup B_W^*$, e pelo teorema anterior temos $\langle B_U^* \rangle = W^0$ e $\langle B_W^* \rangle = U^0$. □

2.5 Transpostas

Definição 2.26. Sejam U e V espaços vetoriais sobre K , e $T \in \mathcal{L}(U, V)$. Então definimos a **transposta** de T como a função:

$$\begin{aligned} T^t : V^t &\rightarrow U^t \\ f &\mapsto T^t(f) = f \circ T \end{aligned}$$

Proposição 2.27. Se $\dim(U)$ é finita e $T \in \mathcal{L}(U, V)$, então:

- a) $\text{Ker}(T^t) = (\text{Im}(T))^0$.
- b) $\text{Rank}(T^t) = \text{Rank}(T)$.
- c) $\text{Im}(T^t) = (\text{Ker}(T))^0$.

Demonstração. Temos o seguinte:

- a) Temos:

$$\begin{aligned} \text{Ker}(T^t) &= \{f \in V^* \mid T^t(f) = 0\} \\ &= \{f \in V^* \mid f \circ T = 0\} \\ &= \{f \in V^* \mid \forall u \in U : f(T(u)) = 0\} \\ &= \{f \in V^* \mid f[\text{Im}(T)] = 0\} \\ &= (\text{Im}(T))^0. \end{aligned}$$

- b) Temos $\text{Rank}(T^t) = \dim(\text{Im}(T^t))$ e $\text{Rank}(T) = \dim(\text{Im}(T))$. Além disso:

$$\dim(V^*) = \dim(\text{Im}(T^t)) + \dim(\text{Ker}(T^t))$$

$$\dim(V^*) = \dim(\text{Im}(T)) + \dim(\text{Im}(T))^0$$

$$\text{mas } \dim(V^*) = \dim(V) \text{ e } \dim(\text{Ker}(T^t)) + \dim(\text{Im}(T))^0.$$

- c) Temos $\text{Im}(T^t) \subseteq (\text{Ker}(T))^0$. Seja $\varphi \in \text{Im}(T^t)$, então existe $g \in V^*$ tal que $\varphi = T^t(g)$, aí para todo $u \in U$ nós temos $\varphi(u) = T^t(g)(u) = g(T(u))$. Se $u \in \text{Ker}(T)$ então $T(u) = 0$, aí $\varphi(u) = 0$; logo $\varphi \in (\text{Ker}(T))^0$. Além disso:

$$\dim(U) = \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Ker}(T))^0$$

$$\dim(U) = \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T))$$

$$\text{aí } \dim(\text{Ker}(T))^0 = \dim(\text{Im}(T)), \text{ aí } (\text{Ker}(T))^0 = \text{Im}(T). \quad \square$$

Teorema 2.28. Sejam U e V espaços vetoriais de dimensão finita com bases B e C e bases duais B^* e C^* . Se $T \in \mathcal{L}(U, V)$, então:

$$[T]_{B,C}^t = [T^t]_{C^*,B^*}$$

Corolário 2.29. Se $A \in M_{m,n}(K)$, então:

$$\text{RowRank}(A) = \text{ColumnRank}(A).$$

Demonstração. Consideremos $T : K^n \rightarrow K^m$ dada por $T(v) = Av$. Sejam B e C as bases canônicas de K^n e K^m , então $[T]_{B,C} = A$. Temos:

$$\begin{aligned} \text{Rank}(T) &= \text{ColumnRank}(A) \\ \text{Rank}(T^t) &= \text{ColumnRank}(A^t) = \text{RowRank}(A). \end{aligned} \quad \square$$

2.6 Espaços Quocientes

Definição 2.30. Seja V um espaço, $W \subseteq V$ um subespaço. Para $u, v \in V$, digamos que $u \sim v$ se e só se $u - v \in W$. Então \sim é uma relação de equivalência, ou seja:

- Reflexiva, ou seja, $v \sim v$ sempre.
- Simétrica, ou seja, se $v \sim u$ então $u \sim v$.
- Transitiva, ou seja, se $v \sim u$ e $u \sim w$, então $v \sim w$.

Seja V/W o conjunto das classes de equivalência relativamente a \sim . Para $v \in V$ seja \bar{v} a classe de equivalência de v .

- Definamos em V/W uma estrutura de espaço vetorial. Para $\bar{v}, \bar{w} \in V/W$ definamos $\bar{v} + \bar{w} = \overline{v + w}$.
- Para $\alpha \in K$ e $\bar{v} \in V/W$ definamos $\alpha \cdot \bar{v} = \overline{\alpha v}$. Então V/W é um espaço vetorial chamado **espaço quociente**.

Observação 2.31. As operações estão “bem definidas” pois:

- Se $\bar{v} = \bar{v'}$ e $\bar{u} = \bar{u'}$, então $v \sim v'$ e $u \sim u'$, aí $v - v', u - u' \in W$, aí $(v + u) - (v' + u') = (v - v') + (u - u') \in W$, aí $\overline{v + u} = \overline{v' + u'}$, aí $\bar{v} + \bar{u} = \bar{v'} + \bar{u'}$.
- Analogamente para a outra propriedade.

Também verificaremos algumas propriedades, deixando o resto ao leitor.

- Temos a comutatividade da adição, pois $\bar{u} + \bar{v} = \bar{v} + \bar{u}$ equivale a $\overline{u + v} = \overline{v + u}$, que é verdade pois $u + v = v + u$.
- O que é o $\bar{0}$ de V/W ? Temos $\bar{0} = W$, e também para todo $w \in W$ temos $w \sim 0$, aí $\bar{w} = \bar{0} = W$.

Também temos o seguinte:

- Se $W = V$, então $V/V = \{\bar{0}\}$.
- Se $W = \{0\}$, então $V/\{0\} \cong V$.

Proposição 2.32. Consideremos a aplicação:

$$\pi : V \rightarrow V/W, \quad v \mapsto \bar{v}.$$

Então $\pi \in \mathcal{L}(V, V/W)$, com $\text{Ker}(\pi) = W$.

Notação 2.33. π chama-se a **projeção canônica** de V para V/W .

Demonstração. Temos o seguinte:

- $\pi(v + u) = \overline{v + u} = \bar{v} + \bar{u} = \pi(v) + \pi(u)$.
- $\pi(\alpha v) = \overline{\alpha v} = \alpha \bar{v} = \alpha \pi(v)$.

Além disso, se $w \in W$ então $\pi(w) = \bar{w} = W$ □

Proposição 2.34. Seja $T \in \mathcal{L}(U, V)$ e $W \subseteq U$ tal que $W \subseteq \text{Ker}(T)$. Então existe um único $\bar{T} \in \mathcal{L}(U/W, V)$ tal que para todo $u \in U$ tenhamos:

$$\bar{T}(\bar{u}) = T(u).$$

CAPÍTULO 2. TRANSFORMAÇÕES LINEARES

2.6. ESPAÇOS QUOCIENTES

Demonstração. Temos o seguinte:

1) Mostraremos que \bar{T} está “bem definida”. Se $\bar{u} = \bar{v}$, então $u - v \in W \subseteq \text{Ker}(T)$, aí $T(u - v) = 0$, aí $T(u) = T(v)$.

2) Mostraremos que \bar{T} é uma transformação linear.

- $\bar{T}(\bar{u} + \bar{v}) = \bar{T}(\overline{u + v}) = T(u + v) = T(u) + T(v) = \bar{T}(\bar{u}) + \bar{T}(\bar{v})$.
- $\bar{T}(\alpha\bar{v}) = \bar{T}(\overline{\alpha v}) = T(\alpha v) = \alpha T(v) = \alpha \bar{T}(\bar{v})$.

Agora, para todo $T' \in \mathcal{L}(U/W, V)$ tal que para todo $u \in U$ tenhamos:

$$T'(\bar{u}) = T(u),$$

então para todo $v \in U/W$ existe um $u \in U$ tal que $v = \bar{u}$, aí:

$$T'(v) = T'(\bar{u}) = T(u) = \bar{T}(\bar{u}) = \bar{T}(v);$$

logo $T' = \bar{T}$. □

Teorema 2.35. Sejam U e V espaços vetoriais sobre K , e seja $T \in \mathcal{L}(U, V)$. Então $U/\text{Ker}(T) \cong \text{Im}(T)$.

Demonstração. Pela proposição anterior, existe uma única $\bar{T} : U/\text{Ker}(T) \rightarrow V$ tal que para todo $u \in U$ tenhamos:

$$\bar{T}(\bar{u}) = T(u).$$

Observemos que $\text{Im}(\bar{T}) = \text{Im}(T) = \{T(u) \mid u \in U\}$.

Além disso, para $\bar{u} \in \text{Ker}(\bar{T})$, então $T(u) = \bar{T}(\bar{u}) = 0$, aí $u \in \text{Ker}(T)$, aí $\bar{u} = \bar{0}$, de modo que \bar{T} é injetora. □

Teorema 2.36. Seja W subespaço de V . Então todos os complementos de W em V são isomorfos ao V/W .

Demonstração. Seja $V = W \oplus U$. Consideremos a projeção canônica:

$$\pi : V \rightarrow V/W.$$

Seja $\bar{\pi} = \pi \upharpoonright U$. Então $\text{Ker}(\bar{\pi}) = U \cap \text{Ker}(\pi) = U \cap W = \{0\}$. Logo $\bar{\pi}$ é injetora.

Para $\bar{v} \in V/W$, seja $v = w + u$, com $w \in W$ e $u \in U$. Então $\pi(v) = \pi(w) + \pi(u) = \pi(u) = \bar{\pi}(u)$, aí $\bar{v} = \bar{\pi}(u)$, assim $\bar{\pi}$ é sobre V/W . □

Corolário 2.37. Seja $W \subseteq V$ um subespaço. Então $\dim V = \dim W + \dim V/W$.

Demonstração. Seja $V = W \oplus U$, então $\dim V = \dim W + \dim U$, mas $U \cong V/W$, aí $\dim U = \dim V/W$. □

Observação 2.38. Existem espaços vetoriais W e U e W' e U' tais que $W \oplus U \cong W' \oplus U'$ e $W \cong W'$, mas $U \not\cong U'$. De fato podemos tomar:

$$W = \bigoplus_{i=0}^{\infty} Ke_{2i}, \quad U = \bigoplus_{i=0}^{\infty} Ke_{2i+1}, \quad W' = \bigoplus_{i=0}^{\infty} Ke_i, \quad U' = \{0\}.$$

Capítulo 3

Determinantes

3.1 Formas Multilineares

Definição 3.1. Seja V um espaço vetorial e $V^r = V \times \cdots \times V$. Uma **forma r-linear** sobre V é uma função $F : V^r \rightarrow K$ que é linear em cada argumento, ou seja, para cada $i = 1, \dots, r$ temos:

$$F(v_1, \dots, \alpha v_i + \beta v'_i, \dots, v_r) = \alpha F(v_1, \dots, v_i, \dots, v_r) + \beta F(v_1, \dots, v'_i, \dots, v_r).$$

Denotamos por $L_r(V)$ o conjunto das formas r-lineares sobre V .

Exemplo 3.2. Seja $V = K^2$ e:

$$F((x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)) = x_1 y_2 x_3 - x_1 x_2 y_3.$$

Então F é uma forma 3-linear.

Definição 3.3. Uma forma $F \in L_r(V)$ chama-se **alternada** se e só se para $(v_1, \dots, v_r) \in V^r$ e $i < j$ tais que $v_i = v_j$ então $F(v_1, \dots, v_r) = 0$. Denotamos por $A_r(V)$ o conjunto das formas r-lineares alternadas.

Definição 3.4. Uma forma F é chamada **antissimétrica** se para $v \in V^r$ e para $i < j$ temos:

$$F(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_r) = -F(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_r).$$

Proposição 3.5. Toda forma alternada é antissimétrica.

Demonstração. Seja $F \in A_r(V)$. Sejam $v \in V^r$ e $i < j$, então:

$$\begin{aligned} 0 &= F(v_1, \dots, v_i + v_j, \dots, v_i + v_j, \dots, v_r) \\ &= F(v_1, \dots, v_i, \dots, v_i, \dots, v_r) + F(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_r) \\ &\quad + F(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_r) + F(v_1, \dots, v_j, \dots, v_j, \dots, v_r) \\ &= F(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_r) + F(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_r) \end{aligned}$$

□

Proposição 3.6. Se a característica do corpo é $\neq 2$, então toda forma antissimétrica é reflexiva.

Demonstração. Para F antissimétrica e $v \in V^r$ e $i < j$, se $v_i = v_j$, sendo $v = v_i$, então:

$$F(v_1, \dots, v, \dots, v, \dots, v_1) = -F(v_1, \dots, v, \dots, v, \dots, v_r),$$

aí:

$$2F(v_1, \dots, v, \dots, v, \dots, v_r) = 0,$$

aí:

$$F(v_1, \dots, v, \dots, v, \dots, v_r) = 0.$$

□

CAPÍTULO 3. DETERMINANTES

3.1. FORMAS MULTILINEARES

Definição 3.7. Seja $F \in L_r(V)$ e $\sigma \in S_r$ uma permutação. Para $(v_1, \dots, v_r) \in V^r$ definimos:

$$(\sigma F)(v_1, \dots, v_r) = F(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(r)}).$$

É fácil ver que $\sigma F \in L_r(V)$.

Observação 3.8. Para $F \in L_r(V)$, então F é antissimétrica se e somente se para toda transposição $\tau \in S_r$ tivermos $\tau F = -F$.

Proposição 3.9. Seja $F \in L_r(V)$ uma forma antissimétrica. Então para $\sigma \in S_r$, temos:

$$\sigma F = (\text{sgn } \sigma)F.$$

Demonstração. Para $\sigma \in S_r$, então σ pode ser escrita como um produto de transposições:

$$\sigma = \tau_1 \dots \tau_k,$$

aí σ é par se e só se k é par. Portanto:

$$\sigma F = (\tau_1 \dots \tau_k)F = (-1)^k F = (\text{sgn } \sigma)F,$$

pois $\text{sgn } \sigma = (-1)^k$. □

Proposição 3.10. Toda forma r -linear determina uma forma r -linear alternada da seguinte maneira:

$$F \mapsto \varphi(F) = \sum_{\sigma \in S_r} (\text{sgn } \sigma)(\sigma F).$$

Demonstração. Seja $v_i = v_j = v$ com $i < j$. Precisamos provar que $\varphi(F)(v) = 0$. Seja τ a transposição (i, j) , então $S_r = A_r \cup A_r \tau$ e $A_r \cap A_r \tau = \emptyset$. Então temos o seguinte:

$$\begin{aligned} \varphi(F)(v) &= \sum_{\sigma \in S_r} (\text{sgn } \sigma)(\sigma F(v)) \\ &= \sum_{\sigma \in A_r} (\sigma F(v)) - \sum_{\sigma \in A_r} (\sigma \tau F(v)) \\ &= \sum_{\sigma \in A_r} (\sigma F(v)) - \sum_{\sigma \in A_r} (\sigma F(v)) \\ &= 0. \end{aligned}$$

□

Observação 3.11. Se $F \in A_r(V)$ e $v \in V^r$ é linearmente dependente, então:

$$F(v) = 0.$$

Lema 3.12. Seja $\dim V = n$ e $F \in A_n(V)$. Seja (e_1, \dots, e_n) uma base de V , então F é completamente determinada pelo valor $F(e)$.

Demonstração. Seja $(v_1, \dots, v_n) \in V^n$. Então existe $(\alpha_{i,j}) \in M_n(K)$ tal que:

$$v_i = \sum_{j=1}^n \alpha_{i,j} e_j.$$

Assim:

$$\begin{aligned} F(v_1, \dots, v_n) &= F\left(\sum_{j_1=1}^n \alpha_{1,j_1} e_{j_1}, \dots, \sum_{j_n=1}^n \alpha_{n,j_n} e_{j_n}\right) \\ &= \sum_{j_1, \dots, j_n=1}^n \alpha_{1,j_1} \dots \alpha_{n,j_n} F(e_{j_1}, \dots, e_{j_n}) \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \alpha_{1,\sigma_1} \dots \alpha_{n,\sigma_n} F(e_{\sigma_1}, \dots, e_{\sigma_n}) \\ &= \left(\sum_{\sigma \in S_n} \alpha_{1,\sigma_1} \dots \alpha_{n,\sigma_n} \text{sgn } \sigma \right) F(e_1, \dots, e_n). \end{aligned}$$

□

Note então que o valor

$$\sum_{\sigma \in S_n} \alpha_{1,\sigma_1} \dots \alpha_{n,\sigma_n} \operatorname{sgn} \sigma$$

determina F para qualquer $v \in V^n$. Chamaremos este valor de **determinante** de F .

Exemplo 3.13.

3.2 Determinantes

Seja K um corpo e consideremos o anel das matrizes $M_n(K)$. Identificaremos os elementos de $M_n(K)$ com os elementos de $(K^n)^n$ assim:

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & & a_{1,n} \\ & \ddots & \\ a_{n,1} & & a_{n,n} \end{pmatrix} \longleftrightarrow ((a_{1,1}, \dots, a_{1,n}), \dots, (a_{n,1}, \dots, a_{n,n})).$$

Portanto, uma função n -linear aqui é uma função n -linear nas linhas da matriz.

Definição 3.14. Uma função $\det : M_n(K) \rightarrow K$ é dita uma função **determinante** se e só se \det é n -linear alternada e $\det(I) = 1$.

Pelo que vimos, existe e é única a função determinante: É a forma n -linear alternada que vale 1 na base canônica de K^n .

Logo, se $A = (a_{i,j}) \in M_n(K)$, então:

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1,\sigma_1} \dots a_{n,\sigma_n}.$$

Exemplo 3.15. Para $n = 2$, temos $S_2 = \{I, (1, 2)\}$, e assim, sendo:

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix},$$

então temos:

$$\det(A) = a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1}.$$

Exemplo 3.16. Agora, se $n = 3$, então $S_3 = \{I, (1, 2, 3), (1, 3, 2), (1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$, e assim, sendo:

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix},$$

então temos:

$$\det(A) = a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1} + a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2} - a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3} - a_{1,3}a_{2,2}a_{3,1} - a_{1,1}a_{2,3}a_{3,2}.$$

Proposição 3.17. Temos as seguintes propriedades:

- 1) Para todo $A \in M_n(K)$ temos $\det(A) = \det(A^t)$.
- 2) Para $A, B \in M_n(K)$ vale $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.
- 3) Para $A \in M_n(K)$, então A é inversível se e só se $\det(A) \neq 0$. Neste caso, temos $\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1}$.

CAPÍTULO 3. DETERMINANTES

3.2. DETERMINANTES

Demonstração. Temos o seguinte:

- 1) Sendo $A = (a_{i,j}) \in M_n(K)$, então temos:

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1,\sigma_1} \dots a_{n,\sigma_n} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{\sigma_1^{-1},1} \dots a_{\sigma_n^{-1},n} \\ &= \sum_{\tau \in S_n} \operatorname{sgn}(\tau^{-1}) a_{\tau_1,1} \dots a_{\tau_n,n} \\ &= \sum_{\tau \in S_n} \operatorname{sgn}(\tau) a_{1,\tau_1}^t \dots a_{n,\tau_n}^t \\ &= \det(A^t). \end{aligned}$$

- 2) Seja $F_A : M_n(K) \rightarrow K$ tal que $\forall X \in M_n(K) : F_A(X) = \det(AX)$. Então a função F_A é uma função n -linear alternada sobre as colunas, mas também $F_A(I) = \det(A)$, aí $F_A(B) = \det(A) \det(B)$, assim $\det(AB) = \det(A) \det(B)$

- 3) Se A é inversível, então existe a inversa A^{-1} , assim:

$$1 = \det(I) = \det(AA^{-1}) = \det(A) \det(A)^{-1},$$

aí $\det(A) \neq 0$ e $\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1}$. Por outro lado, se $\det(A) \neq 0$, então $\det(A^t) \neq 0$, aí as colunas de A são linearmente independentes, aí consideremos $T : K^n \rightarrow K^n$ tal que $[T]_{\text{can}} = A$, então T é inversível, assim $A = [T]_{\text{can}}$ é inversível.

□

Assim lembremo-nos do seguinte: a função \det é uma função n -linear e alternada nas linhas (ou nas colunas) da matriz, logo:

- 1) Trocar duas linhas (ou colunas) da matriz muda o sinal do determinante.
- 2) Somar a uma linha (ou coluna) uma combinação linear das demais linhas (colunas) não altera o valor do determinante.
- 3) Ao multiplicar uma linha (ou coluna) por um escalar, o determinante fica multiplicado por esse escalar.

Proposição 3.18. Temos o seguinte:

- 1) O determinante de uma matriz triangular é o produto dos elementos da diagonal da matriz.
- 2) Se:

$$A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ C & D \end{pmatrix}$$

em que $B \in M_r(K)$ e $D \in M_{n-r}(K)$ e $C \in M_{n-r,r}(K)$ e $0 \in M_{r,n-r}(K)$, então:

$$\det(A) = \det(B) \det(D).$$

Demonstração. Temos o seguinte:

- 1) Seja $A = (a_{i,j}) \in M_n(K)$ uma matriz triangular inferior, então para $i < j$ temos $a_{i,j} = 0$, mas a única permutação $\sigma \in S_n$ tal que para todo $i = 1, \dots, n$ tenhamos $i \geq \sigma_i$ é a permutação identidade I , assim temos:

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1,\sigma_1} \dots a_{n,\sigma_n} \\ &= \operatorname{sgn}(I) a_{1,I_1} \dots a_{n,I_n} \\ &= a_{1,1} \dots a_{n,n}. \end{aligned}$$

2) Seja $F : M_r(K) \rightarrow K$ tal que:

$$F(X) = \det \begin{pmatrix} X & 0 \\ C & D \end{pmatrix}.$$

Então F é r -linear alternada nas linhas de X , assim $F(X) = F(I) \det(X)$.

Agora consideremos $G : M_{n-r}(K) \rightarrow K$ tal que:

$$G(Y) = \det \begin{pmatrix} I & 0 \\ C & Y \end{pmatrix}$$

Então G é $(n-r)$ -linear alternada nas colunas de Y , logo $G(Y) = G(I) \det(Y)$. Mas:

$$G(I) = \det \begin{pmatrix} I & 0 \\ C & I \end{pmatrix} = 1,$$

assim $G(Y) = \det(Y)$, aí $F(I) = G(D) = \det(D)$, assim $F(X) = F(I) \det(X) = \det(X) \det(D)$, aí acaba.

□

Agora temos a **regra de Laplace**:

Teorema 3.19. Dada $A = (a_{i,j}) \in M_n(K)$, indicaremos por $M_{i,j}$ a matriz quadrada de tamanho $n-1$ obtida a partir de A eliminando a linha i e a coluna j .

Para cada $i = 1, \dots, n$, então vale:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(M_{i,j}).$$

Para cada $j = 1, \dots, n$, então vale:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(M_{i,j}).$$

Demonstração. Provaremos a primeira afirmação pois a segunda é análoga.

□

AULA DE 19 DE AGOSTO (COLOCAREI ASSIM QUE CONSEGUIR)

FICOU FALTANDO A PROVA DA REGRA DE LAPLACE E A PARTE DE MATRIZES SOBRE ANEIS COMUTATIVOS

Bláa blá blá

Capítulo 4

Formas Canônicas

4.1 Espectro de um Operador

4.1.1 Autovalores e Autovetores

Definição 4.1. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K e seja $T \in \mathcal{L}(V)$.

- Para $\lambda \in K$, dizemos que λ é um **autovalor** de T se existe um $v \neq 0$ tal que $T(v) = \lambda v$.
- Para $\lambda \in K$, um **autovetor** associado a λ é um $v \in V$ tal que $T(v) = \lambda v$.
- Para $\lambda \in K$, chamamos de **autoespaço** associado a λ o conjunto $V_T(\lambda)$ dos autovetores associados a λ .

Exemplo 4.2. Seja $V = \mathbb{C}^1(\mathbb{R})$ e considere o operador linear $T \in \mathcal{L}(V)$ tal que $T(v) = v'$ para cada $v \in V$. Considere $v = e^{\lambda x}$ com $\lambda \in K$. Então $T(v) = \lambda e^{\lambda x} = \lambda v$. Ou seja v é um autovetor associado a λ .

Definição 4.3. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K e seja $T \in \mathcal{L}(V)$. O **spectrum** do operador T é o conjunto:

$$\text{Spec}(T) := \{\lambda \in K : \lambda \text{ é autovalor de } T\}.$$

No contexto da definição anterior, considere $\lambda \in \text{Spec}(T)$. Então

$$\begin{aligned} v \in V_T(\lambda) &\iff T(v) = \lambda v \\ &\iff (T - \lambda I)(v) = 0 \\ &\iff v \in \text{Ker}(T - \lambda I). \end{aligned}$$

Ainda no mesmo contexto, vamos assumir agora que $\dim(V) = n < \infty$. Então temos que

$$\lambda \in \text{Spec}(T) \implies \text{Ker}(T - \lambda I) \neq \{0\} \implies \det(T - \lambda I) = 0.$$

Reciprocamente, se $\det(T - \lambda I) = 0$ então $V_T(\lambda) = \text{Ker}(T - \lambda I) \neq \{0\}$.

4.1.2 Polinômio Característico

Definição 4.4. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K e seja $T \in \mathcal{L}(V)$. O **polinômio característico** de T é o polinômio:

$$p_T(t) := \det(tI - T).$$

CAPÍTULO 4. FORMAS CANÔNICAS

4.1. ESPECTRO DE UM OPERADOR

Note que $\lambda \in \text{Spec}(T)$ se e só se λ é raiz de $p_T(\lambda)$. Além disso, note que se B e B' são bases V , então $p_T(\lambda) = p_{[T]_B}(\lambda)$. De fato, se P é a matriz de mudança da base B para a base B' , então

$$[\lambda I - T]_{B'} = P^{-1}[\lambda I - T]_B P$$

Isso implica que

$$\det([\lambda I - T]_{B'}) = \det(P^{-1})\det([\lambda I - T]_B)\det(P).$$

Ou seja,

$$\det([\lambda I - T]_{B'}) = \det([\lambda I - T]_B).$$

Exemplo 4.5. Seja $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ tal que

$$[T]_{\text{can}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Isto é, $T(x, y) = (-y, x)$ para cada $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Então

$$\begin{aligned} p_T(x) &= \det \begin{pmatrix} x & 1 \\ -1 & x \end{pmatrix} \\ &= x^2 + 1. \end{aligned}$$

Dessa forma, $\text{Spec}(T) = \emptyset$ pois $p_T(x)$ não possui raízes em $K = \mathbb{R}$.

Exemplo 4.6. Seja $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tal que

$$[T]_{\text{can}} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Então:

$$\begin{aligned} p_T(x) &= \det \begin{pmatrix} x-3 & -1 & 1 \\ -2 & x-2 & 1 \\ -2 & -2 & x \end{pmatrix} \\ &= (x-1)^2(x-2). \end{aligned}$$

Isso implica que $\text{Spec}(T) = \{1, 2\}$. Além disso, temos que

$$V_T(1) = \text{Ker}(T - I) = \text{Ker} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \langle (1, 0, 2) \rangle.$$

e ainda

$$V_T(2) = \text{Ker}(T - 2I) = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \langle (1, 1, 2) \rangle$$

Exemplo 4.7. Seja $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tal que

$$[T]_{\text{can}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -3 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

CAPÍTULO 4. FORMAS CANÔNICAS

4.1. ESPECTRO DE UM OPERADOR

Neste caso temos que

$$\begin{aligned} p_T(x) &= \det \begin{pmatrix} x-1 & -2 & 1 \\ 2 & x+3 & 1 \\ -2 & -2 & x+2 \end{pmatrix} \\ &= (x+1)^2(x+2). \end{aligned}$$

Isso implica que $\text{Spec}(T) = \{-1, -2\}$ e ainda

$$V_T(-1) = \langle (1, 0, 2), (0, 1, 2) \rangle$$

e

$$V_T(-2) = \langle (1, -1, 1) \rangle.$$

Uma vez que os autovetores acima são L.I, eles formam uma base B de \mathbb{R}^3 e

$$[T]_B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

é uma matriz diagonal.

Teorema 4.8. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K tal que $\dim(V) = n < \infty$ e seja $T \in \mathcal{L}(V)$, e sejam $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ os autovalores distintos, e para $i = 1, \dots, k$ seja $n_k = \dim V_T(\lambda_i)$. São equivalentes:

1. T é diagonalizável.
2. $p_T(t) = (t - \lambda_1)^{n_1} \dots (t - \lambda_k)^{n_k}$.
3. $n_1 + \dots + n_k = n$.

Lema 4.9. Sejam $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$ distintos. Então:

1. Se $v_i \in V_T(\lambda_i)$ para cada $i = 1, \dots, k$ e $v_1 + \dots + v_k = 0$, então $v_1 = \dots = v_k = 0$.
2. Se $B_i \subseteq V_T(\lambda_i)$ é L.I para cada $i = 1, \dots, k$, então $B_1 \cup \dots \cup B_k$ é L.I.

Demonstração do Lema.

1. Vamos provar essa afirmação por indução em k . Primeiro note que o resultado é trivial quando $k = 1$. Agora seja $k \in \mathbb{N}$ e assumamos que o resultado vale para cada natural $i < k$. Sejam v_1, \dots, v_k tais que $v_i \in V_T(\lambda_i)$ para cada $i = 1, \dots, k$ e $v_1 + \dots + v_k = 0$. Então:

$$0 = \lambda_1 0 = \lambda_1(v_1 + v_2 + \dots + v_k) = \lambda_1 v_1 + \lambda_1 v_2 + \dots + \lambda_1 v_k. \quad (4.1)$$

Além disso, é claro que:

$$0 = T(0) = T(v_1 + v_2 + \dots + v_k) = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_k v_k. \quad (4.2)$$

Subtraindo a Equação 4.1 de 4.2, obtemos:

$$(\lambda_2 - \lambda_1)v_2 + \dots + (\lambda_k - \lambda_1)v_k = 0. \quad (4.3)$$

Agora notamos que cada termo $(\lambda_i - \lambda_1)v_i$ no lado esquerdo é um autovetor de T associado a λ_i e aplicamos a hipótese de indução para concluir que $v_2 = \dots = v_k = 0$. Finalmente, como sabemos que $v_1 + \dots + v_k = 0$ e $v_2 = \dots = v_k = 0$, obtemos que $v_1 = 0$ também, o que conclui nossa prova.

CAPÍTULO 4. FORMAS CANÔNICAS

4.1. ESPECTRO DE UM OPERADOR

2. Seja $S \subseteq B_1 \cup \dots \cup B_k$ finito e seja $\alpha: S \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

$$\sum_{v \in S} \alpha_v v = 0.$$

Note que $V_T(\lambda_i) \cap V_T(\lambda_j) = \{0\}$ sempre que $i \neq j$ e então podemos escrever

$$\sum_{v \in S} \alpha_v v = \sum_{v \in S_1} \alpha_v v + \dots + \sum_{v \in S_k} \alpha_v v,$$

onde $S_i \subseteq B_i$ é finito para cada $i = 1, \dots, k$. Utilizando o fato de que:

$$\sum_{v \in S_i} \alpha_v v \in V_T(\lambda_i)$$

para cada $i = 1, \dots, k$ e aplicando o item anterior, obtemos que

$$\sum_{v \in S_1} \alpha_v v = \dots = \sum_{v \in S_k} \alpha_v v = 0.$$

Finalmente como $S_i \subseteq B_i$ para cada $i = 1, \dots, k$ e B_i é sempre L.I por hipótese segue que a restrição de α a cada S_i é identicamente nula. Como $S = S_1 \cup \dots \cup S_k$, segue que α é identicamente nula. \square

Demonstração. Temos o seguinte:

- (i) \Rightarrow (ii): Seja B uma base tal que:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_k I_{m_k} \end{pmatrix},$$

em que m_1, \dots, m_k são inteiros positivos. Então o polinômio característico de T é:

$$p_T(t) = (t - \lambda_1)^{m_1} \dots (t - \lambda_k)^{m_k}.$$

Além disso, para $i = 1, \dots, k$, então a matriz de $T - \lambda_i I$ é igual a:

$$\begin{pmatrix} (\lambda_1 - \lambda_i) I_{m_1} & & & \\ & \ddots & & \\ & & 0_{m_i} & \\ & & & \ddots & \\ & & & & (\lambda_k - \lambda_i) I_{m_k} \end{pmatrix},$$

aí é fácil ver que:

$$n_i = \dim V_T(\lambda_i) = \dim \text{Ker}(T - \lambda_i I) = m_i,$$

ou seja, $n_i = m_i$; assim:

$$p_T(t) = (t - \lambda_1)^{n_1} \dots (t - \lambda_k)^{n_k}.$$

- (ii) \Rightarrow (iii): O polinômio característico de T tem grau n , aí:

$$n_1 + \dots + n_k = \deg(p_T(t)) = n.$$

- (iii) \Rightarrow (i): Para cada $i = 1, \dots, k$ considere uma base B_i de $V_T(\lambda_i)$. Seja $B = B_1 \cup \dots \cup B_k$. Pelo Lema 4.9, temos que B é L.I. Como $|B| = n$ segue que B é uma base de V . Além disso, B é uma base de autovetores de T . Logo, T é diagonalizável. \square

4.1.3 Polinômio Minimal

Definição 4.10. Seja V um espaço sobre K , $\dim V = n < \infty$, $T \in \mathcal{L}(V)$. Definamos por recursão $T^0 = I$ e $T^{k+1} = T^k \circ T$. Se $p(t) \in K[t]$, $p(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_m t^m$, então está bem definido o operador $p(T) = a_0 \cdot I + a_1 \cdot T + \dots + a_m \cdot T^m \in \mathcal{L}(V)$.

Lembre-mos de que, se $\dim(U) = m$ e $\dim(V) = n$, então $\dim \mathcal{L}(U, V) = mn$. Assim, se V é um espaço vetorial tal que $\dim(V) = n < \infty$, então $\dim \mathcal{L}(V) = n^2$, de modo que existe $m \leq n^2 + 1$ tal que os operadores I, T, T^2, \dots, T^m sejam linearmente dependentes. Seja m o menor deles. Então existem $a_0, \dots, a_{m-1} \in K$ tais que:

$$T^m + a_{m-1} T^{m-1} + \dots + a_1 T + a_0 I = 0.$$

Seja:

$$m_T(t) = t^m + a_{m-1} t^{m-1} + \dots + a_1 t + a_0,$$

então $m_T(T) = 0$, e $m_T(t)$ é um polinômio mônico de grau mínimo tal que $m_T(T) = 0$.

Definição 4.11. Um polinômio mônico de grau mínimo tal que $m_T(t) \in K[t]$ tal que $m_T(T) = 0$ chama-se um **polinômio minimal** do operador T .

Lema 4.12. Seja $f(t) \in K[t]$ tal que $f(T) = 0$. Então $m(t) \mid f(t)$.

Demonstração. Dividimos $f(t)$ por $m(t)$ (com resto):

$$f(t) = m_T(t) \cdot q(t) + r(t), \quad \deg(r(t)) < \deg(m_T(t)) \text{ ou } r(t) = 0.$$

Como $f(T) = 0$ e $m_T(T) = 0$, então $r(T) = 0$, aí $r(t) = 0$. □

Corolário 4.13. O polinômio $m_T(t)$ é único.

Se V é um espaço vetorial e $T \in \mathcal{L}(V)$, então V tem uma estrutura de $K[t]$ módulo à esquerda: Se $f(t) \in K[t]$, para $v \in V$ definimos:

$$f(t) \cdot v = f(T)(v).$$

Além disso, se considerarmos:

$$\begin{aligned} \varphi : K[t] &\rightarrow \text{End}(V) \\ f(t) &\mapsto f(T), \end{aligned}$$

então φ é um homomorfismo de K -álgebras e portanto $\text{Ker}(\varphi)$ é um ideal de $K[t]$.

Teorema 4.14. Os polinômios $p_T(t)$ e $m_T(t)$ têm as mesmas raízes em K (a menos de multiplicidade). Em outras palavras, $m_T(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda \in \text{Spec}(T)$.

Demonstração. Se $m_T(\lambda) = 0$, então $m_T(t) = (t - \lambda)q(t)$. Por minimalidade de $m_T(t)$, $q(T) \neq 0$, então existe $w \in V$ tal que $q(T)(w) \neq 0$, aí seja $v = q(T)(w)$, então $v \neq 0$ e:

$$\begin{aligned} (T - \lambda I)(v) &= (T - \lambda I)q(T)(w) \\ &= m_T(t)(w) = 0, \end{aligned}$$

aí $T(v) = \lambda v$, aí $\lambda \in \text{Spec}(T)$.

Por outro lado, se $\lambda \in \text{Spec}(T)$, seja $v \in V$ tal que $v \neq 0$ e $T(v) = \lambda v$, então:

$$T(T(v)) = \lambda^2 v, \dots, T^m(v) = \lambda^m v, \dots,$$

aí para $f(t) \in K[t]$ temos $f(T)(v) = f(\lambda) \cdot v$, aí $0 = m_T(T)(v) = m_T(\lambda) \cdot v$, aí $m_T(\lambda) = 0$. □

Corolário 4.15. Se T é diagonalizável e $\text{Spec}(T) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_r\}$, então:

$$m_T(t) = (t - \lambda_1) \dots (t - \lambda_r).$$

Demonstração. Já sabemos que:

$$m_T(t) = (t - \lambda_1)^{k_1} \dots (t - \lambda_r)^{k_r} q(t)$$

em que $q(t)$ não tem raízes em K . Seja

$$f(t) = (t - \lambda_1 I) \dots (t - \lambda_r I).$$

Seja $v \in V$, então $v = v_1 + \dots + v_r$ para alguns $v_i \in V_T(\lambda_i)$, aí temos $(T - \lambda_i I)(v_i) = 0$, aí $f(T)(v_i) = 0$; logo $f(T)(v) = 0$. Portanto $f(T) = 0$, aí $m_T \mid f$, aí $m_T = f$. \square

4.2 Restrições de Operadores

4.2.1 Subespaços Invariantes

Definição 4.16. Seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Um subespaço $W \subseteq V$ chama-se **T-invariante** se $T(W) \subseteq W$.

Observação 4.17. Um subespaço é T-invariante se e só se é um $K[t]$ -submódulo.

Exemplo 4.18. Seja $V = \mathbb{C}(\mathbb{R})$ e considere o operador $D: f \rightarrow f'$. Então o subespaço

$$P_n := \{f(t) \in \mathbb{R}[t] : \deg(f) \leq n\}$$

é D-invariante.

Proposição 4.19. Seja V um espaço vetorial de dimensão finita sobre um corpo K , seja $T \in \mathcal{L}(V)$ e seja W um subespaço T-invariante de V . Seja B_1 uma base de W e seja B uma base de V tal que $B_1 \subseteq B$. Então $B_2 = \{\bar{b} : b \in B \setminus B_1\}$ é uma base de V/W e, sendo $\bar{T} \in L(V/W)$ o operador induzido, temos:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} [T|_W]_{B_1} & * \\ 0 & [\bar{T}]_{B_2} \end{pmatrix},$$

Demonstração. Seja $\dim(V) = n$ e $T \in \mathcal{L}(V)$, e seja $W \subseteq V$ um subespaço T-invariante. Escolhemos uma base $B_1 = \{v_1, \dots, v_m\}$ de W e completamos uma base $B = \{v_1, \dots, v_m, v_{m+1}, \dots, v_n\}$ do espaço V . Qual é a matriz $[T]_B$?

Vamos começar notando que T é W-invariante e então:

$$\begin{aligned} T(v_1) &= \sum_{i=1}^m \alpha_{1,i} v_i \\ T(v_2) &= \sum_{i=1}^m \alpha_{2,i} v_i \\ &\vdots \\ T(v_m) &= \sum_{i=1}^m \alpha_{m,i} v_i \\ T(v_{m+1}) &= \sum_{i=1}^n \alpha_{m+1,i} v_i \\ &\vdots \\ T(v_n) &= \sum_{i=1}^n \alpha_{n,i} v_i. \end{aligned}$$

Dessa forma segue que:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} \alpha_{1,1} & \dots & \alpha_{1,m} & \alpha_{1,m+1} & \dots & \alpha_{1,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha_{m,1} & \dots & \alpha_{m,m} & \alpha_{m,m+1} & \dots & \alpha_{m,n} \\ 0 & \dots & 0 & \alpha_{m+1,m+1} & \dots & \alpha_{m+1,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & \alpha_{n,m+1} & \dots & \alpha_{n,n} \end{pmatrix}.$$

CAPÍTULO 4. FORMAS CANÔNICAS

4.2. RESTRIÇÕES DE OPERADORES

Isto é, a matriz de T na base B tem a forma:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} X & * \\ 0 & Y \end{pmatrix},$$

onde $X \in M_m(K)$ e $Y \in M_{n-m}(K)$. Note que X é a matriz da restrição de T a W na base B_1 . Além disso, temos o seguinte:

$$\begin{aligned} \bar{T}(\bar{v}_{m+1}) &= \sum_{i=m+1}^n \alpha_{m+1,i} \bar{v}_i \\ &\vdots \\ \bar{T}(\bar{v}_n) &= \sum_{i=m+1}^n \alpha_{n,i} \bar{v}_i. \end{aligned}$$

Portanto Y é a matriz da transformação \bar{T} na base $\{\bar{v}_{m+1}, \dots, \bar{v}_n\}$. \square

Lema 4.20. Seja $\dim(V) = n$, $T \in \mathcal{L}(V)$ e $W \subseteq V$ um subespaço T -invariante. Então:

$$p_T(t) = p_{T|_W}(t) \cdot p_{\bar{T}}(t)$$

em que \bar{T} é o operador induzido em V/W .

Demonstração. Escolhamos B_1 e B como bases de W e V tais que $B_1 \subseteq B$, então, considerando $B_2 = \{\bar{b} : b \in B \setminus B_1\}$, a matriz de T na base B tem a forma:

$$Z = \begin{pmatrix} X & * \\ 0 & Y \end{pmatrix},$$

onde X é a matriz de $T|_W$ em relação a B_1 e Y é a matriz de \bar{T} em relação a B_2 , assim:

$$\begin{aligned} p_T(t) &= p_Z(t) \\ &= \det(tI - Z) \\ &= \det \begin{pmatrix} tI_m - X & * \\ 0 & tI_{n-m} - Y \end{pmatrix} \\ &= \det(tI_m - X) \det(tI_{n-m} - Y) \\ &= p_X(t) p_Y(t) \\ &= p_{T|_W}(t) p_{\bar{T}}(t) \end{aligned} \quad \square$$

Observação 4.21. O mesmo **não** ocorre para polinômios minimais. De fato, seja $T = I_V$ e seja W um subespaço T -invariante (De fato, quando T é a identidade, todo subespaço de V é T -invariante), então $T_1 = I_W$ e $T_2 = I_{V/W}$ e aí $m_T(t) = m_{T_1}(t) = m_{T_2}(t) = t - 1$. Não obstante, ainda temos um resultado interessante para isso.

Lema 4.22. Seja $\dim(V) = n$, $T \in \mathcal{L}(V)$ e $W \subseteq V$ um subespaço T -invariante. Então:

$$m_{T|_W}(t) \mid m_T(t), \quad m_{\bar{T}}(t) \mid m_T(t),$$

em que \bar{T} é o operador induzido em V/W .

Demonstração. Escolhamos B_1 e B como bases de W e V tais que $B_1 \subseteq B$, então, considerando $B_2 = \{\bar{b} : b \in B \setminus B_1\}$, a matriz de T na base B tem a forma:

$$Z = \begin{pmatrix} X & * \\ 0 & Y \end{pmatrix},$$

onde X é a matriz de $T|_W$ em relação a B_1 e Y é a matriz de \bar{T} em relação a B_2 , assim é fácil de mostrar por indução que para todo $k \geq 0$ então temos uma matriz da forma:

$$Z^k = \begin{pmatrix} X^k & * \\ 0 & Y^k \end{pmatrix},$$

assim temos uma matriz é da forma:

$$m_T(Z) = \begin{pmatrix} m_T(X) & * \\ 0 & m_T(Y) \end{pmatrix},$$

mas sabemos que $m_T(Z) = 0$, aí $m_T(X) = 0$ e $m_T(Y) = 0$, aí a conclusão segue. \square

4.2.2 Subespaços Cíclicos

Definição 4.23. Seja V um espaço vetorial e $T \in \mathcal{L}(V)$. Para $v \in V$, definimos o **subespaço T -cíclico gerado por v** como o conjunto $Z(v, T)$ de todos os vetores da forma $p(T)(v)$ em que $p \in K[x]$. Dizemos que v é um **vetor cíclico** para T se e só se $Z(v, T) = V$.

Proposição 4.24. Seja V um espaço vetorial e seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Para $v \in V$, então $Z(v, T)$ é o subespaço gerado pelo conjunto $\{T^n(v) : n \in \mathbb{N}\}$.

Definição 4.25. Dado $v \in V$, um polinômio mônico de grau mínimo $m_{T,v}(t) \in K[t]$ tal que $m_{T,v}(T)(v) = 0$ chama-se um **polinômio T -anulador** do vetor v .

Lema 4.26. Seja $f(t) \in K[t]$ tal que $f(T)(v) = 0$. Então $m_{T,v}(t) \mid f(t)$.

Demonstração. Dividimos $f(t)$ por $m_{T,v}(t)$ (com resto):

$$f(t) = m_{T,v}(t) \cdot q(t) + r(t), \quad \deg(r(t)) < \deg(m_{T,v}(t)) \text{ ou } r(t) = 0.$$

Como $f(T)(v) = 0$ e $m_{T,v}(T)(v) = 0$, então $r(T)(v) = 0$, aí $r(t) = 0$. \square

Corolário 4.27. O polinômio $m_{T,v}(t)$ é único.

Teorema 4.28. Seja V um espaço vetorial e $T \in \mathcal{L}(V)$. Seja $v \in V$ que possua um polinômio T -anulador, e consideremos o polinômio $m_{T,v}$. Então:

- O grau de $m_{T,v}$ é igual à dimensão de $Z(v, T)$.
- Se o grau de $m_{T,v}$ é k , então $v, T(v), \dots, T^{k-1}(v)$ formam uma base de $Z(v, T)$.
- Se $W = Z(v, T)$, então $m_{T|_W} = m_{T,v}$.

O teorema seguinte mostra como subespaços cíclicos podem ser compostos e decompostos.

Teorema 4.29. Seja V um espaço vetorial e $T \in \mathcal{L}(V)$.

- (Compondo subespaços cíclicos) Se $u_1, \dots, u_n \in V$ tem T -anuladores mutuamente primos entre si, então o T -anulador de $u = u_1 + \dots + u_n$ é:

$$m_{T,u} = m_{T,u_1} \dots m_{T,u_n}$$

e também:

$$Z(u, T) = Z(u_1, T) \oplus \dots \oplus Z(u_n, T).$$

- (Decompondo subespaços cíclicos) Se $m_{T,u} = f_1 \dots f_n$ com f_1, \dots, f_n mutuamente primos entre si, então u tem a forma:

$$u = u_1 + \dots + u_n,$$

em que $m_{T,u_i} = f_i$, e também:

$$Z(u, T) = Z(u_1, T) \oplus \dots \oplus Z(u_n, T).$$

4.3 Teoremas de Cayley-Hamilton

4.3.1 Teorema de Cayley-Hamilton Usual

Teorema 4.30 (Teorema da Cayley-Hamilton). Seja V um espaço vetorial de dimensão finita sobre um corpo K , e seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Então $p_T(T) = 0$, onde $p_T(t) \in K[t]$ é um polinômio característico de T .

Demonstração. Basta provar que $\forall v \in V : p_T(T)(v) = 0$. Seja $v \in V$. Consideremos:

$$m_{T,v}(t) = t^m + \alpha_{m-1}t^{m-1} + \dots + \alpha_1t + \alpha_0,$$

o polinômio mônico de menor grau tal que $m_{T,v}(T)(v) = 0$. Então $B_1 = \{v, T(v), \dots, T^{m-1}(v)\}$ é linearmente independente. Seja W o subespaço gerado por ele. Note que W é T -invariante e ainda:

$$[T|_W]_{B_1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -\alpha_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -\alpha_{m-1} \end{pmatrix}$$

Então, pelo Exercício 18 da lista 1, segue que:

$$p_{T|_W}(t) = t^m + \alpha_{m-1}t^{m-1} + \dots + \alpha_1t + \alpha_0.$$

Aplicando essa função a v segue:

$$p_{T|_W}(T)(v) = m_{T,v}(T)(v) = 0.$$

Para concluir que $p_T(T)(v) = 0$, notamos que $p_T(t) = p_{T|_W}(t) \cdot p_{\bar{T}}(t)$, em que \bar{T} é o operador induzido em V/W . \square

Corolário 4.31. Se $A \in M_n(K)$ então $p_A(A) = 0$, onde $p_A(t) = \det(tI - A)$.

Exemplo 4.32. Considere a matriz

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Então temos que $p_A(t) = t^2 - (a+d)t + (ad-bc)$ e também

$$\begin{aligned} P_A(A) &= A^2 - (a+d)A + (ad-bc)I \\ &= \begin{pmatrix} a^2+bc & ab+ad \\ ac+dc & bc+d^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a^2+ad & ab+bd \\ ac+dc & ad+d^2 \end{pmatrix} + \det(A)I \\ &= \begin{pmatrix} bc-ad & 0 \\ 0 & bc-ad \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix} = 0. \end{aligned}$$

4.3.2 Teorema de Cayley Hamilton ao Avesso

Teorema 4.33 (Teorema da Cayley-Hamilton ao Avesso). Se V é espaço de dimensão finita e $T \in L(V)$, então todo polinômio irredutível que divide p_T também divide m_T .

Demonstração. Faremos a demonstração por indução na dimensão de V . Suponhamos o lema válido para $\dim(V) < n$. Seja V espaço vetorial tal que $\dim(V) = n$ e seja $T \in L(V)$ e seja p um polinômio irredutível que divide p_T . Se $V = 0$, é fácil. Senão, então tome um $v \neq 0$ qualquer. Consideremos:

$$m_{T,v}(t) = t^m + \alpha_{m-1}t^{m-1} + \dots + \alpha_1t + \alpha_0,$$

o polinômio mônico de menor grau tal que $m_{T,v}(T)(v) = 0$. Então $B_1 = \{v, T(v), \dots, T^{m-1}(v)\}$ é linearmente independente. Seja W o subespaço gerado por ele. Note que W é T -invariante e ainda:

$$[T|_W]_{B_1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -\alpha_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -\alpha_{m-1} \end{pmatrix}$$

Então, pelo Exercício 18 da lista 1, segue que:

$$p_{T|_W}(t) = t^m + \alpha_{m-1}t^{m-1} + \dots + \alpha_1t + \alpha_0.$$

Além disso, vendo a definição de $m_{T,v}$, é fácil ver que:

$$m_{T|_W}(t) = t^m + \alpha_{m-1}t^{m-1} + \dots + \alpha_1t + \alpha_0.$$

Sendo $\bar{T} \in L(V/W)$ o operador induzido, temos $p_T = p_{T|_W}p_{\bar{T}}$ e $m_{T|_W} \mid m_T$ e $m_{\bar{T}} \mid m_T$. Assim, como $p \mid p_T$, então $p \mid p_{T|_W}$ ou $p \mid p_{\bar{T}}$.

- Se $p \mid p_{T|_W}$, como $p_{T|_W} = m_{T|_W}$, então $p \mid m_{T|_W}$, aí $p \mid m_T$.
- Se $p \mid p_{\bar{T}}$, então, por hipótese de indução, temos $p \mid m_{\bar{T}}$, aí $p \mid m_T$. □

4.4 Decomposições Primárias

4.4.1 Decomposição Primária Geral

Teorema 4.34 (Decomposição Primária Geral). Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K tal que $\dim(V) = n < \infty$ e seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Suponhamos que $f(T) = 0$ e também:

$$f = f_1 \dots f_r,$$

com f_1, \dots, f_r mutuamente primos entre si. Para cada i seja $V_i = \text{Ker } f_i(T)$. Então:

- Cada V_i é T -invariante.
- $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_r$.
- Cada projeção canônica $P_i : V \rightarrow V_i$ é um polinômio de T .

Lema 4.35 (Identidade de Bézout). Se $\text{mdc}(f_1, \dots, f_r) = 1$ então existem $g_1, \dots, g_r \in K[t]$ tais que:

$$f_1g_1 + \dots + f_rg_r = 1.$$

Demonstração do Teorema. Para cada i , então para $v \in V_i$ temos $f_i(T)(v) = 0$, aí $Tf_i(T)(v) = 0$, aí $f_i(T)T(v) = 0$, aí $T(v) \in V_i$; logo V_i é T -invariante. Agora para cada i seja:

$$h_i = \frac{f}{f_i}.$$

Então $\text{mdc}(h_1, \dots, h_r) = 1$, assim existem $g_1, \dots, g_r \in K[t]$ tais que:

$$h_1g_1 + \dots + h_rg_r = 1,$$

aí:

$$h_1(T)g_1(T) + \dots + h_r(T)g_r(T) = I.$$

Para $v_1, \dots, v_r \in V$, se para todo i tivermos $v_i \in V_i$ e:

$$v_1 + \dots + v_r = 0,$$

então para cada i temos:

$$h_i(T)(v_1) + \dots + h_i(T)(v_r) = 0,$$

mas para cada $j \neq i$ então $f_j \mid h_i$, aí $h_i(T)(v_j) = 0$; assim:

$$h_i(T)(v_i) = 0,$$

mas:

$$v_i = h_1(T)g_1(T)(v_i) + \dots + h_r(T)g_r(T)(v_i),$$

e para cada $j \neq i$ temos $f_i \mid h_j$, aí $h_j(T)(v_i) = 0$; assim:

$$v_i = h_i(T)g_i(T)(v_i) = 0;$$

portanto:

$$v_1 = \dots = v_r = 0.$$

Para todo $v \in V$ então:

$$v = h_1(T)g_1(T)(v) + \dots + h_r(T)g_r(T)(v),$$

e para cada i temos:

$$f_i(T)h_i(T)g_i(T)(v) = f(T)g_i(T)(v) = 0,$$

aí:

$$h_i(T)g_i(T)(v) \in V_i;$$

logo:

$$V = V_1 \oplus \dots \oplus V_r,$$

e, para cada i , a função $h_i(T)g_i(T)$ é a projeção canônica de V em V_i . □

4.4.2 Decomposição Primária para Minimais

Teorema 4.36 (Decomposição Primária para Minimais). Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K tal que $\dim(V) = n < \infty$ e seja $T \in \mathcal{L}(V)$, e seja:

$$m_T = p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r},$$

com p_1, \dots, p_r irredutíveis e mutuamente primos entre si. Para cada i seja $V_i = \text{Ker } p_i(T)^{k_i}$. Então:

- Cada V_i é T -invariante.
- $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_r$.
- Cada projeção canônica $P_i : V \rightarrow V_i$ é um polinômio de T .
- Para cada i então $m_{T|_{V_i}} = p_i^{k_i}$.

Demonstração. Por definição temos $m_T(T) = 0$. Logo, pelo teorema da decomposição primária geral, temos os três primeiros itens. Agora considere $T_i := T|_{V_i}$ para cada $i = 1, \dots, r$. Temos que $p_i(T_i)^{k_i} = 0$. Então segue que $m_{T_i} \mid p_i^{k_i}$, ou seja, $m_{T_i} = p_i^{m_i}$, onde $m_i \leq k_i$. Consideremos:

$$g = p_1^{k_1} \dots p_i^{m_i} \dots p_r^{k_r}.$$

Para $j \neq i$ e para $v \in V_j$, então $p_j^{k_j}(v) = 0$ e portanto $g(T)(v) = 0$. Se $v \in V_i$ então $p_i^{m_i}(T)(v) = 0$ e $g(T)(v) = 0$. Assim, como $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_r$, concluímos que $g(T) = 0$. Isso implica que $m_T \mid g$, aí $p_i^{k_i} \mid p_i^{m_i}$, aí $k_i \leq m_i$, assim $m_i = k_i$, aí $m_{T_i} = p_i^{k_i}$. □

A decomposição primária para minimais também goza de uma propriedade muito importante para o estudo da álgebra linear.

Teorema 4.37 (Unicidade da Decomposição Primária para Minimais). Seja V um espaço vetorial e seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Suponhamos que:

$$V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_m$$

em que U_i é um subespaço T -invariante tal que $m_{T|_{U_i}} = p_i^{e_i}$ e p_1, \dots, p_m são polinômios mônicos irredutíveis distintos, e suponhamos que:

$$V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_n$$

em que W_j é um subespaço T -invariante tal que $m_{T|_{W_j}} = q_j^{f_j}$ e q_1, \dots, q_n são polinômios mônicos irredutíveis distintos. Então $m = n$ e, depois de uma reindexação adequada, $U_k = W_k$ para todo k . Portanto $p_k = q_k$ e $e_k = f_k$ para todo k .

Demonstração. Para todo i , então U_i contém um elemento u_i tal que $m_{T, u_i} = p_i^{e_i}$; assim, definindo a soma $u = u_1 + \cdots + u_m$, então $m_{T, u} = p_1^{e_1} \cdots p_m^{e_m}$. Logo $m_T = p_1^{e_1} \cdots p_m^{e_m}$. Analogamente temos $m_T = q_1^{f_1} \cdots q_n^{f_n}$.

Portanto, pela fatoração única em $K[t]$, então $m = n$ e, depois de uma reindexação apropriada, temos $p_k = q_k$ e $e_k = f_k$ para todo k . Para todo k , temos:

$$U_k \subseteq \text{Ker } p_k(T)^{e_k},$$

mas pela decomposição primária geral temos:

$$U_1 \oplus \cdots \oplus U_m = (\text{Ker } p_1(T)^{e_1}) \oplus \cdots \oplus (\text{Ker } p_m(T)^{e_m}),$$

aí para todo k temos $U_k = \text{Ker } p_k(T)^{e_k}$. Analogamente temos $W_k = \text{Ker } q_k(T)^{f_k}$ para todo k . \square

4.4.3 Decomposição Primária para Característicos

Teorema 4.38 (Decomposição Primária para Característicos). Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K tal que $\dim(V) = n < \infty$ e seja $T \in \mathcal{L}(V)$, e seja:

$$p_T = p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r},$$

com p_1, \dots, p_r irredutíveis e mutuamente primos entre si. Para cada i seja $V_i = \text{Ker } p_i(T)^{k_i}$. Então:

- Cada V_i é T -invariante.
- $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_r$.
- Cada projeção canônica $P_i : V \rightarrow V_i$ é um polinômio de T .
- Para cada i então $p_{T|_{V_i}} = p_i^{k_i}$.

Demonstração. Pelo teorema de Cayley-Hamilton temos $p_T(T) = 0$. Portanto, pelo teorema da decomposição primária geral, temos os três primeiros itens. Agora considere $T_i := T|_{V_i}$ para cada $i = 1, \dots, r$. Temos que $p_i(T_i)^{k_i} = 0$. Então segue que $m_{T_i} \mid p_i^{k_i}$, aí, pelo teorema de Cayley-Hamilton [ao avesso](#) (Teorema 4.33), todo fator irredutível de p_{T_i} deve dividir m_{T_i} , logo ser igual a p_i . Assim $p_{T_i} = p_i^{l_i}$ para algum l_i . Entretanto, considerando bases B_i de V_i , e juntando numa base B de V , é fácil ver que $p_T = p_{T_1} \cdots p_{T_r}$, assim $p_T = p_1^{l_1} \cdots p_r^{l_r}$, aí pela fatoração única devemos ter $l_i = k_i$ para todo i , concluindo a demonstração. \square

4.5 Critérios de Diagonalização

4.5.1 Diagonalização Usual

Teorema 4.39. Um operador $T \in \mathcal{L}(V)$ é diagonalizável se, e somente se:

$$m_T(t) = (t - \lambda_1) \dots (t - \lambda_r)$$

com $\lambda_i \neq \lambda_j$ sempre que $i \neq j$.

Demonstração. A ida já foi provada no corolário 4.15, então vamos mostrar apenas a volta. Pelo teorema da decomposição primária geral, sendo $V_i = \text{Ker}(T - \lambda_i I)$ para todo i , então cada V_i é T -invariante e $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_r$, aí para todo i temos $T|_{V_i} = \lambda_i I$, aí $V_i \subseteq V_T(\lambda_i)$; logo T é diagonalizável. \square

4.5.2 Diagonalização Simultânea de Vários Operadores

Considere $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{L}(V)$. Em que condições os operadores $T \in \mathcal{F}$ podem ser diagonalizados simultaneamente, ou seja, existe base B de V tal que para todo $T \in \mathcal{F}$ a matriz $[T]_B$ seja diagonal?

Teorema 4.40. Um conjunto $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{L}(V)$ pode ser diagonalizado simultaneamente se, e somente se cada $T \in \mathcal{F}$ é diagonalizável e $TU = UT$ para quaisquer $T, U \in \mathcal{F}$.

Demonstração. Mostraremos por indução na dimensão. Suponhamos que o teorema é válido para espaços de dimensão menor que n . Seja V um espaço tal que $\dim(V) = n$ e seja \mathcal{F} um conjunto de operadores que comutam um com outro. Se todo elemento de \mathcal{F} é múltiplo da identidade, então acaba. Caso contrário, existe um $T \in \mathcal{F}$ que não é múltiplo da identidade. Sejam c_1, \dots, c_k os autovalores de T . Para i seja $W_i = \text{Ker}(T - c_i I)$. Então, como os elementos de \mathcal{F} comutam um com outro, então W_i é invariante para todo elemento de \mathcal{F} . Para cada $U \in \mathcal{F}$, então m_U é produto de fatores lineares distintos, aí, como $m_U|_{W_i} \mid m_U$, então $m_U|_{W_i}$ é produto de fatores lineares distintos, aí $U|_{W_i}$ é diagonalizável. Como $\dim(W_i) < n$, então existe uma base B_i tal que para todo $U \in \mathcal{F}$ a matriz $[U|_{W_i}]_{B_i}$ seja diagonal. Portanto $B = B_1 \cup \dots \cup B_k$ é a base que buscamos. \square

4.6 Triangularização de Matrizes

4.6.1 Triangularização Usual

Definição 4.41. Um operador linear $T \in \mathcal{L}(V)$ é dito **triangularizável** se existe uma base ordenada $B = (v_1, \dots, v_n)$ de V tal que a matriz $[T]_B$ seja triangular por cima, ou equivalentemente, se:

$$T(v_i) \in \langle v_1, \dots, v_i \rangle$$

para todo $i = 1, \dots, n$.

Teorema 4.42 (Teorema de Schur). Seja V um espaço vetorial de dimensão finita sobre um corpo K e seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Se o polinômio característico (ou o polinômio minimal) de T se decompõe em fatores lineares sobre K , então T é triangularizável.

Demonstração. Provaremos por indução em n que cada matriz $A \in \mathcal{M}_n(K)$ cujo polinômio característico se decompõe em fatores lineares sobre K é similar a uma matriz triangular por cima. Se $n = 1$, então é fácil, já que todas as matrizes quadradas de tamanho 1 são triangulares por cima. Assumamos o resultado para $n - 1$ e seja $A \in \mathcal{M}_n(K)$ tal que o polinômio característico se decompõe em fatores lineares sobre K .

Seja λ um autovalor de T e seja $e_1 \neq 0$ tal que $T(e_1) = \lambda e_1$, e estenda (e_1) a uma base ordenada $B = (e_1, \dots, e_n)$ de K^n . A matriz de A em relação a B tem a forma:

$$[A]_B = \begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & A' \end{pmatrix}$$

para alguma matriz $A' \in M_{n-1}(K)$. Como $[A]_B$ e A são similares, temos:

$$\det(xI - A) = \det(xI - [A]_B) = (x - \lambda) \det(xI - A').$$

Portanto o polinômio característico de A' também se decompõe em fatores lineares sobre K a hipótese de indução implica que exista uma matriz inversível $P \in M_{n-1}(K)$ tal que:

$$U = PA'P^{-1}$$

seja triangular por cima. Assim, se:

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P \end{pmatrix},$$

então Q é inversível e:

$$Q[A]_B Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & A' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & U \end{pmatrix}$$

é triangular por cima. □

Corolário 4.43. Num corpo algebricamente fechado K , então toda matriz sobre K é semelhante sobre K a uma matriz triangular superior.

Observação 4.44. Por outro lado, se $T \in \mathcal{L}(V)$ é triangularizável, então é evidente que o polinômio característico de T se decompõe em fatores lineares sobre K .

Demonstração. Para isto, apenas considere a matriz triangular superior:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \dots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & a_{2,3} & \dots & a_{2,n} \\ 0 & 0 & a_{3,3} & \dots & a_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}.$$

Então é fácil ver que:

$$p_T(x) = (x - a_{1,1}) \dots (x - a_{n,n}),$$

ou seja, o polinômio característico se decompõe em fatores lineares sobre K . □

4.6.2 Triangularização Simultânea de Vários Operadores

Considere $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{L}(V)$. Em que condições os operadores $T \in \mathcal{F}$ podem ser triangularizados simultaneamente, ou seja, existe base B de V tal que para todo $T \in \mathcal{F}$ a matriz $[T]_B$ seja triangular por cima?

Infelizmente não responderemos a esta pergunta, mas mostraremos uma condição suficiente para a triangularização simultânea.

Teorema 4.45. Seja $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{L}(V)$ um conjunto tal que cada $T \in \mathcal{F}$ seja triangularizável e $TU = UT$ para quaisquer $T, U \in \mathcal{F}$. Então \mathcal{F} pode ser triangularizado simultaneamente.

Lema 4.46. Para todo espaço vetorial V de dimensão finita tal que $V \neq 0$ e conjunto $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{L}(V)$ de operadores triangularizáveis que comutam um com outro, então existe um $v \in V$ tal que $v \neq 0$ e para todo $T \in \mathcal{F}$ exista $\lambda \in K$ tal que $T(v) = \lambda v$.

Demonstração. Suponhamos a afirmação para espaços vetoriais de dimensão menor que n . Seja V um espaço com $\dim(V) = n$. Seja \mathcal{F} conjunto de operadores triangularizáveis que comutam. Se todo elemento de \mathcal{F} é múltiplo da identidade, então acaba. Senão, então existe $T \in \mathcal{F}$ que não é múltiplo da identidade, então, como T é triangularizável, então existe um autovalor c , aí, sendo $W = \text{Ker}(T - cI)$, então $0 < \dim(W) < n$, aí, como os elementos de \mathcal{F} se comutam, então W é invariante para todo elemento de \mathcal{F} . Para $U \in \mathcal{F}$, então m_U é produto de fatores lineares, aí, como $m_{U|_W} \mid m_U$, então $m_{U|_W}$ é produto de fatores lineares, aí $U|_W$ é triangularizável. Como $\dim(W) < n$, então existe um $v \in W$ não nulo tal que para cada $U \in \mathcal{F}$ exista um $\lambda \in K$ tal que $(U|_W)(v) = \lambda v$, aí $U(v) = \lambda v$; aí acaba. \square

Demonstração do Teorema. \square

4.6.3 Quase Triangularização

4.7 Decomposições Cíclicas

4.7.1 Espaços Primários

Definição 4.47. Seja V um espaço vetorial e seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Dizemos que V é **primário** em relação a T se e só se existe um polinômio irredutível $p(t) \in K[t]$ e um natural e tal que $p(T)^e = 0$.

O seguinte teorema mostra como podemos decompor um espaço vetorial anulável por uma potência de polinômio irredutível em subespaços cíclicos.

Teorema 4.48 (Decomposição Cíclica de Espaços Primários). Seja V um espaço vetorial com *dimensão finita* e seja $T \in \mathcal{L}(V)$ tal que $m_T = p^e$, em que p é um polinômio irredutível. Então V é uma soma direta:

$$V = Z(v_1, T) \oplus \cdots \oplus Z(v_n, T)$$

de subespaços cíclicos com anuladores $m_{T, v_i} = p^{e_i}$, que podem ser arranjados em ordem decrescente:

$$e = e_1 \geq e_2 \geq \cdots \geq e_n.$$

Demonstração. Seja $v_1 \in V$ um vetor com anulador igual a polinômio minimal de T , ou seja:

$$m_{T, v_1} = m_T = p^e.$$

Tal elemento deve existir pois $m_{T, v} \mid m_T$ para todo $v \in V$ e se ninguém tiver anulador igual a $p(t)^e$, então $p(t)^{e-1}$ anulará V .

Se mostrarmos que $Z(v_1, T)$ possui complemento T -invariante, ou seja, $V = Z(v_1, T) \oplus S_1$ para algum subespaço T -invariante S_1 , então, como S_1 tem dimensão finita sobre K , ao considerarmos $T|_{S_1}$, podemos repetir o processo para obter:

$$V = Z(v_1, T) \oplus Z(v_2, T) \oplus S_2$$

em que $m_{T, v_i} = p^{e_i}$. Podemos continuar esta decomposição:

$$V = Z(v_1, T) \oplus Z(v_2, T) \oplus \cdots \oplus Z(v_n, T) \oplus S_n$$

enquanto $S_n \neq 0$. Mas a sequência ascendente de subespaços T -invariantes:

$$Z(v_1, T) \subseteq Z(v_1, T) \oplus Z(v_2, T) \subseteq \cdots$$

deve terminar pois a sequência das dimensões é estritamente crescente e V tem dimensão finita, assim existe um inteiro n tal que $S_n = 0$, fornecendo-nos a decomposição buscada.

CAPÍTULO 4. FORMAS CANÔNICAS

4.7. DECOMPOSIÇÕES CÍCLICAS

Seja $v = v_1$. A soma direta de subespaços T -invariantes $V_1 = Z(v, T) \oplus 0$ claramente existe. Suponhamos que a soma direta de subespaços T -invariantes:

$$V_k = Z(v, T) \oplus W_k$$

exista. Afirmamos que, se $V_k \neq V$, então é possível encontrar um subespaço T -invariante W_{k+1} que contenha propriamente W_k e para o qual a soma direta $V_{k+1} = Z(v, T) \oplus W_{k+1}$ exista. Este processo deve também terminar após um número finito de passos, fornecendo-nos uma decomposição em soma direta de subespaços T -invariantes:

$$V = Z(v, T) \oplus W$$

como desejado.

Se $V_k \neq V$, então seja $u \in V \setminus V_k$, aí o polinômio de menor grau r tal que $r(T)(u) \in V_k$ deve ser p^f para algum $f \leq e$. Além disso, como $u \notin V_k$, então $f > 0$. Assim existem $a(t) \in K[t]$ e $w \in W_k$ tais que:

$$p(T)^f(u) = a(T)(v) + w.$$

Logo:

$$0 = p(T)^e(u) = p(T)^{e-f}p(T)^f(u) = p(T)^{e-f}(a(T)(v) + w) = p(T)^{e-f}a(T)(v) + p(T)^{e-f}(w).$$

Como $Z(v, T) \cap W_k = 0$ então $p(T)^{e-f}a(T)(v) = 0$, aí $p^e \mid p^{e-f}a$, aí $p^f \mid a$, aí existe $\alpha(t) \in K[t]$ tal que $a = p^f\alpha$, assim:

$$p(T)^f(u) = a(T)(v) + w = p(T)^f\alpha(T)(v) + w,$$

aí:

$$p(T)^f(u - \alpha(T)(v)) \in W_k.$$

Assim seja:

$$W_{k+1} = W_k + Z(u - \alpha(T)(v), T).$$

Para $x \in Z(v, T) \cap W_{k+1}$, então existem $f(t) \in K[t]$ e $g(t) \in K[t]$ e $w \in W_k$ tais que:

$$x = f(T)(v) = w + g(T)(u - \alpha(T)(v)),$$

aí:

$$g(T)(u) = (f - g\alpha)(T)(v) - w \in V_k,$$

aí $p^f \mid g$, aí:

$$g(T)(u - \alpha(T)(v)) \in W_k,$$

aí:

$$x \in Z(v, T) \cap W_k,$$

aí $x = 0$. Logo a soma direta de subespaços T -invariantes:

$$V_{k+1} = Z(v, T) \oplus W_{k+1}$$

existe. □

A decomposição cíclica de espaços primários, assim como a decomposição primária para minimais, goza da propriedade da unicidade.

Teorema 4.49 (Unicidade da Decomposição Cíclica de Espaços Primários). Seja V um espaço vetorial e seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Suponhamos que V é uma soma direta:

$$V = Z(u_1, T) \oplus \cdots \oplus Z(u_m, T),$$

em que $m_{T,u_i} = p_i^{e_i}$ e também:

$$e_1 \geq e_2 \geq \cdots \geq e_m,$$

e também suponhamos que V é uma soma direta:

$$V = Z(v_1, T) \oplus \cdots \oplus Z(v_n, T),$$

em que $m_{T,v_j} = q_j^{f_j}$ e também:

$$f_1 \geq f_2 \geq \cdots \geq f_n.$$

Então $m = n$ e $p = q$ e $e_k = f_k$ para todo k .

Lema 4.50. Seja V um espaço vetorial e $T \in \mathcal{L}(V)$ e seja $p(t)$ um polinômio irredutível.

- Se $p(T) = 0$, então V é um espaço vetorial sobre o corpo $K[t]/p(t)K[t]$ com a multiplicação definida por:

$$\bar{r}(v) = r(T)v$$

para quaisquer $r(t) \in K[t]$ e $v \in V$.

- Para qualquer subespaço T -invariante W de V o conjunto:

$$W \cap \text{Ker } p(T) = \{v \in W : p(T)(v) = 0\}$$

é um subespaço T -invariante de V e se $V = U \oplus W$, então:

$$\text{Ker } p(T) = (U \cap \text{Ker } p(T)) \oplus (W \cap \text{Ker } p(T)).$$

Demonstração do Teorema. Primeiro notemos que $m_T = p_1^{e_1}$ e $m_T = q_1^{f_1}$. Assim $p = q$ e $e_1 = f_1$. Agora mostraremos que $m = n$. De acordo com o lema anterior, sendo $W = \text{Ker } p(T)$, então:

$$W = (W \cap Z(u_1, T)) \oplus \cdots \oplus (W \cap Z(u_m, T))$$

e também:

$$W = (W \cap Z(v_1, T)) \oplus \cdots \oplus (W \cap Z(v_n, T)).$$

Como $p(T)[W] = 0$, então W é um espaço vetorial sobre o corpo $L = K[t]/p(t)K[t]$ e aí cada uma das duas decomposições expressa W como uma soma direta de subespaços de dimensão 1. Logo $m = \dim_L(W) = n$.

Finalmente mostraremos que os expoentes e_i e f_i são iguais usando indução em e_1 . Se $e_1 = 1$, então $e_i = 1$ para todo i e como $f_1 = e_1$, temos também $f_i = 1$ para todo i . Suponhamos que o resultado seja válido para $e_1 \leq k-1$ e seja $e_1 = k$. Escreva:

$$(e_1, \dots, e_n) = (e_1, \dots, e_s, 1, \dots, 1), \quad e_s > 1$$

e

$$(f_1, \dots, f_n) = (f_1, \dots, f_t, 1, \dots, 1), \quad f_t > 1.$$

Então:

$$p(T)[V] = p(T)[Z(u_1, T)] \oplus \cdots \oplus p(T)[Z(u_m, T)]$$

e

$$p(T)[V] = p(T)[Z(v_1, T)] \oplus \cdots \oplus p(T)[Z(v_n, T)],$$

mas $p(T)[Z(v_1, T)]$ é um subespaço cíclico anulável por $p(T)^{e_1-1}$, aí pela hipótese de indução temos:

$$s = t \quad \text{e} \quad e_1 = f_1, \dots, e_s = f_s,$$

concluindo assim a demonstração da unicidade. □

4.7.2 Decomposição Cíclica em Divisores Elementares

Agora podemos juntar a decomposição primária para minimais e a decomposição cíclica para espaços primários e obter a decomposição cíclica em divisores elementares.

Teorema 4.51 (Decomposição Cíclica em Divisores Elementares). Seja V um espaço vetorial de dimensão finita e seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Se o polinômio minimal é dado por:

$$m_T = p_1^{e_1} \cdots p_n^{e_n},$$

em que os p_i são polinômios irredutíveis mônicos distintos sobre K , então V pode ser decomposto em uma soma direta:

$$V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_n,$$

em que:

$$V_i = \text{Ker } p_i(T)^{e_i}$$

é um subespaço T -invariante tal que $m_{T|_{V_i}} = p_i^{e_i}$. Finalmente, cada subespaço T -invariante V_i pode ser escrito como uma soma direta de submódulos cíclicos, de modo que:

$$V = \left(Z(v_{1,1}, T) \oplus \cdots \oplus Z(v_{1,k_1}, T) \right) \oplus \left(Z(v_{n,1}, T) \oplus \cdots \oplus Z(v_{n,k_n}, T) \right),$$

em que $m_{T, v_{i,j}} = p_i^{e_{i,j}}$ e os termos de cada decomposição cíclica podem ser arranjados de modo que para cada i tenhamos:

$$e_i = e_{i,1} \geq e_{i,2} \geq \cdots \geq e_{i,k_i}.$$

Além disso, juntando os teoremas das unicidades da decomposição primária para minimais e da decomposição cíclica para espaços primários, então temos a unicidade da decomposição cíclica em divisores elementares.

Teorema 4.52 (Unicidade da Decomposição Cíclica em Divisores Elementares). Seja V um espaço vetorial e seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Suponhamos que V possa ser escrito como uma soma direta:

$$V = \left(Z(u_{1,1}, T) \oplus \cdots \oplus Z(u_{1,k_1}, T) \right) \oplus \cdots \oplus \left(Z(u_{m,1}, T) \oplus \cdots \oplus Z(u_{m,k_m}, T) \right)$$

em que $m_{T, u_{i,j}} = p_i^{e_{i,j}}$ e:

$$e_{i,1} \geq e_{i,2} \geq \cdots \geq e_{i,k_i},$$

e suponhamos que V possa ser escrito como uma soma direta:

$$V = \left(Z(v_{1,1}, T) \oplus \cdots \oplus Z(v_{1,l_1}, T) \right) \oplus \cdots \oplus \left(Z(v_{n,1}, T) \oplus \cdots \oplus Z(v_{n,l_n}, T) \right)$$

em que $m_{T, v_{i,j}} = q_i^{f_{i,j}}$ e:

$$f_{i,1} \geq f_{i,2} \geq \cdots \geq f_{i,l_i}.$$

Então:

- O número de somandos é o mesmo em ambas as decomposições; de fato, $m = n$ e, depois de uma reindexação apropriada, $k_u = l_u$ para todo u .
- Os subespaços primários são os mesmos; isto é, depois de uma reindexação apropriada, para todo i temos $p_i = q_i$ e:

$$Z(u_{i,1}, T) \oplus \cdots \oplus Z(u_{i,k_i}, T) = Z(v_{i,1}, T) \oplus \cdots \oplus Z(v_{i,l_i}, T).$$

Definição 4.53. O multiconjunto dos polinômios $p_i^{e_{i,j}}$ é unicamente determinado pela decomposição cíclica em divisores elementares, assim ele é chamado o multiconjunto dos **divisores elementares**.

4.7.3 Decomposição Cíclica em Fatores Invariantes

A forma mais usual de se apresentar uma decomposição em subespaços cíclicos é a decomposição cíclica em fatores invariantes.

Teorema 4.54 (Decomposição Cíclica em Fatores Invariantes). Seja V um espaço vetorial de *dimensão finita* e seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Então V pode ser escrito como uma soma direta:

$$V = Z(v_1, T) \oplus \cdots \oplus Z(v_r, T)$$

em que $m_{T, v_i} = p_i$ e também:

$$p_r \mid p_{r-1} \mid \cdots \mid p_2 \mid p_1.$$

Demonstração. De acordo com a decomposição cíclica em divisores elementares, V pode ser escrito como soma direta:

$$V = \left(Z(u_{1,1}, T) \oplus \cdots \oplus Z(u_{1,k_1}, T) \right) \oplus \cdots \oplus \left(Z(u_{m,1}, T) \oplus \cdots \oplus Z(u_{m,k_m}, T) \right)$$

em que $m_{T, u_{i,j}} = p_i^{e_{i,j}}$ e:

$$e_{i,1} \geq e_{i,2} \geq \cdots \geq e_{i,k_i},$$

assim podemos combinar somandos cíclicos com polinômios minimais relativamente primos. Uma maneira de fazer isto é pegar o subespaço cíclico $Z(u_{i,1}, T)$ de cada coleção:

$$Z(u_{i,1}, T) \oplus \cdots \oplus Z(u_{i,k_i}, T)$$

para obtermos o seguinte:

$$Z(v_1, T) = Z(u_{1,1}, T) \oplus \cdots \oplus Z(u_{m,1}, T)$$

e repetir o processo:

$$Z(v_2, T) = Z(u_{1,2}, T) \oplus \cdots \oplus Z(u_{m,2}, T)$$

$$Z(v_3, T) = Z(u_{1,3}, T) \oplus \cdots \oplus Z(u_{m,3}, T)$$

\vdots

É claro que alguns somandos podem estar faltando aqui pois os diferentes subespaços primários:

$$Z(u_{i,1}, T) \oplus \cdots \oplus Z(u_{i,k_i}, T)$$

não necessariamente têm o mesmo número de somandos. De qualquer modo o resultado de reorganjarmos e combinarmos os somandos cíclicos é uma decomposição da forma:

$$V = Z(v_1, T) \oplus \cdots \oplus Z(v_r, T).$$

□

Por causa da unicidade da decomposição cíclica em divisores elementares, então temos a unicidade da decomposição cíclica em fatores invariantes

Teorema 4.55 (Unicidade da Decomposição Cíclica em Fatores Invariantes). Seja V um espaço vetorial e seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Suponhamos que V possa ser escrito como uma soma direta:

$$V = Z(u_1, T) \oplus \cdots \oplus Z(u_r, T)$$

em que $m_{T, u_i} = p_i$ e também:

$$p_r \mid p_{r-1} \mid \cdots \mid p_2 \mid p_1,$$

e que V possa ser escrito como uma soma direta:

$$V = Z(v_1, T) \oplus \cdots \oplus Z(v_s, T)$$

em que $m_{T, v_j} = q_j$ e também:

$$q_s \mid q_{s-1} \mid \cdots \mid q_2 \mid q_1.$$

Então $m = n$ e também $p_k = q_k$ para todo k .

Definição 4.56. A sequência dos polinômios p_i é unicamente determinado pela decomposição cíclica em fatores invariantes, assim ela é chamada a sequência dos **fatores invariantes**.

4.8 Formas Racionais de Matrizes

4.8.1 Matrizes Companheiras

Definição 4.57. Definimos a **matriz companheira** do polinômio mônico:

$$p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$$

como a matriz:

$$C[p(x)] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

Teorema 4.58. Dado polinômio $p(x) \in K[x]$, então temos:

$$PC[p(x)](x) = m_{C[p(x)]} = p(x).$$

Além disso, um espaço vetorial V possui um vetor cíclico para $T \in \mathcal{L}(V)$ se e somente se T pode ser representado por uma matriz companheira, e nesse caso a base representante é T -cíclica.

Demonstração. Veja o Exercício 15 da lista 2. □

4.8.2 Forma Racional para Divisores Elementares

Agora estamos prontos para determinar um conjunto de formas canônicas para similaridade entre matrizes. Faremos isto através das formas racionais. Há pelo menos dois tipos de formas racionais: a forma racional para divisores elementares e a forma racional para fatores invariantes. Primeiro apresentaremos as formas racionais para divisores elementares.

Definição 4.59. Dizemos que uma matriz A está na **forma racional para divisores elementares** se e só se A é da forma:

$$\begin{pmatrix} C[r_1^{e_1}(x)] & & \\ & \ddots & \\ & & C[r_n^{e_n}(x)] \end{pmatrix},$$

em que os $r_i(x)$ são polinômios mônicos irredutíveis.

Teorema 4.60 (Forma Racional para Divisores Elementares). Cada classe de similaridade S de matrizes contém uma matriz A na forma racional para divisores elementares. Além disso, o conjunto das matrizes em S que estão nessa forma é o conjunto de matrizes obtidas de A através de reordenação das matrizes companheiras no bloco diagonal.

Demonstração. Seja V um espaço vetorial de *dimensão finita* e seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Pela decomposição cíclica em divisores elementares, o espaço V pode ser expressado pela seguinte soma direta:

$$V = \left(Z(v_{1,1}, T) \oplus \cdots \oplus Z(v_{1,k_1}, T) \right) \oplus \left(Z(v_{n,1}, T) \oplus \cdots \oplus Z(v_{n,k_n}, T) \right),$$

em que $m_{T, v_{i,j}} = p_i^{e_{i,j}}$ e também:

$$e_{i,1} \geq e_{i,2} \geq \cdots \geq e_{i,k_i}.$$

A concatenação B das bases ordenadas:

$$B_{i,j} = \left(v_{i,j}, T(v_{i,j}), \dots, T^{d_{i,j}-1}(v_{i,j}) \right),$$

em que $d_{i,j} = \deg(p_i) \cdot e_{i,j}$, é uma base ordenada tal que:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} C[p_1^{e_{1,1}}(x)] & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & C[p_1^{e_{1,k_1}}(x)] & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & C[p_n^{e_{n,1}}(x)] & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & C[p_n^{e_{n,k_n}}(x)] \end{pmatrix}$$

O restante do enunciado pode ser demonstrada tendo em mente a unicidade da decomposição cíclica em divisores elementares. \square

4.8.3 Forma Racional para Fatores Invariantes

Agora apresentaremos a forma racional para fatores invariantes, que é a forma racional usual da álgebra linear. Portanto, se alguém pedir que representemos uma matriz na forma racional, muito provavelmente está pedindo a forma racional para fatores invariantes.

Definição 4.61. Dizemos que uma matriz A está na **forma racional para fatores invariantes** se e só se A é uma matriz da forma:

$$\begin{pmatrix} C[s_1(x)] & & \\ & \ddots & \\ & & C[s_n(x)] \end{pmatrix},$$

em que $s_{k+1}(x) \mid s_k(x)$ para $k = 1, \dots, n-1$.

Teorema 4.62 (Forma Racional para Fatores Invariantes). Cada classe de similaridade S de matrizes contém uma matriz A na forma racional para fatores invariantes. Além disso, o conjunto das matrizes em S que estão nessa forma é o conjunto de matrizes obtidas de A através de reordenação das matrizes companheiras no bloco diagonal.

Lema 4.63. Se $p(x), q(x)$ são polinômios mônicos primos entre si, então:

$$C[p(x)q(x)] \sim \begin{pmatrix} C[p(x)] & \\ & C[q(x)] \end{pmatrix}.$$

Demonstração do Lema. Se uma matriz A tem polinômio minimal:

$$m_T = p_1^{e_1} \dots p_n^{e_n}$$

de grau igual ao tamanho da matriz, então o teorema das formas racionais para divisores elementares implica que os divisores elementares de A são precisamente:

$$p_1^{e_1}, \dots, p_n^{e_n}.$$

Como as matrizes $C[p(x)q(x)]$ e $C[p(x)] \oplus C[q(x)]$ têm o mesmo tamanho m e o mesmo polinômio minimal $p(x)q(x)$ de grau m , segue que eles têm o mesmo multiconjunto dos divisores elementares e assim são similares. \square

Demonstração do Teorema. O lema pode ser usado para rearranjar e combinar as matrizes companheiras numa matriz A em forma racional para divisores elementares para produzir uma matriz em forma racional para fatores invariantes que seja similar a A . Além disso, é fácil ver que este processo é reversível. \square

Finalizaremos esta seção mostrando uma aplicação das formas racionais para divisores elementares.

Teorema 4.64. O polinômio característico de uma matriz é igual ao produto de seus divisores elementares.

Demonstração. Seja A uma matriz, então ela é similar a uma matriz na forma racional para divisores elementares:

$$\begin{pmatrix} C[r_1(x)] & & \\ & \ddots & \\ & & C[r_n(x)] \end{pmatrix}.$$

Sabemos que o polinômio característico de $C[r_i(x)]$ é igual a $r_i(x)$, assim o resultado segue. \square

4.9 Formas de Jordan de Matrizes

4.9.1 Forma de Jordan Usual

As formas racionais, seja para divisores elementares ou para fatores invariantes, têm a façanha de que todo operador linear num espaço vetorial de dimensão finita tem uma forma racional canônica, seja para divisores elementares ou para fatores invariantes. Porém, as formas racionais podem estar longes do ideal de simplicidade que tínhamos em mente para um conjunto de formas canônicas fáceis de apresentar, assim servem mais como ferramentas teóricas do que práticas.

Quando V tem dimensão finita e o polinômio minimal $m_T(x)$ de T se decompõe sobre K , ou seja:

$$m_T(x) = (x - c_1)^{r_1} \dots (x - c_k)^{r_k},$$

então existe uma outra forma canônica que é bem mais fácil de apresentar do que a forma racional.

De algum modo, a complexidade das formas racionais vem da escolha da base para os subespaços T -invariantes cíclicos $Z(v_{i,j}, T)$. Recordemos que as bases T -cíclicas têm a forma:

$$B_{i,j} = (v_{i,j}, T(v_{i,j}), \dots, T^{d_{i,j}-1}(v_{i,j})),$$

em que $d_{i,j} = \deg(p_i) \cdot e_{i,j}$. Com essa base, toda complexidade no final quando tentamos expressar:

$$T(T^{d_{i,j}-1}(v_{i,j})) = T^{d_{i,j}}(v_{i,j})$$

como combinação linear dos vetores da base.

No entanto, como $B_{i,j}$ tem a forma:

$$(v, T(v), T^2(v), \dots, T^{d-1}(v)),$$

então qualquer sequência da forma:

$$(p_0(T)(v), p_1(T)(v), \dots, p_{d-1}(T)(v))$$

em que $\deg(p_k) = k$ será uma base de $Z(v_{i,j}, T)$. Em particular, quando $m_T(x)$ se decompõe sobre K , os divisores elementares são:

$$p_i^{e_{i,j}}(x) = (x - c_i)^{e_{i,j}}$$

e assim a sequência:

$$C_{i,j} = (v_{i,j}, (T - c_i I)(v_{i,j}), \dots, (T - c_i I)^{e_{i,j}-1}(v_{i,j}))$$

é também uma base de $Z(v_{i,j}, T)$.

Para $0 \leq k < e_{i,j}$ temos:

$$\begin{aligned} T((T - c_i I)^k(v_{i,j})) &= (T - c_i I + c_i I)((T - c_i I)^k(v_{i,j})) \\ &= (T - c_i I)^{k+1}(v_{i,j}) + c_i(T - c_i I)^k(v_{i,j}). \end{aligned}$$

Logo, para esta base, a complexidade se espalha melhor, e a matriz de $T|_{Z(v_{i,j}, T)}$ em relação a $C_{i,j}$ é a matriz de tamanho $e_{i,j}$:

$$\begin{pmatrix} c_i & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 1 & c_i & \ddots & & \vdots \\ 0 & 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & c_i \end{pmatrix}.$$

Assim apresentaremos o conceito das formas de Jordan.

Definição 4.65. Um **bloco de Jordan** é uma matriz do tipo:

$$J_{c,n} = \begin{pmatrix} c & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 1 & c & \ddots & & \vdots \\ 0 & 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & c \end{pmatrix},$$

em que $c \in K$ e a matriz tem tamanho n . Dizemos que uma matriz está na **forma de Jordan** se e só se é uma soma direta de blocos de Jordan.

Com a discussão anterior, então temos as conhecidas formas de Jordan.

Teorema 4.66 (Forma de Jordan). Seja V um espaço vetorial de dimensão finita sobre um corpo K e seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Suponhamos que o polinômio minimal de $T \in \mathcal{L}(V)$ se decompõe sobre o corpo K , ou seja:

$$m_T(x) = (x - c_1)^{e_1} \dots (x - c_n)^{e_n},$$

em que $c_i \in K$. Então existe uma base B tal que a matriz de T seja:

$$\begin{pmatrix} J_{c_1, e_{1,1}} & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & J_{c_1, e_{1,k_1}} & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & J_{c_n, e_{n,1}} & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & J_{c_n, e_{n,k_n}} \end{pmatrix},$$

em que os polinômios $(x - c_i)^{e_{i,j}}$ são os divisores elementares de T .

Corolário 4.67. Se K é algebricamente fechado, então, a menos de ordem dos blocos na diagonal, o conjunto de matrizes na forma de Jordan constitui um conjunto de formas canônicas para a similaridade de matrizes.

4.9.2 Forma de Jordan Generalizada

Vimos que, para T possuir uma forma canônica de Jordan, o polinômio minimal $m_T(x)$ deve ser um produto de fatores lineares. Agora apresentaremos uma forma canônica de Jordan generalizada para lidarmos com as demais situações. Começaremos com o caso de um espaço vetorial de dimensão finita primário para um operador linear T .

Definição 4.68. Seja p polinômio mônico de grau d . Um **bloco de Jordan generalizado** é uma matriz do tipo:

$$\mathfrak{J}_{p,n} = \begin{pmatrix} C[p] & 0 & \dots & 0 & 0 \\ N & C[p] & \dots & 0 & 0 \\ 0 & N & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & C[p] & 0 \\ 0 & 0 & \dots & N & C[p] \end{pmatrix},$$

em que:

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

que é a matriz valendo 1 na entrada $(1, d)$ e 0 nas outras entradas. Dizemos que $\mathfrak{J}_{p,n}$ é **irredutível** se e só se p é um polinômio irredutível. Dizemos que uma matriz está na **forma de Jordan generalizada** se e só se é uma soma direta de blocos de Jordan generalizados *irredutíveis*. Note, em particular, que o bloco de Jordan usual $J_{c,n}$ é a mesma coisa que o bloco de Jordan generalizado irredutível $\mathfrak{J}_{x-c,n}$.

Proposição 4.69. Seja V um espaço vetorial de dimensão finita sobre um corpo K e seja $T \in \mathcal{L}(V)$, e assumamos que $m_T = p^n$, em que p é um polinômio de grau d , e que T tenha um vetor cíclico v . Defina B assim:

$$B = \left(v, \dots, T^{d-1}(v), p(T)(v), \dots, T^{d-1}p(T)(v), \dots, p(T)^{n-1}(v), \dots, T^{d-1}p(T)^{n-1}(v) \right).$$

Então B é uma base de V sobre K e $[T]_B = \mathfrak{J}_{p,n}$.

Demonstração. Seja:

$$p(x) = x^d + a_{d-1}x^{d-1} + \dots + a_1x + a_0.$$

Para $0 \leq k < n$ temos:

$$\begin{aligned} T(T^{d-1}p(T)^k(v)) &= T^d p(T)^k(v) \\ &= \left(p(T) - (a_{d-1}T^{d-1} + \dots + a_1T + a_0) \right) p(T)^k(v) \\ &= (p(T))^{k+1}(v) - (a_{d-1}T^{d-1}p(T)^k(v) + \dots + a_1Tp(T)^k(v) + a_0p(T)^k(v)). \end{aligned}$$

Logo é fácil ver que $[T]_B = \mathfrak{J}_{p,n}$. □

Teorema 4.70 (Forma de Jordan Generalizada). Seja V um espaço vetorial de dimensão finita

sobre um corpo K e seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Então existe uma base B tal que a matriz de T seja:

$$\mathfrak{J} = \begin{pmatrix} \mathfrak{J}_{p_1, e_{1,1}} & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \mathfrak{J}_{p_1, e_{1,k_1}} & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \mathfrak{J}_{p_n, e_{n,1}} & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & \mathfrak{J}_{p_n, e_{n,k_n}} \end{pmatrix},$$

em que os polinômios $p_i^{e_{i,j}}$ são os divisores elementares de T .

4.9.3 Forma de Jordan Real

Agora seja $K = \mathbb{R}$ o corpo dos números reais. Produziremos uma outra versão da forma canônica de Jordan que é válida para todas as matrizes com entradas em \mathbb{R} . Essa forma canônica será de alguma forma diferente da forma de Jordan generalizada.

Lembre-mos de que um operador linear $T \in \mathcal{L}(V)$, em que V é um espaço vetorial de dimensão finita sobre um corpo K , tem uma forma canônica de Jordan se e somente se o polinômio minimal m_T é um produto de fatores lineares, não necessariamente distintas. Essa condição será satisfeita para todos os polinômios sobre K se e somente se o corpo K for algebricamente fechado. O corpo \mathbb{C} dos números complexos é algebricamente fechado (embora não apresentaremos uma prova desse fato nestas notas de aula), mas o corpo \mathbb{R} dos números reais não é. De fato, $x^2 + 1$ é um polinômio sobre \mathbb{R} que não possui raízes em \mathbb{R} . Portanto, nenhum operador linear $T \in \mathcal{L}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2)$ tal que $m_T(x) = x^2 + 1$ pode possuir uma forma canônica de Jordan. Não obstante, há uma variante bem simples da forma canônica de Jordan que é válida sobre \mathbb{R} e dá conta da natureza especial de \mathbb{R} e de sua relação com os números complexos.

Definição 4.71. Um **bloco de Jordan real** é um bloco de Jordan usual ou uma matriz do tipo:

$$J_{a+bi, n} = \begin{pmatrix} C_{a+bi} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ I & C_{a+bi} & \dots & 0 & 0 \\ 0 & I & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & C_{a+bi} & 0 \\ 0 & 0 & \dots & I & C_{a+bi} \end{pmatrix},$$

em que a e b são reais com $b \neq 0$ e:

$$C_{a+bi} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Dizemos que uma matriz está na **forma de Jordan real** se e só se é uma soma direta de blocos de Jordan reais.

Proposição 4.72. Seja V um espaço vetorial de dimensão finita sobre \mathbb{R} e seja $T \in \mathcal{L}(V)$, e assuma que:

$$m_T(x) = \left((x-a)^2 + b^2\right)^n,$$

em que a e b são reais e $b \neq 0$, e que T tenha um vetor cíclico v . Então existe uma base B de V sobre \mathbb{R} tal que $[T]_B = J_{a+bi, n}$.

Teorema 4.73 (Forma de Jordan Real). Seja V um espaço vetorial de dimensão finita sobre \mathbb{R} e seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Então existe uma base B tal que a matriz de T seja uma soma direta de blocos de Jordan reais.

4.10 Espaços Indecomponíveis

4.10.1 Espaços Cíclicos

A decomposição cíclica em divisores elementares pode ser usada para caracterizar espaços vetoriais de dimensão finita com vetores cíclicos através de seus divisores elementares.

Teorema 4.74 (Caracterização de Espaços Cíclicos). Seja V um espaço vetorial de dimensão finita e seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Consideremos o polinômio minimal:

$$m_T = p_1^{e_1} \cdots p_n^{e_n}.$$

As seguintes propriedades são equivalentes:

1) V possui um vetor cíclico para T .

2) V é uma soma direta:

$$V = Z(v_1, T) \oplus \cdots \oplus Z(v_n, T)$$

de subespaços cíclicos primários $V_i = Z(v_i, T)$ tais que $m_{T|V_i} = p_i^{e_i}$.

3) Os divisores elementares de V são precisamente:

$$p_1^{e_1}, \dots, p_n^{e_n}.$$

Demonstração. Suponhamos que V tenha vetor cíclico para T . Então a decomposição primária para minimais de V é uma decomposição cíclica, pois pelo Exercício 1 da Lista 4 todo subespaço T -invariante de um espaço com vetor cíclico também tem um vetor cíclico. Logo, (1) implica (2). Reciprocamente, se (2) ocorre, então como os polinômios minimais são relativamente primos, o Teorema 4.29 implica que V tem um vetor cíclico. Deixamos o restante da prova para o leitor. \square

4.10.2 Espaços Indecomponíveis

A decomposição cíclica em divisores elementares é uma decomposição de V numa soma direta de subespaços T -invariantes que não podem ser decompostos em pedaços menores. De fato, isto caracteriza a decomposição cíclica em divisores elementares de V . Antes de justificar estas afirmações, apresentamos a seguinte definição.

Definição 4.75. Um espaço vetorial V é dito **indecomponível** para um $T \in \mathcal{L}(V)$ se e só se não puder ser escrito como uma soma direta de dois subespaços T -invariantes próprios.

Teorema 4.76 (Caracterização de Espaços Indecomponíveis). Seja V um espaço vetorial de dimensão finita e seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Então as seguintes propriedades são equivalentes:

1) V é indecomponível para T .

2) V é um espaço primário e tem um vetor cíclico para T .

3) V tem apenas um divisor elementar para T .

Portanto, a decomposição cíclica em divisores elementares é uma decomposição de V em uma soma direta de subespaços T -invariantes indecomponíveis para T . Reciprocamente, se:

$$V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_n$$

é uma decomposição de V numa soma direta de subespaços T -invariantes indecomponíveis para T , então cada subespaço T -invariante V_i é primário e possui vetor cíclico, aí esta decomposição é a decomposição cíclica em divisores elementares de V .

4.10.3 Teorema de Cauchy

Quem já está familiarizado com teoria dos grupos sabem que todo grupo de ordem prima é cíclico. Entretanto, existem espaços com polinômio minimal irredutível que no entanto não possuem vetores cíclicos. Não obstante, espaços com polinômio minimal irredutível com vetores cíclicos são importantes.

De fato, se V é um espaço vetorial de dimensão finita e $T \in \mathcal{L}(V)$, com polinômio minimal m_T , então cada fator primo de p de m_T nos oferece um subespaço T -invariante W de V com vetor cíclico cujo polinômio minimal é p e aí W é também indecomponível para T . Infelizmente, W não necessariamente tem um complemento T -invariante e aí não podemos usá-lo para decompor V . Não obstante, o teorema ainda é útil.

Teorema 4.77 (Teorema de “Cauchy” para Álgebra Linear). Seja V um espaço vetorial de dimensão finita e $T \in \mathcal{L}(V)$, com polinômio minimal m_T . Se p é um divisor primo de m_T , então V tem um subespaço T -invariante W com vetor cíclico com T -anulador p .

Demonstração. Se $m_T = pq$, então existe um $v \in V$ tal que $w := q(T)(v) \neq 0$ mas $p(T)(w) = 0$. Assim $W = Z(w, T)$ é anulado por $p(T)$ e assim $m_{T,w} \mid p$. Mas p é primo e $m_{T,w} \neq 1$, aí $m_{T,w} = p$. \square

Capítulo 5

Espaços com Produto Interno

Neste capítulo, convencionaremos que K é \mathbb{R} ou \mathbb{C} .

5.1 Definições e Exemplos

Definição 5.1. Um espaço vetorial V é dito um **espaço com produto interno** se estiver munida com uma função:

$$\begin{aligned} V \times V &\rightarrow K \\ (u, v) &\mapsto \langle u, v \rangle \end{aligned}$$

tal que:

- $\langle \alpha u + \beta v, w \rangle = \alpha \langle u, w \rangle + \beta \langle v, w \rangle$ para quaisquer $\alpha, \beta \in K$ e $u, v, w \in V$.
- $\overline{\langle u, v \rangle} = \langle v, u \rangle$ para quaisquer $u, v \in V$.
- $\langle v, v \rangle \geq 0$ para $v \in V$.
- $\langle v, v \rangle = 0 \Rightarrow v = 0$ para $v \in V$.

Exemplo 5.2. O exemplo principal é $V = K^n$, em que, tomando $u = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ e $v = (\beta_1, \dots, \beta_n)$, definimos:

$$\langle u, v \rangle = \alpha_1 \overline{\beta_1} + \dots + \alpha_n \overline{\beta_n}.$$

Exemplo 5.3. Podemos considerar $V = \mathcal{M}_n(K) \cong K^{n^2}$. Com base no exemplo anterior, definimos:

$$\langle A, B \rangle = \sum_{i,j} a_{i,j} \overline{b_{i,j}}.$$

Para toda $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(K)$, definimos:

$$A^* = (\overline{a_{i,j}}),$$

e

$$\text{tr}(A) = a_{1,1} + \dots + a_{n,n},$$

então podemos ver que:

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(AB^*).$$

Exemplo 5.4. Podemos tomar $V = \mathcal{C}[a, b]$, o conjunto das funções contínuas de $[a, b]$ em \mathbb{C} , e para $f, g \in V$ definirmos:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t) \overline{g(t)} dt.$$

Exemplo 5.5. Seja $T \in \mathcal{L}(U, V)$ bijetora. Suponhamos que V tenha um produto interno. Se $u_1, u_2 \in U$, definimos:

$$\langle u_1, u_2 \rangle_U = \langle T(u_1), T(u_2) \rangle_V.$$

Suponhamos que U tenha uma base $B = (e_1, \dots, e_n)$. Então existe uma $T : U \rightarrow K^n$ tal que:

$$T(e_i) = (0, \dots, 1, \dots, 0),$$

em que a entrada i vale 1 e as outras valem 0. Sendo:

$$u = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n, \quad v = \beta_1 e_1 + \dots + \beta_n e_n,$$

então:

$$\langle u, v \rangle_U = \langle T(u), T(v) \rangle_V = \sum_{i=1}^n \alpha_i \overline{\beta_i}.$$

Definição 5.6. Definimos o seguinte:

- Se $\dim(V) = n < \infty$ e $K = \mathbb{R}$, então chamamos V de **euclidiano**.
- Se $\dim(V) = n < \infty$ e $K = \mathbb{C}$, então chamamos V de **unitário**.

Definição 5.7. Se V é um espaço com produto interno e V é um espaço completo em relação à norma $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$, então V se chama um **espaço de Hilbert**.

5.2 Matriz de Gramm

Definição 5.8. Seja V um espaço com produto interno. Sejam $v_1, \dots, v_k \in V$. Definimos:

$$G(v_1, \dots, v_n) = \begin{pmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \dots & \langle v_1, v_n \rangle \\ \dots & \dots & \dots \\ \langle v_n, v_1 \rangle & \dots & \langle v_n, v_n \rangle \end{pmatrix}.$$

Nesse caso temos:

$$G(v_1, \dots, v_n)^* = G(v_1, \dots, v_n).$$

Toda matriz A que satisfaz $A^* = A$ é chamada **Hermitiana**.

Proposição 5.9. Seja $B = (e_1, \dots, e_n)$ uma base de V . Então $G(e_1, \dots, e_n)$ é inversível.

Demonstração. Primeiro observemos que para quaisquer $u, v \in V$, com:

$$[u]_B = (\alpha_1, \dots, \alpha_n), \quad [v]_B^* = (\beta_1, \dots, \beta_n)$$

então:

$$\langle u, v \rangle = [u]_B A [v]_B^*.$$

De fato:

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i,j} \alpha_i \overline{\beta_j} \langle e_i, e_j \rangle,$$

aí:

$$\begin{aligned} [u]_B A [v]_B^* &= (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} \langle e_1, e_1 \rangle & \dots & \langle e_1, e_n \rangle \\ \dots & \dots & \dots \\ \langle e_n, e_1 \rangle & \dots & \langle e_n, e_n \rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{\beta_1} \\ \vdots \\ \overline{\beta_n} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha_1 \langle e_1, e_1 \rangle + \dots + \alpha_n \langle e_n, e_1 \rangle \\ \vdots \\ \alpha_1 \langle e_1, e_n \rangle + \dots + \alpha_n \langle e_n, e_n \rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{\beta_1} \\ \vdots \\ \overline{\beta_n} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Se A não for inversível, então existe $u \neq 0$ tal que $[u]_B A = 0$. Neste caso, $\langle u, u \rangle = [u]_B A [u]_B^* = 0$, aí $u = 0$, contradição. \square

Se $B = (e_1, \dots, e_n)$ é uma base de V e $A = G(e_1, \dots, e_n)$ então para todo $v \in V$ temos:

$$[v]_B A [v]_B^* \geq 0$$

e a igualdade ocorre se e somente se $v = 0$.

Definição 5.10. Uma matriz Hermitiana A é dita:

- **Positiva semidefinitiva** se e só se para todo $x \in K^n$ temos $x A x^* \geq 0$.
- **Positiva definitiva** se e só se para todo $x \in K^n$ tal que $x \neq 0$ temos $x A x^* > 0$.

Proposição 5.11. Seja $A \in \mathcal{M}_n(K)$ uma matriz Hermitiana positiva definitiva. Seja V um espaço vetorial com base $B = (e_1, \dots, e_n)$. Definamos, para $u, v \in V$, o seguinte:

$$\langle u, v \rangle = [u]_B A [v]_B^*.$$

Então $\langle u, v \rangle$ é um produto interno.

5.3 Espaços Normados

Definição 5.12. Um espaço vetorial V é dito um **espaço normado** se estiver munido com uma função:

$$\begin{aligned} V &\rightarrow \mathbb{R} \\ v &\mapsto \|v\| \end{aligned}$$

que satisfaça as seguintes propriedades:

- $\|v\| \geq 0$ para $v \in V$.
- $\|v\| = 0 \Rightarrow v = 0$ para $v \in V$.
- $\|\alpha v\| = |\alpha| \|v\|$ para $\alpha \in K$ e $v \in V$.
- $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ para $u, v \in V$.

Proposição 5.13 (Desigualdade de Cauchy-Bunyakovski-Schwarz). Seja V um espaço com produto interno. Então para quaisquer $u, v \in V$ temos:

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|.$$

Demonstração. Se $v = 0$, então é fácil. Se $v \neq 0$, então $\|v\| > 0$, aí para quaisquer $\alpha, \beta \in K$ temos:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle \alpha u - \beta v, \alpha u - \beta v \rangle \\ &= \alpha \bar{\alpha} \langle u, u \rangle + \beta \bar{\beta} \langle v, v \rangle - \alpha \bar{\beta} \langle u, v \rangle - \beta \bar{\alpha} \langle v, u \rangle \\ &= |\alpha|^2 \|u\|^2 + |\beta|^2 \|v\|^2 - \left(\alpha \bar{\beta} \langle u, v \rangle + \overline{\alpha \bar{\beta} \langle u, v \rangle} \right). \end{aligned}$$

Em particular, fazendo $\alpha = \|v\|$ e $\beta = \langle u, v \rangle$, então:

$$\begin{aligned} &\|v\|^4 \|u\|^2 + |\langle u, v \rangle|^2 \|v\|^2 - 2 \|v\|^2 \langle u, v \rangle^2 \geq 0 \\ \Rightarrow &\|v\|^2 \|u\|^2 - |\langle u, v \rangle|^2 \geq 0 \\ \Rightarrow &(\|v\| \|u\|)^2 \geq |\langle u, v \rangle|^2. \end{aligned}$$

□

Proposição 5.14. Seja V um espaço com produto interno e definamos $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$. Então $\|v\|$ é uma norma.

Demonstração. Provaremos apenas a última propriedade requerida para espaço normado, deixando as outras para o leitor. Sabemos que para $z \in \mathbb{C}$ então $z + \bar{z} \leq 2|z|$. De fato, sendo $z = a + bi$, então $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \geq a$, aí $z + \bar{z} = 2a \leq 2|z|$. Agora temos:

$$\begin{aligned} |u + v|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle \\ &= \|u\|^2 + \|v\|^2 + (\langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle}) \\ &\leq \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2|\langle u, v \rangle| \\ &\leq \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\|u\| \cdot \|v\| \\ &= (\|u\| + \|v\|)^2. \end{aligned}$$

□

5.4 Ortogonalidade

Definição 5.15. Dois vetores $u, v \in V$ são ditos **ortogonais** se e só se $\langle u, v \rangle = 0$.

Uma família $(v_i)_{i \in I}$ de vetores é chamado **ortogonal** se e só se para quaisquer $i, j \in I$ tais que $i \neq j$ os vetores v_i e v_j forem ortogonais.

Uma família $(v_i)_{i \in I}$ de vetores é chamado **ortonormal** se e só se é ortogonal e para todo $i \in I$ temos $\|v_i\| = 1$.

Proposição 5.16. Se $(v_i)_{i \in I}$ é uma família ortogonal de vetores *não nulos*, então a família é L.I.

Demonstração. Para conjunto finito $J \subseteq I$ e para $\alpha : J \rightarrow \mathbb{R}$, se:

$$\sum_{i \in J} \alpha_i v_i = 0,$$

então para $j \in J$ temos:

$$0 = \left\langle \sum_{i \in J} \alpha_i v_i, v_j \right\rangle = \sum_{i \in J} \alpha_i \langle v_i, v_j \rangle = \alpha_j \|v_j\|^2,$$

mas $v_j \neq 0$, aí $\|v_j\|^2 \neq 0$, aí $\alpha_j = 0$.

□

Proposição 5.17 (Ortogonalização de Gramm-Schmidt). Para toda sequência linearmente independente (v_1, \dots, v_k) de vetores, existe uma sequência ortogonal (u_1, \dots, u_k) tal que $\langle v_1, \dots, v_k \rangle = \langle u_1, \dots, u_k \rangle$.

Demonstração. Indução sobre k .

□

Corolário 5.18. Todo espaço com produto interno de dimensão finita tem uma base ortonormal.

5.5 Funcionais Lineares

Proposição 5.19. Seja V um espaço com produto interno. Para $u \in V$, definimos $\varphi_u : V \rightarrow K$ assim:

$$\varphi_u(v) = \langle v, u \rangle.$$

Então φ_u é um funcional linear.

Teorema 5.20 (Teorema de Riesz). Se $\dim(V) < \infty$, então para todo $f \in V^*$ existe $u \in V$ tal que $f = \varphi_u$.

CAPÍTULO 5. ESPAÇOS COM PRODUTO INTERNO

5.5. FUNCIONAIS LINEARES

Demonstração. Seja $f \in V^*$. Escolhemos uma base ortonormal $B = (e_1, \dots, e_n)$ em V e seja $\alpha_i = f(e_i) \in K$ para $i = 1, \dots, n$. Consideremos $u = \overline{\alpha_1}e_1 + \dots + \overline{\alpha_n}e_n$. Então para $k = 1, \dots, n$ temos:

$$\begin{aligned}\varphi_u(e_k) = \langle e_k, u \rangle &= \langle e_k, \overline{\alpha_1}e_1 + \dots + \overline{\alpha_n}e_n \rangle \\ &= \alpha_k \langle e_k, e_k \rangle = \alpha_k = f(e_k),\end{aligned}$$

ou seja, $\varphi_u(e_k) = f(e_k)$; logo $\varphi_u = f$. \square

Observação 5.21. O teorema de Riesz não é válido para espaços com produto interno de dimensão finita. De fato, se $V = \mathcal{C}[a, b]$, então seja $x_0 \in [a, b]$ e seja $\varphi \in V^*$ dada por:

$$\varphi(f) = f(x_0).$$

Definição 5.22. Agora seja V um espaço com produto interno e S um subconjunto de V . Definimos o conjunto:

$$S^\perp = \{v \in V : \forall s \in S : \langle v, s \rangle = 0\},$$

e chamamos de **complemento ortogonal** de S .

Proposição 5.23. Para qualquer subconjunto S temos:

- 1) S^\perp é um subespaço de V .
- 2) Se $W \subseteq V$ é um subespaço, então $V = W \oplus W^\perp$.
- 3) Se $W \subseteq V$ é um subespaço, então $W^{\perp\perp} = W$.

Demonstração. 2) Escolhemos em W uma base ortonormal (v_1, \dots, v_k) . Seja $u \in V$ arbitrário. Consideremos:

$$\tilde{u} = \langle u, v_1 \rangle v_1 + \dots + \langle u, v_k \rangle v_k \in W.$$

Provemos que $u - \tilde{u} \in W^\perp$. Notemos que $W^\perp = \{v_1, \dots, v_k\}^\perp$. Para $i = 1, \dots, k$, então temos:

$$\begin{aligned}\langle u - \tilde{u}, v_i \rangle &= \langle u, v_i \rangle - \langle \sum_{j=1}^k \langle u, v_j \rangle v_j, v_i \rangle \\ &= \langle u, v_i \rangle - \sum_{j=1}^k \langle u, v_i \rangle \langle v_j, v_i \rangle \\ &= \langle u, v_i \rangle - \langle u, v_i \rangle \langle u, v_i \rangle \\ &= 0;\end{aligned}$$

logo $u - \tilde{u} \in W^\perp$, aí $u = \tilde{u} + (u - \tilde{u}) \in W + W^\perp$. Para $v \in W \cap W^\perp$, então $\langle u, v \rangle = 0$, aí $u = 0$.

- 3) Temos $V = W \oplus W^\perp = W^\perp \oplus W^{\perp\perp}$, aí:

$$\dim(W) = \dim(V) - \dim(W^\perp) = \dim(W^{\perp\perp}),$$

mas é fácil ver que $W \subseteq W^{\perp\perp}$, aí $W = W^{\perp\perp}$. \square

Definição 5.24. Para subespaço W de V , definimos a **projeção ortogonal** como a função $E_W : V \rightarrow W$ tal que, para $v \in V$ tenhamos $v - E_W(v) \in W^\perp$.

Proposição 5.25. Para subespaço W e para $v \in V$, temos:

$$\|v - E_W(v)\| = \min\{\|v - w\| \mid w \in W\}.$$

Demonstração. Seja $v^\perp = v - E_W(v)$. Então para $w \in W$ temos:

$$v - w = v^\perp + E_W(v) - w,$$

mas $v^\perp \in W^\perp$ e $E_W(v) - w \in W$, aí:

$$\|v - w\|^2 = \|v^\perp\|^2 + \|E_W(v) - w\|^2 \geq \|v^\perp\|^2 = \|v - E_W(v)\|^2.$$

\square

CAPÍTULO 5. ESPAÇOS COM PRODUTO INTERNO 5.6. TRANSFORMAÇÃO ADJUNTA

Teorema 5.26 (Desigualdade de Bessel). Sejam $v_1, \dots, v_k \in V$ vetores não nulos mutuamente ortogonais. Então para todo $v \in V$ temos:

$$\sum_{i=1}^k \frac{|\langle v, v_i \rangle|^2}{\|v_i\|^2} \leq \|v\|^2.$$

Demonstração. Seilah □

5.6 Transformação Adjunta

Definição 5.27. Sejam U e V espaços com produto interno de dimensão finita e $T \in \mathcal{L}(U, V)$. Uma **transformação adjunta** para T é uma função $T^* \in \mathcal{L}(V, U)$ tal que para quaisquer $u \in U$ e $v \in V$ tenhamos:

$$\langle T(u), v \rangle_V = \langle u, T^*(v) \rangle_U.$$

Teorema 5.28. T^* sempre existe e é única.

Demonstração. Preencher os detalhes.

Seja $v \in V$. Consideremos a função:

$$\varphi_v : u \mapsto \langle T(u), v \rangle \in K.$$

Então $\varphi_v \in U^*$. Assim, pelo teorema de Riesz, então existe um único $T^*(v) \in U$ tal que:

$$\forall u \in U : \varphi_v(u) = \langle u, T^*(v) \rangle.$$

Consideremos a função:

$$T^* : v \mapsto T^*(v).$$

É fácil ver que $T^* \in \mathcal{L}(V, U)$. □

Teorema 5.29. Sejam $B = (e_1, \dots, e_n)$ e $C = (f_1, \dots, f_m)$ bases ortonormais de U e V , e seja $T \in \mathcal{L}(U, V)$. Se $A = [T]_{B,C}$, então $A^* = [T^*]_{C,B}$.

Demonstração. Seilah □

Observação 5.30. Por outro lado, consideremos $V = \mathbb{R}[t]$, e consideremos o produto interno:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t) dt.$$

Consideremos o operador derivação $D = \mathcal{L}(V)$ dado por:

$$\forall f \in \mathbb{R} : D(f) = f'.$$

Então D não tem um adjunto.

Proposição 5.31. Sejam U e V e W espaços com produto interno de dimensão finita e sejam $T, S \in \mathcal{L}(U, V)$ e $P \in \mathcal{L}(V, W)$ e $\alpha \in K$. Então:

- $(T + S)^* = T^* + S^*$.
- $(\alpha T)^* = \bar{\alpha} T^*$.
- $(TP)^* = P^* T^*$.
- $T^{**} = T$.

Demonstração. É só fazer umas continhas. □

Definição 5.32. Um operador $L \in \mathcal{L}(V)$ se chama **autoadjunto**, ou também **Hermitiano**, se e só se $T^* = T$.

Agora seja $T \in \mathcal{L}(U, V)$ e $b \in V$. Queremos encontrar $x \in U$ que dê a melhor aproximação da equação:

$$T(x) = b,$$

ou seja, queremos encontrar $x \in U$ tal que a distância:

$$\|T(x) - b\|$$

seja *mínima*. Isso significa encontrarmos um $x \in U$ tal que a projeção ortogonal de b em $\text{Im}(T)$ seja $T(x)$. Temos de encontrar $x \in U$ tal que para todo $v \in \text{Im}(T)$ tenhamos:

$$\langle T(x) - b, v \rangle = 0;$$

ou seja,

$$T(x) - b \in (\text{Im}(T))^\perp.$$

Seja (e_1, \dots, e_n) uma base de U . Então:

$$\begin{aligned} T(x) - b \in (\text{Im}(T))^\perp &\Leftrightarrow \forall i = 1, \dots, n : \langle T(x) - b, T(e_i) \rangle = 0 \\ &\Leftrightarrow \forall i = 1, \dots, n : \langle T(x), T(e_i) \rangle = \langle b, T(e_i) \rangle \\ &\Leftrightarrow \forall i = 1, \dots, n : \langle T^*T(x), e_i \rangle = \langle T^*(b), e_i \rangle \\ &\Leftrightarrow T^*T(x) = T^*(b). \end{aligned}$$

EXEMPLO NUMÉRICO QUE ESTOU COM PREGUIÇA DE ESCREVER PORQUE É CHATO DEMAIS

5.7 Operadores Unitários

Teorema 5.33. Seja U e V espaços com produto interno de *uma mesma* dimensão finita e seja $T \in \mathcal{L}(U, V)$. São equivalentes:

- Para $u, v \in U$ temos $\langle u, v \rangle = \langle T(u), T(v) \rangle$.
- T é um isomorfismo de espaços com produto interno.
- Para toda base ortonormal B de U , a sua imagem $T[B]$ é uma base ortonormal de V .
- Existe uma base ortonormal B de U tal que $T[B]$ seja uma base ortonormal de V .

Demonstração. Se (i), então primeiro provemos que $\text{Ker}(T) = 0$. Para $v \in \text{Ker}(T)$, então $T(v) = 0$, aí:

$$\langle v, v \rangle = \langle T(v), T(v) \rangle = 0,$$

aí $v = 0$. Como $\dim V = \dim U = \dim \text{Im } T + \dim \text{Ker } T$, então $\dim \text{Im } T = \dim V$, aí T é sobrejetora, aí (ii).

Se (ii), então para base ortonormal $B = (e_1, \dots, e_n)$ de U , então $(T(e_1), \dots, T(e_n))$ é um conjunto ortonormal em V , aí é uma base ortonormal de V ; logo (iii).

Se (iii), como sempre existe uma base ortonormal de U , então (iv) é evidente.

Se (iv), então seja $B = (e_1, \dots, e_n)$ uma base ortonormal de U tal que $(T(e_1), \dots, T(e_n))$ seja base ortonormal de V . Para $u, v \in U$, então existem $a_1, \dots, a_n \in K$ e b_1, \dots, b_n tais que:

$$u = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n, \quad v = b_1 e_1 + \dots + b_n e_n,$$

então:

$$\langle u, v \rangle = a_1 \overline{b_1} + \cdots + a_n \overline{b_n},$$

aí:

$$T(u) = a_1 T(e_1) + \cdots + a_n T(e_n), \quad T(v) = b_1 T(e_1) + \cdots + b_n T(e_n),$$

aí:

$$\begin{aligned} \langle T(u), T(v) \rangle &= \sum_{i,j} \langle a_i T(e_i), b_j T(e_j) \rangle \\ &= \sum_{i,j} a_i \overline{b_j} \langle T(e_i), T(e_j) \rangle \\ &= \sum_{k=1}^n a_k \overline{b_k} \\ &= \langle u, v \rangle. \end{aligned}$$

□

Corolário 5.34. Dois espaços vetoriais U e V com produto interno de dimensão finita são isomorfos se e só se $\dim U = \dim V$.

Demonstração. (\Rightarrow) é claro. Por outro lado, se $\dim U = \dim V$, então escolhamos bases ortonormais $B = (e_1, \dots, e_n)$ de U e $C = (f_1, \dots, f_n)$ de V , aí seja $T : U \rightarrow V$ dada por:

$$T(a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n) = a_1 f_1 + \cdots + a_n f_n,$$

então $T \in \mathcal{L}(U, V)$, e para $u, v \in U$, sendo:

$$u = a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n, \dots, v = b_1 e_1 + \cdots + b_n e_n,$$

então:

$$\langle u, v \rangle = a_1 \overline{b_1} + \cdots + a_n \overline{b_n}$$

e também:

$$\langle T(u), T(v) \rangle = a_1 \overline{b_1} + \cdots + a_n \overline{b_n},$$

assim:

$$\langle u, v \rangle = \langle T(u), T(v) \rangle.$$

□

Definição 5.35. Se V é um espaço com produto interno e $T \in \mathcal{L}(V)$, dizemos que T é **operador unitário** se e só se $\forall u, v \in V : \langle T(u), T(v) \rangle = \langle u, v \rangle$.

Teorema 5.36. Seja $T \in \mathcal{L}(U, V)$. Então T preserva o produto interno se e só se $\forall u \in U : \|T(u)\| = \|u\|$.

Demonstração. (\Rightarrow) É fácil pois:

$$\|T(u)\|^2 = \langle T(u), T(u) \rangle = \langle u, u \rangle = \|u\|^2.$$

(\Leftarrow) Por outro lado, então:

$$\|T(u + v)\|^2 = \|u + v\|^2,$$

aí:

$$\|T(u)\|^2 + \langle T(u), T(v) \rangle + \langle T(v), T(u) \rangle + \|T(v)\|^2 = \|u\|^2 + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \|v\|^2,$$

aí:

$$\langle T(u), T(v) \rangle + \langle T(v), T(u) \rangle = \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle,$$

□

Proposição 5.37. Sejam $T, S \in \mathcal{L}(V)$ unitários. Então $T \circ S$ é operador unitário. O conjunto dos operadores unitários formam um grupo em relação à composição.

CAPÍTULO 5. ESPAÇOS COM PRODUTO INTERNO 5.7. OPERADORES UNITÁRIOS

Demonstração.

$$\langle TS(u), TS(v) \rangle = \langle S(u), S(v) \rangle = \langle u, v \rangle.$$

□

Definição 5.38. O conjunto dos operadores unitários no espaço K^n se denota por $U(n, K)$.

Teorema 5.39. Para $T \in \mathcal{L}(V)$, então T é unitário se e somente se $T^* = T^{-1}$.

Demonstração. (\Rightarrow) Se T é unitário, então para todo $v \in V$ temos:

$$\forall u \in V : \langle u, v \rangle = \langle T(u), T(v) \rangle = \langle u, T^*T(v) \rangle,$$

aí $T^*T(v) = v$; logo $T^*T = I$.

(\Leftarrow) se $T^* = T^{-1}$, então para $u, v \in V$ temos:

$$\langle T(u), T(v) \rangle = \langle u, T^*T(v) \rangle = \langle u, T^{-1}T(v) \rangle = \langle u, v \rangle;$$

logo T é unitário.

□

Definição 5.40. Uma matriz $A \in \mathcal{M}_n(K)$ se chama **unitária** se e só se $A^* = A^{-1}$.

Corolário 5.41. Para operador $T \in \mathcal{L}(V)$, então T é unitário se e só se para toda base B de V a matriz $[T]_B$ é unitária.

Teorema 5.42. Para matriz $A \in \mathcal{M}_n(K)$, então A é unitária se e só se as linhas de A formam conjunto ortonormal em K^n , e isso equivale a dizer que as colunas de A formam um conjunto ortonormal em K^n .

Demonstração. Seja $A \in \mathcal{M}_n(K)$ uma matriz unitária, então $AA^* = I$, aí sendo:

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix},$$

então:

$$A^* = \begin{pmatrix} \overline{a_{1,1}} & \dots & \overline{a_{n,1}} \\ \dots & \dots & \dots \\ \overline{a_{1,n}} & \dots & \overline{a_{n,n}} \end{pmatrix},$$

então temos:

$$A_i = (a_{i,1}, \dots, a_{i,n}), \quad (A^*)^j = \begin{pmatrix} \overline{a_{j,1}} \\ \vdots \\ \overline{a_{j,n}} \end{pmatrix},$$

assim:

$$a_{i,1}\overline{a_{j,1}} + \dots + a_{i,n}\overline{a_{j,n}} = \delta_{i,j},$$

assim:

$$\langle (a_{i,1}, \dots, a_{i,n}), (a_{j,1}, \dots, a_{j,n}) \rangle = \delta_{i,j}.$$

□

Definição 5.43. Para $A \in \mathcal{M}_n(K)$, dizemos que A se chama **ortogonal** se e só se $A^{-1} = A^t$.

Observação 5.44. Toda matriz real ortogonal é unitária. Toda matriz unitária ortogonal é real.

Definição 5.45. Definimos o **grupo ortogonal** $O(n, \mathbb{R})$ como o conjunto das matrizes reais ortogonais.

Definição 5.46. Para matrizes $A, B \in \mathcal{M}_n(K)$, dizemos que A é **unitariamente equivalente** a B se e só se existe uma matriz $U \in \mathcal{M}_n(K)$ *unitária* tal que $U^{-1}AU = B$.

Definição 5.47. Para matrizes $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, dizemos que A é **ortogonalmente equivalente** a B se e só se existe uma matriz $U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ *ortogonal* tal que $U^{-1}AU = B$.

Proposição 5.48. Seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Então, para quaisquer bases ortonormais B e C de V , as matrizes $[T]_B$ e $[T]_C$ são unitariamente equivalentes.

Demonstração. Seja $P_{B,C}$ a matriz de mudança de B para C . Então $P_{B,C}$ é unitária. Mas também:

$$[T]_C = P_{B,C}^{-1}[T]_B P_{B,C}.$$

□

5.8 Operadores Normais

Assim como estudamos os operadores que possuíssem uma base de autovetores em espaços vetoriais, agora queremos estudar os operadores que possuam uma base *ortonormal* de autovetores em espaços com *produto interno*.

Seja $T \in \mathcal{L}(V)$ que possua uma base $B = (e_1, \dots, e_n)$ de autovetores. Então:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \cdots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

e também:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} \overline{\lambda_1} & & 0 \\ & \cdots & \\ 0 & & \overline{\lambda_n} \end{pmatrix},$$

aí:

$$[TT^*]_B = [T]_B[T^*]_B = \begin{pmatrix} \lambda_1 \overline{\lambda_1} & & 0 \\ & \cdots & \\ 0 & & \lambda_n \overline{\lambda_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overline{\lambda_1} \lambda_1 & & 0 \\ & \cdots & \\ 0 & & \overline{\lambda_n} \lambda_n \end{pmatrix} = [T^*]_B[T]_B = [T^*T]_B,$$

assim $TT^* = T^*T$.

Definição 5.49. Para $T \in \mathcal{L}(V)$, dizemos que T é **normal** se e só se $TT^* = T^*T$.

Exemplo 5.50. Temos alguns exemplos:

- Operadores autoadjuntos (isto é, que satisfazem $T^* = T$) são normais.
- Operadores unitários (isto é, que satisfazem $T^* = T^{-1}$) são normais.
- Operadores antiadjuntos (isto é, que satisfazem $T^* = -T$) são normais.

Lema 5.51. Seja $T \in \mathcal{L}(V)$ normal e λ um autovalor de T . Então $\overline{\lambda}$ é um autovalor de T .

Demonstração. Seja $v \in V$ tal que $v \neq 0$ e $T(v) = \lambda v$. Então $(T - \lambda I)(v) = 0$, aí para $u \in V$:

$$\begin{aligned} 0 &= \langle (T - \lambda I)(v), (T - \lambda I)(v) \rangle \\ &= \langle v, (T - \lambda I)^*(T - \lambda I)(v) \rangle \\ &= \langle v, (T^* - \overline{\lambda} I)(T - \lambda I)(v) \rangle \\ &= \langle v, (T - \lambda I)(T^* - \overline{\lambda} I)(v) \rangle \\ &= \langle (T - \lambda I)^*(v), (T^* - \overline{\lambda} I)(v) \rangle \\ &= \langle (T^* - \overline{\lambda} I)(v), (T^* - \overline{\lambda} I)(v) \rangle, \end{aligned}$$

aí $(T^* - \overline{\lambda} I)(v) = 0$, aí $T^*(v) = \overline{\lambda} v$.

□

Lema 5.52. Seja $T \in \mathcal{L}(V)$ e $W \subseteq V$ um subespaço T -invariante. Então W^\perp é T^* -invariante.

Demonstração. Seja $w' \in W^\perp$. Para $w \in W$ então $T(w) \in W$, aí $\langle T(w), w' \rangle = 0$, aí $\langle w, T^*(w') \rangle = 0$. Logo $T^*(w') \in W^\perp$. \square

Lema 5.53. Seja $T \in \mathcal{L}(V)$ normal e sejam λ, μ tais que $\lambda \neq \mu$. Se u e v são autovetores associados a λ e μ respectivamente, então $\langle u, v \rangle = 0$.

Demonstração. Temos o seguinte:

$$\begin{aligned} \lambda \langle u, v \rangle &= \langle \lambda u, v \rangle \\ &= \langle T(u), v \rangle \\ &= \langle u, T^*(v) \rangle \\ &= \langle u, \bar{\mu} v \rangle \\ &= \mu \langle u, v \rangle, \end{aligned}$$

aí $(\lambda - \mu) \langle u, v \rangle = 0$, mas $\lambda - \mu \neq 0$, aí $\langle u, v \rangle = 0$. \square

5.9 Formas Canônicas

5.9.1 Caso dos Números Complexos

Teorema 5.54. Seja V um espaço com produto interno sobre \mathbb{C} e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então T é normal se e somente se existe uma base ortonormal B de V tal que $[T]_B$ seja diagonal.

Demonstração. (\Leftarrow) Já foi provado.

(\Rightarrow) Indução em $n = \dim(V)$. Para $n = 1$ é claro. Para $n > 1$, se assumirmos o teorema válido para $\dim(V) < n$, então seja λ um autovalor e seja $v \neq 0$ tal que $T(v) = \lambda v$. Nós temos $V = \langle v \rangle \oplus \langle v \rangle^\perp$. Sabemos que $\langle v \rangle^\perp$ é T^* -invariante. Provaremos que $\langle v \rangle^\perp$ é T -invariante. Seja $u \in \langle v \rangle^\perp$, então para $u \in V$ temos:

$$\langle v, T(u) \rangle = \langle T^*(v), u \rangle = \langle \bar{\lambda} v, u \rangle = \bar{\lambda} \langle v, u \rangle = 0;$$

logo $T(v) \in \langle v \rangle^\perp$. Além disso, $\dim \langle v \rangle = n - 1$. Portanto podemos definir $T|_{\langle v \rangle^\perp}$ e ele é normal (**Cheque!**). Assim por hipótese de indução existe uma base ortonormal $B' = (e_2, \dots, e_n)$ de $\langle v \rangle^\perp$ tal que $[T|_{\langle v \rangle^\perp}]_{B'}$ seja diagonal. Seja $e_1 = \frac{v}{\|v\|}$, então $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ uma base ortonormal e é fácil ver que $[T]_B$ é diagonal. \square

Outro exemplo numérico enfadonho!

5.9.2 Caso dos Números Reais

Para isso primeiro definimos o seguinte.

Definição 5.55. Seja V um espaço vetorial sobre \mathbb{R} . Definimos a **complexificação** de V como:

$$V_{\mathbb{C}} = \{(x, y) \mid x, y \in V\},$$

e munimo-lo do seguinte:

$$\begin{aligned} (x, y) + (x', y') &= (x + x', y + y'). \\ (a + bi)(x, y) &= (ax - by, bx + ay). \end{aligned}$$

Proposição 5.56. Nas notações acima, verifica-se que $V_{\mathbb{C}}$ é um espaço vetorial sobre \mathbb{C} .

Demonstração. É só fazer umas continhas. \square

Definição 5.57. Para espaço vetorial V sobre \mathbb{R} , para $T \in \mathcal{L}(V)$ definimos:

$$T_{\mathbb{C}}(x, y) = (T(x), T(y)).$$

Proposição 5.58. Nas notações acima, verifica-se que $T_{\mathbb{C}} \in \mathcal{L}(V_{\mathbb{C}})$.

Demonstração. É só fazer umas continhas. □

Proposição 5.59. Nas notações acima, verificam-se:

- Para toda base B base de V , então $B_{\mathbb{C}} = \{(x, 0) \mid x \in B\}$ é uma base de $V_{\mathbb{C}}$.
- Para todo $T \in \mathcal{L}(V)$, então $p_T = p_{T_{\mathbb{C}}}$.
- Para subespaço W de $V_{\mathbb{C}}$, então W é da forma $W = U_{\mathbb{C}}$ para algum subespaço U de V se e só se $W^* \subseteq W$, em que definimos $W^* = \{(x, -y) \mid (x, y) \in W\}$.

Demonstração. Temos o seguinte:

- Seja $B = (e_1, \dots, e_n)$ uma base ortonormal de V . Para $(x, y) \in V_{\mathbb{C}}$, existem números reais:

$$a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$$

tais que:

$$x = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n, \quad y = b_1 e_1 + \dots + b_n e_n,$$

assim:

$$(x, y) = (a_1 + b_1 i)(e_1, 0) + \dots + (a_n + b_n i)(e_n, 0).$$

Logo $B_{\mathbb{C}}$ gera $V_{\mathbb{C}}$. Para:

$$a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R},$$

se:

$$(a_1 + b_1 i)(e_1, 0) + \dots + (a_n + b_n i)(e_n, 0) = 0,$$

então:

$$(a_1 e_1 + \dots + a_n e_n, b_1 e_1 + \dots + b_n e_n) = 0,$$

aí:

$$a_1 e_1 + \dots + a_n e_n = 0, \quad b_1 e_1 + \dots + b_n e_n = 0,$$

assim:

$$a_1 = \dots = a_n = b_1 = \dots = b_n = 0.$$

Logo $B_{\mathbb{C}}$ é linearmente independente.

- É só aplicar o item anterior e fazer umas continhas.
- (\Rightarrow) Se W é da forma $U_{\mathbb{C}}$ para algum subespaço U de V , então para todo $(x, y) \in W$ temos $x \in U$ e $y \in U$, aí $x \in U$ e $-y \in U$, aí $(x, -y) \in W$; logo $W^* \subseteq W$.
- (\Leftarrow) Se $W^* \subseteq W$, então seja (v_1, \dots, v_k) uma base de W , e para todo $i = 1, \dots, k$ seja $v_i = (e_i, f_i)$ com $e_i, f_i \in V$, então temos $v_i^* = (e_i, -f_i) \in W$, assim:

$$\begin{aligned} (e_i, 0) &= \frac{1}{2}(v_i + v_i^*) \in W \\ (f_i, 0) &= \frac{1}{2i}(v_i - v_i^*) \in W, \end{aligned}$$

assim, sendo U o subespaço gerado por $e_1, \dots, e_n, f_1, \dots, f_n$, é fácil ver que $W = U_{\mathbb{C}}$. □

CAPÍTULO 5. ESPAÇOS COM PRODUTO INTERNO 5.10. OPERADORES POSITIVOS

Definição 5.60. Seja V um espaço com produto interno sobre os reais. Então definimos:

$$\langle (x, y), (x', y') \rangle = \left(\langle x, x' \rangle + \langle y, y' \rangle, \langle y, x' \rangle - \langle x, y' \rangle \right).$$

Proposição 5.61. Nas notações acima, verificam-se:

- $V_{\mathbb{C}}$ é um espaço com produto interno sobre os complexos.
- Para $T \in \mathcal{L}(V)$ então temos $(T_{\mathbb{C}})^* = (T^*)_{\mathbb{C}}$.

Demonstração. É só fazer umas continhas. □

Corolário 5.62. $T \in \mathcal{L}(V)$ é normal (resp. unitário; autoadjunto) se e só se $T_{\mathbb{C}}$ é normal (resp. unitário; autoadjunto).

Demonstração. É só fazer umas continhas. □

Teorema 5.63. Seja V um espaço com produto interno sobre os reais e seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Então T é normal se e só se existe uma base ortonormal B de V tal que:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} A_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A_n \end{pmatrix},$$

em que A_i esteja em uma das seguintes formas:

- $A_i = \begin{pmatrix} a_i \end{pmatrix}, \quad a_i \in \mathbb{R}$
- $A_i = r_i \begin{pmatrix} \cos(\varphi_i) & -\sin(\varphi_i) \\ \sin(\varphi_i) & \cos(\varphi_i) \end{pmatrix}, \quad r_i \neq 0, \quad 0 < \varphi < \pi$

5.10 Operadores Positivos

Definição 5.64. Um operador T é dito **positivo semidefinido** se e só se para todo $x \in V$ temos $\langle T(x), x \rangle \geq 0$. Nesse caso, denotamos a propriedade por $T \geq 0$.

Definição 5.65. Um operador T é dito **positivo definido** se e só se para todo $x \in V$ tal que $x \neq 0$ temos $\langle T(x), x \rangle > 0$. Nesse caso, denotamos a propriedade por $T \succ 0$.

Teorema 5.66. Um operador T é positivo semidefinido se e só se $T^* = T$ e para todo $\alpha \in \text{Spec}(T)$ temos $\alpha \geq 0$.

5.11 Matriz de Gram

Definição 5.67. Seja V um espaço sobre K com produto interno. Sejam $v_1, \dots, v_n \in V$. A matriz:

$$G(v_1, \dots, v_n) = \left(\langle v_i, v_j \rangle \right) \in \mathcal{M}_n(K)$$

chama-se a **matriz de Gram** do sistema $\{v_1, \dots, v_n\}$.

A matriz $G(v_1, \dots, v_n)$ é Hermitiana, ou seja:

$$G(v_1, \dots, v_n)^* = G(v_1, \dots, v_n),$$

pois para todo i, j temos:

$$\overline{\langle v_i, v_j \rangle} = \langle v_j, v_i \rangle.$$

Proposição 5.68. Seja $\dim(V) = n$, $B = (e_1, \dots, e_n)$ uma base de V . Se $C = (f_1, \dots, f_n)$ é outra base de V , então:

$$G(f_1, \dots, f_n) = P_{B,C}^t G(e_1, \dots, e_n) \overline{P_{B,C}}.$$

Demonstração. Observemos que para todo $x, y \in V$ temos:

$$\langle x, y \rangle = [x]_B^t G_B \overline{[y]_B} = (x_1, \dots, x_n) \left(\langle e_i, e_j \rangle \right) \begin{pmatrix} \overline{y_1} \\ \vdots \\ \overline{y_n} \end{pmatrix}$$

em que:

$$x = \sum_i x_i e_i, \quad y = \sum_i y_i e_i,$$

pois:

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i,j} x_i \overline{y_j} \langle e_i, e_j \rangle.$$

Agora temos:

$$[x]_B = [x]_C P_{B,C}^t,$$

aí sendo:

$$P = (a_{ij}),$$

temos:

$$f_i = \sum_{j=1}^n a_{ji} e_j,$$

aí:

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n = \sum_{i=1}^n x_i' f_i = \sum_{i,j} x_i' a_{ji} e_j =$$

□

Corolário 5.69. Se $B = (e_1, \dots, e_n)$ é uma base de V então $\det G(e_1, \dots, e_n) > 0$.

Demonstração. Seja C uma base de V . Então:

$$G_C = P_{B,C}^t G_B \overline{P_{B,C}},$$

então, sendo $\det(P_{B,C}) = \alpha$, temos:

$$1 = \det(G_C) = \det(P_{B,C}^t) \det(G_B) \det(\overline{P_{B,C}}) = \alpha \det(G_B) \overline{\alpha} = |\alpha|^2 \det(G_B).$$

□

Corolário 5.70. Seja V um espaço com produto interno, $v_1, \dots, v_n \in V$ que são linearmente independentes. Então:

$$\det G(v_1, \dots, v_n) > 0$$

Demonstração. Seja $V_0 = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$, então V_0 é um espaço com produto interno e $\dim(V_0) = n$ e (v_1, \dots, v_n) é uma base de V_0 . Assim, pelo corolário anterior, temos $G(v_1, \dots, v_n) > 0$. □

Proposição 5.71. Se v_1, \dots, v_n são linearmente dependentes, então $G(v_1, \dots, v_n)$ é degenerada; em particular $\det G(v_1, \dots, v_n) = 0$.

Demonstração. Seja $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ uma base e $C = \{f_1, \dots, f_n\}$ um conjunto arbitrário. Seja:

$$P_{B,C} = ([f_1]_B, \dots, [f_n]_B),$$

a matriz de coordenadas de $\{f_1, \dots, f_n\}$ na base B . Então para x , sendo:

$$x = x'_1 f_1 + \dots + x'_n f_n,$$

então:

$$[x]_B = (x'_1, \dots, x'_n) P_{B,C}^t.$$

□

Proposição 5.72. Seja $U \subseteq V$ um subespaço, e seja $U = \langle u_1, \dots, u_m \rangle$ com u_i linearmente independentes, e seja $v \in V$. Então:

$$d(v, U) = \sqrt{\frac{\det G(u_1, \dots, u_m, v)}{\det G(u_1, \dots, u_m)}}.$$

Demonstração. Seja $v = u + w$ com $u \in U$ e $w \perp U$. Então para $i = 1, \dots, m$ temos:

$$\langle u_i, v \rangle = \langle u_i, u \rangle;$$

assim temos:

$$G(u_1, \dots, u_m, v) = \begin{pmatrix} G(u_1, \dots, u_m) & \begin{matrix} \langle u_1, u \rangle \\ \vdots \\ \langle u_m, u \rangle \end{matrix} \\ \langle u, u_1 \rangle \quad \dots \quad \langle u, u_m \rangle & \langle u, u \rangle + \langle w, w \rangle \end{pmatrix},$$

assim:

$$\det G(u_1, \dots, u_m, v) = \det G(u_1, \dots, u_m, u) + \det \begin{pmatrix} G(u_1, \dots, u_m) & \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} \\ \langle u, u_1 \rangle \quad \dots \quad \langle u, u_m \rangle & \|w\|^2 \end{pmatrix},$$

ai:

$$\det G(u_1, \dots, u_m, v) = \det G(u_1, \dots, u_m) \cdot \|w\|^2.$$

□

Proposição 5.73. Seja V um espaço sobre K com uma base $B = (v_1, \dots, v_n)$. Se V possui um produto interno então $G(v_1, \dots, v_n) > 0$. Reciprocamente, seja $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(K)$ uma matriz positiva definida, aí definamos em V o produto escalar $\langle v_i, v_j \rangle = a_{ij}$, então V é um espaço com produto interno.

Teorema 5.74. Seja $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(K)$ uma matriz hermitiana. Então são equivalentes:

- A é positiva definida.
- $\text{Spec}(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ com $\lambda_i > 0$ para todo $i = 1, \dots, n$
- $A = B^2$ para alguma matriz B tal que $B = B^*$ e $\det B \neq 0$. De modo mais geral $A = TT^*$ com $\det T \neq 0$.
- Todos os menores principais de A são positivos.

Demonstração. (1) \Rightarrow (4) Se A é positiva definida, então existe um produto interno tal que $G(e_1, \dots, e_n) = A$. Em particular, sendo:

$$A_i = \begin{pmatrix} a_{11} & & a_{1i} \\ & \ddots & \\ a_{i1} & & a_{ii} \end{pmatrix},$$

então $A_i = G(e_1, \dots, e_i)$, aí $\det(A_i) > 0$.

(4) \Rightarrow (1) Indução sobre n . Seja $\text{Spec}(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ ($\lambda_i \in \mathbb{R}$ com repetição). Sabemos que $\det(A) = \lambda_1 \cdots \lambda_n > 0$. Se A não é positiva definida, então existem i e j tais que $\lambda_i \lambda_j < 0$, aí sejam u, v autovetores não nulos associados aos autovalores λ_i, λ_j . Escolhamos $\alpha, \beta \in K$ tais que $x = \alpha u + \beta v \in \langle e_1, \dots, e_{n-1} \rangle$, então:

$$\begin{aligned} \langle Ax, x \rangle &= \langle \alpha Au + \beta Av, \alpha u + \beta v \rangle \\ &= \langle \lambda_i \alpha u + \lambda_j \beta v, \alpha u + \beta v \rangle \\ &= \lambda_i \|\alpha u\|^2 + \lambda_j \|\beta v\|^2 + \lambda_i \alpha \bar{\beta} \langle u, v \rangle + \lambda_j \beta \bar{\alpha} \langle v, u \rangle \quad \text{rcl} \\ &= \lambda_i \|\alpha u\|^2 + \lambda_j \|\beta v\|^2, \end{aligned}$$

assim:

$$\lambda_i \|\alpha u\|^2 + \lambda_j \|\beta v\|^2 < 0,$$

contradizendo a hipótese de indução. □

Capítulo 6

Formas Bilineares

6.1 Definições e Exemplos

Definição 6.1. Sejam U, V, W espaços vetoriais sobre K . Uma **função bilinear** de U e V em W é uma função $f : U \times V \rightarrow W$ que satisfaz o seguinte:

- $f(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2, v) = \alpha_1 f(u_1, v) + \alpha_2 f(u_2, v)$.
- $f(u, \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2) = \beta_1 f(u, v_1) + \beta_2 f(u, v_2)$.

Denotamos o conjunto das funções bilineares de U e V em W por $B(U, V; W)$.

Definição 6.2. Se $U = V = W$, cada $f \in B(U, V; W)$ determina em U um produto:

$$u \cdot v = f(u, v).$$

Neste caso, $A = (U, f)$ chama-se uma **álgebra** sobre o corpo K .

Exemplo 6.3. Seja $A = (\mathbb{R}^3, \times)$, em que \times é o produto vetorial usual, então A é uma \mathbb{R} -álgebra.

Exemplo 6.4. A estrutura dos complexos \mathbb{C} é uma \mathbb{R} -álgebra de dimensão 2.

Exemplo 6.5. K é uma K -álgebra de dimensão 1.

Exemplo 6.6. O conjunto das matrizes $\mathcal{M}_n(K)$ é uma K -álgebra com:

$$f(A, B) = AB.$$

Exemplo 6.7. Seja:

$$H_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(K) \mid A^t = A\},$$

e definamos:

$$f(A, B) = AB + BA,$$

então $H_n(\mathbb{R})$ é uma \mathbb{R} -álgebra, chamada **álgebra de Jordan**.

Definição 6.8. Uma **forma bilinear** entre dois espaços vetoriais U e V sobre K é uma função bilinear de U e V em K . Denotamos o conjunto das formas bilineares entre U e V por $B(U, V)$.

Exemplo 6.9. Alguns exemplos são:

- Um produto interno sobre um espaço vetorial *real*.
- $(A, B) \mapsto \text{tr}(AB)$.
- Sejam $\varphi \in U^*$ e $\psi \in V^*$, então definamos $(\varphi \otimes \psi)(u, v) = \varphi(u)\psi(v)$, o **produto tensorial** de φ e ψ .

6.2 Formas Não Degeneradas

Definição 6.10. Seja (V, f) um espaço com uma forma bilinear f . Um subespaço $U \subseteq V$ chama-se **não-degenerado** se e só se a restrição $f|_U$ é não degenerada, e chama-se **isotrópico** se e só se $f|_U = 0$.

Por exemplo, num espaço simplético todo subespaço de dimensão 1 é simplético.

Proposição 6.11. Seja (V, f) de dimensão finita.

- Se $U \subseteq V$ é não degenerado, então $V = U \oplus U^\perp$.
- Se os dois U e U^\perp são não degenerados, então $U^{\perp\perp} = U$.

Demonstração. • Seja $B = (u_1, \dots, u_m)$ uma base de U e completemos a uma base $C = (v_1, \dots, v_m)$ de V . Consideremos $f' \in B(U, V)$ e $f'' \in B(U, U)$ que são restrições de f sobre $U \times V$ e $U \times U$. Sejam $A = [f']_{B,C} \in \mathcal{M}_{m,n}(K)$ e $B = [f'']_{B,B} \in \mathcal{M}_n(K)$. É claro que a matriz B é formada pelas m primeiras colunas da matriz A . Como $f|_U$ é não degenerada, então a matriz B é não degenerada. Assim $\text{posto}(B) = \text{posto}(A) = m$. Agora consideremos:

$$U^\perp = \{v \in V \mid [f']_{B,C}[v]_C^t = A[v]_C^t = 0\},$$

então:

$$\begin{aligned} v \in U^\perp &\Leftrightarrow \forall u \in U : f(u, v) = 0 \\ &\Leftrightarrow \forall u \in U : [u]_B [f]_{B,C} [v]_C^t = 0 \\ &\Leftrightarrow [f]_{B,C} [v]_C^t = 0 \\ &\Leftrightarrow A[v]_C^t = 0. \end{aligned}$$

Assim, como $A \in \mathcal{M}_{m,n}(K)$, então $\dim(U^\perp) = n - m$. Como U é não degenerado, então $U \cap U^\perp = 0$, portanto $V = U \oplus U^\perp$.

- É claro que $U^{\perp\perp}$. Se U^\perp é não degenerado então $\dim(U^{\perp\perp}) = n - \dim(U^\perp) = n - (n - m) = m = \dim(U)$, portanto $\dim(U^{\perp\perp}) = U$.

□

Teorema 6.12. Seja (V, f) um espaço com uma forma bilinear f simétrica ou antissimétrica. Então V se decompõe numa soma ortogonal de subespaços:

$$V = V_1 \oplus \dots \oplus V_m,$$

em que $\dim(V_i) = 1$ no caso simétrico e $\dim(V_i) = 1, 2$ no caso antissimétrico, sendo $\dim(V_i) = 1$ com V_i isotrópico e $\dim(V_i) = 2$ com V_i não degenerado.

Demonstração. Indução sobre $\dim(V)$.

- 1) Caso simétrico. Se $f = 0$, então $V = Ke_1 \oplus \dots \oplus Ke_n$ para qualquer base $B = (e_1, \dots, e_n)$ é a soma desejada. Agora suponhamos que $f \neq 0$. Se $\forall v : f(v, v) = 0$, então já vimos que para u e v temos $f(u, v) = -f(v, u) = f(v, u)$, aí $f(u, v) = 0$, contradição. Assim existe v tal que $f(v, v) \neq 0$. Agora tomemos $V_1 = \langle v \rangle$, então V_1 é não degenerado, portanto $V = V_1 \oplus V_1^\perp$. Por indução, $V_1^\perp = V_2 \oplus \dots \oplus V_m$, aí $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_m$.
- 2) Caso antissimétrico. Se $f = 0$, então tudo é evidente. Se $f \neq 0$, então existem u e v tais que $f(u, v) = \alpha \neq 0$. Seja $V_1 = \langle u, v \rangle$, então $B = (u, v)$ é uma base de V_1 . Temos:

$$[f|_{V_1}]_B = \begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ -\alpha & 0 \end{pmatrix},$$

então $f|_{V_1}$ é não degenerada, aí V_1 é não degenerado e $V = V_1 \oplus V_1^\perp$.

□

Corolário 6.13. Seja $A \in \mathcal{M}_n(K)$ uma matriz simétrica ou antissimétrica. Então existe $P \in \mathcal{M}_n(K)$ não degenerada tal que:

1) No caso simétrico:

$$P^t A P = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha_n \end{pmatrix}$$

em que $\alpha_i \in K$.

2) No caso antissimétrico:

$$P^t A P = \begin{pmatrix} A_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & A_m & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

em que:

$$A_i = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Corolário 6.14 (Teorema da Inversão). Se $K = \mathbb{R}$ e $f \in B(V, \mathbb{R})$, então existe uma base B de V tal que:

$$[f]_B = \begin{pmatrix} I_r & 0 & 0 \\ 0 & -I_s & 0 \\ 0 & 0 & 0_t \end{pmatrix},$$

em que I_m é a matriz identidade de tamanho m e 0_m é a matriz quadrada nula de tamanho m . O trio (r, s, t) se chama **assinatura** da forma f e está unicamente determinada.

Demonstração. Temos $V = V_+ \oplus V_- \oplus V_0$, em que $\dim(V_+) = r$ e $\dim(V_-) = s$ e $\dim(V_0) = t$, e também $r + s = \text{posto}[f]_B$, assim $t = n - \text{posto}[f]_B$ está determinado unicamente.

Agora seja $V = V'_+ \oplus V'_- \oplus V'_0$, e seja $\dim(V'_+) = r$ e $\dim(V'_-) = s'$. Basta provar que $r = r'$. Suponhamos que $r > r'$. Consideremos a projeção:

$$\begin{aligned} \pi : V &\rightarrow V'_+ \\ v = v'_+ + v'_- + v'_0 &\mapsto v'_+ \end{aligned}$$

Seja $\pi_+ = \pi|_{V_+}$, então $\pi_+ : V_+ \rightarrow V'_+$. Como $r > r'$ então $\dim(V_+) > \dim(V'_+)$, portanto existe $v \in V_+$ tal que $v \neq 0$ e $\pi_+(v) = 0$, aí $v \in V_+$ e $v \in V'_- \oplus V'_0$, pois $v'_+ = 0$, aí:

$$0 < f(v, v) = f(v'_- + v'_0, v'_- + v'_0) = f(v'_-, v'_-) + f(v'_0, v'_0) \leq 0,$$

chegando a contradição. □

Observação 6.15. A forma bilinear de assinatura $(3, 1, 0)$ no espaço \mathbb{R}^4 determina a **geometria do espaço de Minkowski**, associada com a teoria da relatividade.

6.3 Formas Quadráticas

Definição 6.16. Um polinômio homogêneo nas variáveis x_1, \dots, x_n de grau 2 com coeficientes no corpo K chama-se uma **forma quadrática** nas variáveis x_1, \dots, x_n , e sua aparência genérica é assim:

$$q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j.$$

A matriz $A = (a_{ij})$ chama-se matriz da forma quadrática q .

Então a matriz $A^t = A$ e para $x \in K^n$ temos $a(x) = [x]A[x]^t$.

Associemos com q a forma bilinear simétrica:

$$f(x, y) = [x]A[y]^t,$$

de modo que $q(x) = f(x, x)$.

Se $\text{Char}(K) \neq 2$, então:

$$f(x, y) = \frac{1}{2} (q(x+y) - q(x) - q(y)).$$

Definição 6.17. Uma aplicação $q : V \rightarrow K$ é chamada uma **forma quadrática** sobre V se e só se existe uma forma bilinear f simétrica tal que:

$$\forall x \in V : q(x) = f(x, x).$$

A forma f chama-se a forma bilinear associada com a forma quadrática q . A forma q é dita **não degenerada** se e só se a f é uma forma não degenerada.

Teorema 6.18. Temos o seguinte:

- Seja V um espaço vetorial sobre K de dimensão n e $q : V \rightarrow K$ uma forma quadrática. Então existe uma base B de V e $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$ tais que:

$$q(x) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2,$$

em que $(x_1, \dots, x_n) = [x]_B$.

- Se $K = \mathbb{R}$ então no caso anterior existe uma base B de V tal que nesta base:

$$q(x) = x_1^2 + \dots + x_r^2 - x_{r+1}^2 - \dots - x_{r+s}^2,$$

em que os números r e s estão unicamente determinados.

6.4 Produto Tensorial

Definição 6.19. Sejam U e V espaços vetoriais sobre K . Um espaço W junto com uma função bilinear ι de U e V a W formam um **produto tensorial** de U e V se e só se para qualquer espaço L e função bilinear φ de U e V a L existe uma única aplicação linear $\bar{\varphi} : W \rightarrow L$ tal que $\varphi = \bar{\varphi} \circ \iota$.

Proposição 6.20. O par (W, ι) é unicamente determinado sob isomorfismo.

Demonstração. Seja (W', ι') um outro produto tensorial. Então:

- Existe uma função linear $\varphi : W \rightarrow W'$ tal que $\iota' = \varphi \circ \iota$.
- Existe uma função linear $\varphi' : W' \rightarrow W$ tal que $\iota = \varphi' \circ \iota'$.

Assim:

- $(\varphi' \circ \varphi) \circ \iota = \iota$, mas $I_W \circ \iota = \iota$, aí $\varphi' \circ \varphi = I_W$.
- $(\varphi \circ \varphi') \circ \iota' = \iota'$, mas $I_{W'} \circ \iota' = \iota'$, aí $\varphi \circ \varphi' = I_{W'}$.

□

Proposição 6.21. Para U e V existe um produto tensorial (W, ι) .

Demonstração. Consideremos o espaço vetorial X com base $U \times V$. Seja E a reunião do conjunto dos elementos de X da forma:

$$(a_1 u_1 + a_2 u_2, v) - a_1(u_1, v) - a_2(u_2, v), \quad a_1, a_2 \in K, \quad u_1, u_2, v \in V$$

com o conjunto dos elementos de X da forma:

$$(u, a_1 v_1 + a_2 v_2) - a_1(u, v_1) - a_2(u, v_2), \quad a_1, a_2 \in K, \quad u, v_1, v_2 \in V$$

e seja Y o subespaço gerado por E . Agora consideremos $W = X/Y$ juntamente com a projeção canônica $\iota : X \rightarrow W$. Então podemos mostrar que (W, ι) é um produto tensorial (**Completar detalhes**). □

Definição 6.22. Denotamos o par (W, ι) definido na demonstração por $(U \otimes V, \otimes)$.

Proposição 6.23. Sejam U e V espaços. Então a imagem de $\langle \text{Im}(\otimes) \rangle = U \otimes V$.

Demonstração. Seja $L = (U \otimes V) / \langle \text{Im}(\otimes) \rangle$, e consideremos a projeção canônica $\pi : U \otimes V \rightarrow L$. Então $\pi \circ \otimes = 0$ e $0 \circ \otimes = 0$, assim $\pi = 0$, aí $\langle \text{Im}(\otimes) \rangle = U \otimes V$. □

Teorema 6.24. Sejam U e V espaços, $(e_i)_{i \in I}$ uma base de U e $(f_j)_{j \in J}$ uma base de V . Então a família $(e_i \otimes f_j)_{(i,j) \in I \times J}$ é uma base de $U \otimes V$.

Proposição 6.25. Sejam U e V espaços vetoriais sobre K . Seja $w = \sum_{i=1}^n u_i \otimes v_i \in U \otimes V$, em que (v_1, \dots, v_n) é linearmente independente. Então os elementos (u_1, \dots, u_n) estão determinados unicamente, isto é, se $w = \sum_{i=1}^n u'_i \otimes v_i$, então $u'_i = u_i$ para todo $i = 1, \dots, n$. O mesmo é válido quando o (u_1, \dots, u_n) é linearmente independente.

Demonstração. Suponhamos que $\sum_{i=1}^n u_i \otimes v_i = \sum_{i=1}^n u'_i \otimes v_i$, então:

$$0 = \sum_{i=1}^n (u_i \otimes v_i - u'_i \otimes v_i) = \sum_{i=1}^n (u_i - u'_i) \otimes v_i.$$

Assim basta provar que, se:

$$\sum_{i=1}^n u_i \otimes v_i = 0$$

então:

$$u_1 = \dots = u_n = 0.$$

□

6.5 Extensão Escalar

Definição 6.26. Para corpo F e subcorpo K e espaço V sobre K , então uma **extensão escalar** de V por F é um espaço vetorial sobre F munido de uma função K -linear $i : V \rightarrow W$ tal que para todo espaço U sobre F e para todo $\varphi \in \mathcal{L}_K(V, U)$ exista um único $\bar{\varphi} \in \mathcal{L}_F(W, U)$ tal que $\bar{\varphi} \circ i = \varphi$.

Proposição 6.27. Para corpo F e subcorpo K e espaço V sobre K , então uma extensão escalar de V por F é determinado unicamente sob isomorfismo.

Proposição 6.28. Se V é um espaço vetorial sobre \mathbb{R} , então a complexificação $V_{\mathbb{C}}$ munida da função $i : V \rightarrow V_{\mathbb{C}}$ dada por $\forall x \in V : i(x) = (x, 0)$ é uma extensão escalar de V por \mathbb{C} .

Proposição 6.29. Para corpo F e subcorpo K e espaço V sobre K , então $F \otimes V$ munido da função $i : V \rightarrow F \otimes V$ dada por $\forall x \in V : i(x) = 1 \otimes x$ é uma extensão escalar de V por F .

Definição 6.30. Para corpo F e subcorpo K e espaço V sobre K , definimos $V_F = F \otimes V$ e definimos $\iota_F : V \rightarrow F \otimes V$ por $\forall x \in V : \iota_F(x) = 1 \otimes x$.

Proposição 6.31. Propriedades da extensão escalar.

- $\dim_F(V_F) = \dim_K(V)$.
- Para qualquer base $(e_i)_{i \in I}$ de V sobre K , então $(\iota(e_i))_{i \in I}$ é uma base de V_F sobre F .

Proposição 6.32 (Isomorfismos Canônicos). Temos os seguintes isomorfismos canônicos:

- Se V é um espaço sobre K então:

$$\begin{aligned} K \otimes V &\cong V \\ \alpha \otimes v &\mapsto v. \end{aligned}$$

- Se U e V são espaços sobre K , então:

$$\begin{aligned} U \otimes V &\cong V \otimes U \\ u \otimes v &\mapsto v \otimes u. \end{aligned}$$

- Se U e V e W são espaços sobre K então:

$$\begin{aligned} (U \otimes V) \otimes W &\cong U \otimes (V \otimes W) \\ (u \otimes v) \otimes w &\mapsto u \otimes (v \otimes w). \end{aligned}$$

Capítulo 7

Mecânica Quântica

7.1 Postulados

Apresentaremos alguns postulados.

Postulado 1. O estado de um sistema quântico num espaço X (em geral $X = \mathbb{R}^n$ ou afins) está completamente determinado por uma função de onda $\psi : X \rightarrow \mathbb{C}$ tal que:

$$\int_X |\psi(x)|^2 dx = 1.$$

Além disso, interpretamos $|\psi(x)|^2$ como a distribuição de probabilidade de encontrarmos a partícula na posição x .

Postulado 2. Toda grandeza física α de um estado quântico está associado a um operador linear autoadjunto $\hat{\alpha}$ em L^2 . Para algumas grandezas podemos mostrar mais especificamente seus operadores correspondentes.

- Cada coordenada cartesiana de posição x_i em \mathbb{R}^n corresponde ao operador \hat{x}_i dado pela multiplicação por x_i , ou seja:

$$(\hat{x}_i f)(x_1, \dots, x_n) = x_i f(x_1, \dots, x_n).$$

- Cada coordenada cartesiana de momento linear p_i corresponde ao operador \hat{p}_i dado por:

$$\hat{p}_i(f) = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial f}{\partial x_i},$$

em que \hbar é a **constante reduzida de Planck**:

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}, \quad h \cong 6,62607015 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s},$$

e h é a **constante de Planck**.

- Para a energia cinética K_i na coordenada i , temos as seguintes contas:

$$K_i = \frac{mv_i^2}{2} = \frac{m^2 v_i^2}{2m} = \frac{p_i^2}{2m},$$

pois o momento linear na coordenada i é dado por:

$$p_i = mv_i.$$

Por enquanto desconsideramos efeitos relativísticos, assim a massa m é uma constante, de modo que podemos associar K_i ao operador:

$$\hat{K}_i = \frac{\hat{p}_i^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}.$$

- Para a energia cinética K , lembrando que:

$$K = K_1 + \cdots + K_n,$$

então associamos K ao operador

$$\hat{K} = \hat{K}_1 + \cdots + \hat{K}_n = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \cdots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2} \right) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2.$$

- Para a energia potencial V , consideramos o operador \hat{V} dado pela multiplicação por V , ou seja:

$$(\hat{V}f)(x_1, \dots, x_n) = V(x_1, \dots, x_n)f(x_1, \dots, x_n).$$

- A energia total E é dada por:

$$E = K + V,$$

assim associamos E ao **operador Hamiltoniano**:

$$\hat{H} = \hat{K} + \hat{V} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V.$$

- Em \mathbb{R}^3 , o momento angular $\mathbf{L} = (L_x, L_y, L_z)$ é dado pelo seguinte:

$$\begin{aligned} L_x &= y p_z - z p_y \\ L_y &= z p_x - x p_z \\ L_z &= x p_y - y p_x \end{aligned}$$

assim associamos os componentes de \mathbf{L} aos seguintes operadores:

$$\begin{aligned} \hat{L}_x &= \hat{y} \hat{p}_z - \hat{z} \hat{p}_y = \frac{\hbar}{i} \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right) \\ \hat{L}_y &= \hat{z} \hat{p}_x - \hat{x} \hat{p}_z = \frac{\hbar}{i} \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right) \\ \hat{L}_z &= \hat{x} \hat{p}_y - \hat{y} \hat{p}_x = \frac{\hbar}{i} \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \end{aligned}$$

- Também associamos o quadrado da magnitude de \mathbf{L} , que é:

$$L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$$

ao seguinte operador:

$$\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2.$$

Postulado 3. Em qualquer medição de uma grandeza física α num sistema quântico, os únicos possíveis valores que serão observados são os autovalores $(\alpha_i)_{i \in I}$ do operador correspondente $\hat{\alpha}$, ou seja, que satisfazem a seguinte equação:

$$\hat{\alpha} \psi_i = \alpha_i \psi_i.$$

Além disso, se ψ_i é um autovetor de $\hat{\alpha}$ com autovalor α_i , então uma medição de α sobre ψ_i sempre retornará o valor α_i .

Postulado 4. Se um sistema quântico é descrito por uma função de onda ψ , então o valor esperado de uma grandeza física α é dado por:

$$\langle \alpha \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \psi^* \hat{\alpha} \psi \, dx.$$

Postulado 5. Um sistema quântico temporal:

$$\begin{aligned}\Psi : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{C} \\ (x, t) &\mapsto \Psi(x, t)\end{aligned}$$

evolui no tempo de acordo com a **equação de Schrödinger temporal**:

$$\hat{H}\Psi(x, t) = -\frac{\hbar}{i} \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t},$$

em que \hat{H} é o operador Hamiltoniano:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(x, t).$$

7.2 Princípio da Incerteza

Postulamos que, se uma função de onda ψ é um autovetor de um operador \hat{a} com autovalor a , então uma medição da grandeza física α sempre retornará o valor a . Assim, se ψ é simultaneamente um autovetor de dois operadores $\hat{\alpha}$ e $\hat{\beta}$, ou seja, se $\hat{\alpha}(\psi) = a\psi$ e $\hat{\beta}(\psi) = b\psi$, então podemos associar simultaneamente as grandezas físicas α e β aos valores definitivos a e b . Portanto, seria interessante saber quando podemos encontrar um “conjunto completo”¹ $(e_i)_{i \in I}$ de autovetores simultâneos de $\hat{\alpha}$ e $\hat{\beta}$. Sabemos que, num espaço dimensional de dimensão finita, uma família de operadores é simultaneamente diagonalizável se e somente se eles são diagonalizáveis e se comutam um com outro.

¹Se o espaço tem dimensão finita, podemos simplesmente definir um conjunto completo como uma base. Em alguns outros casos, podemos definir um conjunto completo como uma base de Schauder.

Índice

Autoespaço, 31

Autovalor, 31

Autovetor, 31

Espaço Vetorial

Base, 9

Base dual, 19

Base ordenada, 9

Dimensão, 12

Soma direta, 14

Teorema do Núcleo-Imagem, 18

Transformações Lineares, 17

Spectrum, 31

Teorema de Cantor-Bernstein, 11

Transformações Lineares

Isomorfismos, 18