

Álgebra Linear

Douglas Smigly

MAT5730

2º semestre de 2019

Conteúdo

Informações da Disciplina	5
1 Espaços vetoriais	7
1.1 Definições Iniciais	7
1.2 Base e Dimensão	8
1.3 Subespaços	12
1.4 Coordenadas	15
2 Transformações Lineares	17
2.1 Definições	17
2.2 Espaço Dual	18
2.3 Espaço Bidual	19
2.4 Anuladores	20
2.5 Transpostas	21
2.6 Espaços Quocientes	22
3 Determinantes	25
3.1 Formas Multilineares	25
3.2 Determinantes	27
4 Formas Canônicas	31
4.1 Autovalores e Autovetores	31
4.2 Polinômio Minimal	35
4.3 Subespaços Invariantes	36
4.4 Teorema de Cayley-Hamilton	38
4.5 Decomposições Primárias	40
4.6 Critérios de Diagonalização	41

CONTEÚDO

CONTEÚDO

Informações da Disciplina

Informações Básicas

Essas são as notas de aula de Álgebra Linear (MAT5730), as aulas acontecem na sala B-134 às terças 10h e às quintas 8h.

Informações do Professor

O professor é o Ivan Shestakov, sua sala é a 290-A e o seu e-mail é shestak@ime.usp.br

Bibliografia

- [1] Flávio Coelho and Mary Lilian Lourenço. *Um Curso de Álgebra Linear*. Edusp, 2001.
- [2] Werner H. Greub. *Multilinear Algebra*. Springer, 1978.
- [3] Werner H. Greub. *Linear Algebra*. Springer, 1981.
- [4] Kenneth Hoffman and Ray Kunze. *Linear Algebra*. Prentice Hall, 1971.
- [5] Steven Roman. *Advanced Linear Algebra*. Springer, 2005.

Avaliação

A nota final da disciplina será a média aritmética de P1, P2, e P3. Todos os alunos poderão fazer a prova sub para substituir a menor das suas notas (Sub aberta). As datas das provas são as seguintes:

Prova	Data
P1	10-09
P2	15-10
P3	12-11
SUB	19-11

Outras Informações

- (i) Teremos listas, que não contarão para a nota
- (ii) As listas serão publicadas em
- (iii) Não haverá monitoria

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

Capítulo 1

Espaços vetoriais

1.1 Definições Iniciais

Definição 1.1. Um **grupo abeliano** é um conjunto X munido do seguinte:

- $+: X \times X \rightarrow X$,
- $0 \in X$,
- $-: X \rightarrow X$,

satisfazendo as seguintes propriedades:

- Para $x, y, z \in X$ então $(x + y) + z = x + (y + z)$,
- Para $x, y \in X$ então $x + y = y + x$,
- Para $x \in X$ então $x + 0 = x$,
- Para $x \in X$ então $x + (-x) = 0$.

Definição 1.2. Um **corpo** é um grupo abeliano $(K, +, 0, -)$ munido do seguinte:

- $\cdot: K \times K \rightarrow K$,
- $1 \in K$,
- $\cdot^{-1}: K \setminus \{0\} \rightarrow K$,

satisfazendo as seguintes propriedades:

- Para $x, y, z \in K$ então $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$,
- Para $x, y \in K$ então $x \cdot y = y \cdot x$,
- Para $x \in K$ então $x \cdot 1 = x$,
- Para $x \in K \setminus \{0\}$ então $x \cdot x^{-1} = 1$,
- Para $x, y, z \in K$ então $x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$.

Definição 1.3. Dado K um corpo, um **espaço vetorial sobre K** é um grupo abeliano $(V, +, 0, -)$ munido do seguinte:

- $\cdot: K \times V \rightarrow V$,

satisfazendo as seguintes propriedades:

- Para $a, b \in K$ e $x \in V$ então $(a \cdot b) \cdot x = a \cdot (b \cdot x)$,
- Para $x \in V$ então $x \cdot 1 = x$,
- Para $a \in K$ e $x, y \in V$ então $a \cdot (x + y) = (a \cdot x) + (a \cdot y)$,
- Para $a, b \in K$ e $x \in V$ então $(a + b) \cdot x = (a \cdot x) + (b \cdot x)$.

1.2 Base e Dimensão

Durante o restante deste capítulo, sempre adotaremos K como sendo um corpo qualquer.

Definição 1.4. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K . Seja I um conjunto e $v : I \rightarrow V$ uma função. Uma **combinação linear** de v é um elemento $u \in V$ tal que existam um conjunto finito $J \subseteq I$ e uma função $\alpha : J \rightarrow K$ tais que:

$$u = \sum_{i \in J} \alpha_i v_i.$$

Dizemos que v **gera** V se e só se todo elemento de V é combinação linear de v .

Definição 1.5. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K . Dizemos que um conjunto $S \subseteq V$ **gera** V se e só se a função $v : S \rightarrow V$ dada por $\forall s \in S : v_s = s$ gera V .

Proposição 1.6. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K e sejam I um conjunto e $v : I \rightarrow V$ uma função. Então v gera V se e somente se a imagem $S = \{v_i : i \in I\}$ gera V .

Demonstração. Temos o seguinte:

- Se v gera V , então para $x \in V$ existem um conjunto finito $J \subseteq I$ e uma função $\alpha : J \rightarrow K$ tais que:

$$x = \sum_{i \in J} \alpha_i v_i,$$

aí seja $T = v[J]$, e seja:

$$\forall s \in T : J_s = \{i \in J : v_i = s\};$$

e seja $\beta : T \rightarrow K$ a função dada por:

$$\forall s \in T : \beta_s = \sum_{i \in J_s} \alpha_i,$$

então T é finito, aí temos:

$$x = \sum_{i \in J} \alpha_i v_i = \sum_{s \in T} \sum_{i \in J_s} \alpha_i v_i = \sum_{s \in T} \sum_{i \in J_s} \alpha_i s = \sum_{s \in T} \beta_s s;$$

logo S gera V .

- Se S gera V , então para $x \in V$ existem um conjunto finito $T \subseteq S$ e uma função $\beta : T \rightarrow K$ tais que:

$$x = \sum_{s \in T} \beta_s s,$$

aí existe uma função $i : T \rightarrow I$ tal que:

$$\forall s \in T : v_{i_s} = s,$$

aí seja $J = \text{Im}(i)$, então J é finito e i é uma bijeção de T a J e sua inversa é $u = v \upharpoonright J$, aí seja $\alpha = \beta \circ u$, então:

$$x = \sum_{s \in T} \beta_s s = \sum_{j \in J} \beta_{u_j} u_j = \sum_{j \in J} \alpha_j u_j = \sum_{j \in J} \alpha_j v_j;$$

logo v gera V . □

Definição 1.7. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K e seja I um conjunto e seja $v : I \rightarrow V$ uma função. Dizemos que v é **linearmente independente** se e só se para todo conjunto finito $J \subseteq I$ e toda função $\alpha : J \rightarrow K$, então temos a implicação:

$$\sum_{i \in J} \alpha_i v_i = 0 \quad \Rightarrow \quad \forall i \in J : \alpha_i = 0.$$

Dizemos que v é **linearmente dependente** se e só se v não é linearmente independente.

Definição 1.8. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K e seja $S \subseteq V$ um conjunto. Dizemos que S é **linearmente independente** se e só se a função $v : S \rightarrow V$ dada por $\forall s \in S : v_s = s$ é linearmente independente. Dizemos que S é **linearmente dependente** se e só se não é linearmente independente.

Exemplo 1.9. Se V é um espaço vetorial sobre um corpo K e $u \in V$ é um elemento não nulo, então a função $v : \{0, 1\} \rightarrow V$ dada por $v_0 = u$ e $v_1 = u$ é linearmente **dependente**, mas o conjunto $\{v_0, v_1\} = \{u\}$ é linearmente **independente**.

Definição 1.10. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K e seja I um conjunto. Uma **base de V ordenada por I** é uma função $b : I \rightarrow V$ tal que:

- (i) b é linearmente independente.
- (ii) b gera V .

Definição 1.11. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K . Uma **base de V** é um conjunto $B \subseteq V$ tal que:

- (i) B é linearmente independente.
- (ii) B gera V .

Teorema 1.12. Seja V um espaço vetorial e sejam $I \subseteq V$ linearmente independente e $S \subseteq V$ gerador de V tais que $I \subseteq S$. Então existe uma base B de V tal que

$$I \subseteq B \subseteq S.$$

Demonstração. Consideremos o conjunto:

$$\mathcal{M} := \{M \subseteq S \mid M \text{ é linearmente independente e } I \subseteq M\}$$

Então (\mathcal{M}, \subseteq) é um conjunto parcialmente ordenado indutivo (ou seja, todo subconjunto totalmente ordenado possui uma cota superior). De fato, $I \in \mathcal{M}$, o que nos mostra que $\mathcal{M} \neq \emptyset$, e para subconjunto totalmente ordenado não vazio $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{M}$ então $\bigcup \mathcal{C} \in \mathcal{M}$.

Logo, pelo Lema de Zorn, \mathcal{M} possui um elemento maximal B . Vamos provar que esse elemento maximal é de fato uma base para V .

- (i) B é linearmente independente: segue da definição de \mathcal{M} .
- (ii) B gera V : Suponha por absurdo que B não gera V . Então existe $v \in S$ que não é combinação linear de elementos de B , aí $B \cup \{v\}$ é linearmente independente e $I \subseteq B \cup \{v\} \subseteq S$. Então $B \cup \{v\} \in \mathcal{M}$, uma contradição, pois B já é um elemento maximal de \mathcal{M} e obviamente $B \subseteq B \cup \{v\}$. Logo B gera V . Portanto, B é uma base de V e $I \subseteq B \subseteq S$. \square

O resultado acima mostra que todo espaço vetorial tem base, bastando para isso tomar $I = \emptyset$ e $S = V$.

Corolário 1.13. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K , seja $I \subseteq V$ um conjunto linearmente independente e seja $S \subseteq V$ um conjunto que gere V . Então

- (i) O espaço V tem uma base;
- (ii) Existe uma base B de V tal que $I \subseteq B$;
- (iii) Existe uma base B de V tal que $B \subseteq S$.

Lema 1.14. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K . Sejam $(v_i)_{i=1}^n$ uma sequência linearmente independente e $(u_j)_{j=1}^m$ uma sequência que gera V . Então $n \leq m$.

Sublema 1.15. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K . Uma sequência $(v_i)_{i=1}^m$ é linearmente dependente se e somente se existem i e uma sequência $(\alpha_j)_{j=1}^{i-1}$ tais que

$$v_i = \sum_{j=1}^{i-1} \alpha_j v_j.$$

Demonstração do Sublema. Se $(v_i)_{i=1}^m$ é linearmente dependente, então existe uma sequência $(\alpha_i)_{i=1}^m$ não identicamente nula tal que:

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i v_i = 0.$$

Seja i o maior índice tal que $\alpha_i \neq 0$. Então segue que

$$\begin{aligned} & \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_i v_i = 0 \\ \iff & \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{i-1} v_{i-1} = -\alpha_i v_i \\ \iff & v_i = -\sum_{j=1}^{i-1} \frac{\alpha_j}{\alpha_i} v_j. \end{aligned} \quad \square$$

Demonstração do Lema. Primeiro, listamos os dois conjuntos de vetores: o conjunto gerador seguido do conjunto linearmente independente:

$$u_1, \dots, u_m; v_1, \dots, v_n$$

Então movemos o primeiro vetor v_1 para a esquerda da primeira lista:

$$v_1, u_1, \dots, u_m; v_2, \dots, v_n$$

Como u_1, \dots, u_m gera V , v_1 é combinação linear dos u_i 's. Isso implica que podemos remover um dos u_i 's, que indexando se necessário pode ser u_1 , da primeira lista, e ainda temos um conjunto gerador:

$$v_1, u_2, \dots, u_m; v_2, \dots, v_n$$

Note que o primeiro conjunto dos vetores ainda gera V e o segundo conjunto ainda é linearmente independente.

Agora repetimos o processo, movendo v_2 da segunda lista para a primeira lista:

$$v_1, v_2, u_2, \dots, u_m; v_3, \dots, v_n$$

Como antes, os vetores na primeira lista são linearmente dependentes, já que eles geravam V antes da inclusão de v_2 . Entretanto, como os v_i 's são linearmente independentes, qualquer combinação linear não trivial dos vetores na primeira lista que valha 0 deve envolver pelo menos um dos u_i 's. Portanto, podemos remover este vetor, que novamente reindexando se necessário pode ser u_2 e ainda temos um conjunto gerador:

$$v_1, v_2, u_3, \dots, u_m; v_3, \dots, v_n$$

Mais uma vez, o primeiro conjunto dos vetores gera V e o segundo conjunto é linearmente independente.

Agora, if $m < n$, então este processo eventualmente esgotará os u_i 's e nos levará à lista

$$v_1, v_2, \dots, v_m; v_{m+1}, \dots, v_n$$

em que v_1, v_2, \dots, v_m geram V , o que claramente não é possível pois v_n não é combinação linear dos v_1, v_2, \dots, v_m . Portanto $n \leq m$. \square

Observação 1.16. Com o lema, também podemos mostrar que, se existe um conjunto gerador finito, então podemos mostrar que todo conjunto linearmente independente é finito.

De fato, se existirem uma sequência geradora $(u_j)_{j=1}^m$ e um conjunto linearmente independente infinito S , então podemos pegar $m+1$ vetores distintos e assim formar uma sequência linearmente independente $(v_i)_{i=1}^{m+1}$, contradizendo o lema 1.14.

Vamos relembrar o que fizemos até aqui com um exemplo:

Exemplo 1.17. Considere $V = \mathbb{R}^4$ um \mathbb{R} -espaço vetorial. Sejam os vetores:

$$\begin{aligned} v_1 &= (1, 0, 0, 0) \\ v_2 &= (0, 1, 0, -1) \\ v_3 &= (0, 0, 1, -1) \\ v_4 &= (1, -1, 0, 0) \\ v_5 &= (1, 2, 1, 0) \end{aligned}$$

Considere $I = \{v_1, v_2\}$ e $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$. Observe que I é LI; de fato,

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = 0 \Rightarrow \alpha_1 (1, 0, 0, 0) + \alpha_2 (0, 1, 0, -1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \\ -\alpha_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = 0$$

Ademais, tomando $v = (x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4$, temos que

$$(x - z + w + y)v_1 + (z - w - \varepsilon)v_2 + (z - \varepsilon)v_3 + (z - w - y + \varepsilon)v_4 + \varepsilon v_5 = v,$$

para todo $\varepsilon \in \mathbb{R}$. Logo, S gera V .

Então, existe uma base B de \mathbb{R}^4 tal que

$$\{v_1, v_2\} \subseteq B \subseteq \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$$

De fato, esta base é $B = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, pois percebe-se que

$$v_5 = \frac{5}{2}v_1 + \frac{1}{2}v_2 - \frac{1}{2}v_3 - \frac{3}{2}v_4$$

Para trabalhar com a cardinalidade das bases, utilizaremos alguns fatos conhecidos, enunciados na próxima proposição:

Proposição 1.18. Se λ e μ são cardinais, então:

- Se $\lambda \leq \mu$ e $\mu \leq \lambda$, então $\lambda = \mu$. (Teorema de Cantor-Bernstein)
- Se λ e μ são infinitos, então

$$\lambda + \mu = \lambda\mu = \max\{\lambda, \mu\}.$$

Teorema 1.19. Seja V um espaço vetorial, então duas bases quaisquer têm o mesmo cardinal.

Demonstração. Sejam B e C bases de V .

- Se B ou C são finitos, então pela observação 1.16 podemos inferir que B e C são ambos finitos e assim aplicar o lema 1.14.
- Se B e C são infinitos. Para $u \in C$ existem um conjunto finito $I_u \subseteq B$ e uma função $\alpha_u : I_u \rightarrow K$ tais que $u = \sum_{i \in I_u} (\alpha_u)_i i$. Seja $I \subseteq \bigcup_{u \in C} I_u \subseteq B$. Então I gera V , assim $I = C$. Desse modo:

$$|B| = |I| = \left| \bigcup_{u \in C} I_u \right| \leq \sum_{u \in C} |I_u| \leq \aleph_0 \cdot |C| = |C|,$$

assim $|B| \leq |C|$. Analogamente $|C| \leq |B|$. Portanto $|B| = |C|$.

□

Definição 1.20. Dizemos que a **dimensão** de um espaço vetorial é a cardinalidade de sua base.

1.3 Subespaços

Definição 1.21. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K . Um **subespaço** de V é um conjunto $W \subseteq V$ tal que:

- $0 \in W$,
- Para $x, y \in W$ então $x + y \in W$,
- Para $a \in K$ e $x \in W$ então $ax \in W$.

Proposição 1.22. Seja V um espaço vetorial e seja \mathcal{W} um conjunto de subespaços. Então $\bigcap \mathcal{W}$ é um subespaço de V .

Definição 1.23. Se S é subconjunto de V , definimos:

$$\langle S \rangle = \left\{ \sum_{v \in I} \alpha_v v \mid I \subseteq S \text{ e } I \text{ é finito e } \alpha \in K^I \right\}$$

e chamamos de **subespaço gerado** por S .

Proposição 1.24. Se S é subconjunto de V , então:

$$\langle S \rangle = \bigcap \{W \mid W \text{ é subespaço de } V \text{ e } S \subseteq W\}.$$

Demonstração. Seja:

$$T = \bigcap \{W \mid W \text{ é subespaço de } V \text{ e } S \subseteq W\}.$$

Para $x \in \langle S \rangle$, então existem um conjunto finito $I \subseteq S$ e uma função $\alpha : I \rightarrow K$ tal que:

$$x = \sum_{v \in I} \alpha_v v,$$

ai para todo subespaço W tal que $S \subseteq W$, então para todo $v \in I$ temos $v \in S$, ai $v \in W$; ai por indução finita temos $x \in W$; logo $x \in T$. Portanto $\langle S \rangle \subseteq T$.

Além disso, temos o seguinte:

- $\emptyset \subseteq S$ e \emptyset é finito e $\emptyset \in K^\emptyset$ e:

$$0 = \sum_{v \in \emptyset} \emptyset_v v,$$

ai $0 \in \langle S \rangle$.

CAPÍTULO 1. ESPAÇOS VETORIAIS

1.3. SUBESPAÇOS

- Para $x, y \in \langle S \rangle$, então existem conjuntos finitos $I, J \subseteq S$ e funções $\alpha \in K^I$ e $\beta \in K^J$ tais que:

$$x = \sum_{u \in I} \alpha_u u, \quad y = \sum_{v \in J} \beta_v v,$$

aí sendo $L = I \cup J$ então $L \subseteq S$ e L é finito, e também sendo $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta} : L \rightarrow K$ dadas por:

$$\tilde{\alpha}_l = \begin{cases} \alpha_l & \text{se } l \in I \\ 0 & \text{se } l \notin I \end{cases}, \quad \tilde{\beta}_l = \begin{cases} \beta_l & \text{se } l \in J \\ 0 & \text{se } l \notin J \end{cases},$$

e sendo $\gamma : L \rightarrow K$ dada por $\gamma_l = \tilde{\alpha}_l + \tilde{\beta}_l$, então:

$$x + y = \sum_{l \in L} \gamma_l l,$$

aí $x + y \in \langle S \rangle$.

- Para $a \in K$ e $x \in \langle S \rangle$, então existem conjunto finito $I \subseteq S$ e $\alpha \in K^I$ tais que:

$$x = \sum_{v \in I} \alpha_v v,$$

aí sendo $\beta : I \rightarrow K$ dada por $\beta_v = a\alpha_v$, então:

$$ax = \sum_{v \in I} \beta_v v,$$

aí $ax \in \langle S \rangle$.

- Para $s \in S$, então $\{s\} \subseteq S$ e $\{s\}$ é finito, e considerando a função $\alpha : \{s\} \rightarrow K$ dada por $\alpha_s = 1$, então:

$$s = \sum_{v \in \{s\}} \alpha_v v,$$

aí $S \subseteq \langle S \rangle$.

Logo $\langle S \rangle$ é um subespaço de V tal que $S \subseteq \langle S \rangle$, aí $T \subseteq \langle S \rangle$. □

A intersecção de subespaços sempre é um subespaço, mas o mesmo não acontece com a união de subespaços.

Proposição 1.25. Se A e B são subespaços de V tais que $A \not\subseteq B$ e $B \not\subseteq A$, então $A \cup B$ não é subespaço de V .

Demonstração. Nesse caso, existe $a \in A$ tal que $a \notin B$ e existe $b \in B$ tal que $b \notin A$. Seja $c = a + b$. Então:

- Se $c \in A$, $b = c - a \in A$, o que é impossível.
- Se $c \in B$, $a = c - b \in B$, o que é impossível.

Logo, concluímos que $c \notin A \cup B$, absurdo. □

Portanto concluímos que $A \cup B$ é um subespaço se e somente se $A \subseteq B$ ou $B \subseteq A$.

Observação 1.26. Seja $K = F_2 = \{0, 1\}$, e tome $V = K^2$. Então,

$$V = \langle (0, 1) \rangle \cup \langle (1, 0) \rangle \cup \langle (1, 1) \rangle$$

Na verdade, V só pode ser escrito como união de um número finito de subespaços próprios se K for um corpo finito, conforme a seguinte proposição.

Proposição 1.27. Um espaço vetorial V sobre um corpo infinito K não pode ser escrito como união de um número finito de subespaços próprios.

Demonstração. Suponhamos que $V = S_1 \cup \dots \cup S_n$, em que podemos assumir que:

$$S_1 \not\subseteq S_2 \cup \dots \cup S_n,$$

Seja $w \in S_1 \setminus (S_2 \cup \dots \cup S_n)$ e seja $v \notin S_1$. Considere o conjunto infinito:

$$A = \{rw + v \mid r \in K\},$$

que é a “reta” passando por v e paralela a w . Queremos mostrar que cada S_i contém no máximo um vetor do conjunto infinito A , o que será uma contradição ao fato de que $V = S_1 \cup \dots \cup S_n$. Isto provará o teorema.

Se $rw + v \in S_1$ para algum $r \neq 0$, então $w \in S_1$ implicará $v \in S_1$, contrário às hipóteses. Agora, suponha que $r_1w + v \in S_1$ e $r_2w + v \in S_1$, para algum $i \geq 2$, em que $r_1 \neq r_2$. Então:

$$(r_1 - r_2)w = (r_1w + v) - (r_2w + v) \in S_i,$$

aí $w \in S_i$, que também contradiz as hipóteses. □

Apesar de não podermos trabalhar com a união, podemos realizar a soma de subespaços, e esta sim é um subespaço:

Definição 1.28. Sejam $W_i \subseteq V$, $i \in I$, subespaços de V . Definimos:

$$\sum_{i \in I} W_i = \{w_{i_1} + \dots + w_{i_k} \mid k \in \mathbb{N}, w_i \in W_i\}.$$

Pode-se mostrar que o conjunto:

$$\sum_{i \in I} W_i$$

é subespaço de V .

Definição 1.29. Uma soma:

$$\sum_{i \in I} W_i$$

é dita uma **soma direta** se para todo $i \in I$ tivermos:

$$W_i \cap \left(\sum_{j \neq i} W_j \right) = 0.$$

Teorema 1.30. Para subespaço A de V , então existe subespaço $B \subseteq V$ tal que $V = A \oplus B$.

Demonstração. Seja E uma base de A . Então existe uma base G de V tal que $E \subseteq G$, aí seja $F = G \setminus E$, e seja B o subespaço gerado por F . Então é fácil ver que $V = A \oplus B$. □

Teorema 1.31.

$$\dim(A + B) + \dim(A \cap B) = \dim(A) + \dim(B).$$

Demonstração. Seja E base de $A \cap B$. Então existe F tal que $B \cap F = \emptyset$ e $E \cup F$ seja base de A e existe G tal que $A \cap G = \emptyset$ e $E \cup G$ seja base de B . Então $E \cup F \cup G$ é base de $A + B$. Daí:

$$\dim(A + B) + \dim(A \cap B) = |E| + |F| + |G| + |E| = |E| + |F| + |E| + |G| = \dim(A) + \dim(B)$$

□

Exemplo 1.32. Considere novamente $V = \mathbb{R}^4$. Sejam

$$W_1 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid y + z + t = 0\},$$

$$W_2 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = 0 \text{ e } z - 2t = 0\}.$$

Então W_1 e W_2 são subespaços de V . Assim, $W_1 + W_2$ e $W_1 \cap W_2$ são subespaços de V . Vamos encontrar bases para eles.

Note que:

$$\begin{aligned} W_1 &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid y + z + t = 0\} \\ &= \{(x, y, z, -y - z) \in \mathbb{R}^4 \mid x, y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(x, 0, 0, 0) + (0, y, 0, -y) + (0, 0, z, -z) : x, y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, -1), (0, 0, 1, -1) \rangle \end{aligned}$$

Verifica-se também que $(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, -1), (0, 0, 1, -1)$ são linearmente independentes. Logo, $B_1 = \{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, -1), (0, 0, 1, -1)\}$ é base para W_1 .

Analogamente, mostra-se que $B_2 = \{(1, -1, 0, 0), (0, 0, 2, 1)\}$ é base para W_2 .

Agora, para determinar uma base de $W_1 + W_2$, podemos escalonar a matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \cdots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Portanto, o conjunto

$$\mathcal{B} = \{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, -1), (0, 0, 1, -1), (1, -1, 0, 0)\}$$

é base de $W_1 + W_2$.

Para determinar uma base de $W_1 \cap W_2$, basta resolver o sistema

$$\begin{cases} y + z + t = 0 \\ x + y = 0 \\ z - 2t = 0 \end{cases}$$

Assim, $W_1 \cap W_2 = \langle (3, -3, 2, 1) \rangle$.

Observe que

$$\dim(W_1 \cap W_2) + \dim(W_1 + W_2) = 1 + 4 = 5 = 3 + 2 = \dim(W_1) + \dim(W_2).$$

Como $\dim(W_1 + W_2) = 4$, temos que $W_1 + W_2 = V = \mathbb{R}^4$.

Observe também que, como $\dim(W_1 \cap W_2) = 1$, a soma $W_1 + W_2$ não é direta.

1.4 Coordenadas

Definição 1.33. Seja V um espaço vetorial de dimensão finita. Seja B uma base de V . Então para $v \in V$ existe um único $\alpha : B \rightarrow K$ tal que

$$v = \sum_{b \in B} \alpha_b b,$$

e chamamos esse α de $[v]_B$.

Capítulo 2

Transformações Lineares

2.1 Definições

Definição 2.1. Sejam U e V espaços vetoriais sobre um corpo K . Uma **transformação linear** é uma função $T : U \rightarrow V$ tal que

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$$

para quaisquer $\alpha, \beta \in K$ e $u, v \in V$. Além disso, denotamos o conjunto das transformações lineares de U a V por $\mathcal{L}(U, V)$.

Teorema 2.2. Sejam U e V espaços vetoriais sobre K , seja B uma base de U e $f : B \rightarrow V$ uma função. Então existe uma única transformação linear $T \in \mathcal{L}(U, V)$ tal que $\forall b \in B : T(b) = f(b)$.

Definição 2.3. Seja $T \in \mathcal{L}(U, V)$. Definimos $\text{Ker}(T) = \{u \in U : T(u) = 0\}$. Definimos $\text{Rank}(T) = \dim(\text{Im}(T))$.

Proposição 2.4. Seja $T \in \mathcal{L}(U, V)$. Então:

- $\text{Ker}(T)$ é um subespaço de U .
- $\text{Im}(T)$ é um subespaço de V .
- T é injetora se e só se $\text{Ker}(T) = 0$.
- Se T é bijetora, então $T^{-1} \in \mathcal{L}(V, U)$.

Teorema 2.5. Seja $\mathcal{L}(U, V)$, seja B uma base de $\text{Ker}(T)$, e seja C um conjunto tal que $T[C]$ seja base de $\text{Im}(T)$. Então $B \cup C$ é base V .

Demonstração. Para $v \in V$ então $T(v) \in \text{Im}(T)$, então existem um conjunto finito $F \subseteq C$ e $\alpha : F \rightarrow K$ tais que:

$$T(v) = \sum_{w \in F} \alpha_w T(w),$$

assim:

$$T \left(v - \sum_{w \in F} \alpha_w w \right) = 0,$$

aí:

$$v - \sum_{w \in F} \alpha_w w \in \text{Ker}(T),$$

assim existem um conjunto finito $E \subseteq B$ e função $\beta : E \rightarrow K$ tais que:

$$v - \sum_{w \in F} \alpha_w w = \sum_{u \in E} \beta_u u,$$

aí:

$$v = \sum_{u \in E} \beta_u u + \sum_{w \in F} \alpha_w w.$$

Por outro lado, para subconjunto finito $E \subseteq B \cup C$ e função $\alpha : E \rightarrow K$ tais que:

$$\sum_{e \in E} \alpha_e e = 0,$$

então:

$$\sum_{e \in E \cap C} \alpha_e T(e) = 0,$$

aí:

$$\forall e \in E \cap C : \alpha_e = 0,$$

aí:

$$\sum_{e \in E \setminus C} \alpha_e e = 0,$$

aí:

$$\forall e \in E \setminus C : \alpha_e = 0,$$

portanto:

$$\forall e \in E : \alpha_e = 0.$$

□

Teorema 2.6 (Teorema do Núcleo-Imagem). Seja $T \in \mathcal{L}(U, V)$. Então

$$U = \text{Ker}(T) \oplus \text{Im}(T)$$

Corolário 2.7.

$$\dim V = \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T)).$$

Definição 2.8. Se $T \in \mathcal{L}(U, V)$ é bijetora, dizemos que T é um **isomorfismo** de U a V .

Proposição 2.9. $T \in \mathcal{L}(U, V)$ é isomorfismo se e somente se T^{-1} também o é.

Proposição 2.10. Dois espaços vetoriais U e V são isomorfos se e somente se quaisquer duas bases B de U e C de V possuem a mesma cardinalidade.

Teorema 2.11. Para espaços vetoriais U e V , então U é isomorfo a V se e só se $\dim(U) = \dim(V)$.

2.2 Espaço Dual

Definição 2.12. Seja V um espaço vetorial sobre K . Denotamos $V^* = \mathcal{L}(V, K)$. O espaço V^* chama-se o **espaço dual** de V . Os elementos de V chamam-se **funcionais lineares**.

Se $\dim(V) = n$, então $\dim(V^*) = n \cdot 1 = n$, aí V e V^* são isomorfos.

Teorema 2.13. Seja V um espaço vetorial com $\dim(V) = n$ e $B = (v_i)_{i=1}^n$ uma base de V . Então existe uma base $B^* = (f_i)_{i=1}^n$ de V^* tal que $f_i(v_j) = \delta_{i,j}$ para quaisquer i, j . Além disso:

$$\forall v \in V : v = \sum_{i=1}^n f_i(v) v_i$$

e:

$$\forall f \in V^* : f = \sum_{i=1}^n f(v_i) f_i.$$

Demonstração. Para $i = 1, \dots, n$, existe uma única função linear $f_i : V \rightarrow K$ tal que:

$$f_i(v_j) = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

Sejam $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ tais que:

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i f_i = 0.$$

Para $j = 1, \dots, n$, aplicando este funcional para o vetor $v_j \in B$, então:

$$0 = 0(v_j) = \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i(v_j) = \alpha_j,$$

ou seja, $\alpha_j = 0$. Portanto B^* é linearmente independente.

Além disso, para $v \in V$ existem $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ tais que:

$$v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i,$$

aí para $i = 1, \dots, n$ temos:

$$f_i(v) = \alpha_i f_i(v_i) = \alpha_i;$$

logo:

$$f(v) = \sum_{i=1}^n \alpha_i f(v_i) = \sum_{i=1}^n f(v_i) f_i(v).$$

□

Definição 2.14. A base B^* chama-se a **base dual** da base B .

Podemos estender o estudo do espaço dual para espaços vetoriais quaisquer.

Definição 2.15. Seja B uma base de V , então para cada $a \in B$ definimos a transformação linear $f_a \in V^*$ por $f_a(b) = \delta_{a,b}$.

Nesse caso, podemos adaptar facilmente o argumento na demonstração do teorema 2.13 para mostrar que $(f_a)_{a \in B}$ é linearmente independente em V^* e para todo $v \in V$ existe um conjunto finito $F \subseteq B$ tal que:

$$v = \sum_{b \in F} f_b(v) b.$$

2.3 Espaço Bidual

Definição 2.16. Seja V um espaço vetorial sobre K . O espaço $V^{**} = (V^*)^*$ chama-se o **espaço bidual** do espaço V .

Definição 2.17. Para $v \in V$, definamos $\varphi_v : V^* \rightarrow K$ assim:

$$\forall f \in V^* : \varphi_v(f) = f(v).$$

Então $\varphi_v \in V^{**}$.

Proposição 2.18. $\varphi \in \mathcal{L}(V, V^{**})$ e φ é injetora.

Demonstração. Seja B uma base de V . Para $v \in \text{Ker}(\varphi)$, então $\varphi_v = 0$, aí temos $\forall b \in B : f_b(v) = \varphi_v(f_b) = 0$, aí existe um conjunto finito $F \subseteq B$ tal que:

$$v = \sum_{b \in F} f_b(v)b,$$

aí $v = 0$. □

Corolário 2.19. Se $\dim(V)$ é finita, então $\varphi : V \rightarrow V^{**}$ é um isomorfismo.

Demonstração.

$$\dim(V) = \dim(V^*) = \dim(V^{**}).$$

□

Observação 2.20. Nesse caso φ é um isomorfismo natural, ou seja, não depende da escolha de uma base.

Corolário 2.21. Se $\dim(V)$ é finita, então toda base de V^* é a base dual para uma base de V .

Demonstração. Seja $C = (f_i)_{i=1}^n$ uma base de V^* . Consideremos a base dual $C^* = (g_i)_{i=1}^n$ de V^{**} . Mas φ é sobrejetora, então existem $v_1, \dots, v_n \in V$ tais que para todo i tenhamos $g_i = \varphi_{v_i}$, assim:

$$f_i(v_j) = \varphi_{v_j}(f_i) = g_j(f_i) = \delta_{j,i} = \delta_{i,j},$$

logo $C = (f_i)_{i=1}^n$ é base dual da base $(v_i)_{i=1}^n$ de V . □

2.4 Anuladores

Definição 2.22. Seja V um espaço vetorial e seja $S \subseteq V$ um subconjunto. Então definimos:

$$S^0 = \{f \in V^* \mid \forall s \in S : f(s) = 0\}.$$

O conjunto S^0 chama-se o **anulador** de S .

Proposição 2.23. S^0 é um subespaço de V .

Teorema 2.24. Seja V um espaço de dimensão finita e $W \subseteq V$ um subespaço. Então:

$$\dim(V) = \dim(W) + \dim(W^0).$$

Demonstração. Seja $\dim(V) = n$ e $\dim(W) = m$. Escolhemos uma base (v_1, \dots, v_m) de W e completemo-la até uma base $(v_1, \dots, v_m, v_{m+1}, \dots, v_n)$ de V . Consideremos a base dual (f_1, \dots, f_n) de V^* . Mostraremos que (f_{m+1}, \dots, f_n) é uma base de W^0 . É claro que para todo $i = m+1, \dots, n$ temos $f_i \in W^0$. Seja $f \in W^0$, então:

$$f = \sum_{i=1}^n f(v_i)f_i = \sum_{i=m+1}^n f(v_i)f_i.$$

□

Teorema 2.25. Se $\dim(V)$ é finita e $V = U \oplus W$, então $V^* = U^0 \oplus W^0$ e $U^0 \cong W^*$ e $W^0 \cong U^*$.

Demonstração. Seja $B = B_U \cup B_W$ base de V , em que B_U é base de U e B_W é base de W . Então a base dual é $B^* = B_U^* \cup B_W^*$, e pelo teorema anterior temos $\langle B_U^* \rangle = W^0$ e $\langle B_W^* \rangle = U^0$. □

2.5 Transpostas

Definição 2.26. Sejam U e V espaços vetoriais sobre K , e $T \in \mathcal{L}(U, V)$. Então definimos a **transposta** de T como a função:

$$\begin{aligned} T^t : V^t &\rightarrow U^t \\ f &\mapsto T^t(f) = f \circ T \end{aligned}$$

Proposição 2.27. Se $\dim(U)$ é finita e $T \in \mathcal{L}(U, V)$, então:

- a) $\text{Ker}(T^t) = (\text{Im}(T))^0$.
- b) $\text{Rank}(T^t) = \text{Rank}(T)$.
- c) $\text{Im}(T^t) = (\text{Ker}(T))^0$.

Demonstração. Temos o seguinte:

- a) Temos:

$$\begin{aligned} \text{Ker}(T^t) &= \{f \in V^* \mid T^t(f) = 0\} \\ &= \{f \in V^* \mid f \circ T = 0\} \\ &= \{f \in V^* \mid \forall u \in U : f(T(u)) = 0\} \\ &= \{f \in V^* \mid f[\text{Im}(T)] = 0\} \\ &= (\text{Im}(T))^0. \end{aligned}$$

- b) Temos $\text{Rank}(T^t) = \dim(\text{Im}(T^t))$ e $\text{Rank}(T) = \dim(\text{Im}(T))$. Além disso:

$$\dim(V^*) = \dim(\text{Im}(T^t)) + \dim(\text{Ker}(T^t))$$

$$\dim(V^*) = \dim(\text{Im}(T)) + \dim(\text{Im}(T))^0$$

$$\text{mas } \dim(V^*) = \dim(V) \text{ e } \dim(\text{Ker}(T^t)) + \dim(\text{Im}(T))^0.$$

- c) Temos $\text{Im}(T^t) \subseteq (\text{Ker}(T))^0$. Seja $\varphi \in \text{Im}(T^t)$, então existe $g \in V^*$ tal que $\varphi = T^t(g)$, aí para todo $u \in U$ nós temos $\varphi(u) = T^t(g)(u) = g(T(u))$. Se $u \in \text{Ker}(T)$ então $T(u) = 0$, aí $\varphi(u) = 0$; logo $\varphi \in (\text{Ker}(T))^0$. Além disso:

$$\dim(U) = \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Ker}(T))^0$$

$$\dim(U) = \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T))$$

$$\text{aí } \dim(\text{Ker}(T))^0 = \dim(\text{Im}(T)), \text{ aí } (\text{Ker}(T))^0 = \text{Im}(T). \quad \square$$

Teorema 2.28. Sejam U e V espaços vetoriais de dimensão finita com bases B e C e bases duais B^* e C^* . Se $T \in \mathcal{L}(U, V)$, então:

$$[T]_{B,C}^t = [T^t]_{C^*,B^*}$$

Corolário 2.29. Se $A \in M_{m,n}(K)$, então:

$$\text{RowRank}(A) = \text{ColumnRank}(A).$$

Demonstração. Consideremos $T : K^n \rightarrow K^m$ dada por $T(v) = Av$. Sejam B e C as bases canônicas de K^n e K^m , então $[T]_{B,C} = A$. Temos:

$$\begin{aligned} \text{Rank}(T) &= \text{ColumnRank}(A) \\ \text{Rank}(T^t) &= \text{ColumnRank}(A^t) = \text{RowRank}(A). \end{aligned} \quad \square$$

2.6 Espaços Quocientes

Definição 2.30. Seja V um espaço, $W \subseteq V$ um subespaço. Para $u, v \in V$, digamos que $u \sim v$ se e só se $u - v \in W$. Então \sim é uma relação de equivalência, ou seja:

- Reflexiva, ou seja, $v \sim v$ sempre.
- Simétrica, ou seja, se $v \sim u$ então $u \sim v$.
- Transitiva, ou seja, se $v \sim u$ e $u \sim w$, então $v \sim w$.

Seja V/W o conjunto das classes de equivalência relativamente a \sim . Para $v \in V$ seja \bar{v} a classe de equivalência de v .

- Definamos em V/W uma estrutura de espaço vetorial. Para $\bar{v}, \bar{w} \in V/W$ definamos $\bar{v} + \bar{w} = \overline{v + w}$.
- Para $\alpha \in K$ e $\bar{v} \in V/W$ definamos $\alpha \cdot \bar{v} = \overline{\alpha v}$. Então V/W é um espaço vetorial chamado **espaço quociente**.

Observação 2.31. As operações estão “bem definidas” pois:

- Se $\bar{v} = \bar{v'}$ e $\bar{u} = \bar{u'}$, então $v \sim v'$ e $u \sim u'$, aí $v - v', u - u' \in W$, aí $(v + u) - (v' + u') = (v - v') + (u - u') \in W$, aí $\overline{v + u} = \overline{v' + u'}$, aí $\bar{v} + \bar{u} = \bar{v'} + \bar{u'}$.
- Analogamente para a outra propriedade.

Também verificaremos algumas propriedades, deixando o resto ao leitor.

- Temos a comutatividade da adição, pois $\bar{u} + \bar{v} = \bar{v} + \bar{u}$ equivale a $\overline{u + v} = \overline{v + u}$, que é verdade pois $u + v = v + u$.
- O que é o $\bar{0}$ de V/W ? Temos $\bar{0} = W$, e também para todo $w \in W$ temos $w \sim 0$, aí $\bar{w} = \bar{0} = W$.

Também temos o seguinte:

- Se $W = V$, então $V/V = \{\bar{0}\}$.
- Se $W = \{0\}$, então $V/\{0\} \cong V$.

Proposição 2.32. Consideremos a aplicação:

$$\pi : V \rightarrow V/W, \quad v \mapsto \bar{v}.$$

Então $\pi \in \mathcal{L}(V, V/W)$, com $\text{Ker}(\pi) = W$.

Notação 2.33. π chama-se a **projeção canônica** de V para V/W .

Demonstração. Temos o seguinte:

- $\pi(v + u) = \overline{v + u} = \bar{v} + \bar{u} = \pi(v) + \pi(u)$.
- $\pi(\alpha v) = \overline{\alpha v} = \alpha \bar{v} = \alpha \pi(v)$.

Além disso, se $w \in W$ então $\pi(w) = \bar{w} = W$ □

Proposição 2.34. Seja $T \in \mathcal{L}(U, V)$ e $W \subseteq U$ tal que $W \subseteq \text{Ker}(T)$. Então existe um único $\bar{T} \in \mathcal{L}(U/W, V)$ tal que para todo $u \in U$ tenhamos:

$$\bar{T}(\bar{u}) = T(u).$$

CAPÍTULO 2. TRANSFORMAÇÕES LINEARES

2.6. ESPAÇOS QUOCIENTES

Demonstração. Temos o seguinte:

1) Mostraremos que \bar{T} está “bem definida”. Se $\bar{u} = \bar{v}$, então $u - v \in W \subseteq \text{Ker}(T)$, aí $T(u - v) = 0$, aí $T(u) = T(v)$.

2) Mostraremos que \bar{T} é uma transformação linear.

- $\bar{T}(\bar{u} + \bar{v}) = \bar{T}(\overline{u + v}) = T(u + v) = T(u) + T(v) = \bar{T}(\bar{u}) + \bar{T}(\bar{v})$.
- $\bar{T}(\alpha\bar{v}) = \bar{T}(\overline{\alpha v}) = T(\alpha v) = \alpha T(v) = \alpha \bar{T}(\bar{v})$.

Agora, para todo $T' \in \mathcal{L}(U/W, V)$ tal que para todo $u \in U$ tenhamos:

$$T'(\bar{u}) = T(u),$$

então para todo $v \in U/W$ existe um $u \in U$ tal que $v = \bar{u}$, aí:

$$T'(v) = T'(\bar{u}) = T(u) = \bar{T}(\bar{u}) = \bar{T}(v);$$

logo $T' = \bar{T}$. □

Teorema 2.35. Sejam U e V espaços vetoriais sobre K , e seja $T \in \mathcal{L}(U, V)$. Então $U/\text{Ker}(T) \cong \text{Im}(T)$.

Demonstração. Pela proposição anterior, existe uma única $\bar{T} : U/\text{Ker}(T) \rightarrow V$ tal que para todo $u \in U$ tenhamos:

$$\bar{T}(\bar{u}) = T(u).$$

Observemos que $\text{Im}(\bar{T}) = \text{Im}(T) = \{T(u) \mid u \in U\}$.

Além disso, para $\bar{u} \in \text{Ker}(\bar{T})$, então $T(u) = \bar{T}(\bar{u}) = 0$, aí $u \in \text{Ker}(T)$, aí $\bar{u} = \bar{0}$, de modo que \bar{T} é injetora. □

Teorema 2.36. Seja W subespaço de V . Então todos os complementos de W em V são isomorfos ao V/W .

Demonstração. Seja $V = W \oplus U$. Consideremos a projeção canônica:

$$\pi : V \rightarrow V/W.$$

Seja $\bar{\pi} = \pi \upharpoonright U$. Então $\text{Ker}(\bar{\pi}) = U \cap \text{Ker}(\pi) = U \cap W = \{0\}$. Logo $\bar{\pi}$ é injetora.

Para $\bar{v} \in V/W$, seja $v = w + u$, com $w \in W$ e $u \in U$. Então $\pi(v) = \pi(w) + \pi(u) = \pi(u) = \bar{\pi}(u)$, aí $\bar{v} = \bar{\pi}(u)$, assim $\bar{\pi}$ é sobre V/W . □

Corolário 2.37. Seja $W \subseteq V$ um subespaço. Então $\dim V = \dim W + \dim V/W$.

Demonstração. Seja $V = W \oplus U$, então $\dim V = \dim W + \dim U$, mas $U \cong V/W$, aí $\dim U = \dim V/W$. □

Observação 2.38. Existem espaços vetoriais W e U e W' e U' tais que $W \oplus U \cong W' \oplus U'$ e $W \cong W'$, mas $U \not\cong U'$. De fato podemos tomar:

$$W = \bigoplus_{i=0}^{\infty} Ke_{2i}, \quad U = \bigoplus_{i=0}^{\infty} Ke_{2i+1}, \quad W' = \bigoplus_{i=0}^{\infty} Ke_i, \quad U' = \{0\}.$$

Capítulo 3

Determinantes

3.1 Formas Multilineares

Definição 3.1. Seja V um espaço vetorial e $V^r = V \times \cdots \times V$. Uma **forma r-linear** sobre V é uma função $F : V^r \rightarrow K$ que é linear em cada argumento, ou seja, para cada $i = 1, \dots, r$ temos:

$$F(v_1, \dots, \alpha v_i + \beta v'_i, \dots, v_r) = \alpha F(v_1, \dots, v_i, \dots, v_r) + \beta F(v_1, \dots, v'_i, \dots, v_r).$$

Denotamos por $L_r(V)$ o conjunto das formas r-lineares sobre V .

Exemplo 3.2. Seja $V = K^2$ e:

$$F((x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)) = x_1 y_2 x_3 - x_1 x_2 y_3.$$

Então F é uma forma 3-linear.

Definição 3.3. Uma forma $F \in L_r(V)$ chama-se **alternada** se e só se para $(v_1, \dots, v_r) \in V^r$ e $i < j$ tais que $v_i = v_j$ então $F(v_1, \dots, v_r) = 0$. Denotamos por $A_r(V)$ o conjunto das formas r-lineares alternadas.

Definição 3.4. Uma forma F é chamada **antissimétrica** se para $v \in V^r$ e para $i < j$ temos:

$$F(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_r) = -F(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_r).$$

Proposição 3.5. Toda forma alternada é antissimétrica.

Demonstração. Seja $F \in A_r(V)$. Sejam $v \in V^r$ e $i < j$, então:

$$\begin{aligned} 0 &= F(v_1, \dots, v_i + v_j, \dots, v_i + v_j, \dots, v_r) \\ &= F(v_1, \dots, v_i, \dots, v_i, \dots, v_r) + F(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_r) \\ &\quad + F(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_r) + F(v_1, \dots, v_j, \dots, v_j, \dots, v_r) \\ &= F(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_r) + F(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_r) \end{aligned}$$

□

Proposição 3.6. Se a característica do corpo é $\neq 2$, então toda forma antissimétrica é reflexiva.

Demonstração. Para F antissimétrica e $v \in V^r$ e $i < j$, se $v_i = v_j$, sendo $v = v_i$, então:

$$F(v_1, \dots, v, \dots, v, \dots, v_1) = -F(v_1, \dots, v, \dots, v, \dots, v_r),$$

aí:

$$2F(v_1, \dots, v, \dots, v, \dots, v_r) = 0,$$

aí:

$$F(v_1, \dots, v, \dots, v, \dots, v_r) = 0.$$

□

CAPÍTULO 3. DETERMINANTES

3.1. FORMAS MULTILINEARES

Definição 3.7. Seja $F \in L_r(V)$ e $\sigma \in S_r$ uma permutação. Para $(v_1, \dots, v_r) \in V^r$ definimos:

$$(\sigma F)(v_1, \dots, v_r) = F(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(r)}).$$

É fácil ver que $\sigma F \in L_r(V)$.

Observação 3.8. Para $F \in L_r(V)$, então F é antissimétrica se e somente se para toda transposição $\tau \in S_r$ tivermos $\tau F = -F$.

Proposição 3.9. Seja $F \in L_r(V)$ uma forma antissimétrica. Então para $\sigma \in S_r$, temos:

$$\sigma F = (\text{sgn } \sigma)F.$$

Demonstração. Para $\sigma \in S_r$, então σ pode ser escrita como um produto de transposições:

$$\sigma = \tau_1 \dots \tau_k,$$

aí σ é par se e só se k é par. Portanto:

$$\sigma F = (\tau_1 \dots \tau_k)F = (-1)^k F = (\text{sgn } \sigma)F,$$

pois $\text{sgn } \sigma = (-1)^k$. □

Proposição 3.10. Toda forma r -linear determina uma forma r -linear alternada da seguinte maneira:

$$F \mapsto \varphi(F) = \sum_{\sigma \in S_r} (\text{sgn } \sigma)(\sigma F).$$

Demonstração. Seja $v_i = v_j = v$ com $i < j$. Precisamos provar que $\varphi(F)(v) = 0$. Seja τ a transposição (i, j) , então $S_r = A_r \cup A_r \tau$ e $A_r \cap A_r \tau = \emptyset$. Então temos o seguinte:

$$\begin{aligned} \varphi(F)(v) &= \sum_{\sigma \in S_r} (\text{sgn } \sigma)(\sigma F(v)) \\ &= \sum_{\sigma \in A_r} (\sigma F(v)) - \sum_{\sigma \in A_r} (\sigma \tau F(v)) \\ &= \sum_{\sigma \in A_r} (\sigma F(v)) - \sum_{\sigma \in A_r} (\sigma F(v)) \\ &= 0. \end{aligned}$$

□

Observação 3.11. Se $F \in A_r(V)$ e $v \in V^r$ é linearmente dependente, então:

$$F(v) = 0.$$

Lema 3.12. Seja $\dim V = n$ e $F \in A_n(V)$. Seja (e_1, \dots, e_n) uma base de V , então F é completamente determinada pelo valor $F(e)$.

Demonstração. Seja $(v_1, \dots, v_n) \in V^n$. Então existe $(\alpha_{i,j}) \in M_n(K)$ tal que:

$$v_i = \sum_{j=1}^n \alpha_{i,j} e_j.$$

Assim:

$$\begin{aligned} F(v_1, \dots, v_n) &= F\left(\sum_{j_1=1}^n \alpha_{1,j_1} e_{j_1}, \dots, \sum_{j_n=1}^n \alpha_{n,j_n} e_{j_n}\right) \\ &= \sum_{j_1, \dots, j_n=1}^n \alpha_{1,j_1} \dots \alpha_{n,j_n} F(e_{j_1}, \dots, e_{j_n}) \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \alpha_{1,\sigma_1} \dots \alpha_{n,\sigma_n} F(e_{\sigma_1}, \dots, e_{\sigma_n}) \\ &= \left(\sum_{\sigma \in S_n} \alpha_{1,\sigma_1} \dots \alpha_{n,\sigma_n} \text{sgn } \sigma \right) F(e_1, \dots, e_n). \end{aligned}$$

□

Note então que o valor

$$\sum_{\sigma \in S_n} \alpha_{1,\sigma_1} \dots \alpha_{n,\sigma_n} \text{sgn } \sigma$$

determina F para qualquer $v \in V^n$. Chamaremos este valor de **determinante** de F .

Exemplo 3.13.

3.2 Determinantes

Seja K um corpo e consideremos o anel das matrizes $M_n(K)$. Identificaremos os elementos de $M_n(K)$ com os elementos de $(K^n)^n$ assim:

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & & a_{1,n} \\ & \ddots & \\ a_{n,1} & & a_{n,n} \end{pmatrix} \longleftrightarrow ((a_{1,1}, \dots, a_{1,n}), \dots, (a_{n,1}, \dots, a_{n,n})).$$

Portanto, uma função n -linear aqui é uma função n -linear nas linhas da matriz.

Definição 3.14. Uma função $\det : M_n(K) \rightarrow K$ é dita uma função **determinante** se e só se \det é n -linear alternada e $\det(I) = 1$.

Pelo que vimos, existe e é única a função determinante: É a forma n -linear alternada que vale 1 na base canônica de K^n .

Logo, se $A = (a_{i,j}) \in M_n(K)$, então:

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1,\sigma_1} \dots a_{n,\sigma_n}.$$

Exemplo 3.15. Para $n = 2$, temos $S_2 = \{I, (1, 2)\}$, e assim, sendo:

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix},$$

então temos:

$$\det(A) = a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1}.$$

Exemplo 3.16. Agora, se $n = 3$, então $S_3 = \{I, (1, 2, 3), (1, 3, 2), (1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$, e assim, sendo:

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix},$$

então temos:

$$\det(A) = a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1} + a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2} - a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3} - a_{1,3}a_{2,2}a_{3,1} - a_{1,1}a_{2,3}a_{3,2}.$$

Proposição 3.17. Temos as seguintes propriedades:

- 1) Para todo $A \in M_n(K)$ temos $\det(A) = \det(A^t)$.
- 2) Para $A, B \in M_n(K)$ vale $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.
- 3) Para $A \in M_n(K)$, então A é inversível se e só se $\det(A) \neq 0$. Neste caso, temos $\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1}$.

CAPÍTULO 3. DETERMINANTES

3.2. DETERMINANTES

Demonstração. Temos o seguinte:

- 1) Sendo $A = (a_{i,j}) \in M_n(K)$, então temos:

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1,\sigma_1} \dots a_{n,\sigma_n} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{\sigma_1^{-1},1} \dots a_{\sigma_n^{-1},n} \\ &= \sum_{\tau \in S_n} \operatorname{sgn}(\tau^{-1}) a_{\tau_1,1} \dots a_{\tau_n,n} \\ &= \sum_{\tau \in S_n} \operatorname{sgn}(\tau) a_{1,\tau_1}^t \dots a_{n,\tau_n}^t \\ &= \det(A^t). \end{aligned}$$

- 2) Seja $F_A : M_n(K) \rightarrow K$ tal que $\forall X \in M_n(K) : F_A(X) = \det(AX)$. Então a função F_A é uma função n -linear alternada sobre as colunas, mas também $F_A(I) = \det(A)$, aí $F_A(B) = \det(A) \det(B)$, assim $\det(AB) = \det(A) \det(B)$

- 3) Se A é inversível, então existe a inversa A^{-1} , assim:

$$1 = \det(I) = \det(AA^{-1}) = \det(A) \det(A)^{-1},$$

aí $\det(A) \neq 0$ e $\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1}$. Por outro lado, se $\det(A) \neq 0$, então $\det(A^t) \neq 0$, aí as colunas de A são linearmente independentes, aí consideremos $T : K^n \rightarrow K^n$ tal que $[T]_{\text{can}} = A$, então T é inversível, assim $A = [T]_{\text{can}}$ é inversível.

□

Assim lembremo-nos do seguinte: a função \det é uma função n -linear e alternada nas linhas (ou nas colunas) da matriz, logo:

- 1) Trocar duas linhas (ou colunas) da matriz muda o sinal do determinante.
- 2) Somar a uma linha (ou coluna) uma combinação linear das demais linhas (colunas) não altera o valor do determinante.
- 3) Ao multiplicar uma linha (ou coluna) por um escalar, o determinante fica multiplicado por esse escalar.

Proposição 3.18. Temos o seguinte:

- 1) O determinante de uma matriz triangular é o produto dos elementos da diagonal da matriz.
- 2) Se:

$$A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ C & D \end{pmatrix}$$

em que $B \in M_r(K)$ e $D \in M_{n-r}(K)$ e $C \in M_{n-r,r}(K)$ e $0 \in M_{r,n-r}(K)$, então:

$$\det(A) = \det(B) \det(D).$$

Demonstração. Temos o seguinte:

- 1) Seja $A = (a_{i,j}) \in M_n(K)$ uma matriz triangular inferior, então para $i < j$ temos $a_{i,j} = 0$, mas a única permutação $\sigma \in S_n$ tal que para todo $i = 1, \dots, n$ tenhamos $i \geq \sigma_i$ é a permutação identidade I , assim temos:

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1,\sigma_1} \dots a_{n,\sigma_n} \\ &= \operatorname{sgn}(I) a_{1,I_1} \dots a_{n,I_n} \\ &= a_{1,1} \dots a_{n,n}. \end{aligned}$$

2) Seja $F : M_r(K) \rightarrow K$ tal que:

$$F(X) = \det \begin{pmatrix} X & 0 \\ C & D \end{pmatrix}.$$

Então F é r -linear alternada nas linhas de X , assim $F(X) = F(I) \det(X)$.

Agora consideremos $G : M_{n-r}(K) \rightarrow K$ tal que:

$$G(Y) = \det \begin{pmatrix} I & 0 \\ C & Y \end{pmatrix}$$

Então G é $(n-r)$ -linear alternada nas colunas de Y , logo $G(Y) = G(I) \det(Y)$. Mas:

$$G(I) = \det \begin{pmatrix} I & 0 \\ C & I \end{pmatrix} = 1,$$

assim $G(Y) = \det(Y)$, aí $F(I) = G(D) = \det(D)$, assim $F(X) = F(I) \det(X) = \det(X) \det(D)$, aí acaba.

□

Agora temos a **regra de Laplace**:

Teorema 3.19. Dada $A = (a_{i,j}) \in M_n(K)$, indicaremos por $M_{i,j}$ a matriz quadrada de tamanho $n-1$ obtida a partir de A eliminando a linha i e a coluna j .

Para cada $i = 1, \dots, n$, então vale:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(M_{i,j}).$$

Para cada $j = 1, \dots, n$, então vale:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(M_{i,j}).$$

Demonstração. Provaremos a primeira afirmação pois a segunda é análoga.

□

AULA DE 19 DE AGOSTO (COLOCAREI ASSIM QUE CONSEGUIR)

FICOU FALTANDO A PROVA DA REGRA DE LAPLACE E A PARTE DE MATRIZES SOBRE ANEIS COMUTATIVOS

Bláa blá blá

Capítulo 4

Formas Canônicas

4.1 Autovalores e Autovetores

Definição 4.1. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K e seja $T \in \mathcal{L}(V)$.

- Para $\lambda \in K$, dizemos que λ é um **autovalor** de T se existe um $v \neq 0$ tal que $T(v) = \lambda v$.
- Para $\lambda \in K$, um **autovetor** associado a λ é um $v \in V$ tal que $T(v) = \lambda v$.
- Para $\lambda \in K$, chamamos de **autoespaço** associado a λ o conjunto $V_T(\lambda)$ dos autovetores associados a λ .

Exemplo 4.2. Seja $V = \mathbb{C}^1(\mathbb{R})$ e considere o operador linear $T \in \mathcal{L}(V)$ tal que $T(v) = v'$ para cada $v \in V$. Considere $v = e^{\lambda x}$ com $\lambda \in K$. Então $T(v) = \lambda e^{\lambda x} = \lambda v$. Ou seja v é um autovetor associado a λ .

Definição 4.3. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K e seja $T \in \mathcal{L}(V)$. O **spectrum** do operador T é o conjunto:

$$\text{Spec}(T) := \{\lambda \in K : \lambda \text{ é autovalor de } T\}.$$

No contexto da definição anterior, considere $\lambda \in \text{Spec}(T)$. Então

$$\begin{aligned} v \in V_T(\lambda) &\iff T(v) = \lambda v \\ &\iff (T - \lambda I)(v) = 0 \\ &\iff v \in \text{Ker}(T - \lambda I). \end{aligned}$$

Ainda no mesmo contexto, vamos assumir agora que $\dim(V) = n < \infty$. Então temos que

$$\lambda \in \text{Spec}(T) \implies \text{Ker}(T - \lambda I) \neq \{0\} \implies \det(T - \lambda I) = 0.$$

Reciprocamente, se $\det(T - \lambda I) = 0$ então $V_T(\lambda) = \text{Ker}(T - \lambda I) \neq \{0\}$.

Definição 4.4. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K e seja $T \in \mathcal{L}(V)$. O **polinômio característico** de T é o polinômio:

$$p_T(t) := \det(tI - T).$$

Note que $\lambda \in \text{Spec}(T)$ se e só se λ é raiz de $p_T(\lambda)$. Além disso, note que se B e B' são bases V , então $p_T(\lambda) = p_{[T]_B}(\lambda)$. De fato, se P é a matriz de mudança da base B para a base B' , então

$$[\lambda I - T]_{B'} = P^{-1}[\lambda I - T]_B P$$

Isso implica que

$$\det([\lambda I - T]_{B'}) = \det(P^{-1})\det([\lambda I - T]_B)\det(P).$$

Ou seja,

$$\det([\lambda I - T]_{B'}) = \det([\lambda I - T]_B).$$

Exemplo 4.5. Seja $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ tal que

$$[T]_{\text{can}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Isto é, $T(x, y) = (-y, x)$ para cada $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Então

$$\begin{aligned} p_T(x) &= \det \begin{pmatrix} x & 1 \\ -1 & x \end{pmatrix} \\ &= x^2 + 1. \end{aligned}$$

Dessa forma, $\text{Spec}(T) = \emptyset$ pois $p_T(x)$ não possui raízes em $K = \mathbb{R}$.

Exemplo 4.6. Seja $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tal que

$$[T]_{\text{can}} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Então:

$$\begin{aligned} p_T(x) &= \det \begin{pmatrix} x-3 & -1 & 1 \\ -2 & x-2 & 1 \\ -2 & -2 & x \end{pmatrix} \\ &= (x-1)^2(x-2). \end{aligned}$$

Isso implica que $\text{Spec}(T) = \{1, 2\}$. Além disso, temos que

$$V_T(1) = \text{Ker}(T - I) = \text{Ker} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \langle (1, 0, 2) \rangle.$$

e ainda

$$V_T(2) = \text{Ker}(T - 2I) = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \langle (1, 1, 2) \rangle$$

Exemplo 4.7. Seja $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tal que

$$[T]_{\text{can}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -3 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Neste caso temos que

$$\begin{aligned} p_T(x) &= \det \begin{pmatrix} x-1 & -2 & 1 \\ 2 & x+3 & 1 \\ -2 & -2 & x+2 \end{pmatrix} \\ &= (x+1)^2(x+2). \end{aligned}$$

Isso implica que $\text{Spec}(T) = \{-1, -2\}$ e ainda

$$V_T(-1) = \langle (1, 0, 2), (0, 1, 2) \rangle$$

e

$$V_T(-2) = \langle (1, -1, 1) \rangle.$$

Uma vez que os autovetores acima são L.I, eles formam uma base B de \mathbb{R}^3 e

$$[T]_B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

é uma matriz diagonal.

Teorema 4.8. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K tal que $\dim(V) = n < \infty$ e seja $T \in \mathcal{L}(V)$, e sejam $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ os autovalores distintos, e para $i = 1, \dots, k$ seja $n_k = \dim V_T(\lambda_i)$. São equivalentes:

1. T é diagonalizável.
2. $p_T(t) = (t - \lambda_1)^{n_1} \dots (t - \lambda_k)^{n_k}$.
3. $n_1 + \dots + n_k = n$.

Lema 4.9. Sejam $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$ distintos. Então:

1. Se $v_i \in V_T(\lambda_i)$ para cada $i = 1, \dots, k$ e $v_1 + \dots + v_k = 0$, então $v_1 = \dots = v_k = 0$.
2. Se $B_i \subseteq V_T(\lambda_i)$ é L.I para cada $i = 1, \dots, k$, então $B_1 \cup \dots \cup B_k$ é L.I.

Demonstração do Lema.

1. Vamos provar essa afirmação por indução em k . Primeiro note que o resultado é trivial quando $k = 1$. Agora seja $k \in \mathbb{N}$ e assumamos que o resultado vale para cada natural $i < k$. Sejam v_1, \dots, v_k tais que $v_i \in V_T(\lambda_i)$ para cada $i = 1, \dots, k$ e $v_1 + \dots + v_k = 0$. Então:

$$0 = \lambda_1 0 = \lambda_1(v_1 + v_2 + \dots + v_k) = \lambda_1 v_1 + \lambda_1 v_2 + \dots + \lambda_1 v_k. \quad (4.1)$$

Além disso, é claro que:

$$0 = T(0) = T(v_1 + v_2 + \dots + v_k) = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_k v_k. \quad (4.2)$$

Subtraindo a Equação 4.1 de 4.2, obtemos:

$$(\lambda_2 - \lambda_1)v_2 + \dots + (\lambda_k - \lambda_1)v_k = 0. \quad (4.3)$$

Agora notamos que cada termo $(\lambda_i - \lambda_1)v_i$ no lado esquerdo é um autovetor de T associado a λ_i e aplicamos a hipótese de indução para concluir que $v_2 = \dots = v_k = 0$. Finalmente, como sabemos que $v_1 + \dots + v_k = 0$ e $v_2 = \dots = v_k = 0$, obtemos que $v_1 = 0$ também, o que conclui nossa prova.

2. Seja $S \subseteq B_1 \cup \dots \cup B_k$ finito e seja $\alpha: S \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

$$\sum_{v \in S} \alpha_v v = 0.$$

Note que $V_T(\lambda_i) \cap V_T(\lambda_j) = \{0\}$ sempre que $i \neq j$ e então podemos escrever

$$\sum_{v \in S} \alpha_v v = \sum_{v \in S_1} \alpha_v v + \dots + \sum_{v \in S_k} \alpha_v v,$$

onde $S_i \subseteq B_i$ é finito para cada $i = 1, \dots, k$. Utilizando o fato de que:

$$\sum_{v \in S_i} \alpha_v v \in V_T(\lambda_i)$$

para cada $i = 1, \dots, k$ e aplicando o item anterior, obtemos que

$$\sum_{v \in S_1} \alpha_v v = \dots = \sum_{v \in S_k} \alpha_v v = 0.$$

Finalmente como $S_i \subseteq B_i$ para cada $i = 1, \dots, k$ e B_i é sempre L.I por hipótese segue que a restrição de α a cada S_i é identicamente nula. Como $S = S_1 \cup \dots \cup S_k$, segue que α é indenticamente nula. \square

Demonstração. Temos o seguinte:

- (i) \Rightarrow (ii): Seja B uma base tal que:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_k I_{m_k} \end{pmatrix},$$

em que m_1, \dots, m_k são inteiros positivos. Então o polinômio característico de T é:

$$p_T(t) = (t - \lambda_1)^{m_1} \dots (t - \lambda_k)^{m_k}.$$

Além disso, para $i = 1, \dots, k$, então a matriz de $T - \lambda_i I$ é igual a:

$$\begin{pmatrix} (\lambda_1 - \lambda_i) I_{m_1} & & \\ & \ddots & \\ & & 0_{m_i} & \\ & & & \ddots & \\ & & & & (\lambda_k - \lambda_i) I_{m_k} \end{pmatrix},$$

aí é fácil ver que:

$$n_i = \dim V_T(\lambda_i) = \dim \text{Ker}(T - \lambda_i I) = m_i,$$

ou seja, $n_i = m_i$; assim:

$$p_T(t) = (t - \lambda_1)^{n_1} \dots (t - \lambda_k)^{n_k}.$$

- (ii) \Rightarrow (iii): O polinômio característico de T tem grau n , aí:

$$n_1 + \dots + n_k = \deg(p_T(t)) = n.$$

- (iii) \Rightarrow (i): Para cada $i = 1, \dots, k$ considere uma base B_i de $V_T(\lambda_i)$. Seja $B = B_1 \cup \dots \cup B_k$. Pelo Lema 4.9, temos que B é L.I. Como $|B| = n$ segue que B é uma base de V . Além disso, B é uma base de autovetores de T . Logo, T é diagonalizável.

\square

4.2 Polinômio Minimal

Definição 4.10. Seja V um espaço sobre K , $\dim V = n < \infty$, $T \in \mathcal{L}(V)$. Definamos por recursão $T^0 = I$ e $T^{k+1} = T^k \circ T$. Se $p(t) \in K[t]$, $p(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_m t^m$, então está bem definido o operador $p(T) = a_0 \cdot I + a_1 \cdot T + \cdots + a_m \cdot T^m \in \mathcal{L}(V)$.

Lembremo-nos de que, se $\dim(U) = m$ e $\dim(V) = n$, então $\dim \mathcal{L}(U, V) = mn$. Assim, se V é um espaço vetorial tal que $\dim(V) = n < \infty$, então $\dim \mathcal{L}(V) = n^2$, de modo que existe $m \leq n^2 + 1$ tal que os operadores I, T, T^2, \dots, T^m sejam linearmente dependentes. Seja m o menor deles. Então existem $a_0, \dots, a_{m-1} \in K$ tais que:

$$T^m + a_{m-1} T^{m-1} + \cdots + a_1 T + a_0 I = 0.$$

Seja:

$$m_T(t) = t^m + a_{m-1} t^{m-1} + \cdots + a_1 t + a_0,$$

então $m_T(T) = 0$, e $m_T(t)$ é um polinômio mônico de grau mínimo tal que $m_T(T) = 0$.

Definição 4.11. Um polinômio mônico de grau mínimo tal que $m_T(t) \in K[t]$ tal que $m_T(T) = 0$ chama-se um **polinômio minimal** do operador T . Chamemos um polinômio $f(t) \in K[t]$ de um **polinômio anulador** de T se $f(T) = 0$.

Lema 4.12. Seja $f(t) \in K[t]$ tal que $f(T) = 0$. Então $m(t) \mid f(t)$.

Demonstração. Dividimos $f(t)$ por $m(t)$ (com resto):

$$f(t) = m_T(t) \cdot q(t) + r(t), \quad \deg(r(t)) < \deg(m_T(t)) \text{ ou } r(t) = 0.$$

Como $f(T) = 0$ e $m_T(T) = 0$, então $r(T) = 0$, aí $r(t) = 0$. □

Corolário 4.13. O polinômio $m_T(t)$ é único.

Definição 4.14. Dado $v \in V$, um polinômio mônico de grau mínimo $m_{T,v}(t) \in K[t]$ tal que $m_{T,v}(T)(v) = 0$ chama-se um **polinômio T-minimal** do vetor v . Chamemos um polinômio $f(t) \in K[t]$ de um **polinômio T-anulador** de v se $f(T)(v) = 0$.

Lema 4.15. Seja $f(t) \in K[t]$ tal que $f(T)(v) = 0$. Então $m_{T,v}(t) \mid f(t)$.

Demonstração. Dividimos $f(t)$ por $m_{T,v}(t)$ (com resto):

$$f(t) = m_{T,v}(t) \cdot q(t) + r(t), \quad \deg(r(t)) < \deg(m_{T,v}(t)) \text{ ou } r(t) = 0.$$

Como $f(T)(v) = 0$ e $m_{T,v}(T)(v) = 0$, então $r(T)(v) = 0$, aí $r(t) = 0$. □

Corolário 4.16. O polinômio $m_{T,v}(t)$ é único.

Se V é um espaço vetorial e $T \in \mathcal{L}(V)$, então V tem uma estrutura de $K[t]$ módulo à esquerda: Se $f(t) \in K[t]$, para $v \in V$ definimos:

$$f(t) \cdot v = f(T)(v).$$

Além disso, se considerarmos:

$$\begin{aligned} \varphi : K[t] &\rightarrow \text{End}(V) \\ f(t) &\mapsto f(T), \end{aligned}$$

então φ é um homomorfismo de K -álgebras e portanto $\text{Ker}(\varphi)$ é um ideal de $K[t]$.

Teorema 4.17. Os polinômios $p_T(t)$ e $m_T(t)$ têm as mesmas raízes em K (a menos de multiplicidade). Em outras palavras, $m_T(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda \in \text{Spec}(T)$.

Demonstração. Se $m_T(\lambda) = 0$, então $m_T(t) = (t - \lambda)q(t)$. Por minimalidade de $m_T(t)$, $q(T) \neq 0$, então existe $w \in V$ tal que $q(T)(w) \neq 0$, aí seja $v = q(T)(w)$, então $v \neq 0$ e:

$$\begin{aligned} (T - \lambda I)(v) &= (T - \lambda I)q(T)(w) \\ &= m_T(t)(w) = 0, \end{aligned}$$

aí $T(v) = \lambda v$, aí $\lambda \in \text{Spec}(T)$.

Por outro lado, se $\lambda \in \text{Spec}(T)$, seja $v \in V$ tal que $v \neq 0$ e $T(v) = \lambda v$, então:

$$T(T(v)) = \lambda^2 v, \dots, T^m(v) = \lambda^m v, \dots,$$

aí para $f(t) \in K[t]$ temos $f(T)(v) = f(\lambda) \cdot v$, aí $0 = m_T(T)(v) = m_T(\lambda) \cdot v$, aí $m_T(\lambda) = 0$. \square

Corolário 4.18. Se T é diagonalizável e $\text{Spec}(T) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_r\}$, então:

$$m_T(t) = (t - \lambda_1) \dots (t - \lambda_r).$$

Demonstração. Já sabemos que:

$$m_T(t) = (t - \lambda_1)^{k_1} \dots (t - \lambda_r)^{k_r} q(t)$$

em que $q(t)$ não tem raízes em K . Seja

$$f(t) = (t - \lambda_1 I) \dots (t - \lambda_r I).$$

Seja $v \in V$, então $v = v_1 + \dots + v_r$ para alguns $v_i \in V_{T(\lambda_i)}$, aí temos $(T - \lambda_i I)(v_i) = 0$, aí $f(T)(v_i) = 0$; logo $f(T)(v) = 0$. Portanto $f(T) = 0$, aí $m_T \mid f$, aí $m_T = f$. \square

4.3 Subespaços Invariantes

Definição 4.19. Seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Um subespaço $W \subseteq V$ chama-se **T-invariante** se $T(W) \subseteq W$.

Observação 4.20. Um subespaço é T-invariante se e só se é um $K[t]$ -submódulo.

Exemplo 4.21. Seja $V = \mathbb{C}(\mathbb{R})$ e considere o operador $D: f \rightarrow f'$. Então o subespaço

$$P_n := \{f(t) \in \mathbb{R}[t] : \deg(f) \leq n\}$$

é D-invariante.

Proposição 4.22. Seja V um espaço vetorial de dimensão finita sobre um corpo K , seja $T \in \mathcal{L}(V)$ e seja W um subespaço T-invariante de V . Seja B_1 uma base de W e seja B uma base de V tal que $B_1 \subseteq B$. Então $B_2 = \{\bar{b} : b \in B \setminus B_1\}$ é uma base de V/W e, sendo $\bar{T} \in L(V/W)$ o operador induzido, temos:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} [T|_W]_{B_1} & * \\ 0 & [\bar{T}]_{B_2} \end{pmatrix},$$

Demonstração. Seja $\dim(V) = n$ e $T \in \mathcal{L}(V)$, e seja $W \subseteq V$ um subespaço T-invariante. Escolhemos uma base $B_1 = \{v_1, \dots, v_m\}$ de W e completamos uma base $B = \{v_1, \dots, v_m, v_{m+1}, \dots, v_n\}$ do espaço V . Qual é a matriz $[T]_B$?

Vamos começar notando que T é W -invariante e então:

$$\begin{aligned} T(v_1) &= \sum_{i=1}^{\mathbf{m}} \alpha_{1,i} v_i \\ T(v_2) &= \sum_{i=1}^{\mathbf{m}} \alpha_{2,i} v_i \\ &\vdots \\ T(v_m) &= \sum_{i=1}^{\mathbf{m}} \alpha_{m,i} v_i \\ T(v_{m+1}) &= \sum_{i=1}^{\mathbf{n}} \alpha_{m+1,i} v_i \\ &\vdots \\ T(v_n) &= \sum_{i=1}^{\mathbf{n}} \alpha_{n,i} v_i. \end{aligned}$$

Dessa forma segue que:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} \alpha_{1,1} & \dots & \alpha_{1,m} & \alpha_{1,m+1} & \dots & \alpha_{1,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha_{m,1} & \dots & \alpha_{m,m} & \alpha_{m,m+1} & \dots & \alpha_{m,n} \\ 0 & \dots & 0 & \alpha_{m+1,m+1} & \dots & \alpha_{m+1,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & \alpha_{n,m+1} & \dots & \alpha_{n,n} \end{pmatrix}.$$

Isto é, a matriz de T na base B tem a forma:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} X & * \\ 0 & Y \end{pmatrix},$$

onde $X \in M_m(K)$ e $Y \in M_{n-m}(K)$. Note que X é a matriz da restrição de T a W na base B_1 . Além disso, temos o seguinte:

$$\begin{aligned} \bar{T}(\bar{v}_{m+1}) &= \sum_{i=\mathbf{m}+1}^{\mathbf{n}} \alpha_{m+1,i} \bar{v}_i \\ &\vdots \\ \bar{T}(\bar{v}_n) &= \sum_{i=\mathbf{m}+1}^{\mathbf{n}} \alpha_{n,i} \bar{v}_i. \end{aligned}$$

Portanto Y é a matriz da transformação \bar{T} na base $\{\bar{v}_{m+1}, \dots, \bar{v}_n\}$. □

Lema 4.23. Seja $\dim(V) = n$, $T \in \mathcal{L}(V)$ e $W \subseteq V$ um subespaço T -invariante. Então:

$$p_T(t) = p_{T|_W}(t) \cdot p_{\bar{T}}(t)$$

em que \bar{T} é o operador induzido em V/W .

Demonstração. Escolhamos B_1 e B como bases de W e V tais que $B_1 \subseteq B$, então, considerando $B_2 = \{\bar{b} : b \in B \setminus B_1\}$, a matriz de T na base B tem a forma:

$$Z = \begin{pmatrix} X & * \\ 0 & Y \end{pmatrix},$$

onde X é a matriz de $T|_W$ em relação a B_1 e Y é a matriz de \bar{T} em relação a B_2 , assim:

$$\begin{aligned} p_T(t) &= p_Z(t) \\ &= \det(tI - Z) \\ &= \det \begin{pmatrix} tI_m - X & * \\ 0 & tI_{n-m} - Y \end{pmatrix} \\ &= \det(tI_m - X) \det(tI_{n-m} - Y) \\ &= p_X(t) p_Y(t) \\ &= p_{T|_W}(t) p_{\bar{T}}(t) \end{aligned} \quad \square$$

Observação 4.24. O mesmo **não** ocorre para polinômios minimais. De fato, seja $T = I_V$ e seja W um subespaço T -invariante (De fato, quando T é a identidade, todo subespaço de V é T -invariante), então $T_1 = I_W$ e $T_2 = I_{V/W}$ e aí $m_T(t) = m_{T_1}(t) = m_{T_2}(t) = t - 1$. Não obstante, ainda temos um resultado interessante para isso.

Lema 4.25. Seja $\dim(V) = n$, $T \in \mathcal{L}(V)$ e $W \subseteq V$ um subespaço T -invariante. Então:

$$m_{T|_W}(t) \mid m_T(t), \quad m_{\bar{T}}(t) \mid m_T(t),$$

em que \bar{T} é o operador induzido em V/W .

Demonstração. Escolhamos B_1 e B como bases de W e V tais que $B_1 \subseteq B$, então, considerando $B_2 = \{\bar{b} : b \in B \setminus B_1\}$, a matriz de T na base B tem a forma:

$$Z = \begin{pmatrix} X & * \\ 0 & Y \end{pmatrix},$$

onde X é a matriz de $T|_W$ em relação a B_1 e Y é a matriz de \bar{T} em relação a B_2 , assim é fácil de mostrar por indução que para todo $k \geq 0$ então temos uma matriz da forma:

$$Z^k = \begin{pmatrix} X^k & * \\ 0 & Y^k \end{pmatrix},$$

assim temos uma matriz é da forma:

$$m_T(Z) = \begin{pmatrix} m_T(X) & * \\ 0 & m_T(Y) \end{pmatrix},$$

mas sabemos que $m_T(Z) = 0$, aí $m_T(X) = 0$ e $m_T(Y) = 0$, aí a conclusão segue. \square

4.4 Teorema de Cayley-Hamilton

Teorema 4.26 (Teorema da Cayley-Hamilton). Seja V um espaço vetorial de dimensão finita sobre um corpo K , e seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Então $p_T(T) = 0$, onde $p_T(t) \in K[t]$ é um polinômio característico de T .

Demonstração. Basta provar que $\forall v \in V : p_T(T)(v) = 0$. Seja $v \in V$. Consideremos:

$$m_{T,v}(t) = t^m + \alpha_{m-1}t^{m-1} + \dots + \alpha_1t + \alpha_0,$$

o polinômio mônico de menor grau tal que $m_{T,v}(T)(v) = 0$. Então $B_1 = \{v, T(v), \dots, T^{m-1}(v)\}$ é linearmente independente. Seja W o subespaço gerado por ele. Note que W é T -invariante e ainda:

$$[T|_W]_{B_1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -\alpha_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -\alpha_{m-1} \end{pmatrix}$$

CAPÍTULO 4. FORMAS CANÔNICAS

4.4. TEOREMA DE CAYLEY-HAMILTON

Então, pelo Exercício 18 da lista 1, segue que:

$$p_{T|_W}(t) = t^m + \alpha_{m-1}t^{m-1} + \dots + \alpha_1t + \alpha_0.$$

Aplicando essa função a v segue:

$$p_{T|_W}(T)(v) = m_{T,v}(T)(v) = 0.$$

Para concluir que $p_T(T)(v) = 0$, notamos que $p_T(t) = p_{T|_W}(t) \cdot p_{\bar{T}}(t)$, em que \bar{T} é o operador induzido em V/W . \square

Corolário 4.27. Se $A \in M_n(K)$ então $p_A(A) = 0$, onde $p_A(t) = \det(tI - A)$.

Exemplo 4.28. Considere a matriz

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Então temos que $p_A(t) = t^2 - (a + d)t + (ad - bc)$ e também

$$\begin{aligned} P_A(A) &= A^2 - (a + d)A + (ad - bc)I \\ &= \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + ad \\ ac + dc & bc + d^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a^2 + ad & ab + bd \\ ac + dc & ad + d^2 \end{pmatrix} + \det(A)I \\ &= \begin{pmatrix} bc - ad & 0 \\ 0 & bc - ad \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = 0. \end{aligned}$$

Teorema 4.29 (Teorema da Cayley-Hamilton ao Avesso). Se V é espaço de dimensão finita e $T \in L(V)$, então todo polinômio irredutível que divide p_T também divide m_T .

Demonstração. Faremos a demonstração por indução na dimensão de V . Suponhamos o lema válido para $\dim(V) < n$. Seja V espaço vetorial tal que $\dim(V) = n$ e seja $T \in L(V)$ e seja p um polinômio irredutível que divide p_T . Se $V = 0$, é fácil. Senão, então tome um $v \neq 0$ qualquer. Consideremos:

$$m_{T,v}(t) = t^m + \alpha_{m-1}t^{m-1} + \dots + \alpha_1t + \alpha_0,$$

o polinômio mônico de menor grau tal que $m_{T,v}(T)(v) = 0$. Então $B_1 = \{v, T(v), \dots, T^{m-1}(v)\}$ é linearmente independente. Seja W o subespaço gerado por ele. Note que W é T -invariante e ainda:

$$[T|_W]_{B_1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -\alpha_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -\alpha_{m-1} \end{pmatrix}$$

Então, pelo Exercício 18 da lista 1, segue que:

$$p_{T|_W}(t) = t^m + \alpha_{m-1}t^{m-1} + \dots + \alpha_1t + \alpha_0.$$

Além disso, vendo a definição de $m_{T,v}$, é fácil ver que:

$$m_{T|_W}(t) = t^m + \alpha_{m-1}t^{m-1} + \dots + \alpha_1t + \alpha_0.$$

Sendo $\bar{T} \in L(V/W)$ o operador induzido, temos $p_T = p_{T|_W}p_{\bar{T}}$ e $m_{T|_W} \mid m_T$ e $m_{\bar{T}} \mid m_T$. Assim, como $p \mid p_T$, então $p \mid p_{T|_W}$ ou $p \mid p_{\bar{T}}$.

- Se $p \mid p_{T|_W}$, como $p_{T|_W} = m_{T|_W}$, então $p \mid m_{T|_W}$, aí $p \mid m_T$.
- Se $p \mid p_{\bar{T}}$, então, por hipótese de indução, temos $p \mid m_{\bar{T}}$, aí $p \mid m_T$. \square

4.5 Decomposições Primárias

Teorema 4.30 (Decomposição Primária Geral). Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K tal que $\dim(V) = n < \infty$ e seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Suponhamos que $f(T) = 0$ e também:

$$f = f_1 \dots f_r,$$

com f_1, \dots, f_r mutuamente primos entre si. Para cada i seja $V_i = \text{Ker } f_i(T)$. Então:

- Cada V_i é T -invariante.
- $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_r$.
- Cada projeção canônica $P_i : V \rightarrow V_i$ é um polinômio de T .

Lema 4.31 (Identidade de Bézout). Se $\text{mdc}(f_1, \dots, f_r) = 1$ então existem $g_1, \dots, g_r \in K[t]$ tais que:

$$f_1 g_1 + \dots + f_r g_r = 1.$$

Demonstração do Teorema. Para cada i , então para $v \in V_i$ temos $f_i(T)(v) = 0$, aí $T f_i(T)(v) = 0$, aí $f_i(T)T(v) = 0$, aí $T(v) \in V_i$; logo V_i é T -invariante. Agora para cada i seja:

$$h_i = \frac{f}{f_i}.$$

Então $\text{mdc}(h_1, \dots, h_r) = 1$, assim existem $g_1, \dots, g_r \in K[t]$ tais que:

$$h_1 g_1 + \dots + h_r g_r = 1,$$

aí:

$$h_1(T)g_1(T) + \dots + h_r(T)g_r(T) = I.$$

Para $v_1, \dots, v_r \in V$, se para todo i tivermos $v_i \in V_i$ e:

$$v_1 + \dots + v_r = 0,$$

então para cada i temos:

$$h_i(T)(v_1) + \dots + h_i(T)(v_r) = 0,$$

mas para cada $j \neq i$ então $f_j \mid h_i$, aí $h_i(T)(v_j) = 0$; assim:

$$h_i(T)(v_i) = 0,$$

mas:

$$v_i = h_1(T)g_1(T)(v_i) + \dots + h_r(T)g_r(T)(v_i),$$

e para cada $j \neq i$ temos $f_i \mid h_j$, aí $h_j(T)(v_i) = 0$; assim:

$$v_i = h_i(T)g_i(T)(v_i) = 0;$$

portanto:

$$v_1 = \dots = v_r = 0.$$

Para todo $v \in V$ então:

$$v = h_1(T)g_1(T)(v) + \dots + h_r(T)g_r(T)(v),$$

e para cada i temos:

$$f_i(T)h_i(T)g_i(T)(v) = f(T)g_i(T)(v) = 0,$$

aí:

$$h_i(T)g_i(T)(v) \in V_i;$$

logo:

$$V = V_1 \oplus \dots \oplus V_r,$$

e, para cada i , a função $h_i(T)g_i(T)$ é a projeção canônica de V em V_i . □

Teorema 4.32 (Decomposição Primária para Minimais). Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K tal que $\dim(V) = n < \infty$ e seja $T \in \mathcal{L}(V)$, e seja:

$$m_T = p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r},$$

com p_1, \dots, p_r irredutíveis e mutuamente primos entre si. Para cada i seja $V_i = \text{Ker } p_i(T)^{k_i}$. Então:

- Cada V_i é T -invariante.
- $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_r$.
- Cada projeção canônica $P_i : V \rightarrow V_i$ é um polinômio de T .
- Para cada i então $m_{T|_{V_i}} = p_i^{k_i}$.

Demonstração. Por definição temos $m_T(T) = 0$. Logo, pelo teorema da decomposição primária geral, temos os três primeiros itens. Agora considere $T_i := T|_{V_i}$ para cada $i = 1, \dots, r$. Temos que $p_i(T_i)^{k_i} = 0$. Então segue que $m_{T_i} \mid p_i^{k_i}$, ou seja, $m_{T_i} = p_i^{m_i}$, onde $m_i \leq k_i$. Consideremos:

$$g = p_1^{k_1} \dots p_i^{m_i} \dots p_r^{k_r}.$$

Para $j \neq i$ e para $v \in V_j$, então $p_j^{k_j}(v) = 0$ e portanto $g(T)(v) = 0$. Se $v \in V_i$ então $p_i^{m_i}(T)(v) = 0$ e $g(T)(v) = 0$. Assim, como $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_r$, concluímos que $g(T) = 0$. Isso implica que $m_T \mid g$, aí $p_i^{k_i} \mid p_i^{m_i}$, aí $k_i \leq m_i$, assim $m_i = k_i$, aí $m_{T_i} = p_i^{k_i}$. \square

Teorema 4.33 (Decomposição Primária para Característicos). Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K tal que $\dim(V) = n < \infty$ e seja $T \in \mathcal{L}(V)$, e seja:

$$p_T = p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r},$$

com p_1, \dots, p_r irredutíveis e mutuamente primos entre si. Para cada i seja $V_i = \text{Ker } p_i(T)^{k_i}$. Então:

- Cada V_i é T -invariante.
- $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_r$.
- Cada projeção canônica $P_i : V \rightarrow V_i$ é um polinômio de T .
- Para cada i então $p_{T|_{V_i}} = p_i^{k_i}$.

Demonstração. Pelo teorema de Cayley-Hamilton temos $p_T(T) = 0$. Portanto, pelo teorema da decomposição primária geral, temos os três primeiros itens. Agora considere $T_i := T|_{V_i}$ para cada $i = 1, \dots, r$. Temos que $p_i(T_i)^{k_i} = 0$. Então segue que $m_{T_i} \mid p_i^{k_i}$, aí, pelo teorema de Cayley-Hamilton **ao avesso** (Teorema 4.29), todo fator irredutível de p_{T_i} deve dividir m_{T_i} , logo ser igual a p_i . Assim $p_{T_i} = p_i^{l_i}$ para algum l_i . Entretanto, considerando bases B_i de V_i , e juntando numa base B de V , é fácil ver que $p_T = p_{T_1} \dots p_{T_r}$, assim $p_T = p_1^{l_1} \dots p_r^{l_r}$, aí pela fatoração única devemos ter $l_i = k_i$ para todo i , concluindo a demonstração. \square

4.6 Critérios de Diagonalização

Teorema 4.34. Um operador $T \in \mathcal{L}(V)$ é diagonalizável se, e somente se:

$$m_T(t) = (t - \lambda_1) \dots (t - \lambda_r)$$

com $\lambda_i \neq \lambda_j$ sempre que $i \neq j$.

Demonstração. A ida já foi provada no corolário 4.18, então vamos mostrar apenas a volta. Pelo teorema da decomposição primária geral, sendo $V_i = \text{Ker}(T - \lambda_i I)$ para todo i , então cada V_i é T -invariante e $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_r$, aí para todo i temos $T|_{V_i} = \lambda_i I$, aí $V_i \subseteq V_T(\lambda_i)$; logo T é diagonalizável. \square

Considere $\{T_i : i \in I\} \subseteq \mathcal{L}(V)$. Em que condições os operadores T_i podem ser diagonalizados simultaneamente, ou seja, existe base B de V tal que para todo $i \in I$ a matriz $[T_i]_B$ seja diagonal?

Teorema 4.35. Um conjunto $\{T_i : i \in I\}$ pode ser diagonalizado simultaneamente se, e somente se cada T_i é diagonalizável e $T_i T_j = T_j T_i$ para todo $i, j \in I$.

Demonstração. Mostraremos por indução na dimensão. Suponhamos que o teorema é válido para espaços de dimensão menor que n . Seja V um espaço tal que $\dim(V) = n$ e seja \mathcal{F} um conjunto de operadores que comutam um com outro. Se todo elemento de \mathcal{F} é múltiplo da identidade, então acaba. Caso contrário, existe um $T \in \mathcal{F}$ que não é múltiplo da identidade. Sejam c_1, \dots, c_k os autovalores de T . Para i seja $W_i = \text{Ker}(T - c_i I)$. Então, como os elementos de \mathcal{F} comutam um com outro, então W_i é invariante para todo elemento de \mathcal{F} . Para cada $U \in \mathcal{F}$, então m_U é produto de fatores lineares distintos, aí, como $m_U|_{W_i} \mid m_U$, então $m_U|_{W_i}$ é produto de fatores lineares distintos, aí $U|_{W_i}$ é diagonalizável. Como $\dim(W_i) < n$, então existe uma base B_i tal que para todo $U \in \mathcal{F}$ a matriz $[U|_{W_i}]_{B_i}$ seja diagonal. Portanto $B = B_1 \cup \dots \cup B_k$ é a base que buscamos. \square

Índice

Espaço Vetorial

Base, 9

Base dual, 19

Base ordenada, 9

Dimensão, 12

Soma direta, 14

Teorema do Núcleo-Imagem, 18

Transformações Lineares, 17

Teorema de Cantor-Bernstein, 11

Transformações Lineares

Isomorfismos, 18