

GUIDE 12 • SANTÉ, SÉCURITÉ, VIE À LA MAISON 3 min de lecture

Et si c'était la douleur ?

Les signes discrets qui doivent faire penser à la santé avant de parler de désobéissance ou de caractère.

EN 30 SECONDES


- 1 Un changement de comportement peut avoir une cause médicale, même sans boiterie visible.
- 2 Les signes sont souvent discrets : se lever plus lentement, éviter un escalier, grogner au toucher.
- 3 Vétérinaire d'abord, travail sur le comportement ensuite.

LA BONNE QUESTION

Avant de te demander « pourquoi il fait ça ? », demande-toi « est-ce que quelque chose lui fait mal ? ».

1 Pourquoi y penser en premier

La douleur change la tolérance, l'humeur, le sommeil et l'envie de bouger. Un chien qui a mal peut devenir irritable, éviter certains contacts, ou refuser ce qu'il faisait sans problème.



Le réflexe : santé d'abord, dès qu'un changement est brutal, inhabituel ou accompagné d'un signe physique.

LE NIVEAU DE PREUVE

Bien établi

La douleur est fréquente chez les chiens qui présentent des problèmes de comportement.

Revue de Mills et al. (2020) : environ un tiers des cas vus en consultation spécialisée selon une estimation prudente, de 28 à 82 % selon les cliniciens.

Plausible

Traiter la douleur peut améliorer le comportement.

Recommandation des auteurs : tester un traitement antidouleur quand on la suspecte, sous contrôle vétérinaire.

2 Les signes à repérer

SI TU OBSERVES

Il se lève plus lentement, hésite avant de sauter ou de monter un escalier.

-

ÇA PEUT INDiquer

Une gêne articulaire ou musculaire.

SI TU OBSERVES

Il grogne ou se retourne quand on touche une zone précise, ou quand on met le harnais.

-

ÇA PEUT INDiquer

Une zone sensible à montrer au vétérinaire.

SI TU OBSERVES

Il est «changeant»: parfois câlin, parfois irritable sans raison apparente.

-

ÇA PEUT INDiquer

La douleur peut varier d'un moment à l'autre, et l'humeur avec elle.

SI TU OBSERVES

Il refuse la balade, traîne, s'arrête souvent.

-

ÇA PEUT INDiquer

Fatigue, douleur ou chaleur: à vérifier avant de parler de paresse.

SI TU OBSERVES

Il se lèche ou se mordille toujours au même endroit.

ÇA PEUT INDiquer

Une démangeaison ou une douleur localisée.

SI TU OBSERVES

Il dort plus, ou change sans cesse de position sans arriver à s'installer.

ÇA PEUT INDiquer

Un inconfort possible.

Ces signes ne sont pas un diagnostic. Ils sont une bonne raison de consulter, et de noter ce que tu vois pour le vétérinaire.

3 Que faire

1 Noter

Quand, où, après quoi, depuis quand. Filme si possible : une vidéo aide beaucoup le vétérinaire.

2 Consulter

Dis au vétérinaire que tu observes un changement de comportement, pas seulement un souci physique.

3 Adapter en attendant

Moins d'escaliers et de sauts, balades plus courtes, pas de jeux brusques, pas de manipulations qui font mal.

4 Réévaluer ensuite

Si le comportement s'améliore avec le traitement, c'est une information précieuse. S'il persiste, un travail sur le comportement prend le relais.

CONSULTE EN URGENCE SI

- ❗ Il crie quand on le touche ou ne pose plus une patte.
- ❗ Il a le ventre gonflé et dur, ou essaie de vomir sans y arriver.
- ❗ Il respire difficilement.
- ❗ Il s'effondre ou ne se relève pas.

4 Ton observation sur 7 jours

JOUR	SITUATION	CE QUE J'AI VU	DEPUIS QUAND / FRÉQUENCE
Jour 1			
Jour 2			
Jour 3			
Jour 4			
Jour 5			
Jour 6			
Jour 7			

5 Les erreurs fréquentes

- ✗ Mettre un changement récent sur le compte du caractère ou de la « têtutesse ».
- ✗ Gronder un chien qui grogne quand on le touche.
- ✗ Lui donner un médicament humain : certains sont toxiques pour le chien.
- ✗ Attendre une boiterie franche pour consulter.

✓ Teste-toi

1 Un chien qui a mal boite forcément.

Faux : la douleur peut se voir seulement dans le comportement (irritabilité, évitement, sommeil).

2 On peut donner un antidouleur humain à un chien pour tester.

Faux : certains médicaments humains sont toxiques pour le chien. Toujours l'avis du vétérinaire.

3 Un grognement au toucher peut être un signe de douleur.

Vrai : c'est une bonne raison de consulter plutôt que de gronder.

Sources

- Mills et al. (2020), Pain and Problem Behavior in Cats and Dogs, *Animals* 10(2) : <https://www.mdpi.com/2076-2615/10/2/318>
- AVSAB, Position Statement on Humane Dog Training (2021) : <https://avsab.org/wp-content/uploads/2021/08/AVSAB-Humane-Dog-Training-Position-Statement-2021.pdf>
- Dogs Trust, Helping dogs cope with fear and big emotions : <https://www.dogstrust.org.uk/dog-advice/understanding-your-dog/signs-your-dog-may-be-stressed>

Guide mis à jour le 23 septembre 2026. Il donne une première orientation et ne remplace ni un diagnostic vétérinaire ni un accompagnement individualisé.

Et après ?

Chaque semaine, la lettre d'Asgard & Brienne raconte une situation réelle et te donne une chose à observer chez ton chien. Inscription gratuite sur asgardbrienne.com, rubrique « Newsletter ». Tu as rempli un tableau ? Réponds à la lettre avec tes observations.

Instagram, YouTube, Threads : @asgard_brienne • TikTok : @asgardbrienne