

Модели и методы решения задач с нечеткими параметрами и четкими отношениями

Я. А. Воронцов

Научный руководитель: М.Г.Матвеев, д.т.н., профессор.

Материалы для защиты диссертации на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Специальность 05.13.18 — математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»

Воронеж, 2015

Цель и задачи исследования

Цель: построение и исследование моделей учёта нечёткой неопределённости, обеспечивающих требуемые свойства решения различных прикладных задач, а также разработка методов эффективного численного решения на основе вводимых моделей

Задачи:

- анализ существующих методик нечётких вычислений с точки зрения сохранения свойств решения задач;
- разработка модели представления нечётких чисел, позволяющей максимально сохранять исходную экспертную информацию и обеспечить требуемые качественные свойства решений (устойчивость, сохранение чётких математических соотношений и т. п.);

Цель и задачи исследования

- разработка методики эффективной численной реализации решения задач с нечёткими параметрами, основанной на подходящих алгебраических структурах и её тестирование на примере задачи сетевого планирования с нечёткими параметрами;
- разработка и верификация программного обеспечения, реализующего предложенную модель представления нечётких параметров и методики численного решения задач с нечёткими параметрами.

Научная новизна

- **модификация метода моделирования экспертных числовых оценок**, полученных в классе LR-чисел, отличающаяся наличием L-преобразования LR-числа в соответствующие LL/RR-числа;
- **эффективные вычислительные методы решения задач с нечёткими параметрами**, отличающиеся использованием описанной в работе алгебраической структуры (поле модифицированных нечётких чисел) и позволяющие параметрически управлять устойчивостью решения;
- **программный комплекс** для решения задачи сетевого планирования с нечёткими параметрами, реализующий предложенные вычислительные методы, модули которого используют стандартные вычислительные операции (в отличие от специализированных программных пакетов).

Представление нечёткой информации

- нечёткие множества (подмножества предопределённого универсального множества X)

$$\tilde{A} = \{(x, \mu_{\tilde{A}}(x)) \mid x \in X\}; \quad E(\mu_{\tilde{A}}(x)) = [0; 1] \quad (1)$$

- нечёткие числа (подмножества множества действительных чисел \mathbb{R})
 - кусочная непрерывность $\mu_{\tilde{A}}(x)$;
 - выпуклость $\mu_{\tilde{A}}(x)$

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}; \forall \gamma \in [0; 1] \\ \mu_{\tilde{A}}(\gamma x_1 + (1 - \gamma) x_2) \geq \min \{\mu_{\tilde{A}}(x_1), \mu_{\tilde{A}}(x_2)\} \quad (2)$$

- нормальность $\mu_{\tilde{A}}(x)$

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} (\mu_{\tilde{A}}(x)) = 1 \quad (3)$$

Основные понятия

- Нечёткие числа LR -типа: $L(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $R(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$L(-x) = L(x);$$

$$R(-x) = R(x);$$

$$L(0) = R(0) = 1.$$

L и R являются невозрастающими на интервале $[0; +\infty)$

- Функция принадлежности LR -числа

$$\mu_{\tilde{A}}(x) = \begin{cases} L\left(\frac{m-x}{a}\right); & x \leq m \\ R\left(\frac{x-m}{b}\right); & x > m \end{cases} \quad (4)$$

- При известной форме функции принадлежности удобнее запись $\tilde{A} = (m; a; b)$

Основные понятия

- Треугольное нечёткое число $\tilde{A} = \langle m, a, b \rangle$

$$\mu_{\tilde{A}}(x) = \begin{cases} \frac{x - m + a}{a}; & x \in [m - a; m] \\ \frac{m + b - x}{b}; & x \in (m; m + b] \\ 0; & \text{в остальных случаях} \end{cases} \quad (5)$$

- Формы записи — коэффициенты нечёткости $\langle m, a, b \rangle$ и границы $\langle x_{\tilde{A}}^L, m, x_{\tilde{A}}^R \rangle$

$$\begin{cases} x_{\tilde{A}}^L = m - a \\ x_{\tilde{A}}^R = m + b \end{cases} \quad (6)$$

- Число LL (RR)-типа — правый (левый) коэффициент нечёткости числа равен нулю

Основные понятия


- Теорема о декомпозиции

$$\tilde{A} = \bigcup_{\alpha \in [0;1]} A_{\alpha} \quad (7)$$

- Число как совокупность α -интервалов $X_{\alpha} = [x^L(\alpha); x^R(\alpha)]$

$$\begin{cases} x^L(\alpha) = m - a + a\alpha \\ x^R(\alpha) = m + b - b\alpha \end{cases} \quad (8)$$

Классификация нечётких моделей



- Исследуются модели, использующие чёткие отношения и нечёткие параметры (модели второго типа)
- Существующие подходы к нечётким вычислениям далеко не всегда применимы в моделях второго типа

Проблемы существующих способов вычислений

- требуются значительные вычислительные ресурсы (принцип обобщения);
- неоправданно расширяется носитель функции принадлежности (алгебры и арифметики LR-чисел);
- происходит выход за класс используемых в арифметике чисел из-за искажения формы функции принадлежности;
- ограничивается область определения функции принадлежности;
- нарушаются классические отношения равенства и частичного порядка.

Требования к разрабатываемой методике

- ограничение роста неопределенности результатов обработки нечеткой информации;
- сохранение чётких отношений в модельных уравнениях при подстановке данных;
- возможность представления линейного порядка на множестве нечётких чисел;
- возможность использования стандартных программных средств реализации численных методов решений;
- возможность управления устойчивостью решения решаемой задачи.

Преобразование L

Исходная задача $\tilde{Y} = f(\tilde{X}, \tilde{A})$ с нечёткими числовыми параметрами и переменными рассматривается как совокупность задач с интервальной неопределённостью

$$\tilde{Y} = f(\tilde{X}, \tilde{A}) \rightarrow \bigcup_{\alpha=0}^1 y_{\alpha} = f(X_{\alpha}, A_{\alpha}) \quad (9)$$

с последующим переходом к полной определённости на каждом α -уровне, для чего на каждом α -уровне внутри интервала X_{α} выбирается точка $\bar{x}(\alpha)$. Предлагается выбирать значение $\bar{x}(\alpha)$ с помощью линейного параметрического преобразования L

$$\bar{x}(\alpha) = L(X_{\alpha}) = \lambda x^L(\alpha) + (1 - \lambda) x^R(\alpha). \quad (10)$$

Преобразование (10) приводит к потерям информации

Модифицированные нечёткие числа

После решения чётких α -уровневых задач полученные результаты $y(\alpha)$ аппроксимируются нечётким числом

$$\tilde{Y}^* = \{y(\alpha) \mid \mu_{\tilde{Y}}(y) = \alpha\} \quad (11)$$

Результат (11) есть **модифицированное решение** задачи (9). Происходит переход от использования «полноценных» нечётких чисел к алгебрам для чисел LL/RR -типа. Функция принадлежности чисел LL/RR -типа является обратной к функции $\bar{x}(\alpha)$:

$$\mu_{\tilde{A}^*}(x) = (\bar{x}(\alpha))^{-1} \quad (12)$$

и Число (12) и есть **модифицированное нечёткое число**. Является числом LL/RR -типа

Свойства преобразования L

1. Преобразование L сохраняет моду нечёткого числа, т. е.
 $\forall \lambda \in [0; 1] : m_{\tilde{A}} = m_{\tilde{A}^*}.$
2. При некоторых значениях параметра λ преобразование L сохраняет
 - 2.1 знак степени асимметрии:
 $\exists \lambda \in [0; 1] : \text{sign}(AS_{\tilde{A}}) = \text{sign}(AS_{\tilde{A}^*});$
 - 2.2 значение степени асимметрии: $\exists \lambda \in [0; 1] : AS_{\tilde{A}} = AS_{\tilde{A}^*}.$ $\lambda^* = \frac{a}{a+b} = \frac{a}{d_{\tilde{A}}}$ сохраняет значение степени асимметрии.
3. $\forall \lambda \in [0; 1] : A_{\alpha}^* \subset A_{\alpha}; d_{\tilde{A}} \geq d_{\tilde{A}^*}$ — преобразование L уменьшает длину носителя нечёткого числа и оставляет α -интервалы модифицированного числа внутри α -интервалов исходного числа.

Алгебра модифицированных нечётких чисел

Строится чёткая алгебра $P = \langle K; +, * \rangle$, $K = \{\bar{x}(\alpha)\}$ и показывается, что P удовлетворяем всем аксиомам поля. Используется более удобная форма записи модифицированного числа

$$\bar{x}(\alpha) = c + k\alpha, \quad (13)$$

$$\begin{cases} c = m + b - \lambda(a + b) \\ k = \lambda(a + b) - b \end{cases} \quad (14)$$
$$\lambda \in [0; 1]; \quad c, k \in \mathbb{R}$$

Сложение и его свойства

На множестве K вводится операция сложения (15)

$$\bar{x}_1(\alpha) + \bar{x}_2(\alpha) = r_1(\alpha) = c_1 + c_2 + (k_1 + k_2)\alpha, \quad r_1(\alpha) \in K; \quad (15)$$

нейтральный по сложению элемент (16)

$$\begin{aligned} \bar{0} &= 0 + 0\alpha \in K : \forall \bar{x}(\alpha) \in K : \\ \bar{x}(\alpha) + \bar{0} &= c + k\alpha + 0 + 0\alpha = \bar{x}(\alpha); \end{aligned} \quad (16)$$

противоположный по сложению элемент (17)

$$-\bar{x}(\alpha) = -c - k\alpha \in K : \bar{x}(\alpha) + (-\bar{x}(\alpha)) = \bar{0}. \quad (17)$$

Доказываются свойства ассоциативности и коммутативности операции (15).

Умножение и его свойства

На множестве K вводится операция умножения (18)

$$r_2(\alpha) = c_1 c_2 + (c_1 k_2 + c_2 k_1 + k_1 k_2) \alpha; \quad r_2(\alpha) \in K. \quad (18)$$

нейтральный по умножению элемент (19)

$$\bar{1} = 1 + 0\alpha \in K : \forall \bar{x}(\alpha) \in K \quad \bar{x}(\alpha) \cdot \bar{1} = \bar{x}(\alpha); \quad (19)$$

обратный по умножению (20) элемент.

$$\bar{x}^{-1}(\alpha) = \frac{1}{c} - \frac{k}{c(c+k)}\alpha \in K, \quad c \neq 0 : \bar{x}(\alpha) \bar{x}^{-1}(\alpha) = \bar{1}. \quad (20)$$

Доказываются свойства ассоциативности и коммутативности, а также свойство дистрибутивности умножения (18) относительно сложения (15).

Показано, что для существования обратного элемента число $\bar{x}(\alpha)$ должно иметь ненулевую моду, поскольку, согласно (14), $c + k = m \neq 0$.

Двухточечные вычисления

В диссертации для модифицированных нечётких чисел показывается эквивалентность записи в виде (??) и в виде

$$\bar{x}_{\tilde{A}}(\alpha) = \bar{x}_{\tilde{A}}(0) + \alpha(\bar{x}_{\tilde{A}}(1) - \bar{x}_{\tilde{A}}(0)) = \alpha\bar{x}_{\tilde{A}}(1) + (1 - \alpha)\bar{x}_{\tilde{A}}(0). \quad (21)$$

Двухточечные вычисления основаны на (21) и позволяют решать нечёткую задачу как две чёткие при $\alpha = 0$ и $\alpha = 1$.

Если обозначить за $*$ произвольную арифметическую операцию, то для чисел в форме (21) её результат будет выглядеть следующим образом:

$$\bar{x}_{\tilde{A}}(\alpha) * \bar{x}_{\tilde{B}}(\alpha) = \alpha(\bar{x}_{\tilde{A}}(1) * \bar{x}_{\tilde{B}}(1)) + (1 - \alpha)(\bar{x}_{\tilde{A}}(0) * \bar{x}_{\tilde{B}}(0)). \quad (22)$$

Преимущества двухточечных вычислений:

- сводятся к алгебре модифицированных нечётких чисел;
- избавляют от необходимости вводить отношение линейного порядка;
- позволяют использовать стандартные программные

Устойчивость задачи ЛП

Задача линейного программирования с нечёткими параметрами

$$\begin{cases} f(\mathbf{x}) = \mathbf{C}\mathbf{x} \rightarrow \min; \\ \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{B}, \end{cases} \quad (23)$$

Применение к каждому из элементов матрицы и векторов преобразования L приводит к модифицированной задаче (24)

$$\begin{cases} f(\mathbf{x}) = \mathbf{C}^*\mathbf{x} \rightarrow \min; \\ \mathbf{A}^*\mathbf{x} = \mathbf{B}^*, \end{cases} \quad (24)$$

Здесь $\mathbf{A}^* = \{\bar{x}_{\tilde{A}_{ij}}(\alpha)\}$, $\mathbf{B}^* = \{\bar{x}_{\tilde{B}_i}(\alpha)\}$, $\mathbf{C}^* = \{\bar{x}_{\tilde{C}_i}(\alpha)\}$

Устойчивость задачи ЛП

Предлагаемое условие устойчивости по решению:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall \alpha \in [0; 1) \quad |\alpha - 1| < \delta \Rightarrow \|\mathbf{x}(1) - \mathbf{x}(\alpha)\| < \varepsilon. \quad (25)$$

При решении на уровне $\alpha = 0$, все значения λ_S , где S — один из индексов \tilde{A}_{ij} , \tilde{B}_i , \tilde{C}_i , — принимают нулевые/единичные значения. Используется критерий минимизации

$$(\lambda_S^* - \lambda_S)^2 \rightarrow \min \quad (26)$$

Возникает задача векторной оптимизации ввиду противоречивости критерия (26) и целевой функции задачи (24). Используется аддитивная свёртка критериев (27)

$$f^*(\mathbf{x}) = \mathbf{C}^* \mathbf{x} + \gamma \sum_s (\lambda_s^* - \lambda_s)^2 \rightarrow \min \quad (27)$$

Задача сетевого планирования

Алгоритмический метод решения не позволяет проводить анализ задачи на устойчивость, т.е. на изменение критического пути.

Модифицированная задача сетевого планирования

В качестве основного способа решения выбрано решение задачи линейного программирования с нечёткими временными оценками

$$T = t_n - t_1 \rightarrow \min \quad (28)$$

при ограничениях на времена наступления событий

$$t_{j_s} - t_{i_s} \geq \tilde{\tau}_s; \quad s = \overline{1, m}, \quad (29)$$

где t_{i_s} и t_{j_s} — времена наступления событий начала и окончания работы w_s соответственно.

В результате решения данной задачи получается общее время выполнения проекта \tilde{T} , а также вектор времён $\mathbf{t} = \{\tilde{t}_1, \dots, \tilde{t}_n\}$, называемых календарным планом проекта, и совокупность критических операций \mathbf{S}_1 .

Решение задачи сетевого планирования

Для решения задачи (28)–(29), в работе применяется преобразование L и методика двухточечных вычислений.

Формулируется задача для произвольного α -уровня

$$\begin{cases} T(\alpha) = t_n - t_1 \rightarrow \min \\ t_{js} - t_{is} \geq \bar{\tau}_s(\alpha, \lambda_s), \quad \forall s = \overline{1, m}. \end{cases} \quad (30)$$

Полученное при $\alpha = 1$ решение задачи (30) даёт активные ограничения на критические операции. В диссертации отмечается, что на параметры λ_s преобразования L также необходимо наложить ограничения и учесть их в целевой функции (27), чтобы избежать ситуации, когда λ_s принимают граничные значения (0 или 1). В результате при $\alpha = 0$ решается видоизменённая задача

$$\begin{cases} T^*(\alpha, \lambda) = t_n - t_1 + \gamma \sum_{s=1}^m (\lambda_s^* - \lambda_s)^2 \rightarrow \min; \end{cases}$$

Результат решения задачи

В результате проведённого исследования предлагается следующий алгоритм решения задачи сетевого планирования с нечёткими временными оценками как задачи линейного программирования с возмущениями.

1. Решается невозмущённая задача (30) при $\alpha = 1$. Ввиду свойства ?? преобразования L , это решение соответствует модифицированному решению $\langle T(1), t(1), S_1(1) \rangle$. Фиксируется множество операций $S_1(1)$, образующих критический путь.
2. Фиксируется критический путь при всех $\alpha \neq 1$. Для этого в задаче (30) нестрогие неравенства меняются на равенства $\forall s_1 \in S_1(1)$, т. е. выбранные операции всегда будут критическими. Данный шаг позволяет выполнить условие устойчивости задачи по решению (??).
3. Решается возмущённая задача (31) с изменённой целевой функцией. Результатом решения задачи является кортеж


Программное обеспечение

Приложение «CSBusinessGraph» не использует никаких специализированных средств и третьесторонних библиотек для представления нечётких чисел и выполняет все вычисления только с использованием действительных переменных.

Функциональные возможности

- создание модели проекта в виде вершинного графа в ручном режиме или импорт существующей модели из XML-файла;
- поддержка модели проекта в согласованном состоянии — проверка отсутствия циклов в графе и наличие только одной компоненты связности;
- формирование временных оценок выполнения операций, выраженных в виде треугольных чисел;
- автоматическое преобразование вершинного графа в стрелочный;
- реализация механизма расчёта критического пути на основе

Главное окно приложения



Результаты работы

- Комплекс методов для моделей с чёткими отношениями и нечёткими параметрами
 - применение классических методов решения
 - достижение требуемых качественных свойств решения
- Параметрическая модель представления нечёткого числа
 - максимальное сохранение экспертной информации
 - двухточечные вычисления — эффективная численная реализации решения
- Устойчивость решения задачи линейного программирования с нечёткими параметрами
 - свёртка критериев для управления устойчивостью
 - алгоритм получения устойчивого решения задачи
- Апробация методов — задача сетевого планирования
- Программный комплекс — решение задачи оценки сроков разработки программного обеспечения

Апробация работы и публикации

Основные положения работы докладывались на конференциях:

- Современные проблемы прикладной математики, теории управления и математического моделирования (Воронеж, 2012 г.)
- Информатика: проблемы, методология, технологии (Воронеж, 2013–2014 гг.);
- Современные технологии в задачах управления, автоматики и обработки информации (Алушта, 2013–2014 гг.);
- Радиоэлектроника, электротехника и энергетика (Москва, 2014).

Основное содержание диссертационного исследования изложено в 11 научных работах, из них 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.