

JULIHO CASTILLO COLMENARES

# MATEMÁTICAS COMPUTACIONALES

[WWW.ASIMOVIAN.ACADEMY](http://WWW.ASIMOVIAN.ACADEMY)

This work is licensed under the Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.



## *Índice general*

<i>1</i>	<i>TEORÍA DE GRÁFICAS</i>	<i>5</i>
<i>1.1</i>	<i>MATRICES</i>	<i>5</i>
<i>1.2</i>	<i>TEORÍA GENERAL DE GRAFOS</i>	<i>9</i>
<i>1.3</i>	<i>DIGRAFOS</i>	<i>16</i>
<i>2</i>	<i>BIBLIOGRAFÍA</i>	<i>23</i>



# 1 Teoría de gráficas

## 1.1 Matrices

Las matrices son arreglos rectangulares de número que nos ayudan a codificar información. Por ejemplo:

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix}$$

puede ser útil para codificar los coeficientes del sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} a_{1,1}x + a_{1,2}y = b_1 \\ a_{2,1}x + a_{2,2}y = b_2 \end{cases}$$

En general, una matriz tiene la forma

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix} \quad (\text{A})$$

Los subíndices de cada elemento  $a_{i,j}$  denotan la posición del mismo:  $i$  es el número del *renglón* (contando de arriba a abajo), mientras que  $j$  es el número de la columna (contando de izquierda a derecha).

Podemos extraer renglones y columnas de la matrix (A): El  $i$ -ésimo renglón es

$$R_i = (a_{i,1} \quad \cdots \quad a_{i,n})$$

mientras que la  $j$ -ésima columna será

$$C_j = \begin{pmatrix} a_{j,1} \\ \vdots \\ a_{j,m} \end{pmatrix}$$

Diremos que la matriz (A) tiene dimensión  $m \times n$ .

Si existe un conjunto de números  $F$ , tal que todos los elementos  $a_{i,j}$  de la matriz pertenecen a dicho conjunto, diremos que la matriz tiene coeficientes en  $F$ .

*Observación 1.1.* Para que las operaciones entre matrices estén bien definidas, es necesario que la suma, resta y multiplicación entre elementos de  $F$  también esté bien definida. Por esto generalmente  $F$  se elige como  $\mathbb{R}$  o  $\mathbb{Z}$ .

La colección de todas las matrices de dimensión  $m \times n$  con coeficientes en  $F$  se denotará por

$$M_{m,n}(F).$$

**Definición 1.1.** Las matrices de dimensión  $m \times 1$  se conocen como *vectores columna*, mientras que las de dimensión  $1 \times n$  se conocen como *vectores renglón*.

La colección  $M_{m,1}(F)$  de todos los vectores columna con coeficientes comunmente se denota por  $F^m$ . Mientras que la colección  $M_{1,n}(F)$  de todos los vectores columna con coeficientes comunmente se denota por  $F^{n*}$ .

### Operaciones elementales

Por brevedad, la matriz  $(A)$  se denota por  $A = [a_{i,j}]$ .

En el caso de los vectores renglones y columnas, podemos omitir el subíndice fijo

$$R = [R_{1,j}] = [R_j], \quad C = [C_{i,1}] = [C_i].$$

Si  $B = [b_{i,j}]$  es otra matriz de dimensión  $m \times n$ , la suma se define como

$$A + B = [a_{i,j} + b_{i,j}].$$

De manera similar, la resta se define como

$$A - B = [a_{i,j} - b_{i,j}].$$

### Problema 1.1.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 7 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & -4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 7 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix} =$$

Observe que para que la *suma y resta* tenga sentido, ambas matrices deben tener exactamente las *mismas dimensiones*.

Después de ver la facilidad para definir la suma y resta, uno se ve tentado a definir la multiplicación de la misma forma. Pero tal definición es poco útil en las aplicaciones.

Por esta razón, desarrollaremos el concepto de multiplicación, a fin de poder aplicar esta operación en la resolución de Ejemplos.

*Multiplicación*

**Definición 1.2.** Sean  $R = [R_j]$  un vector renglón y  $C = [C_i]$  un vector columna, ambos de longitud  $n$ .

El *producto renglón-columna* se define como

$$RC = \begin{pmatrix} R_1 & \cdots & R_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ \vdots \\ C_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n R_i C_i. \quad (\text{RC})$$

**Problema 1.2.** Considere

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Calcule  $RC$ .

**Problema 1.3.** Reescriba la siguiente ecuación, utilizando el *producto renglón-columna*:

$$2x - 3y + z = 0.$$

**Definición 1.3.** Sea  $A = [a_{i,j}] \in M_{m \times n}$  y  $B = [b_{j,k}] \in M_{n \times l}$ . Definimos su producto como

$$AB = \begin{pmatrix} R_i C_k \end{pmatrix} \quad (\text{AB})$$

donde  $R_i$  es el  $i$ -ésimo renglón de  $A$  y  $C_k$  es la  $k$ -ésima columna de  $B$ .

*Observación 1.2.* ■ Para que esta multiplicación tenga sentido, los renglones de  $A$  y las columnas de  $B$  deberán tener la misma longitud  $n$ .

- La matriz resultante tendrá dimensión  $m \times l$ .
- A menos que  $m = l$ , el producto  $BA$  podría no estar definido.
- Aun cuando  $BA$  estuviera bien definido, el producto de matrices no es *conmutativo*, es decir, generalmente tendremos que

$$AB \neq BA.$$

**Problema 1.4.** Encuentre el producto  $AB$  de las siguientes matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Solución:

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$$

**Problema 1.5.** Encuentre el producto  $AB$  de las siguientes matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución:

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

**Problema 1.6.** Encuentre el producto  $AB$  de las siguientes matrices

$$A = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

**Problema 1.7.** Encuentre el producto  $AB$  de las siguientes matrices

$$A = \begin{pmatrix} 6 \\ -9 \\ -10 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -5 \end{pmatrix}$$

Solución:

$$AB = \begin{pmatrix} -30 \\ 45 \\ 50 \end{pmatrix}$$

**Problema 1.8.** Encuentre el producto  $AB$  de las siguientes matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

Solución:

$$AB = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -6 \end{pmatrix}$$



**Problema 1.9.** Encuentre el producto  $AB$  de las siguientes matrices

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -7 & -1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -7 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Solución:

$$AB = \begin{pmatrix} 19 \\ 53 \end{pmatrix}$$

**Problema 1.10.** Rescriba el siguiente sistema de ecuación en forma matricial y encuentre su solución:

$$\begin{cases} -x - 3y = 19 \\ -7x - y = 53 \end{cases}$$

## 1.2 Teoría general de grafos

En matemáticas, la *teoría de grafos* estudia estructuras matemáticas usadas para modelar relaciones por pares entre objetos.

### Definición de grafo

Concepto de grafo Un *grafo*  $G$  consiste de:

- (a) Un conjunto  $V$  cuyos elementos son llamados *vértices*, puntos o nodos de  $G$ .
- (b) Un conjunto  $E$  de pares (no ordenados) de distintos vertices, a los que llamaremos *aristas* de  $G$ .

Denotaremos un grafo por  $G(V, E)$  cuando querramos enfatizar los componentes del mismo.

*Observación 1.3.* Debido a una ambigüedad en la traducción del inglés al español, en ocasiones, a un grafo también se le conoce como *gráfica*, que se puede confundir con el concepto de teoría de conjuntos. En este material, a veces utilizaremos *gráfica*, pero debe entenderse como un grafo.

**Multigrafos** Consideremos la figura 1.1 (b). Las aristas  $e_4$  y  $e_5$  son llamadas *aristas múltiples* ya que conectan los mismos extremos, mientras que la arista  $e_6$  es llamada *bucle* ya que conecta un vértice consigo mismo.

Tales diagramas son llamados *multigrafos*; la definición formal de grafo no admite aristas múltiples ni bucles.




Figura 1.1: Grafos y multigrafos

**Observación 1.4.** Sin embargo, algunos textos utilizan “grafos” para referirse a lo que nosotros llamaremos multigrafos, mientras que ocupan “grafo simple” para lo que nosotros llamaremos grafos.

**Grado de un vértice** El *grado* de un vértice  $v$  en un grafo  $G$ , denotado por  $\deg(v)$ , es igual al número de aristas en  $G$  que contienen a  $v$ , es decir, que *inciden* en  $v$ .

Dado que cada arista incide en dos vértices diferentes, tenemos el siguiente resultado simple pero importante:

**Teorema 1.1.** *La suma de los grados de los vértices en un grafo  $G$  es el doble del número de aristas.*

**Problema 1.11.** En el grafo de la figura 1.1(a), tenemos que

$$\deg(A) = 2, \deg(B) = 3, \deg(C) = 3, \deg(D) = 2.$$

La suma de los grados es igual a 10, que es dos veces el número de aristas.

**Definición 1.4.** Diremos que un vértice es *par* o *impar* de acuerdo a la paridad de su grado.

En el ejemplo anterior, tanto  $A$  como  $D$  son vértices pares, mientras que  $B$  y  $C$  son impares.

**Observación 1.5.** Diremos que un vértice de grado cero está *aislado*.

**Gráfos finitos y triviales** Diremos que un grafo es *finito* si tiene un número finito de vértices y un número finito de aristas.

Observe que un número finito de vértices implica un número finito de aristas; pero no lo contrario no es necesariamente cierto.

Diremos que un grafo con un único vértice, sin aristas, es *trivial*.

**Observación 1.6.** A menos que se indique de otra manera, sólo trataremos con grafos finitos.

### Subgrafos y grafos homeomorfos e isomorfos

Ahora, discutiremos relaciones de equivalencia entre grafos.

**Subgrafos** Consideremos un grafo  $G(V, E)$ . Diremos que otro grafo  $H(V', E')$  es un *subgrafo* de  $G$  si los vértices y aristas de  $H$  están contenidos en los vértices y aristas de  $G$ , es decir,

$$V' \subset V, E' \subset E.$$

En particular:

- (a) Un subgrafo  $H(V', E')$  de  $G(V, E)$  es llamado subgrafo *inducido* por sus vértices  $V'$  si el conjunto de aristas  $E'$  contiene todas las aristas en  $G$  cuyo extremos pertenecen a los vértices en  $H$ .
- (b) Si  $v$  es un vértice en  $G$ , entonces  $G - v$  es el subgrafo de  $G$  obtenido al borrar  $v$  de  $G$  y todas las aristas en  $G$  que inciden en  $v$ .
- (c) Si  $e$  es una arista en  $G$ , entonces  $G - e$  es el subgrafo de  $G$  obtenido borrando la arista  $e$  en  $G$ .

**Grafos isomorfos** Dos grafos  $G(V, E)$  y  $G^*(V^*, E^*)$  son llamados *isomorfos* si existe una función biyectiva  $f : V \rightarrow V^*$  tal que:  $\{u, v\}$  es una arista de  $G$  si y solo si  $\{f(u), f(v)\}$  es una arista de  $G^*$ .

La idea es que estos grafos son equivalentes, aún cuando sus representaciones pueden lucir muy diferentes.




Figura 1.2: Grafos isomorfos.

**Grafos homeomorfos** Dado un grafo  $G$ , podemos obtener un nuevo grafo dividiendo una arista de  $G$  con vértices adicionales.

Dos grafos  $G$  y  $G^*$  son llamados *homeomorfos* si pueden obtenerse de gráficas isomorfas a través de este método.




Figura 1.3: Grafos homomorfos

Los grafos (a) y (b) son homeomorfos, ya que se pueden obtener añadiendo vértices al grafo (c).

### *Caminos y conexidad*

Un *camino* en un (multi)grafo  $G$  consiste en una sucesión alternante de vértices y arista de la forma

$$v_0, e_1, v_1, \dots, e_{n-1}, v_{n-1}, e_n, v_n$$

donde cada arista  $e_i$  contiene los vértices  $v_{i-1}$  y  $v_i$ .

*Observación 1.7.* Observe que en grafo, podemos simplificar la notación para un camino, indicando sólo los vértices que recorre:

$$v_0, v_1, \dots, v_n.$$

Diremos que el camino es *cerrado* si  $v_n = v_0$ . En otro caso, diremos que el camino conecta  $v_0$  con  $v_n$ .

Un *camino simple* es aquel en el cual todos los vértices son distintos. Mientras que un camino en el que todas las aristas son distintas se llama *paseo*.

La *longitud* de un camino es igual a número de aristas en la sucesión que lo define.

Un *ciclo* es un camino cerrado de *longitud* al menos 3, en el que todos los vértices son distintos, excepto el inicial  $v_0$  y el final  $v_n$ .

Un ciclo de longitud  $k$  es llamado  $k$ -*ciclo*.




Figura 1.4: Conexidad en grafos

**Problema 1.12.** Consideremos el grafo 1.4(a). Considere las siguientes sucesiones

$$\alpha = (P_4, P_1, P_2, P_5, P_1, P_2, P_3, P_6),$$





$$\beta = (P_4, P_1, P_5, P_2, P_6)$$

$$\gamma = (P_4, P_1, P_5, P_2, P_3, P_5, P_6)$$

$$\delta = (P_4, P_1, P_5, P_3, P_6).$$

$\alpha$  es un camino de  $P_4$  a  $P_6$ , pero no es un paseo.

$\beta$  no es un camino, ya que no existe alguna arista  $\{P_2, P_6\}$ .



$\gamma$  es un paseo, pero no es un camino simple.

$\delta$  es un camino simple de  $P_4$  a  $P_6$ , pero no es el camino más corto, es decir, con el menor número de aristas. ¿Cuál es el camino más corto?


Eliminando aristas innecesarias, no es difícil ver que cualquier camino de  $u$  a  $v$  puede ser reemplazado por un camino simple.

Formalmente:

**Teorema 1.2.** *Existe un camino del vértice  $u$  a  $v$  si y solo si existe un camino simple de  $u$  a  $v$ .*


**Conexidad y componentes conexas** Un grafo  $G$  es conexo si existe un camino entre cualesquiera dos vértices. Por ejemplo, el grafo 1.4(a)

es conexo, pero no así el grafo 1.4(b).



Consideremos un grafo  $G$ . Un subgrafo conexo  $H$  de  $G$  es llamado *componente conexa* de  $G$  si  $H$  no está contenido de manera propia en cualquier otro grafo conexo de  $G$ .

Por ejemplo, el grafo 1.4(b) tiene tres componentes conexas.



*Observación 1.8.* Formalmente, permitiendo que un vértice  $u$  esté conectado consigo mismo, la relación

$$u \text{ está conectado con } v$$

es una relación de equivalencia en el conjunto de vértices del grafo  $G$ , y las clases de equivalencia de esta relación son las componentes conexas de  $G$ .

**Distancia y diámetro** Consideremos un grafo conexo  $G$ . La distancia entre dos vértices  $u$  y  $v$  en  $G$ , denotada por  $d(u, v)$ , es la longitud del camino más corto entre  $u$  y  $v$ . El diámetro de  $G$ , escrito  $\text{diam}(G)$ , es la distancia máxima entre cualesquiera dos puntos en  $G$ .




Figura 1.5: Distancia y diámetro

Por ejemplo, en el grafo 1.5(a), el diámetro es 3, mientras que en el (b), el diámetro es 4.

**Puntos de corte y puentes** Sea  $G$  un grafo conexo. Un vértice  $v$  en  $G$  es llamado *punto de corte* si  $G - v$  es desconexo. Una arista  $e$  en  $G$  es llamada *punte* si  $G - e$  es desconexo.




Figura 1.6: Puntos de corte y puentes

### Grafos transitables y eulerianos




Figura 1.7: Puentes de Königsberg y su representación

Un multigrafo es llamado *transitable* si existe un *paseo* (un camino dónde todos las aristas son diferentes), que incluye *todos los vértices y todas las aristas*.

Tal paseo será llamado *paseo transitable*.

**Observación 1.9.** De manera equivalente, un paseo transitable es un camino en el que todos los vértices se transitan *al menos* una vez, pero las aristas *exactamente* una vez.

**Propiedad 1.1.** *Cualquier grafo conexo y finito con exactamente dos vértices impares es transitable. Un paseo transitable puede comenzar en alguno de los vértices impares y terminar en el otro vértice impar.*

Un grafo  $G$  es llamado *grafo Euleriano* si existe un *paseo transitable cerrado*.

A tal paseo le llamaremos *paseo Euleriano*.

**Teorema 1.3** (Euler). *Un grafo conexo y finito es Euleriano si y solo si cada vértice tiene grado par.*

Grafos hamiltonianos En la definición de grafos Eulerianos se enfatizó pasar por todas las aristas.

Ahora, nos enfocaremos en visitar todos los vértices.

Un *circuito Hamiltoniano* es un grafo  $G$  es un camino cerrado que visita cada vértice en  $G$  *exactamente* una vez.


Si  $G$  admite un circuito Hamiltoniano, entonces  $G$  es llamado un *grafo Hamiltoniano*.

**Observación 1.10.** En la definición de circuito Hamiltoniano, cuando decimos que el camino *visita* cada vértice exactamente una vez signi-


fica que, aunque el vértice inicial tiene que ser el mismo que el final, todos los demás vértices intermedios deben ser distintos.

*Observación 1.11.* Un **paseo Euleriano** atraviesa **cada una de las aristas** exactamente una vez, pero los vértices se pueden repetir, mientras que un **circuito Hamiltoniano** visita **cada uno de los vértices** exactamente una vez, pero las aristas pueden repetirse.

**Teorema 1.4.** Sea  $G$  un grafo conexo con  $n$  vértices. Entonces  $G$  es Hamiltoniano si  $n \geq 3$  y  $n \leq \deg(v)$  para cada vértice  $v$  en  $G$ .



(a) Hamiltonian and non-Eulerian



(b) Eulerian and non-Hamiltonian

Figura 1.8: Circuitos Eulerianos y Hamiltonianos


### Matriz de adyacencia

Supongamos que  $G$  es un grafo con  $m$  vértices y que estos han sido ordenados:

$$v_1, v_2, \dots, v_m.$$

Entonces, la *matriz de adyacencia*  $A = (a_{i,j})$  del grafo  $G$  es la matriz de dimensión  $m \times m$  definida por:

$$a_{i,j} = \begin{cases} 1 & v_i \text{ es adyacente a } v_j \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



(a)

$$\begin{array}{c} \begin{matrix} & A & B & C & D & E \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \\ E \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

(b)

Figura 1.9: Matriz de adyacencia

## 1.3 Digrafos

Los *grafos dirigidos* o *digrafos* son grafos en los que las aristas tienen una dirección.



### Grafos dirigidos

Un grafo dirigido  $G = G(V, E)$  consiste de:

1. Un conjunto  $V = V(G)$  cuyos elementos son llamados *vértices*;
2. un conjunto  $E = E(G)$  de *pares ordenados* ordenados de vértices llamados *arcos* o *aristas dirigidas*.

Supongamos que  $e = (u, v)$  es un arco en el digrafo  $G$ . Entonces, la siguiente terminología es usada:


- $e$  comienza en  $u$  y termina en  $v$ ;
- $u$  es el origen o punto inicial de  $e$ , mientras que  $v$  es el destino o punto final de  $e$ .
- $v$  es un sucesor de  $u$ ;
- $u$  es adyacente a  $v$  y  $v$  es adyacente desde  $u$ .

Si  $u = v$ ,  $e$  es llamado un *bucle*.

Si las aristas o los vértices de un digrafo están etiquetados con algún tipo de dato, diremos que es un *digrafo etiquetado*.

De manera similar a un grafo, un digrafo será finito si el conjunto de vértices y el de aristas es finito.

**Problema 1.13.** Consideremos el siguiente digrafo. Las aristas  $e_2$  y



$e_3$  son llamados *paralelos*, ya que ambos comienzan en  $B$  y terminan en  $A$ . La arista  $e_7$  es un *bucle*.

### Matriz de adyacencia


Ahora, sólo consideraremos *digrafos simples*  $G(V, E)$ , es decir, sin aristas paralelas. Entonces  $E$  es simplemente una relación en  $V$ .

De manera inversa, si  $R$  es una relación en  $V$ , entonces  $G(V, R)$  es un digrafo simple.

En unidades anteriores, ya hemos construido digrafos asociados a relaciones de orden parcial, llamados diagramas de Hasse.

**Problema 1.14.**

Figura 1.10: Proceso estocástico



Supongamos que  $G$  es un digrafo simple con  $m$  vértices, y supongamos que los vértices de  $G$  han sido ordenados y son llamados  $v_1, v_2, \dots, v_m$ .

Entonces la *matriz de adyacencia*  $A = (a_{i,j})$  de  $G$  es la una matriz de dimensión  $m \times m$  definida de la siguiente manera

$$a_{i,j} = \begin{cases} 1 & \exists e \in E : e = (v_i, v_j) \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

*Observación 1.12.* Las matrices de adyacencia de un mismo grafo dependen del orden en que se enumeren los vértices. Sin embargo, dos matrices de adyacencia de un mismo grafo están relacionadas por operaciones elementales: cambiar el orden de columnas y renglones.

**Problema 1.15.** Sea  $G$  el siguiente digrafo




Figura 1.11: Construya su matriz de adyacencia del digrafo anterior.

La matriz identidad  $I_m = (I_{i,j})$  de dimensión  $m \times m$  se define como

$$I_{i,j} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j, \end{cases}$$

es decir, es matriz cuadrangular con 1's en la *diagonal principal*, y ceros en cualquier otra entrada.

**Problema 1.16.**

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La propiedad principal de una matriz identidad  $I_m$  es que es neutra respecto a la multiplicación de matrices, es decir, para cualquier otra matriz  $A \in M_n$  :

$$AI_n = I_n A = A.$$

La potencia  $n$ -ésima de una matriz  $A \in M_n$  se define de manera recursiva como

$$A^n = \begin{cases} I_n & n = 0 \\ AA^{n-1} & n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$


Es decir,

$$A^0 = I, A^1 = A, A^2 = AA, \dots$$

Definamos  $a_k(i, j)$  como la entrada en la posición  $i, j$  de  $A^k$ .

**Propiedad 1.2.** Sea  $A$  la matriz de adyacencia de un grafo  $G$ . Entonces  $a_k(i, j)$  es igual al número de caminos de longitud  $k$  que van de  $v_i$  a  $v_j$ .

Ejemplo Consideremos nuevamente el grafo



Recordemos que su matriz de adyacencia es

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{AD})$$

Entonces

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 \\ 5 & 0 & 3 & 5 \\ 3 & 0 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Observe que  $a_2(4, 1) = 1$ , de manera que existe un solo camino de longitud 2 de  $v_4$  a  $v_1$ . De manera similar, como  $a_3(2, 3) = 2$ , entonces existen dos caminos de longitud 3 de  $v_2$  a  $v_3$ .

*Observación 1.13.* Si definimos

$$B_r = \sum_{i=1}^r A^i,$$

entonces la entrada  $i, j$  de esta matriz nos indicará el número de caminos de longitud a lo más  $r$  de  $v_i$  a  $v_j$ .

En nuestro ejemplo, considerando  $A$  dado por (AD), tenemos que

$$B_4 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 3 & 4 \\ 11 & 0 & 7 & 11 \\ 7 & 0 & 4 & 7 \\ 7 & 0 & 4 & 7 \end{pmatrix} \quad (1.1)$$

¿Existe alguna manera de llegar al vertice  $v_2$  desde el vértice  $v_1$ , sin importar la longitud del camino?

### *Matriz de accesibilidad*

Sea  $G = G(V, E)$  un grafo simple dirigido con  $m$  vértices  $v_1, \dots, v_m$ . La *matriz de accesibilidad* de  $G$  es la matriz  $m$ -cuadrangular  $P = (p_{ij})$  definida de la siguiente manera:

$$p_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{existe un camino de } v_i \text{ a } v_j \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

**Propiedad 1.3.** Sea  $A$  la matriz de adyacencia de un grafo  $G$  con  $m$  vértices. Entonces la matriz de accesibilidad y

$$B_m = \sum_{i=1}^m A^i \quad (1.2)$$

tienen exactamente las mismas entradas no nulas.

**Definición 1.5.** Un digrafo es *fuertemente conexo* si para cualquier par de vértices  $u, v$  existe al menos un camino de  $u$  a  $v$  y otro de  $v$  a  $u$ .

**Propiedad 1.4.** Sea  $A \in M_m$  la matriz de adyacencia de un grafo  $G$ . Entonces, las siguientes proposiciones son equivalentes:

1.  $G$  es fuertemente conexo;
2. la matriz de accesibilidad  $P$  no tiene entradas nulas;
3. la matriz  $B_m$ , dada por (1.2), no tiene entradas nulas.

**Problema 1.17.** Para encontrar la matriz de accesibilidad asociada a la matriz de adyacencia  $A$ , dada por (AD), basta sustituir las entradas no nulas en la matriz  $B_4$ , dada por (1.1), por 1's :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$



## 2 Bibliografía

Cárdenas, H. (1973). *Álgebra superior*.