うちの子の専属コーチ｜教材

第6章
体と食

全5講



第6章 体と食

この章の講

6-1	補食のタイミング	おにぎりも練習のうち
6-2	試合の日の食事と水分	いつものごはんでいい
6-3	睡眠と回復	寝るのも練習のうち
6-4	成長期の体と痛み	痛みは体からの連絡
6-5	身長と成長の個人差	今の背は途中の背

6-1

補食のタイミング


おにぎりも練習のうち


こんなこと、ない？

給食から5時間あいた、夕方の練習。

前半は動けるのに、後半で足が止まる。

簡単なパスミスが増えて、集中も切れる。





一言でいうと

後半で動けないのは、根性じゃなくてガス欠。練習の前と後に、ひと口入れておく。

なぜ？

理由は3つ



体が大きくなる途中

成長期は、体を作る分の燃料もいる。3食では足りない日がある。


= 補食



燃料タンクは有限

糖質は筋肉と肝臓にためられる。空くと、後半に切れる。

= グリコーゲン



「何を」より「いつ」

練習の1〜2時間前にひと口。終わったら、できるだけ早くもう一度。

= タイミング

コーチの言葉で言うと

この講で出てくる専門用語

補食

3食で足りない分を、食事の間に足す「食事の一部」。

この講では

かばんのおにぎり1個が、これにあたる。

グリコーゲン

糖質が筋肉と肝臓にたまった形。動くための燃料のタンク。

この講では

給食から時間が空くと、ここが減って後半に切れる。

糖質+たんぱく質

練習後は、糖質だけよりたんぱく質も一緒の方が回復が進む。

この講では

おにぎり+牛乳、バナナ+ヨーグルトのような組み合わせ。

もう一歩深く——バスケの原理

1 練習前は、脂質少なめの糖質

2〜3時間前なら、おにぎり・パン・うどん。1〜2時間前なら、バナナやゼリー飲料。つまり、近いほど消化の速いものを選ぶ。揚げ物や菓子パンは、直前だとお腹に残る。

2 練習後は「回復の窓」

運動のすぐ後に糖質をとると、2時間後より燃料の回復が速いという研究がある。つまり、終わってすぐのひと口が、次の日の疲れを変える。夕食がすぐなら、夕食をしっかりで十分。

3 量は幅で考える

量は体格・練習の強さ・次の食事までの時間で変わる。個人差がある。体重が減り続ける、食欲がない、疲れが抜けない時は、工夫より先に小児科や専門家へ。受診が先。

僕の話

僕はアスリートフードマイスター(3級)の勉強で、

「何を」と同じくらい「いつ」が大事だと知った。

自分は朝ごはんを抜きがちで見直し中。

後半で動けない子の多くは、技術じゃなくて空腹なんだよね。


だから僕は言っている。おにぎり一個も、練習のうち。

祐川良太



動画で見るとこうなる

- 給食から練習まで、5時間くらい空いている。
- 練習の1〜2時間前に、おにぎり1個かバナナ1本。
- 終わってすぐ、牛乳やヨーグルトと一緒に軽い糖質。



NEXT GAME｜次の試合でやること

試合の1〜2時間前に、おにぎり1個かバナナ1本。

終わったあとは、牛乳やヨーグルトと軽い糖質。後半の動きと翌日の疲れが違ったか、話してみる。

親の人へ

練習かばんに、補食が入っているか。

夏は常温で傷みやすいものになっていないか。痛みや不調は我慢させず、続くなら受診が先。

6-2

試合の日の食事と水分

いつものごはんでいい





こんなこと、ない？

日曜の試合。朝は緊張で、食欲がない。

合間はお菓子とスポーツドリンクだけ。

2試合目の後半で足がつって、ミスが出た。





一言でいうと

試合の日は「いつものごはん」でいい。喉が渇いたと思う前に、ひと口ずつ飲んでおく。

なぜ？


理由は3つ



消化を終えてコートへ

3〜4時間前までに、ごはん・パン・麺を中心に。揚げ物は控えめ。


= 主食中心



渇いてからでは遅い

体重の2%の水分が減ると、動きが落ちると言われる。

= 脱水



汗には塩が入っている

汗をかく日は、水だけでは戻りにくい。塩分が少し入った飲み物を。

= 電解質

コーチの言葉で言うと

この講で出てくる専門用語

電解質

汗と一緒に出ていく、ナトリウムなどのミネラル。

この講では

暑い日に、塩分が少し入った飲み物を選ぶ理由。

脱水

体の水分が足りない状態。体重の減りで程度を表す。

この講では

試合の前後に体重を測ると、自分の飲み方の目安が分かる。

WBGT(暑さ指数)

気温・湿度・日差しから出す、熱中症の危険の目安。

この講では

夏の体育館は、外より高くなることがある。

もう一歩深く——バスケの原理

1 1試合目と2試合目の間

2〜3時間空くなら、1試合目のすぐ後に軽い糖質。2試合目の1〜2時間前に、ゼリーや果物を少し。つまり、固形は早めに、近づくほど液体寄りに。

2 水分は「少量をこまめに」

一度にたくさん飲んでも、胃に残って吸収が追いつかない。試合中や合間は、15〜30分ごとにコップ1杯くらいが目安。つまり、量は体格と汗で変わるから、幅で考える。

3 暑さのサインは根性では消えない

足がつる、頭痛、めまい、反応が鈍い。体温が上がったサイン。涼しい場所で休む・飲む・冷やすが先。個人差がある。我慢しない。意識がはっきりしない時は、救急へ。受診が先。

僕の話

僕なら、試合の朝はいつも通りの朝ごはんを食べて、

いつも通りの会話をして送り出す。

特別なメニューより「結果の話をしない」方が大事。

夏の体育館で集中が切れた子に「集中しろ」は意味がない。


休ませる・飲ませる・冷やす方が、よほど効くんだよね。

祐川良太



動画で見るとこうなる

- 朝は主食中心のごはんを、試合の3〜4時間前までに。
- 1試合目のすぐ後に、おにぎりやバナナで回復。
- 合間は15〜30分ごとに、コップ1杯くらいをこまめに。



NEXT GAME｜次の試合でやること

試合の朝と帰ってから、体重を測ってみる。

減りが2%を超えていたら、次は合間に飲む回数を増やす。30kgの子なら約600gが目安。

親の人へ

合間に、少しずつこまめに飲めているか。

暑い日は、飲み物に塩分が入っているか。足がつる・頭痛が続くなら、我慢させず受診が先。

6-3

睡眠と回復

寝るのも練習のうち


こんなこと、ない？

「もっと上手くなるには?」と思う。

でも部活と塾で、寝るのは23時すぎ。

朝練の日は6時起き。最近、ケガが増えた気がする。





一言でいうと

上手くなるのは、練習している時じゃなくて寝ている間。練習を足す前に、寝る時間を30分早める。

なぜ？


理由は3つ



寝ている間に作られる

骨や筋肉を作るホルモンは、夜の深い眠りの時に多く出る。


= 成長ホルモン



足りないとケガが増す

8時間未満の中高生は、ケガが約1.7倍だったという研究がある。

= 睡眠時間



画面が眠りを遅らせる

寝る前のスマホの光は、眠くなるホルモンを減らす。

= メラトニン

コーチの言葉で言うと

この講で出てくる専門用語

成長ホルモン

骨や筋肉の成長・修復に関わるホルモン。夜の深い眠りで多く出る。

この講では

練習の刺激が体になるのは、寝ている間。

メラトニン

眠気を起こすホルモン。強い光、特に青い光で減る。

この講では

寝る前1時間の画面を手放すと、寝つきが早くなりやすい。

睡眠時間の目安

小学生9〜12時間、中高生8〜10時間(厚労省の目安)。

この講では

最低ラインではなく、不足を防ぐ参考の幅。個人差がある。

もう一歩深く——バスケの原理

1 睡眠を増やしたら数字が変わった

大学のバスケ選手が5〜7週間、長く寝た研究がある。フリースローも3Pもスプリントも良くなった。つまり、睡眠は技術の数字に直結する。ただし大学生11人の研究で、小中学生にそのまま当てはめない。

2 練習時間には上限の目安がある

国の目安は、中学生で平日2時間・休日3時間くらい、週2日以上の休み。週16時間を超えるとケガが増えやすいという提言もある。つまり、足す前に今の合計を書き出してみる。

3 休日の寝だめはサイン

休日に平日より2時間以上長く寝るなら、平日が足りていない。個人差がある。日中の強い眠気や痛みは我慢しない。続くなら受診が先。

僕の話

僕自身、若い頃は「寝る時間がもったいない」と本気で思っていた。

休まず追い込みすぎて、体を壊したことがある。

あの時に学んだのは、「頑張る」と「無理する」は別物だということ。


睡眠と食事は、家庭がいちばん関われる場所なんだよね。

祐川良太



動画で見るとこうなる

- 帰宅19:30、夕食、お風呂。21:30に画面を手放す。
- 22:00に寝て6:30に起きると、8時間半。
- 画面オフを30分早めると、寝るのも30分早くなる。



NEXT GAME｜次の試合でやること

試合前の3日間だけ、寝る時間を30分早める。

画面を手放す時間を30分早めるだけでいい。後半の動きと翌日の疲れを、話してみる。

親の人へ

寝る時間が、少しずつ後ろにずれていないか。

休日に平日より2時間以上長く寝ていないか。痛みや強い眠気が続くなら、受診が先。

6-4

成長期の体と痛み

痛みは体からの連絡


こんなこと、ない？

身長が伸び始めてから、膝の下が痛い。

「成長痛だから大丈夫」と言われた。

でも正座ができなくて、階段で顔をしかめる。






一言でいうと

痛いって言うのは、弱いことじゃない。体からの連絡。早く言った方が、早くコートに戻れる。

なぜ？

理由は3つ



骨が先に伸びる

骨が先に伸び、筋肉や腱が追いつくまで時間差がある。


= 骨端線(成長軟骨)



引っ張られる所が痛む

膝の下・かかと・腰。腱がつく場所に、着地の負担が重なる。

= 骨端症



やりすぎると増える

週の練習が長いほど、痛みが出る確率は上がる。

= オーバーユース

コーチの言葉で言うと

この講で出てくる専門用語

骨端線(成長軟骨)

子どもの骨の端にある、骨が伸びる軟骨の層。大人の骨より弱い。

この講では

ここに繰り返し力がかかると、痛みが出やすい。

オスグッド病・シーバー病

膝のお皿の下が痛むのがオスグッド。かかとが痛むのがシーバー。

この講では

名前を知っておくだけで十分。判断は医師がする。

「成長痛」とは別物

医学でいう成長痛は、夜に痛んで朝に消え、腫れがないもの。

この講では

運動中の痛みに「成長痛だから」は当てはめられない。

もう一歩深く——バスケの原理

1 受診の目安

2週間以上続く。片脚だけ、いつも同じ場所。腫れや熱がある。朝も痛い。足を引きずる。つまり、どれか一つでも整形外科へ。この教材は診断をしない。

2 出場の判断を家だけで決めない

「痛いけど出たい」の気持ちは大事。でも、出るかどうかは医師の診察のあとで。つまり、長い目で見れば、それが競技人生を守る。

3 家でできる範囲

痛い動きを無理に続けない。お風呂と睡眠と食事で土台を整える。ストレッチで痛むなら、無理に伸ばさない。個人差がある。痛みは我慢しない。受診が先。

僕の話

僕は指導者で医師じゃないから、体のことは断定しない。

決めているのは一つだけ。痛みは我慢しない。受診が先。

そこで気合や我慢を求めるのは、技術の指導でも育成でもない。

アキレス腱を切った経験から、違和感の段階で止める価値を知っているんだよね。

祐川良太



動画で見るとこうなる

- 痛みが出やすいのは、膝のお皿の下・かかとの後ろ・腰。
- 階段や正座、片脚ジャンプで、顔をしかめていないか。
- どれか一つでも当てはまれば、整形外科へ。

NEXT GAME｜次の試合でやること

試合前のアップで「今日、気になるところある?」と一言聞く。

「ない」でも「ある」でもいい。聞かれること自体が「言っていい」のサインになる。

親の人へ

「痛い」「重い」を口にした時に、我慢させていないか。

言葉にしなくても、階段・正座・片脚ジャンプで顔をしかめていないか。気になれば受診が先。

6-5

身長と成長の個人差

今の背は途中の背

こんなこと、ない？

同じ学年に、20cm近く大きい子がいる。

リバウンドもシュートも、届かない。

「どうせ小さいから」と、動きまで小さくなる。





一言でいうと

小6の背は、大人の背じゃない。今できるのは、先に動くこと。

なぜ？

理由は3つ



伸びる時期に幅がある

一番伸びるのは女子9〜11歳、男子11〜13歳が目安。


= PHV(成長スパート)



小6の差は順番の差

男子は11〜17歳で平均約24cm伸びる。多くは中学の間。

= 最終身長



生まれ月で約1年違う

4月生まれと3月生まれは、同じ学年でも体の年齢が違う。

= 相対年齢効果

コーチの言葉で言うと

この講で出てくる専門用語

PHV

1年で身長が一番伸びる年齢。その前後が成長スパート。

この講では

小6の教室には、終わりかけの子と、まだの子が同時にいる。

早熟・晩熟

PHVが平均より1年くらい早い子と、遅い子。

この講では

早いと今は有利。でも、伸び代は小さくなる傾向がある。

相対年齢効果

同じ学年の生まれ月の差が、成績や出場機会に影響すること。

この講では

体格の差を「実力の差」と思い込むことが、本当のリスク。

もう一歩深く——バスケの原理

1 今大きい子にもリスクがある

成長の真っ最中は、動きがぎこちなくなり、ケガも増えやすい。体のサイズに頼るプレーが身につくと、周りが追いついた時に差が消える。つまり、時期で課題が違うだけ。

2 今小さい子が身につけやすいこと

体格に頼れないぶん、もらいに行く動き、スペースを見る目、先に動く準備。つまり、次の試合までに変えられるものは残っている。

3 測ると不安が減る

3〜4か月に1回、身長を記録する。年に7〜10cm近く伸び始めたらスパートの入り口。個人差があり、予測は目安。伸びが極端に少ない・体重が減り続ける時は小児科へ。痛みは我慢しない。受診が先。

僕の話

身長は大きな要素。そこはごまかさない方がいい。


でも変えられないものだけを敗因にすると、

子どもは何をすればいいか分からなくなる。

リバウンド、ルーズボール、走る、声を出す、先に動く。

生まれ月も同じ。一気に追いつく子を何人も見てきたんだよね。

祐川良太



動画で見るとこうなる

- 早い子は11歳ごろ伸びて14歳で止まる。遅い子は15歳ごろ伸びる。
- でも18歳での差は、小6の時よりずっと小さい。
- 小6の身長差は、スパートが来た「順番」の差。

NEXT GAME｜次の試合でやること

体格に関係なくできる「動作の約束」を1つ決める。

例えば「シュートが上がったら最初に相手に触れる」。できたかを、身長や得点とは別に振り返る。

親の人へ

「小さいから」が、動かない理由になり始めていないか。

身長を年に3〜4回記録して、「伸びている途中」を事実として共有できているか。

もっと知りたい人へ

この章の元になった資料(1/3)

・日本スポーツ協会『発育期のスポーツ活動ガイド』(2021)「栄養を十分にとる」: https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/supoken/doc/ltld/ltld_guide_20210331.pdf

・JISS 女性アスリート育成・支援プロジェクト「思春期アスリートの補食の方法」: https://female-sport.jpnsport.go.jp/article/2013/

・稲井真ほか「糖質摂取のタイミングの違いが運動後の筋グリコーゲン回復率に及ぼす影響」日本スポーツ栄養研究誌 vol.10(2017): https://www.jsna.org/cms/wp-content/uploads/2022/12/10-p48-57.pdf

・国立スポーツ科学センター(JISS)『競技者のための暑熱対策ガイドブック』5章「暑熱環境下における水分補給」: https://www.jpnsport.go.jp/hpsc/Portals/0/resources/jiss/jigyou/pdf/shonetsu-24-43pp.pdf

・日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防」(ガイドブック・WBGT運動指針): https://www.japan-sports.or.jp/medicine/heatstroke/tabid523.html

・環境省「熱中症環境保健マニュアル」各論8 運動・スポーツ活動: https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/sg_pcm/R0603/ref06.pdf

もっと知りたい人へ

この章の元になった資料(2/3)

・厚生労働省『健康づくりのための睡眠ガイド2023』(小学生9〜12時間、中高生8〜10時間): https://www.mhlw.go.jp/content/001305530.pdf

・Milewski MD ほか(2014)「Chronic lack of sleep is associated with increased sports injuries in adolescent athletes」J Pediatr Orthop: https://www.ovid.com/jnls/pedorthopaedics/fulltext/10.1097/bpo.0000000000000151~chronic-lack-of-sleep-is-associated-with-increased-sports

・Mah CD ほか(2011)「The effects of sleep extension on the athletic performance of collegiate basketball players」SLEEP: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3119836/

・日本整形外科学会「症状・病気をしらべる」膝関節(オスグッド病 ほか): https://www.joa.or.jp/public/sick/body/knee.html

・日本スポーツ整形外科学会「スポーツ損傷シリーズ 1. オスグッド病」: https://jsoa.or.jp/content/images/2025/12/S-01.pdf

・JBA『中学校部活動におけるバスケットボール指導の手引き』(成長期の柔軟性低下と痛み/練習時間とけがの関係): https://www.japanbasketball.jp/wp-content/uploads/Bukatsu-compressed_2018110.pdf

もっと知りたい人へ

この章の元になった資料(3/3)

・日本スポーツ協会『発育期のスポーツ活動ガイド』(2021)「成長を理解する」(PHV年齢・相対年齢効果・早熟の伸び代): https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/supoken/doc/ltld/ltld_guide_20210331.pdf

・文部科学省『令和5年度学校保健統計(確定値)』(年齢別平均身長): https://www.mext.go.jp/content/20241127-mxt_chousa02-000038854_1.pdf

・石川峻・村上佳司「ミニバスケットボール選手における相対的年齢効果についての検討」発育発達研究(2022): https://www.jstage.jst.go.jp/article/hatsuhatsu/2022/93/2022_45/_article/-char/ja/