

3. Gamma Function

29 November 2023 10:06

GAMMA FUNCTION $\Gamma(n)$

$\Gamma(n)$ is defined as:

$$\Gamma(n) = \int_0^{\infty} e^{-x} x^{n-1} dx$$

where 'n' is either +ve real no.
OR
-ve non-integer

Evaluating $\Gamma(1)$ by definition

$$\begin{aligned}\Gamma(1) &= \int_0^{\infty} e^{-x} x^0 dx \\ &= \int_0^{\infty} e^{-x} dx \\ &= [-e^{-x}]_0^{\infty} \\ &= -(0 - 1)\end{aligned}$$

$$\Gamma(1) = 1$$

RECURSIVE FORMULA FOR Γ

To prove: $\Gamma(n) = (n-1)\Gamma(n-1)$

$$\begin{aligned}\Gamma(n) &= \int_0^{\infty} \underbrace{e^{-x}}_v \underbrace{x^{n-1}}_u dx \\ &= \left[x^{n-1} (-e^{-x}) \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} (-e^{-x}) (n-1) x^{n-2} dx \\ &= 0 + (n-1) \int_0^{\infty} e^{-x} \cdot x^{(n-1)-1} dx\end{aligned}$$

$$\Gamma(n) = (n-1)\Gamma(n-1)$$

Case (1): When n is positive

$\Gamma(1) = 1, \Gamma(2) = 1, \Gamma(3) = 2, \Gamma(4) = 6, \Gamma(5) = 24, \dots$

Case ①: When n is positive

$$\Gamma(n) = (n-1)(n-2) \dots (1)\Gamma(1)$$

$$\boxed{\Gamma(n) = (n-1)!}$$

Case ②: When n is +ve fraction

$$\boxed{\Gamma(n) = (n-1)(n-2) \dots (x)\Gamma(x)}$$

where $0 < x < 1$

$$\boxed{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}}$$

Case ③: When $n = 0$

$$\Gamma(n) = (n-1)\Gamma(n-1)$$

$$\Gamma(n-1) = \frac{\Gamma(n)}{n-1}$$

Put $n=1$

$$\Gamma(0) = \frac{1}{0} = \infty$$

$$\boxed{\Gamma(0) = \text{not defined}}$$

Case ④: When n is negative

Using above formula,

$$\Gamma(-1) = \frac{\Gamma(0)}{-1} = -\infty$$

$$\boxed{\Gamma(n) = \text{not defined when } n = 0, -1, -2 \dots}$$

Case ⑤: When n is negative fraction

$$\Gamma(n-1) = (n-1)\Gamma(n-1)$$

Putting n as $n+1$

$$\Gamma(n+1) = (n)\Gamma(n)$$

$$\boxed{\Gamma(1) = 1, \Gamma(2) = 1, \dots}$$

$$\Gamma(n+1) = n \Gamma(n)$$

$$\Gamma(n) = \frac{\Gamma(n+1)}{n}$$

$$\Gamma\left(-\frac{11}{4}\right) = \frac{\Gamma\left(-\frac{7}{4}\right)}{-\frac{11}{4} \times -\frac{7}{4} \times -\frac{3}{4}}$$

Final value b/w 0 and 1

RESULTS

Prove that

$$\int_0^{\infty} x^n e^{-ax^m} dx = \frac{1}{m} \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{m}\right)}{a^{\frac{n+1}{m}}}$$

Where m is +ve.

$$I = \int_0^{\infty} e^{-ax^m} x^n dx$$

$$t = ax^m$$

$$\Rightarrow x^m = \frac{t}{a}$$

$$x = \left(\frac{t}{a}\right)^{\frac{1}{m}}$$

$$dx = \frac{1}{m} \left(\frac{t}{a}\right)^{\frac{1}{m}-1} \cdot \frac{dt}{a}$$

When $x=0, t=0$
 $x=\infty, t=\infty$

$$I = \int_0^{\infty} e^{-t} \left(\left(\frac{t}{a}\right)^{\frac{1}{m}}\right) \cdot \frac{1}{m} \left(\frac{t}{a}\right)^{\frac{1}{m}-1} \frac{dt}{a} = \frac{1}{m} \cdot \frac{1}{a^{\frac{n+1}{m}}} \int_0^{\infty} e^{-t} t^{\frac{n+1}{m}-1} dt$$

$$\int_0^{\infty} e^{-ax^m} x^n dx = \frac{1}{m} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{m}\right)}{a^{\frac{n+1}{m}}}$$

Proved

Put $m=1$

$$\int_0^{\infty} e^{-ax} x^n dx = \frac{\Gamma(n+1)}{a^{n+1}}$$

Putting $n+1$ as n ,

Putting $n+1$ as n ,

$$\Gamma(n) = a^n \int_0^{\infty} e^{-ax} x^{n-1} dx$$

→ Second definition of $\Gamma(n)$

Put $m = 2$

$$\int_0^{\infty} e^{-ax^2} x^n dx = \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{a^{\frac{n+1}{2}}}$$

Putting $n+1$ as n ,

$$\Gamma(n) = 2a^n \int_0^{\infty} e^{-ax^2} x^{n-1} dx$$

→ Third definition of $\Gamma(n)$

Put $a=1$

$$\Gamma(n) = 2 \int_0^{\infty} e^{-x^2} x^{n-1} dx$$

→ Fourth definition of $\Gamma(n)$