

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE FİNAL SINAVI ÖZETİ

Bu özet, Dr. Öğr. Üyesi S. Pınar Mehel Tutuk'un sunumlarından derlenmiş; sınavda çıkabilecek tüm kritik detayları içeren kapsamlı bir çalışma kılavuzudur.

1. ESRAR KULLANIM BOZUKLUĞU

Genel Bilgiler:

- Tanım:** Hint keneviri bitkisinin (Cannabis) baş kısmı, tohumu ve yapraklarının kurutulmasıyla elde edilir.
- Aktif Bileşen:** THC (Tetrahidrokanabinol).
- Tarihçe:** Kenevir bitkisi ilk kez **1543** yılında tanımlanmıştır.
- Sokak İsimleri:** Ot, marihuana, weed, mary jane.
- Özellik:** Dünyada en çok kullanılan psikoaktif maddedir.

Vücuda Etkileri:

- Fiziksel:** Kalp atışında ve kan basıncında artış, damar genişlemesi, **gözlerde kızarma**, iştah artışı.
- Psikolojik:** Öfori, rahatlama, zaman algısının bozulması, paranoya, anksiyete.
- Kanda Tespit:** Kanda yaklaşık **1 hafta** kalır, ancak **yağ dokusunda** depolandığı için idrar ve kan testlerinde **2 aya kadar** tespit edilebilir.

Kritik Detaylar (Sınavda Çıkabilir):

- Apati:** Esrar kullanımında görülen en belirgin sorunlardan biridir (ilgisizlik/duygusuzluk).
- Bilişsel Hasar:** Odaklanma, plan yapma, konuşma ve yazmada zorluk görülür.
- Esrar Demansı:** Uzun süreli yüksek doz kullanımı sonucu oluşan ciddi beyin hasarıdır.
- Bipolar Riski:** Yaşam boyu esrar kullanımı bipolar riskini **5 kat** artırır.

2. EROİN KULLANIM BOZUKLUĞU

Genel Bilgiler:

- Tanım:** Haşhaş bitkisinden elde edilen morfinin sentezlenmesiyle oluşan **yarı sentetik** bir opiyattır.
- Etki:** 4-6 saat sürer. Merkezi sinir sistemini yavaşlatır (solunum yavaşlaması ölüme yol açabilir).
- Kullanım Şekilleri:** Sigara ucu, alüminyum folyoda soluma (yaygın), damara enjekte etme (IV).

Tedavi ve Arınma:

- Suboxone:** Dil altı tableti (Yutulursa etki etmez).

- **HAP (Hızlandırılmış Arınma Programı):** 4 gece 5 günlük yatarak tedavi.
- **Naltrekson İmplant (Çip):** Opioid antagonistidir. Etki süresi **3 aydır**. Tam iyileşme (temiz kalma) süresi için en az **4 implant (1 yıl)** önerilir.

Bağımlı Yakınlarına Tavsiyeler (Önemli!):

- Bağımlı kişiyle **bağımlılık dışında** da bir ilişki geliştirilmelidir.
- Geçmişe değil, **geleceğe** ve şu ana odaklanılmalıdır.
- "Madde kullandın mı?" diye sık sık sormak tetikleyicidir (kaymaya yol açabilir).
- **YEDAM** (Yeşilay Danışmanlık Merkezleri) ücretsiz terapi desteği sağlar.

3. UYARICI MADDELER

Türleri ve Farkları:

- **Doğal Uyarıcılar:** Kokain, Kafein.
- **Sentetik Uyarıcılar:** Amfetaminler, Metamfetamin, MDMA (Ecstasy).
- **Spesifik Maddeler:**
 - **Teobromin:** Kakao ve çikolatada bulunur.
 - **Efedrin:** Astım tedavisinde kullanılır, sinir sistemini uyarır.
 - **Metamfetamin (Kristal):** Kalıcı beyin hasarına neden olan en tehlikeli uyarıcılardandır.

Etkiler:

- **Kısa Vadeli:** Enerji artışı, iştah bastırma, yüksek özgüven.
- **Uzun Vadeli:** Kalp hastalıkları, karaciğer hasarı (siroz), bilişsel bozukluklar.

4. TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

Adım Adım Bağımlılık:

1. **Deneysel:** Merakla deneme.
2. **Sosyal:** Gruba dahil olmak için kullanma.
3. **Operasyonel:** Sorunlardan kaçmak veya zevk almak için kullanma.
4. **Bağımlı:** Sebepsiz, kontrolsüz kullanım.

Ergonomi ve Sağlık:

- **Ekran Uzaklığı:** 46-76 cm.
- **Masa Yüksekliği:** 72-75 cm.
- **Zararlar:** İçer dönüklük, sosyal kaygı, **kuru gözler**, baş ve sırt ağrıları.

Korunma Önerileri:

- **Dış Durdurucu Kullanın:** İnternet kullanımı sonrasına yapılması zorunlu bir iş planlayın.
- **Zıt Saatler:** Kullanım zamanını ve mekanını tam zıt saatlere kaydırın (alışkanlık kırma).
- **Hatırlatıcı Kartlar:** Kayıpları hatırlatan notlar asın.

5. BULAŞICI HASTALIKLAR VE KOMPLİKASYONLAR

Riskli Davranışlar: Ortak enjektör kullanımı, yüksek riskli cinsel davranışlar, kötü hijyen.

Enfeksiyon Türleri:

- **Cinsel Yolla Bulaşan:** HIV (AIDS), Hepatit B/C, Gonore (Bel soğukluğu), Sifiliz (Frengi).
- **Solunum Yolu: Aspirasyon pnömonisi** (bağımlılarda en yaygın akciğer sorunu).
- **Deri Enfeksiyonları:** Apse, selülit, **Puffy Hand (şişmiş el) sendromu**.

Kritik Terimler:

- **Speedball:** Eroin ve kokainin karıştırılarak uygulanmasıdır; deri enfeksiyonu riskini çok artırır.
- **Endokardit:** Kalp iç zarı iltihabı; damar yoluyla madde kullananlarda en tehlikeli komplikasyonlardandır.
- **SPE (Septik Pulmoner Emboli):** Nadir ama tedavisi zor bir akciğer enfeksiyonudur.

Sağlık Personeli Yaklaşımı:

- **Zarar Azaltma:** Maddeyi bırakamayanlar için enjektör temizliği ve ortak kullanmama eğitimi verilmelidir.
- **Bütüncül Yaklaşım:** Birey sadece fiziksel değil; sosyal ve ruhsal olarak da değerlendirilmelidir.

Sınav Tüyosu: Bağımlılık bir "iradesizlik" değil, kronik bir **BEYİN HASTALIĞI**dır. Tedavi süreci Tıbbi Tedavi, Psikososyal Destek ve Sosyal Rehabilitasyon olmak üzere 3 ana adımdır.