

Cônes et cylindres

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiques

Coniques et
quadriques

M53 - Partie 3

novembre 2015

Cônes et cylindres

Cône

Cylindre

Courbes de niveaux

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiquesConiques et
quadriques

Soient \mathcal{E} un espace affine sur \mathbb{R} et $O \in \mathcal{E}$.

Définition

Un ensemble \mathcal{C} est dit **cône de centre** $O \in \mathcal{C}$ si pour tout $M \in \mathcal{C} \setminus \{O\}$, \mathcal{C} contient la droite $\langle O, M \rangle$. Et on dit que \mathcal{C} est de **base** $\mathcal{B} \subset \mathcal{C}$ si pour tout $M \in \mathcal{C} \setminus \{O\}$, $\text{card}(\langle O, M \rangle \cap \mathcal{B}) = 1$.

Définition-Proposition

Soient $O \in \mathcal{E}$ et $\mathcal{F} \subset \mathcal{E}$ non vide, on dit que \mathcal{C} est **le cône de centre** O **engendré par** \mathcal{F} si l'une des conditions équivalentes suivantes est satisfaite :

- 1 \mathcal{C} est le plus petit cône de centre O contenant \mathcal{F} .
- 2 $\mathcal{C} = \bigcup_{M \in \mathcal{F}} \langle O, M \rangle$.
- 3 $\mathcal{C} = \bigcup_{\lambda \in \mathbb{R}} H_{O,\lambda}(\mathcal{F})$, où $H_{O,\lambda}$ est l'homothétie de centre O et de rapport λ .

Cônes et cylindres

Cône

Cylindre

Courbes de niveaux

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiquesConiques et
quadriques

On se place dans \mathbb{R}^3 , vu comme espace affine.

Définition-Proposition

Le cône standard \mathcal{C} de \mathbb{R}^3 est défini par l'une des conditions équivalentes :

- 1** $\mathcal{C} = \{x^2 + y^2 = z^2\} = \{x^2 + y^2 - z^2 = 0\}.$
- 2** \mathcal{C} est le cône de centre 0 engendré par le cercle $\{x^2 + y^2 = 1, z = 1\}.$
- 3** \mathcal{C} est l'ensemble obtenu par la rotation autour de l'axe Oz de la droite vectorielle $\{x = z, y = 0\}.$

Les intersections du cône standard avec les hyperplans non vectoriels sont les **coniques** (**ellipses**, **paraboles** et **hyperboles**, éventuellement dégénérées en des droites ou en un point) qui vont être l'objet d'étude de cette troisième partie du cours.

Cônes et cylindres

Cône

Cylindre

Courbes de niveaux

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiquesConiques et
quadriques

- 1 L'espace tout entier \mathbb{R}^n est un cône de centre 0 et de base « la moitié » de la sphère \mathbb{S}^{n-1} .
- 2 Toute réunion d'espaces vectoriels est un cône de centre 0.
- 3 $\mathcal{C} = \{x^2 = yz\}$ est un cône de centre 0 et de base l'ellipse $\{x^2 + (y-1)^2 = 1, y+z=2\}$.
- 4 Les images directes et inverses d'un cône par des applications affines sont des cônes.

Définition d'un cylindre

Cônes et cylindres

Cône

Cylindre

Courbes de niveaux

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiquesConiques et
quadriques

Soient \mathcal{E} un espace affine et $\vec{\mathcal{F}} \subset \vec{\mathcal{E}}$ un sous-espace vectoriel de directions.

Définition

Un ensemble non vide \mathcal{C} est dit **cylindre de direction $\vec{\mathcal{F}}$** si pour tout $M \in \mathcal{C}$, \mathcal{C} contient le sous-espace affine $M + \vec{\mathcal{F}}$. Et on dit que \mathcal{C} est de **base $\mathcal{B} \subset \mathcal{C}$** si pour tout $M \in \mathcal{C}$, $\text{card}((M + \vec{\mathcal{F}}) \cap \mathcal{B}) = 1$.

Le plus souvent la direction $\vec{\mathcal{F}}$ est une droite.

Définition-Proposition

Soient $\vec{\mathcal{F}} \subset \vec{\mathcal{E}}$ un sous-espace vectoriel de directions, et $\mathcal{B} \subset \mathcal{E}$ non vide, on dit que \mathcal{C} est **le cylindre de direction $\vec{\mathcal{F}}$ engendré par \mathcal{B}** si l'une des conditions équivalentes suivantes est satisfaite :

- 1 \mathcal{C} est le plus petit cylindre de direction $\vec{\mathcal{F}}$ contenant \mathcal{B} .
- 2 $\mathcal{C} = \bigcup_{M \in \mathcal{B}} (M + \vec{\mathcal{F}})$.
- 3 $\mathcal{C} = \bigcup_{\vec{v} \in \vec{\mathcal{F}}} T_{\vec{v}}(\mathcal{B})$, où $T_{\vec{v}}$ est la translation par le vecteur \vec{v} .

Cônes et cylindres

Cône

Cylindre

Courbes de niveaux

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiquesConiques et
quadriques

On se place dans \mathbb{R}^3 , vu comme espace affine.

Définition-Proposition

Le cylindre standard \mathcal{C} de \mathbb{R}^3 est défini par l'une des conditions équivalentes :

- 1** $\mathcal{C} = \{x^2 + y^2 = 1\}$.
- 2** \mathcal{C} est le cylindre de direction Oz engendré par le cercle $\{x^2 + y^2 = 1, z = 0\}$.
- 3** \mathcal{C} est l'ensemble obtenu par la rotation autour de l'axe Oz de la droite vectorielle $\{x = 1, y = 0\}$.

L'intersection du cylindre standard avec un hyperplan est une ellipse, deux droites, une droite, ou bien vide.

Cônes et cylindres

Cône

Cylindre

Courbes de niveaux

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiquesConiques et
quadriques

Soit une application $f: A \rightarrow B$ entre ensembles.

Définition

Soit $k \in B$, l'ensemble $\mathcal{L}_k = f^{-1}(\{k\})$ est appelé **la courbe de niveau k** de f . On peut également l'appeler **la ligne de niveau k** ou **l'ensemble de niveau k** de f , et des notations alternatives sont $\mathcal{L}_k(f)$ ou $\mathcal{L}_{f,k}$.

La terminologie «courbe de niveau» prend tout son sens quand $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est différentiable et k une valeur régulière.

Cônes et cylindres

Cône

Cylindre

Courbes de niveaux

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiquesConiques et
quadriques

- 1 Pour $f(x, y) = x^2 + y^2$, \mathcal{L}_k est un cercle, un point, ou vide, selon que k soit positif (valeur régulière), nul ou négatif.
- 2 Pour $f(x, y) = ax + by$, avec $(a, b) \neq (0, 0)$, les \mathcal{L}_k sont les droites affines de direction la droite vectorielle \mathcal{L}_0 .
- 3 Plus généralement tout ensemble défini par des équations $\{x \in \mathcal{E} \mid f_1(x) = b_1, \dots, f_p(x) = b_p\}$ est la courbe de niveau (b_1, \dots, b_p) de l'application $f(x) = (f_1(x), \dots, f_p(x))$.

Cônes et cylindres

Cône

Cylindre

Courbes de niveaux

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiquesConiques et
quadriques

Proposition

Soit un isomorphisme $\phi : A \xrightarrow{\sim} B$ et $f : A \rightarrow C$, alors l'image de $\mathcal{L}_k(f)$ par ϕ est $\mathcal{L}_k(f \circ \phi^{-1})$.

Exemples :

- 1 Soit $\phi : \mathbb{R}^2 \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^2$ définie par $\phi(x, y) = (ax, by)$. Alors l'image du cercle unité par ϕ est l'ellipse d'équation $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$.
- 2 Soit $\phi : \mathbb{R}^2 \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^2$ définie par $\phi(x, y) = (x - y, x + y)$.
 - 1 $\phi(\{x^2 + y^2 = 1\}) = \{x^2 + y^2 = 2\}$.
 - 2 $\phi(\{ax + by = 1\}) = \{x(a - b) + y(a + b) = 2\}$.
- 3 Soit $\phi : \mathbb{R}^3 \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^3$ définie par $\phi(x, y, z) = (x, z - y, z + y)$. Alors l'image du cône standard est le cône d'équation $\{x^2 = yz\}$.

Cônes et cylindres

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiquesConiques et
quadriques

Définition-Proposition

Soit \mathcal{E} un plan affine euclidien. Un sous-ensemble E est dit une *ellipse* s'il satisfait une des conditions équivalentes :

- 1 Dans un repère orthonormé, E est défini par une équation cartésienne de la forme $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$, où les constantes $a \geq b > 0$ sont appelées *les rayons*.
- 2 Il existe deux points F_1 et F_2 à distance $d(F_1, F_2) = 2c$, appelés *foyers*, et $a > c$ tels que $E = \{M \in \mathcal{E} \mid d(F_1, M) + d(M, F_2) = 2a\}$.
- 3 Soit E est un cercle, soit il existe une droite \mathcal{D} , appelée *la directrice*, un point $F \notin \mathcal{D}$, appelé *foyer*, et $\varepsilon \in]0, 1[$, appelé *excentricité*, tels que $E = \{M \in \mathcal{E} \mid d(F, M) = \varepsilon d(M, \mathcal{D})\}$.

D'autres définitions équivalentes d'une ellipse existent.

Si $d(F, \mathcal{D}) = h$, alors on a les relations entre les paramètres : $a^2 = c^2 + b^2$, $\varepsilon^2 = 1 - \left(\frac{b}{a}\right)^2$, et $(a - c) = \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} h$.

Cônes et cylindres

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiquesConiques et
quadriques

- 1 Toute ellipse possède un unique point de symétrie centrale, appelé **le centre** de l'ellipse.
- 2 Toute ellipse qui n'est pas un cercle admet exactement 2 axes de symétrie orthogonaux qui se coupent dans le centre.
- 3 Les cercles ont une infinité d'axes de symétrie : toute droite qui passe par le centre en est un.
- 4 L'image par un isomorphisme (resp. similitude, resp. isométrie) affine d'une ellipse est une ellipse (resp. de même excentricité, resp. de mêmes rayons).

Cônes et cylindres

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiquesConiques et
quadriques

Définition-Proposition

Soit \mathcal{E} un plan affine euclidien. Un sous-ensemble P est dit une **parabole** s'il satisfait une des conditions équivalentes :

- 1 Dans un repère orthonormé, P est défini par une équation cartésienne de la forme $x^2 = 2py$ avec $p > 0$.
- 2 Il existe une droite \mathcal{D} , appelée **la directrice**, et un point $F \notin \mathcal{D}$, appelé le **foyer**, tels que $P = \{M \in \mathcal{E} \mid d(F, M) = d(M, \mathcal{D})\}$.

Les deux conditions sont reliées par l'équation $d(F, \mathcal{D}) = p$.

Au vu de la deuxième condition, on dit que l'excentricité d'une parabole est $\varepsilon = 1$.

Cônes et cylindres

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiquesConiques et
quadriques

- 1 Les paraboles n'ont pas de centre de symétrie.
- 2 Toute parabole admet un unique axe de symétrie. Il est orthogonal à la directrice et passe par le foyer.
- 3 L'image par un isomorphisme affine d'une parabole est une parabole.

Définition d'une hyperbole

Cônes et cylindres

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiquesConiques et
quadrriques

Définition-Proposition

Soit \mathcal{E} un plan affine euclidien. Un sous-ensemble H est dit une **hyperbole** s'il satisfait une des conditions équivalentes :

- 1 Dans un repère orthonormé, H est défini par une équation cartésienne de la forme $\left(\frac{x}{a}\right)^2 - \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$ avec $a > 0$ et $b > 0$.
- 2 Il existe deux points F_1 et F_2 à distance $d(F_1, F_2) = 2c$, appelés **foyers**, et $a \in]0, c[$ tels que $H = \{M \in \mathcal{E} \mid |d(F_1, M) - d(M, F_2)| = 2a\}$.
- 3 Il existe une droite \mathcal{D} , appelée la **la directrice**, un point $F \notin \mathcal{D}$, appelé **foyer**, et $\varepsilon \in]1, \infty[$, appelée **excentricité**, tels que $H = \{M \in \mathcal{E} \mid d(F, M) = \varepsilon d(M, \mathcal{D})\}$.

D'autres définitions équivalentes d'une hyperbole existent.

Si $d(F, \mathcal{D}) = h$, alors on a les relations entre les paramètres : $c^2 = a^2 + b^2$, $\varepsilon^2 = 1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2$, et $(c - a) = \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} h$.

Cônes et cylindres

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiquesConiques et
quadriques

- 1 Il existe un repère (pas forcément orthonormé, ni même orthogonal) dans lequel l'équation de l'hyperbole est $xy = 1$. Autrement dit c'est la graphe de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$.
- 2 Toute hyperbole possède un unique point de symétrie centrale, appelé **le centre** de l'hyperbole.
- 3 Toute hyperbole admet 2 axes de symétrie orthogonaux qui se coupent dans le centre.
- 4 Les deux droites d'équations $\frac{x}{a} \pm \frac{y}{b} = 0$ sont appelées **les asymptotes** de l'hyperbole $\left\{ \left(\frac{x}{a}\right)^2 - \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1 \right\}$.
- 5 L'image par un isomorphisme (resp. similitude, resp. isométrie) affine d'une hyperbole est une hyperbole (resp. de même excentricité, resp. de mêmes excentricité et distance entre les foyers).

Cônes et cylindres

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiquesConiques et
quadriques

Étant donnée une forme quadratique Q de rang r sur un espace vectoriel euclidien $\vec{\mathcal{E}}$ de dimension n , il existe une b.o.n dans laquelle

$Q(\vec{v}) = \lambda_1 x_1^2 + \cdots + \lambda_r x_r^2$, où (x_1, \dots, x_n) sont les coordonnées de \vec{v} dans cette b.o.n., et $\lambda_i \neq 0, \forall i = 1, \dots, r$.

Si on note Q' la restriction de Q sur l'espace $\vec{\mathcal{F}}$ engendré par les r premiers vecteurs de cette b.o.n., alors

- $\vec{\mathcal{F}} = (\text{Ker } Q)^\perp$;
- Q' est non dégénéré sur $\vec{\mathcal{F}}$;
- La courbe de niveau $\mathcal{L}_k(Q)$ est un cylindre de direction $\text{Ker } Q$ et de base $\mathcal{L}_k(Q') \subset \vec{\mathcal{F}}$.

Donc pour étudier les courbes de niveaux des formes quadratiques, il suffit de connaître les courbes de niveaux des formes quadratiques **non dégénérées**.

Cônes et cylindres

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiquesConiques et
quadriques

- Toute forme quadratique non dégénérée sur \mathbb{R} est de la forme $x \mapsto ax^2$ avec $a \neq 0$, et donc les courbes de niveaux \mathcal{L}_k sont :
 - si $\text{signe}(a) \neq \text{signe}(k)$: vides,
 - si $k = 0$: le point $\{0\}$,
 - si $\text{signe}(a) = \text{signe}(k)$: l'ensemble de deux points $\{\pm\sqrt{k/a}\}$.
- La seule forme quadratique dégénérée sur \mathbb{R} est $x \mapsto 0$ dont les lignes de niveaux \mathcal{L}_k sont :
 - si $k \neq 0$: vides,
 - si $k = 0$: \mathbb{R} qui est un cylindre de base 0 et de direction \mathbb{R} .

Cônes et cylindres

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiquesConiques et
quadriques

- Les formes quadratiques non dégénérées de \mathbb{R}^2 s'écrivent dans une b.o.n. sous la forme $(x, y) \mapsto \lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2$ avec $\lambda_i \neq 0$ pour $i = 1, 2$.

- Si $\text{signe}(\lambda_1) = \text{signe}(\lambda_2)$ les courbes de niveaux \mathcal{L}_k sont :

- si $\text{signe}(\lambda_i) \neq \text{signe}(k)$: vide,
 - si $k = 0$: le point $\{0\}$,
 - si $\text{signe}(\lambda_i) = \text{signe}(k)$: une ellipse d'équation $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$ où $a = \sqrt{k/\lambda_1}$ et $b = \sqrt{k/\lambda_2}$.

- Si $\text{signe}(\lambda_1) \neq \text{signe}(\lambda_2)$ les courbes de niveaux \mathcal{L}_k sont :

- si $k = 0$: deux droites de pentes $\pm\sqrt{-\lambda_1/\lambda_2}$,
 - si $k \neq 0$: une hyperbole dont l'équation standard dans le cas $k > 0$ est $\left(\frac{x}{a}\right)^2 - \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$ où $a = \sqrt{k/\lambda_1}$ et $b = \sqrt{-k/\lambda_2}$.

Les asymptotes de l'hyperbole \mathcal{L}_k sont les deux droites de \mathcal{L}_0 .

- Les formes quadratiques dégénérées de \mathbb{R}^2 non nulles s'écrivent dans une b.o.n. sous la forme $(x, y) \mapsto \lambda x^2$ avec $\lambda \neq 0$. Et donc leurs courbes de niveaux \mathcal{L}_k sont vides, une ou deux droites selon que $k/\lambda < 0$, $k = 0$ ou $k/\lambda > 0$.

Cônes et cylindres

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiquesConiques et
quadriques

- Les formes quadratiques non dégénérées de \mathbb{R}^3 s'écrivent dans une b.o.n. sous la forme $(x, y, z) \mapsto \lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + \lambda_3 z^2$ avec $\lambda_i \neq 0$ pour $i = 1, 2, 3$. Comme $\mathcal{L}_k(Q) = \mathcal{L}_{-k}(-Q)$ on peut restreindre notre étude au cas de 2 ou 3 valeurs propres positives, et quitte à échanger les coordonnées on peut supposer $\lambda_1, \lambda_2 > 0$.
 - Si $\lambda_i > 0$ les courbes de niveaux \mathcal{L}_k sont :
 - si $k < 0$: vide,
 - si $k = 0$: le point $\{0\}$,
 - si $k > 0$: un ellipsoïde d'équation $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1$ où $a = \sqrt{k/\lambda_1}$, $b = \sqrt{k/\lambda_2}$ et $c = \sqrt{k/\lambda_3}$.
 - Si $\lambda_1, \lambda_2 > 0$ et $\lambda_3 < 0$ les courbes de niveaux \mathcal{L}_k sont :
 - si $k = 0$: un cône elliptique de base l'ellipse d'équations $\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 = |\lambda_3|$ et $z = 1$,
 - si $k > 0$: un hyperboloïde à une nappe dont la section avec le plan $z = h$ est l'ellipse $\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 = k + |\lambda_3| h^2$.
 - si $k < 0$: un hyperboloïde à deux nappes dont la section avec le plan $z = h$ est vide si $|h| < \sqrt{k/|\lambda_3|}$ et est une ellipse $\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 = k + |\lambda_3| h^2$ si $|h| \geq \sqrt{k/|\lambda_3|}$.

Cônes et cylindres

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiquesConiques et
quadriques

Définition-Proposition

*On dit que f est une **fonction polynomiale** de degré n sur l'espace affine \mathcal{E} si dans un repère (dans tout repère) la valeur de $f(x_1, \dots, x_n)$ est un polynôme de degré n en les coordonnées (x_1, \dots, x_n) .*

Dans la suite de ce cours on va étudier les courbes de niveaux des fonctions polynomiales de degré 2.

Cônes et cylindres

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiquesConiques et
quadriques

- 1 Les courbes de niveaux des polynômes de degré 0 sont : vide ou tout l'espace.
- 2 Les courbes de niveaux des polynômes de degré 1 sont les hyperplans affines.
- 3 On vient de discuter les courbes de niveaux des polynômes homogènes de degré 2, qui sont les courbes de niveaux des formes quadratiques.
- 4 Une fonction qui est un polynôme homogène de degré 2 dans un repère n'est pas forcément homogène dans un autre repère.
- 5 On ne retrouve pas la parabole si on se limite aux polynômes homogènes.

Pour toutes ces raisons, il est naturel d'étudier en toute généralité les courbes de niveaux des fonctions polynomiales de degré 2 d'un espace affine (euclidien) \mathcal{E} dans \mathbb{R} .

Cônes et cylindres

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiquesConiques et
quadriques

Proposition

Soit f est une fonction polynomiale de degré 2 sur l'espace affine \mathcal{E} de dimension n , alors il existe une b.o.n. dans laquelle soit

$$f(x_1, \dots, x_n) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_r x_r^2 + \mu$$

avec $\lambda_i \neq 0$ pour $i = 1, \dots, r$, soit

$$f(x_1, \dots, x_n) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_r x_r^2 + \mu x_{r+1}$$

avec $\mu \neq 0$ et $\lambda_i \neq 0$ pour $i = 1, \dots, r$.

Dans le premier cas on se retrouve dans le cas déjà discuté des formes quadratiques.

Dans le deuxième cas, en notant $\mathcal{F} = \{(x_1, \dots, x_{r+1}, 0, \dots, 0)\}$ et

$\mathcal{F}^\perp = \{(0, \dots, 0, x_{r+2}, \dots, x_n)\}$, vu que $\mathcal{L}_k(f)$ est un cylindre de direction $\overrightarrow{\mathcal{F}^\perp}$ et de base $\mathcal{L}_k(f|_{\mathcal{F}}) \subset \mathcal{F}$, on peut se restreindre à l'étude du cas où $n = r + 1$.

Cônes et cylindres

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiquesConiques et
quadriques

En dimension 1 il n'y a pas de polynômes de degré 2 qui ne soient pas dans une base de la forme déjà étudiée $AX^2 - C$.

Calcul avec $a \neq 0$:

$$ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c = AX^2 - C,$$

avec $A = a$, $X = x + \frac{b}{2a}$ et $C = \frac{b^2 - 4ac}{4a}$.

Cônes et cylindres

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiquesConiques et
quadriques

En dimension 2 les polynômes qui manquent dans notre étude s'écrivent dans une b.o.n. sous la forme $ax^2 + by$ avec $a \neq 0$ et $b \neq 0$.

Donc leurs courbes de niveaux \mathcal{L}_k sont des paraboles $X^2 = 2pY$, avec $X = x$, $p = -\frac{b}{2a}$ et $Y = y - \frac{k}{b}$.

Cônes et cylindres

Ellipse

Parabole

Hyperbole

Niveaux des formes
quadratiquesConiques et
quadriques

En dimension 3 il y a deux types de polynômes qu'il faut étudier en plus des formes quadratiques déjà étudiées :

- 1 $ax^2 + by^2 + cz$, avec a et b de même signe. Ces courbes de niveaux sont appelées des **paraboloïdes elliptiques**.

Leur intersection avec un plan $\{z = h\}$ est une ellipse, un point ou vide.

Leur intersection avec un plan $\{x = h\}$ ou $\{y = h\}$ est une parabole.

- 2 $ax^2 - by^2 + cz$, avec $a > 0$ et $b > 0$. Ces courbes de niveaux sont appelées des **paraboloïdes hyperboliques**.

Leur intersection avec un plan $\{z = h\}$ est une hyperbole ou deux droites.

Leur intersection avec un plan $\{x = h\}$ ou $\{y = h\}$ est une parabole.