

홍 로

육성내력

국내에서 육성된 최초의 사과품종으로 원예연구소에서 1980년 ‘스퍼어리브 레이즈’에 ‘스퍼골든데리셔스’를 교배, 1987년 ‘원교 가-1’로 1차선발하고 1988년에 최종선발, 명명하였다.

과실 및 생육특성

수확기는 9월 상·중순이나 8월 하순부터 수확이 가능하다. 과실크기는 300g, 과형은 장원형이며 과피색은 농홍색으로 줄무늬는 거의 없다. 당도는 14~15%, 산도는 0.25~0.31%이며 육질이 단단하고 식미는 양호하나 과즙은 적은 편이다. 저장성은 상온에서 30일 정도이다. 유목기 수세는 강한 편이나 결실이후에는 급격히 떨어진다.

장·단점

- 조기결실성이고 풍산성이며 수확 전 낙과가 거의 없다.
- 해발이 낮고 온도가 높은 지역에서도 비교적 착색이 양호하다.
- 과다결실에 따른 수세 쇠약이 심하다.
- 점무늬낙엽병, 역병에 약하고 줄기접무늬썩음병 발생이 많다.

재배상 유의할 점

- 결실과다에 의한 수세저하 및 해거리가 발생하므로 조기에 적화 또는 적과를 철저히 하여 수세유지에 힘쓴다.
- 대과는 밀(蜜)증상 발생이 많으므로, 적정크기의 과실을 생산하도록 한다.
- 중심과는 과경이 짧아 과경부가 가지에 닿아 과실의 모양이 좋지 않거나 낙과가 되는 경우가 있으므로 측과를 남기고 적과 한다.
- 앞에 가리거나 그늘 속의 과실은 착색이 불량하므로 수확 전 잎따기나 과실 돌려주기를 한다.
- 점무늬낙엽병 및 탄저병에 약하므로 낙화 후 10일경부터 장마 전까지의 약제살포에 특히 유의한다.
- 수세가 떨어지면서 여러 가지 장애발생이 많으므로 나무세력을 살려 재배하는 것이 중요하다. 다소 세력이 강한 대목을 쓰고 대목노출정도도 ‘후지’품종보다 덜 노출시키는 것이 수세유지의 방법이라고 할 수 있겠다.
- 최근 봄철에 발생이 많은 ‘홍로’ 줄기괴사현상은 토양이 건조하지 않도록 관수를 잘하는 것이 중요하며, 도포제나 수성페인트를 원줄기에 발라주는 것도 일부 효과가 있다.

* (외벽용)수성페인트 : 물 = 2 : 1(바르는 시기는 늦가을~이른봄)