




# Introducción a la Física (2013)

- Unidad: 01
- Clase: 14
- Fecha: 20130718J
- Contenido: Leyes de Kepler (II)
- Web: [http://halley.uis.edu.co/fisica\\_para\\_todos/](http://halley.uis.edu.co/fisica_para_todos/)
- Archivo: 20130718J-HA-leyes-kepler.pdf

**En el episodio anterior...**



# Movimiento circular



- La velocidad cambia en dirección
- Debe haber una aceleración asociada al cambio de velocidad
- Ergo, hay una fuerza

- Fuerza Centrípeta

$$F = m \frac{v^2}{r}$$

- Pero si los cuerpos tienen masa...

$$F_G = m \frac{G M}{r^2}$$

- Velocidad orbital (circular)

$$v = \sqrt{\frac{G M}{r}}$$

- Y como la velocidad es

$$v = \frac{\Delta x}{t} = \frac{2 \pi r}{t}$$

¡Tercera Ley de Kepler!

- Entonces:

$$\frac{2 \pi r}{t} = \sqrt{\frac{G M}{r}} \longrightarrow r^3 = \frac{G M}{4 \pi^2} t^2 \longrightarrow r^3 \propto t^2$$

# Ecuación “vis-viva”

- Si P=periastro y A=apoastro, se puede ver (hacerlo!!!) que

$$r_P v_P = r_A v_A \rightarrow v_P = (r_A / r_P) v_A$$

- En la órbita, la  $E_m$  se conserva:

$$E_m = E_k + E_g = \text{cte}$$

- Planteamos la conservación en el perihelio y en el afelio


$$\frac{v_A^2}{2} - \frac{GM}{r_A} = \frac{v_P^2}{2} - \frac{GM}{r_P}$$

- Resolvemos para  $v_A$  (maxima) y usamos  $a=(P+A)/2$

$$v(r)^2 = GM \left( \frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right) \rightarrow v_A = \sqrt{GM \left( \frac{2}{A} - \frac{1}{a} \right)}$$

# Hagamos unas cuentas

En el tiempo  $\Delta t$ , el planeta se mueve de A a B, luego De B a C, y así siguiendo...



# Algoritmo general

- Trabajo en cartesianas, el origen en el foco (estrella).
- El tiempo avanza en pasos discretos:  $i=1,2,3..1000$ 
  - En python: `for i in range(1,1001):`
- El intervalo temporal es  $\Delta t=(T/1000)$
- Entonces, el tiempo transcurrido desde el inicio hasta el paso  $i$ -ésimo es

$$t_i = t_0 + i \Delta t \quad ; \text{ si } t_0 = 0, \text{ entonces } t_i = i \Delta t$$

- Luego, cuando  $i=1000$  entonces  $t_i=T$

# Condiciones iniciales

- Es más simple empezar en el apoastro:

$$\bar{\mathbf{r}} = (-(a+f), 0)$$

- En el el apoastro, la velocidad es perpendicular al vector posición y el modulo  $\rightarrow$  “Vis Viva”
- La aceleración siempre tiene dirección radial, sentido hacia la estrella (negativo):

$$\bar{\mathbf{a}} = \frac{\bar{\mathbf{F}}}{m} = -\left(\frac{GM}{|\bar{\mathbf{r}}|^2}\right)\hat{\mathbf{r}} \quad (\text{notar que } \hat{\mathbf{r}} = \frac{1}{|\bar{\mathbf{r}}|}\bar{\mathbf{r}} \rightarrow |\hat{\mathbf{r}}|=1)$$

- Media vuelta después, el vector posición debe ser

$$|\bar{\mathbf{r}}| = ((a-f), 0)$$



- El tiempo avanza y entonces, para calcular la posición en el tiempo (i+1)

$$\mathbf{r}_{i+1}^- = \mathbf{r}_i^- + \Delta t \mathbf{v}_i^-$$

- Imprimo las coordenadas de  $\mathbf{r}$  en la nueva pos.
- Calculo la aceleración en  $\mathbf{r}_{i+1}$ , y entonces:

$$\mathbf{v}_{i+1}^- = \mathbf{v}_i^- + \Delta t \mathbf{a}_{i+1}^-$$

- Y este bucle continua hasta  $i=1000$  ( $t=T$ )
- Sugerencia: suponga  $a=b=r$  y verifique que la trayectoria corresponde a una órbita circular. Luego vuelva a SU exoplaneta

# Algoritmo "Newton-Hooke"

$$\Delta t = \frac{T}{1000} = \text{cte}$$

Datos:  $\mathbf{r}_{i=0}; \mathbf{v}_{i=0}$


Imprimo  $\mathbf{r}_i$

Calculo:  $\mathbf{r}_{i+1} = \mathbf{r}_i + \Delta t \mathbf{v}_i$

$$\text{Calculo: } \mathbf{a}_{i+1} = - \left( \frac{GM}{|\mathbf{r}_{i+1}|^2} \right) \hat{\mathbf{r}}_{i+1}$$

$$\text{Calculo: } \mathbf{v}_{i+1} = \mathbf{v}_i + \Delta t \mathbf{a}_{i+1}$$

$$\text{Notar: } \mathbf{a}_{i+1} = - \left( \frac{GM}{|\mathbf{r}_{i+1}|^3} \right) \mathbf{r}_{i+1}$$




# Resultado: órbita de # HD\_171028\_b

## HD 171028 b

Distanza: 380.670 km  
Raggio: 74.020 km  
Diametro apparente: 18° 44' 17"  
Durata del giorno: 12,560 ore  
Temperatura: 306 K

<http://arxiv.org/abs/1307.1801>  
 $M=0.99 M_{\text{Jup}}$   
 $m=1.962 m_{\text{Jup}}$   
 $a=1.31019 \text{ AU}$   
 $E=0.59$


Velocità: 0.00000 m/s




21:50:17 UTC

Segui HD 171028 b  
OV: 27° 08' 47.8" (1,00x)


# Aumento velocidad en apoastro ( $\pm 10\%$ )



# En apoastro (1<sup>er</sup> : +10%, 2<sup>do</sup> : -50%)



# En el periastro (+5%)



# En el periastro ( $\pm 10\%$ )

