Universidad Nacional de Río Negro Int. Partículas, Astrofísica & Cosmología - 2016

Unidad O1 – Relatividad

Clase U01 C01

Cont Presentación, introducción, relatividad

Cátedra Asorey

Web github.com/asoreyh/unrn-ipac


Archivo a-2017-U01-C01-0808-introduccion-relatividad-1





Colegas contando algunas experiencias

- Hernán Asorey
 - <hasorey@unrn.edu.ar> <asoreyh@gmail.com>
 - Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro: líneas: Aplicaciones de Detectores de Partículas: Meteorología Espacial, Muongafía de Volcanes, Física Médica
 - UNRN
 Profesor Asociado, Física Moderna A; Introducción a la Física de Partículas, Astrofísica y Cosmología (IPAC)



Objetivos y metodología

Objetivos

- Adquirir una perspectiva del estado actual de la Física de Partículas, la Astrofísica y la Cosmología, a un nivel introductorio y que produzca las herramientas para su implementación en el aula de escuelas medias.
- Metodología (orientada al trabajo grupal)
 - Clases interactivas, virtuales y presenciales
 - Prácticas en clase y en casa



- Las clases:
 - Jueves 21 a 23
 - Una hora a definir
- La Bibliografía:
 - Depende de la unidad
 - Apuntes de clase
 - Wikipedia






Formas de Aprobación...

- Evaluación continua (60%)
 - Participación en clases y laboratorios
 - Entrega de prácticos
 - Charla presentando un tema a elección
- Final integrador (40%)
- Promoción, cumpliendo todas estas condiciones:
 - Entrega del 100% de los prácticos en tiempo y forma, cumpliendo con las fechas pactadas
 - Entrega del 100% de los informes en tiempo y forma, cumpliendo con las fechas pactadas
 - Nota Evaluación Continua > 7.9
 - Dispone de un (y sólo un) "comodín" para las entregas

Contenidos mínimos

Los contenidos mínimos según su plan:
 Estrellas y galaxias. Evolución de las estrellas nacimiento y muerte de las estrellas. Relatividad general: gravedad y la curvatura del espacio. El universo en expansión. El Big-Bang y el fondo cósmico de microondas. El modelo estándar cosmológico. Los primeros tiempos del universo


Contenidos: un viaje en el tiempo



Contenidos: un viaje en el tiempo



U1: Todo es relativo 4 encuentros: del 08/Ago al 29/Ago



U2: Cálido y Frío 5 encuentros: del 05/Sep al 03/Oct (1er parcial)

Estrellas

- Astronomía Observacional: sistemas de coordenadas y mapas estelares
- Radiación de Cuerpo Negro
- Ley de Eddington, Clasificación estelar, Diagrama H-R
- Objetos Compactos y evolución estelar
- Planetas
 - Planetas y Exoplanetas
 - Vida en el Universo: Astrobiología
- Galaxias
 - Modelos y formación
 - Ejemplos: La Vía Láctea, Otras Galaxias, GalaxyZoo(*)


U3: no es lo que se ve, sino lo que se palpa 4 encuentros: del 10/0ct al 31/0ct

- Relatividad General
 - Introducción y conceptos básicos,
 - Modelo de Friedman-Lemaître-Robertson-Walker
 - El error de Einstein
- Modelos del Universo
 - Formación de estructuras
 - Midiendo distancias
 - Corrimiento al rojo
 - El universo en expansión

U4: Allá lejos y hace tiempo 3 encuentros: del 07/Nov al 21/Nov

- El modelo cosmológico estándar
 - Modelo de Alpher, Bethe & Gamow
 - El fondo de microondas
 - Modelo ACDM
- Historia térmica del universo
 - El Big Bang
 - Primeros segundos del universo
 - Épocas térmicas de tiempo, inflación, recombinación
 - Evolución futura del universo
 - ¿El fin?

Contenidos: un viaje en el tiempo



U1: Todo es relativo (11/Ago - 01/Sep)


¿Marco de referencia?

¿Marco de referencia inercial?

Marco de referencia

Marco de referencia

- Sistema de coordenadas que fija la posición de objetos físicos de manera unívoca (localización y orientación)
- Existe un conjunto de medidas estandarizadas (una regla)
- Distintos tipos:
 - Fijos al cuerpo, fijos al espacio, inerciales y no inerciales



3-tupla: (x,y,z)

Marco de referencia inercial

 \mathbb{R}^3

(0,0,0


Marco de referencia incercial

 Describe el espacio homogenea (no hay lugares privilegiados) e isotrópicamente (no hay direcciones privilegiadas) e independiente del tiempo.

 Las leyes físicas tienen la "misma forma" en todo sistema inercial.
 Decimos que la física es covariante frente a cambios de sistemas inerciales

 Un sistema de referencia inercial es aquel en el que la primera ley de Newton es válida.

3-tupla: (x,y,z)



(2,4,4)

(2,4,0)

U1: Todo es relativo (11/Ago - 01/Sep)


¿Qué es la relatividad?

¿Quién la descubrió?

Relatividad de Galileo

- Si la ley de la inercia es válida, las aceleraciones son provocadas sólo por fuerzas internas, no externas (p. ej. un sistema rotante)
- El tiempo y el espacio están claramente desacoplados (¡vida diaria!)
- Las leyes de la mecánica son invariantes en el tiempo
 - → El espacio es absoluto
 - → Todos los sistemas inerciales comparten el mismo tiempo
- No hay forma de "saber" si estamos en movimiento
 - Propongan un ejemplo ahora


Relatividad de Galileo



- Sea un sistema S' que se mueve con velocidad constante v respecto a otro sistema S.
- Luego, un objeto en r, a tiempo t en S, tendrá posición r'(t) dada por:

$$\vec{r}'(t) = \vec{r}(t) - \vec{v}t$$

Derivación



Almosa bien, for (2) postulado

$$t=t'$$

Y per (1) en algum monuto to

 $\vec{O}(t_0) = \vec{O}'(t_0) = \vec{O}(t_0) = \vec{O}'(t_0)$

Esso acumó hoa untiempo $(t-t_0)$

Den en tiempo, S' se desplosot DFA Tr. $(t-t_0)$

Nego a tiempo t, y visto desde S

 $\vec{r}(t) - \vec{v}'(t) = \vec{A}\vec{v}(t)$
 $\vec{r}(t) = \vec{v}(t) - \vec{A}\vec{v}(t)$

House to $\vec{v}(t) = \vec{v}(t) - \vec{v}(t-t_0)$

$$\vec{r}'(t) = \vec{r}(t) - \vec{v}t$$

Eutraces.

$$U'(t) = \frac{d}{dt} r'(t) = \frac{d}{dt} \left(\vec{r}(t) - \vec{n}t \right) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} - \vec{N}$$

$$\vec{u}'(t) = \vec{u}(t) - \vec{v}$$

$$\vec{v}(t) = \vec{v}(t) - \vec{v}(t) + \vec{v}(t) - \vec{v}(t) + \vec$$

$$\vec{u}'(t) = \vec{u}(t) - \vec{v}$$

St el objets si ealer = D Sucabroció alt) rista desde s'errón:

$$\vec{a}(t) = \frac{d}{dt} \vec{v}(t) = \frac{d}{dt} (\vec{v}(t) - \vec{k}) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} - \frac{d\vec{v}'}{dt}$$

$$\vec{a}'(t) = \vec{a}(t)$$
 $\vec{a}(t) = \vec{a}(t)$ Aceleroción igoles!!

Pero entonces... Invariancia de Galileo

Este último resultado es crucial, ya que si

$$\vec{a}'(t) = \vec{a}(t)$$

Y suponemos que la masa m es un invariante, m=m'

$$m\vec{a}'(t)=m\vec{a}(t)\Rightarrow \vec{F}'(t)=\vec{F}(t)$$

- ¡La segunda ley de Newton no cambia frente a cambios entre sistemas de referencias inerciales! (la primera ya valía)
- Si las leyes de la mecánica valen en un marco inercial, valen en todos


Atención....

 Para llegar a este importante resultado, dimos por sentado algo que no es trivial:

En todos los casos, derivamos respecto a t, ya que en Galileo, t=t' → dt = dt'

- Esto parece obvio, pero ¡no lo es!
- Y además, sólo vale para las leyes de Newton, en el electromagnetismo, esto no vale (→ F-4B)
 - → Transformaciones de Lorentz (ya vienen)







¿Qué pasa si....

- Ondas mecánicas necesitan un medio
 → Ondas electromagnéticas también → Éter
- Hay una fuerte inconsistencia entre las leyes de Newton y las leyes de Maxwell
- Michelson & Morley (1887) querían medir la velocidad del "viento del éter" (la Tierra se mueve a una velocidad de 30km/s ~ 0.0001 c)...

El experimento de Michelson&Morley







En diferentes momentos del año, la velocidad de la luz medida en los brazos del interferómetro sería diferente, teniendo en cuenta la velocidad de propagación de la Tierra respecto al eter (viento del eter), que era donde se suponía se desplazaba la luz.

¿Qué pasa si....

- Ondas mecánicas necesitan un medio
 → Ondas electromagnéticas también → Éter
- Hay una fuerte inconsistencia entre las leyes de Newton y las leyes de Maxwell
- Michelson & Morley (1887) querían medir la velocidad del "viento del éter" (la Tierra se mueve a una velocidad de 30km/s ~ 0.0001 c) → fallan estrepitósamente...
- ... y esto es un éxito rotundo: demuestran que no hay necesidad de plantear la existencia del éter
- Pero además, vieron que la velocidad de la luz era la misma en cualquier dirección!!!

Einstein postula

• El principio de la relatividad:

Las leyes que gobiernan los cambios en los estados de los sistemas físicos son iguales para todos los observadores inerciales

• El principio de la invarianza de la velocidad de la luz

La luz se propaga en el vacío siempre con la misma velocidad, sin importar la velocidad de la fuente emisora de luz

... y paso a la historia