

Correcciones al texto: Winfried Karl Grassman y Jean-Paul Tremblay [1996] (2003). Matemáticas Discretas y Lógica. Una Perspectiva desde la Ciencia de la Computación. Trad. por Rafael García-Bermejo, María Luisa Díez Platas y Vivian de los Ángeles Fernández Vásquez. Última reimpresión. Prentice Hall.

Por: Andrés Sicard Ramírez

Última actualización: 31 de octubre de 2025

Pág. 467, antes del Ejemplo 9.5. Reemplazar « T , y $T \wedge P \equiv P$ » por « V , y $V \wedge P \equiv P$ ».

Pág. 474. En la tabla que muestra la solución al Ejemplo 9.12, la postcondición de la tercera fila es $\{s = 1 + r^2\}$. Reemplazar esta postcondición por $\{s = 1 + r + r^2\}$.

Pág. 476. En la tabla que muestra la solución al Ejemplo 9.14, la precondition de la última fila es $\{2(r = 2^i)\}$. Reemplazar esta precondition por $\{2r = 2^i\}$.

Pág. 483. En la primera fila de la Figura 9.2 reemplazar la sentencia $i := i + 1$ por la sentencia $i := 1$.

Pág. 485. En la última fila de la Figura 9.3 adicionar una negación al último término del antecedente. Es decir, el último termino del antecedente es $\neg(i \leq n)$.

Pág. 485. En la última fila de la Figura 9.3 eliminar la negación del consecuente. Es decir, el consecuente es $\left(\sum_{j=0}^n r^j\right)$.