

النهايات و الإتصال

محتوى الدرس

2	1	الإتصال في نقطة - الإتصال على مجال
2	1.1	الإتصال في نقطة
2	2.1	الإتصال على اليمين وعلى اليسار
3	3.1	الإتصال على مجال
4	2	العمليات على الدوال المتصلة
4	3	صورة مجال بدالة متصلة
5	1.3	صورة مجال
6	2.3	مبرهنة القيم الوسطية
7	3.3	حالة دالة متصلة و رتيبة قطعاً
7	1.3.3	صورة مجال بدالة متصلة و رتيبة قطعاً
7	2.3.3	مبرهنة القيم الوسطية بالنسبة لدالة متصلة و رتيبة قطعاً
8	4	الدالة العكسية لدالة
8	1.4	تعريف الدالة العكسية
9	2.4	خاصيات الدالة العكسية
9	5	الجزور من الرتبة n
9	1.5	دالة الجزر من الرتبة n
10	2.5	العمليات على الجزور من الرتبة n
10	3.5	القوة الجزرية لعدد حقيقي موجب

1. الإتصال في نقطة - الإتصال على مجال

1.1. الإتصال في نقطة

نشاط 1

تعريف: نسمي دالة الجزء الصحيح، الدالة التي تربط كل عنصر x من \mathbb{R} بالعدد الصحيح النسبي الوحيد n الذي يحقق $n \leq x \leq n+1$ ونرمز لها بالرمز $E(x)$ أو $[.]$.

1. أحسب $[2, 3]$ و $[-1]$ و $[\sqrt{3}]$ و $[100, 3001]$.
2. نعتبر الدوال المعرفة على المجال $[-2; 1[$ بما يلي: $f(x) = [x]$ و $g(x) = x - [x]$ و $h(x) = x^2 + 1$ و لتكن (C_f) و (C_g) و (C_h) تمثيلاتها المبيانية.
3. أرسم في معالم مختلفة (C_f) و (C_g) و (C_h) .
4. هل يمكنك رسم المنحنيات (C_f) و (C_g) و (C_h) بدون تقطع (دون رفع القلم) ؟
5. هل تقبل الدوال f و g و h نهاية عند -1 ؟ عند 0 ؟

تعريف

لتكن f دالة عددية معرفة على مجال مفتوح I و a عنصر من I .
نقول إن الدالة f متصلة في النقطة a إذا كان

تمرين 1

بين أن الدالة $\begin{cases} f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1} & x \neq 1 \\ f(1) = 3 \end{cases}$ متصلة في 1.

2.1. الإتصال على اليمين وعلى اليسار

نشاط 2

لتكن f الدالة المعرفة على \mathbb{R} بما يلي: $\begin{cases} f(x) = x^2 + 1 & x \geq 0 \\ f(x) = \frac{1}{x-1} & x < 0 \end{cases}$

1. تحقق من أن: $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = f(0)$
2. هل الدالة f متصلة على اليسار في 0 ؟
3. هل الدالة f متصلة في 0 ؟

تعريف

- لتكن f دالة عددية معرفة على مجال على شكل $[a; a + \alpha]$ حيث $\alpha > 0$.
نقول إن الدالة f متصلة على اليمين في النقطة a إذا كان
- لتكن f دالة عددية معرفة على مجال على شكل $[a - \alpha; a]$ حيث $\alpha > 0$.
نقول إن الدالة f متصلة على اليسار في النقطة a إذا كان

خاصية

- لتكن f دالة عددية معرفة على مجال مفتوح I و a عنصر من I .
تكون f متصلة في النقطة a إذا كانت

تمرين 2

1. هل الدالة $\begin{cases} f(x) = -x & x \leq 0 \\ f(x) = x^2 & x > 0 \end{cases}$ متصلة في 0.
2. لتكن f الدالة العددية المعرفة على \mathbb{R} بما يلي:

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\sqrt{1 + \sin(x)} - 1}{x} & x < 0 \\ f(x) = \sqrt{1 + x} - \frac{1}{2} & x \geq 0 \end{cases}$$
أدرس إتصال الدالة f في 0.
3. حدد قيمة كل من a و b بحيث تكون الدالة $\begin{cases} f(x) = \frac{x^2 + x - a}{x - 2} & x < 2 \\ f(x) = \frac{2x + b}{3} & x \geq 2 \end{cases}$ متصلة في 2.

3.1. الإتصال على مجال

تعريف

1. نقول إن f دالة متصلة على مجال $[a; b]$ إذا كانت متصلة في كل نقطة من $[a; b]$.
2. نقول إن f دالة متصلة على مجال $[a; b]$ إذا كانت
3. نقول إن f دالة متصلة على مجال $[a; b]$ إذا كانت
4. نقول إن f دالة متصلة على مجال $[a; b]$ إذا كانت

خاصية

- الدوال الحدودية و الدوال \sin و \cos متصلة على \mathbb{R} .
- الدوال الجذرية و الدوال اللاجذرية متصلة على كل مجال ضمن مجموعة تعريفها.
- الدالة \tan متصلة على كل مجال ضمن مجموعة تعريفها.

تمرين 3

أدرس إتصال الدالة f على المجال I في كل حالة من الحالات التالية:

(ب) $f(x) = \sin(x)$ و $I =]\frac{\pi}{3}; \pi]$

(د) $f(x) = \sqrt{x}$ و $I = [0; 7[$

(أ) $f(x) = 3x^3 - x^2 + 1$ و $I = [-5; 2]$

(ج) $f(x) = \frac{3x-1}{x^2+x+1}$ و $I =]-2; +\infty[$

2. العمليات على الدوال المتصلة

خاصيات

لتكن f و g دالتين عدديتين و I مجالا ضمن \mathbb{R} و k عددا حقيقيا.

- إذا كانت f و g متصلتين على I فإن $f+g$ و $f \times g$ و kf دوال متصلة على I .
- إذا كانت f و g متصلتين على I و g لا تنعدم على I فإن $\frac{f}{g}$ و $\frac{1}{g}$ دالتين متصلتين على I .
- إذا كانت f متصلة على مجال I و g متصلة على $f(I)$ فإن $g \circ f$ دالة متصلة على I .




ملاحظة

إذا كانت f متصلة في النقطة a و g متصلة في النقطة $f(a)$ فإن $g \circ f$ متصلة في النقطة a .

3. صورة مجال بدالة متصلة

نشاط 3

نعتبر المنحنيات (C_f) و (C_g) و (C_h) الممثلة على التوالي للدوال f و g و h المعرفة على المجال $[-1; 2]$ و ليكن k عنصرا من $[-2; 3]$.



- ### 1.3. صورة مجال

صورة مجال بدالة متصلة هي مجال.

في النشاط السابق لدينا:

$$\begin{aligned} f([-1; 2]) &= \dots\dots\dots \\ g([-1; 2]) &= \dots\dots\dots \\ h([-1; 2]) &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

إذا كانت f دالة متصلة على $[a; b]$ فإن:

$$f([a; b]) = [\min_{x \in [a; b]} f(x); \max_{x \in [a; b]} f(x)]$$

أدرس اتصال الدالة f على المجال I في كل حالة من الحالات التالية:

$$I =]0, \pi] \text{ و } f(x) = x \sin(x) \text{ (ب)}$$

$$I = \mathbb{R} \text{ و } \begin{cases} f(x) = x - \sqrt{x-2} & x \geq 2 \\ f(x) = \frac{3}{3-x} & x < 2 \end{cases} \text{ (د)}$$

$$I =]0, +\infty[\text{ و } f(x) = \frac{1}{x} + \sqrt{x} \text{ (ا)}$$

$$I =]1; +\infty[\text{ و } f(x) = \sqrt{\frac{3x-1}{x-1}} \text{ (ج)}$$


حدد مجموعة تعريف الدالة f وادرس اتصالها على هذه المجموعة في كل حالة من الحالات التالية:

$$\begin{array}{lll} f(x) = \frac{2x+4}{|1-x|} & (\text{ج}) & f(x) = \frac{x^4-2}{x^2-5x+3} & (\text{ب}) & f(x) = 6x^2+8x+1 & (\text{ا}) \\ f(x) = \cos(4x^2+3x-1) & (\text{و}) & f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{3-x}} & (\text{هـ}) & f(x) = \sqrt{3x^2-2x}+2 & (\text{د}) \end{array}$$

2.3. مبرهنة القيم الوسطية

مبرهنة

لتكن f دالة متصلة على مجال I و a و b عنصرين من I .
لكل محصور بين $f(a)$ و $f(b)$ يوجد على الأقل عنصر c محصور بين a و b بحيث $f(c) = k$.



التأويل المبياني

لكل عدد حقيقي k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$ ، المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = k$ يقطع منحنى الدالة f على الأقل في نقطة.

ملاحظة

إذا كان k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$ حيث $a < b$ فإن k ينتمي إلى $f([a; b])$.
لدينا: $\forall k \in f([a; b]), \exists c \in [a; b] : f(c) = k$

نتيجة

إذا كانت f متصلة على مجال $]a; b[$ و $f(a) \times f(b) < 0$ فإن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل على الأقل حلا في المجال $]a; b[$.

تمرين 6

بين أن المعادلة (E) تقبل حلا على الأقل في المجال I :

(ب) $I = [-3, 0]$ و $(E) : -\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 - 10 = 5$
(د) $I = [1, 2]$ و $(E) : -x^3 + x^2 - x + 3 = 0$

(أ) $I = [0, 1]$ و $(E) : x^3 - 4x + 1 = 0$
(ج) $I = [-2, 3]$ و $(E) : x^2 - 2x - 2 = 0$

3.3. حالة دالة متصلة ورتيبة قطعاً

1.3.3. صورة مجال بدالة متصلة ورتيبة قطعاً

f دالة متصلة و تناقصية قطعاً	f دالة متصلة و تزايدية قطعاً
$f([a; b]) = [f(b); f(a)]$	$f([a; b]) = [f(a); f(b)]$
$f(]a; b]) = \left[f(b); \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) \right]$	$f(]a; b]) = \left[\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x); f(b) \right]$
$f([a; b[) = \left[\lim_{\substack{x \rightarrow b \\ x < b}} f(x); f(a) \right]$	$f([a; b[) = \left[f(a); \lim_{\substack{x \rightarrow b \\ x < b}} f(x) \right]$
$f(]a; b[) = \left[\lim_{\substack{x \rightarrow b \\ x < b}} f(x); \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) \right]$	$f(]a; b[) = \left[\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x); \lim_{\substack{x \rightarrow b \\ x < b}} f(x) \right]$

2.3.3. مبرهنة القيم الوسطية بالنسبة لدالة متصلة ورتيبة قطعاً

نتيجة

إذا كانت f متصلة ورتيبة قطعاً على مجال $[a; b]$ فإنه لكل عدد k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$ يوجد عدد وحيد c من المجال $[a; b]$ بحيث $f(c) = k$.

تمرين 7

بين أن المعادلة (E) تقبل حلاً وحيداً في المجال I :

ب) $(E) : \cos(x) - x = 0$ و $I = [0, \frac{\pi}{2}]$

د) $(E) : \sqrt{x^2 + 1} - x = 0$ و $I = [1, 2]$


أ) $(E) : x^3 + 4x = 1$ و $I = [0, 1]$

ج) $(E) : x^3 - \frac{1}{x} - 7 = 0$ و $I = [1, 2]$

التفرع الثنائي

تمكن طريقة التفرع الثنائي من تحديد قيمة تقريبية لحل المعادلة $f(x) = 0$ على مجال $[a; b]$:

نعيد العملية من أجل $a = m$



نعيد العملية من أجل $b = m$

تمرين 8

1. بين أن المعادلة $x^3 = -x - 1$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $] -1, 1[$.
2. باستعمال طريقة التفرع الثنائي، أعط تأطيرا للعدد α سعته $5 \cdot 10^{-1}$.

4. الدالة العكسية لدالة

1.4. تعريف الدالة العكسية

خاصية

إذا كانت f دالة متصلة و رتيبة قطعاً على مجال I ، فإن المعادلة $f(x) = y$ تقبل حلاً وحيداً في المجال I .

نشاط 4

لتكن f الدالة العددية المعرفة على المجال $I = [1; 3]$ بما يلي: $f(x) = x^2 - 2x$

1. بين أن الدالة f متصلة و تزايدية قطعاً على I .
2. حدد المجال J صورة I بالدالة f .
3. ليكن x عنصراً من J و y عنصراً من I . بين أن: $f(y) = x \iff y = 1 + \sqrt{1+x}$

تعريف

لتكن f دالة عددية متصلة و رتيبة قطعاً على مجال I ، و ليكن J صورة المجال I بالدالة f . الدالة التي تربط كل عنصر x من J بالعنصر الوحيد y من I بحيث $f(y) = x$ تسمى الدالة العكسية للدالة f ، و نرمز لها بالرمز f^{-1} .

نتائج

لتكن f دالة عددية متصلة و رتيبة قطعاً على مجال I و f^{-1} دالتها العكسية، لدينا:

$$\forall x \in I : (f^{-1} \circ f)(x) = x$$

$$\forall x \in f(I) : (f \circ f^{-1})(x) = x$$

$$\begin{cases} f(y) = x \\ y \in I \end{cases} \iff \begin{cases} f^{-1}(x) = y \\ x \in f(I) \end{cases}$$

2.4. خاصيات الدالة العكسية

خاصيات

لتكن f دالة عددية متصلة ورتيبة قطعاً على مجال I و f^{-1} دالتها العكسية، لدينا:

- f^{-1} متصلة على المجال $f(I)$.
- f^{-1} رتيبة قطعاً على المجال $f(I)$ ولها نفس رتبة f .
- منحني الدالة f^{-1} هو مماثل لمنحني الدالة f بالنسبة للمستقيم الذي معادلته $y = x$ في معلم متعامد ممنظم.

تمرين 9

لتكن f الدالة العددية المعرفة على المجال $] -\infty; 3]$ بما يلي: $f(x) = (x - 3)^2 - 1$

1. بين أن الدالة f تقبل دالة عكسية معرفة على مجال J ينبغي تحديده.
2. أحسب $f^{-1}(x)$ لكل x من J .
3. مثل في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم كل من (C_f) و $(C_{f^{-1}})$.

5. الجذور من الرتبة n

نشاط 5

لتكن f الدالة المعرفة على $[0; +\infty[$ بما يلي: $f(x) = x^3$

1. بين أن f تقبل دالة عكسية معرفة على مجال J ينبغي تحديده.
2. أحسب $f^{-1}(0)$ و $f^{-1}(1)$ و $f^{-1}(8)$ و $f^{-1}(27)$ و $f^{-1}(0, 125)$.

1.5. دالة الجذر من الرتبة n

ليكن n عدداً صحيحاً طبيعياً غير منعدم.

الدالة $f: x \mapsto x^n$ متصلة و تزايدية قطعاً على المجال $[0; +\infty[$. إذن f تقبل دالة عكسية.

تعريف

الدالة العكسية للدالة f معرفة على $[0; +\infty[$ وتسمى دالة الجذر من الرتبة n ونرمز لهل بالرمز $\sqrt[n]{\cdot}$.

$$\text{لدينا:} \quad \begin{cases} x^n = y \\ x \in [0; +\infty[\end{cases} \iff \begin{cases} \sqrt[n]{y} = x \\ y \in [0; +\infty[\end{cases}$$

خاصيات

- الدالة $\sqrt[n]{\cdot}$ متصلة و تزايدية قطعاً على $[0; +\infty[$ ولدينا: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$.
- في معلم متعامد ممنظم، منحنى الدالة $\sqrt[n]{\cdot}$ هو ممائل منحنى الدالة $x \mapsto x^n$ بالنسبة للمستقيم ذي المعادلة $y = x$.

نتائج

- $\forall a \in \mathbb{R}^+ : \sqrt[2]{a} = \sqrt{a}$
- $\forall a \in \mathbb{R}^+ : \sqrt[n]{a^n} = \sqrt[n]{a^a} = a$
- $\forall a \in \mathbb{R}^+, \forall b \in \mathbb{R}^+ : \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b} \iff a < b$
- $\forall a \in \mathbb{R}^+, \forall b \in \mathbb{R}^+ : \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{b} \iff a = b$

2.5. العمليات على الجذور من الرتبة n

خاصيات

- ليكن n و m عنصرين من \mathbb{N}^* و a و b عنصرين من \mathbb{R}^+ .
- $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$
- $\sqrt[n]{a} \sqrt[m]{a} = \sqrt[n \times m]{a^n} = \sqrt[n]{a^{\frac{n}{m}}}$ و $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \times m]{a}$
- إذا كان $b \neq 0$ فإن $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ و $\frac{1}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{1}{b}}$

تمرين 10

أحسب بدون استعمال الآلة الحاسبة ما يلي:

- | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| (د) $\sqrt[3]{2\sqrt[3]{4}}$ | (ج) $\sqrt[5]{32}$ | (ب) $\sqrt[4]{625}$ | (ا) $\sqrt[3]{0,001}$ |
| (ح) $\sqrt{\frac{\sqrt[4]{4}}{\sqrt{3}}}$ | (ز) $\sqrt[3]{\sqrt{8}}$ | (و) $\sqrt{\sqrt[3]{16}}$ | (هـ) $\sqrt[10]{2^5}$ |

3.5. القوة الجذرية لعدد حقيقي موجب

تعريف

- ليكن a عددا حقيقيا موجبا قطعاً و r عددا جذريا غير منعدم.
- نسمي القوة الجذرية للعدد a ذات الاس r العدد الذي نرمز له بالرمز a^r المعروف بما يلي $a^r = \sqrt[r]{a^n}$ حيث $r = \frac{n}{m}$ مع $n \in \mathbb{Z}$ و $m \in \mathbb{N}^*$.

ملاحظات

- العدد a^r غير مرتبط بالعدد n و m ، لدينا: $a^r = \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[m]{a^n}$
- $\forall (r, r') \in \mathbb{Q}, \forall a \in \mathbb{R}^+ : a^r = a^{r'} \iff r = r'$
- $\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$ و $\sqrt[m]{a} = a^{\frac{1}{m}}$

خاصيات

تمدد الخواصيات المتعلقة بالقوى الصحيحة النسبية إلى القوى الجذرية.
لكل عددين جذريين r و r' و لكل عددين حقيقيين a و b موجبين، لدينا:

$$\begin{aligned} a^{-r} &= \frac{1}{a^r} & (a^r)^{r'} &= a^{r \times r'} & a^r \times a^{r'} &= a^{r+r'} \\ \frac{a^r}{b^r} &= \left(\frac{a}{b}\right)^r & a^r \times b^r &= (a \times b)^r & \frac{a^r}{a^{r'}} &= a^{r-r'} \end{aligned}$$

تمرين 11

1. اكتب على شكل جذور ماييلي:

$$36^{\frac{3}{2}} \quad \left(\begin{array}{l} \text{ج} \\ \text{و} \end{array} \right)$$

$$3^{\frac{5}{6}} \quad \left(\begin{array}{l} \text{ب} \\ \text{ه} \end{array} \right)$$

$$5^{\frac{1}{2}} \quad \left(\begin{array}{l} \text{ا} \\ \text{د} \end{array} \right)$$

2. اكتب على شكل قوى جذرية ماييلي:

$$-\sqrt[4]{2^8} \quad \left(\begin{array}{l} \text{ج} \\ \text{و} \end{array} \right)$$

$$\sqrt[11]{5^6} \quad \left(\begin{array}{l} \text{ب} \\ \text{ه} \end{array} \right)$$

$$\sqrt[3]{3^2} \quad \left(\begin{array}{l} \text{ا} \\ \text{د} \end{array} \right)$$