

设 A 是拓扑空间 X 的 (强) 形变收缩核, $H : X \times I \rightarrow X$ 是相应的 (强) 形变收缩. 记 \sim 是商映射 $p : X \rightarrow X/\sim$ 确定的等价关系, 若 $\forall x, y$ 使 $p(x) = p(y)$, 都有 $p(H(x, t)) = p(H(y, t)), \forall t \in I$, 则 A/\sim 是 X/\sim 的 (强) 形变收缩核, 相应的 (强) 形变收缩 $H' : X/\sim \times I \rightarrow X/\sim$ 构造为 $H'(x, t) = p \circ H(p^{-1}(x), t)$.

(强) 形变收缩核的三条性质容易验证, 值得注意的是其中只有 $\forall x' \in X/\sim, H'(x', 1) \in A/\sim$ 需要用到 $\forall x, y$ 使 $p(x) = p(y)$, 都有 $p(H(x, t)) = p(H(y, t)), \forall t \in I$ 的条件, 这是为了保证 H' 的良定义性.

下面来验证 H' 的连续性. $\forall U \in \tau_{X/\sim}$, $H'^{-1}(U) = \{(x', t) \in X/\sim \times I : H'(p^{-1}(x'), t) \in V = p^{-1}(U)\} = \{(p(x), t) : (x, t) \in W = H^{-1}(V)\}$

定义 $P : X \times I \rightarrow X/\sim \times I$ 为 $P(x, t) = (p(x), t)$, 把 P 看作商映射, 在 $X/\sim \times I$ 上定义拓扑 $\tau_1 = \{U \times V : P^{-1}(U \times V) \in \tau_{X \times I}\}$, 则 $H'^{-1}(U) = P(W)$, 可以证明它是这个拓扑下的开集. 只需要证明 $P^{-1}(P(W)) = W$ (因为 W 是开集). 若这不成立, 则 $\exists (x, t_0) \in (X \times I) \setminus W, (y, t_0) \in W$ 使得 $p(x) = p(y)$. 按照条件应有 $p \circ H(x, t_0) = p \circ H(y, t_0)$, 但 $p \circ H(x, t_0) \notin U$ 而 $p \circ H(y, t_0) \in U$, 矛盾.

接下来就只需要证明 $X/\sim \times I$ 作为乘积空间确定的拓扑 τ_2 比 $\tau_1 = \left\{ U \times V : P^{-1}(U \times V) = \bigcup_{U_\lambda \in \tau_X, V_\lambda \in \tau_I} (U_\lambda \times V_\lambda) \in \tau_{X \times I} \right\}$ 大. 可以证明, $\forall U \times V \in \tau_1$, U 是开集. 只需证明 $p^{-1}(U)$ 是开集, 而这是因为 $P^{-1}(U \times V) = p^{-1}(U) \times V = \bigcup_{U_\lambda \in \tau_X, V_\lambda \in \tau_I} (U_\lambda \times V_\lambda)$, $\forall x \in p^{-1}(U)$, $\exists U_{\lambda_0}$ 使 $x \in U_{\lambda_0} \subset p^{-1}(U)$, 从而 $p^{-1}(U)$ 每一点都是内点. 同理可以证明 V 中每一点都是内点, 进而 $U \times V$ 是 τ_2 中的开集. 这就证明了整个命题.

事实上, 我们还能证明 $\tau_2 \subset \tau_1$. $\forall \bigcup_{p^{-1}(U_\lambda) \in \tau_X, V_\lambda \in \tau_I} (U_\lambda \times V_\lambda) \in \tau_2$, $P^{-1}\left(\bigcup_{p^{-1}(U_\lambda) \in \tau_X, V_\lambda \in \tau_I} (U_\lambda \times V_\lambda)\right) = \bigcup_{p^{-1}(U_\lambda) \in \tau_X, V_\lambda \in \tau_I} (p^{-1}(U_\lambda) \times V_\lambda) \in \tau_{X \times I}$, 故也在 τ_1 中.