Nombre de variables (ou caractéristiques étudiées) ?

1

Semestre 1

Quantitative

- Comparer à une norme (ou standard ou valeur de référence)
  - Grand échantillon (n ≥ 30)
    - Comparaison d'une moyenne à une norme
      - Statistique **z**
      - Table **Normale**
      - Hypothèses
        - Si bilatérales : p = 2 · (1 - valeur lue dans table Normale)
        - Si unilatérales : p = 1 - valeur lue dans table Normale
      - Comparer p à 0.05
        - Si p ≤ 0.05 : On rejette H0 et accepte H1
        - Si p > 0.05 : On conserve H0
  - Petit échantillon (n < 30)
    - Comparaison d'une moyenne à une norme
      - Statistique **t**
      - Table de **Student**
      - ddl = n - 1
      - Comparer | t calc | à t lu
        - Si | t calc | < t lu : On conserve H0
        - Si | t calc | ≥ t lu : On rejette H0 et accepte H1
- Comparer des groupes
  - 2 groupes
    - Grands échantillons (n1 ≥ 30 et n2 ≥ 30)
      - Échantillons indépendants
        - Comparaison de deux moyennes sur grands échantillons indépendants
        - Statistique **z**
        - Table **Normale**
      - Échantillons appariés
        - Comparaison de deux moyennes sur grand échantillon apparié
        - Statistique **z**
        - Table **Normale**
    - Petits échantillons (n1 < 30 ou n2 < 30)
      - Échantillons indépendants
        - Comparaison de deux moyennes sur petits échantillons indépendants
        - Statistique **t**
        - Table de **Student**
        - ddl = n1 + n2 - 2
      - Échantillons appariés
        - Comparaison de deux moyennes sur petit échantillon apparié
        - Statistique **t**
        - Table de **Student**
        - ddl = n - 1
  - 3 groupes et plus
    - ANOVA à un facteur
      - Statistique **F**
      - Table de **Fisher**
      - ddlinter = A - 1 et ddlintra = A · (S - 1)

Semestre 2

Qualitative

- Comparer à une norme (ou standard ou valeur de référence)
  - Comparaison d'une proportion à une norme
    - Statistique **z**
    - Table **Normale**
- Comparer à une distribution (ou répartition)
  - Test du χ^2 de conformité
    - Statistique χ^2
    - Table de **Khi²**
    - ddl = m - 1
    - Si 5 ≤ cij < 10 : Correction de Yates
    - **Effectifs théoriques cij ≥ 5**
- Comparer des groupes
  - Comparaison de deux proportions
    - Statistique **z**
    - Table **Normale**
    - **n1 > 100 et n2 > 100**

2

Semestre 2

Quantitative

- Mesurer la relation entre les variables
  - Corrélation de Bravais-Pearson
    - Statistique **r**
    - Table de **Bravais-Pearson**
- Prédire une variable à partir de l'autre
  - Régression linéaire simple
    - Statistique **r²** (coefficient de détermination)
    - Équation de relation y = a · x + b

Qualitative

- Mesurer la relation entre les variables
  - Test du χ^2 d'indépendance
    - Statistique χ^2
    - Table de **Khi²**
    - ddl = (l - 1) · (m - 1)
    - Si 5 ≤ n'ij < 10 : Correction de Yates
    - **Effectifs théoriques n'ij ≥ 5**

Presented with xmind