

# Cosas que quedaron por hacer

Evelyn G. Coronel  
Tesis de Maestría en Ciencias Físicas  
Instituto Balseiro

(27 de agosto de 2020)

## I. SUGERENCIA DE HARARI

Durante la presentación de lo que hiciste el semestre pasado, Harari sugirió hacer un histograma de los eventos con respecto a la energía. Durante la presentación afirmé que los eventos del main array iban perdiendo sensibilidad a los eventos de menor energía, y que por eso se empezó a utilizar a todos los disparos. En la Fig.1 se observa que también la sensibilidad disminuye a medida que pasan los años en los eventos de todos los disparos.




Fig. 1: La figura sugerida por Harari

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de eventos y la energía media de cada año considerado:

Año	Eventos	$\log_{10}(E)$ media [EeV]
2014	2096481	17.12
2015	1718141	17.17
2016	1605716	17.18
2017	1713876	17.20
2018	1786301	17.24
2019	1786301	17.28
Total	10706816	

## II. PARÁMETROS DEL CLIMA PARA LOS TODOS LOS DISPAROS

Para obtener los nuevos parámetros del clima, considero el conjunto de datos filtrado mediante el valor de  $S_{38} = 5.36$  VEM sin la corrección de clima de la colaboración. Este valor corresponde aproximadamente a la energía de un evento 1 EeV. Considerando lo que había hecho durante la licenciatura, tenemos que:

$$S = S_0(1 + \alpha_P \dots + \alpha_\rho \dots + \beta_\rho \dots) \quad (1)$$

$$\frac{dR}{d(\sin\theta)} = R_0[1 + a_P \dots + a_\rho \dots + b_\rho \dots] \quad (2)$$

donde  $S$  es la señal medida,  $S_0$  la señal esperada,  $dR/d(\sin\theta)$  es la tasa de eventos por ángulo sólido,  $R_0$  la tasa media y  $a_P = 2.363\alpha_P$ , también los otros parámetros.

Para tener una idea si el modelo se ajusta a lo observado experimentalmente, se consideran estos parámetros del clima independientes de  $\theta$  y la tasa de eventos diaria, se obtiene el ajuste de la Fig.2. La media oscila alrededor de 0.25 eventos por  $\text{km}^2$  por día,  $\sim 56\%$  de aumento con respecto a la media de eventos para el *disparo estándar*.

Si hacemos un promedio de la tasa por cada hora durante los años 2014 al 2019, se obtiene la figura 3. Con respecto al disparo estándar se obtiene una curva de ajuste menos suave por la menor cantidad de años de eventos (por lo menos eso es lo que se me ocurre)




Fig. 2: Tasa de eventos por día por encima de 5.36 VEM  $\sim$  1 EeV

Como la calculas? Haciendo  $\$38 * \$12 / \$37$ ?






Fig. 3: Tasa de eventos por hora por encima de 5.36 VEM  $\sim 1$  EeV

Para los parámetros del clima en función del ángulo sólido, los ajustes obtenidos se presentan en las figs 4, 5 y 6. Se comparan con los valores de la corrección del clima sobre el arreglo principal con el disparo estándar.




Fig. 4: Parámetro de la presión





Fig. 5: Parámetro de la densidad del aire



### III. CORRECCIÓN DEL CLIMA

Acá empezó a fallar todo y no sé que pasó, voy a detallar que errores (o cosas que me hace ruido) me salieron y que acciones tomé/ que detalles revisé para ver que sucedía.

En el informe de fin de semestre, vimos que usando el bin de 1 EeV - 2 EeV teníamos un Rayleigh sucio pero sin la modulación diaria del clima (por lo menos no apreciable), como se muestra en la figura 7

Esta figura solo tiene la corrección del clima con los parámetros de la colaboración obtenidos en el 2017, que además son utilizados por el disparo estándar.

Con los parámetros  $a_P$ ,  $b_P$  y  $a_p$  en función de  $\sin^2 \theta$  se hace un ajuste con un polinomio de orden 2. Por lo tanto, dado un evento, mediante el valor de  $\theta$  asociado podemos tener los parámetros del clima para corregir ese evento.

- Cuando preparo el archivo para la corrección, me aseguro de que se esté imprimiendo el valor de  $S_{38}$  sin corregir.

- Para obtener la señal  $S_0$ , que en este caso  $S_{38,0}$ , uso la expresión  $S_{38,0} = S_{38}/(\text{factor clima})$

- Con este valor  $S_{38,0}$  reconstruyo la energía con  $E = A(S)^B$

Como se ve en la Fig.8, la modulación diaria es muy grande con respecto a lo que se vió el semestre pasado. Al momento de escribir esto, no encontré una razón por la cual sea tan grande el módulo. Lo que verifiqué son estos puntos

- tomo el archivo que usé para calcular los parámetros
- Calculo la nueva energía
- Me restrinjo a los eventos entre 1 - 2 EeV según la energía nueva
- Hago el análisis en el mismo rango de tiempo que lo que presenté el semestre pasado.

Como lo haces?  $\$38 * \$12 / \$37 * (1 + \dots)$






Fig. 7: Rayleigh con todos los disparos y la corrección de la colaboración




Fig. 8

Otros puntos: sería bueno ver como queda la distribución cenital de los eventos con CIC :-Hacer plot de his