UN INDIRIZZO SULLA SFERA CELESTE

Ascensione retta e declinazione: riferimenti comuni per descrivere il cielo.

Per individuare una stella sulla sfera celeste usiamo due coordinate angolari, ascensione retta e declinazione, definite su un sistema **geocentrico** con l'equatore celeste e i poli celesti, legato all'asse di rotazione della Terra.




PUNTO EQUINOZIALE, ORIGINE DELL'AR

Nel modello classico, il punto dell'equinozio di primavera è l'incrocio dove il percorso apparente del Sole attraversa l'equatore celeste da sud verso nord. Qui l'ascensione retta vale 0 h; si misura verso est fino a 24 h.



DUE COORDINATE

La **declinazione** misura quanto una direzione è a nord o a sud dell'equatore celeste: da −90° a +90°.
L'ascensione retta individua la posizione lungo l'equatore: 24 h = 360°, quindi 1 h = 15°.
Sono angoli, non distanze o tempi di viaggio.



EQUATORIALE E ALTAZIMUTALE

Il sistema equatoriale usa equatore e poli celesti: per una stella lontana le coordinate di catalogo sono sostanzialmente le stesse da luoghi diversi, a parità di riferimento ed epoca.
Altezza e azimut usano invece l'orizzonte locale e cambiano con luogo e ora.



UNA MONTATURA, DUE ASSI

L'asse AR va orientato verso il polo celeste, parallelo all'asse terrestre. Nell'emisfero nord la sua inclinazione sopra l'orizzonte è pari alla latitudine del luogo.
L'asse DEC è perpendicolare all'asse AR.
Dopo l'allineamento, la rotazione dell'asse AR compensa il moto diurno delle stelle.



Le coordinate non sono immutabili: riferimento, epoca, moto dell'astro e, per oggetti vicini, posizione dell'osservatore contano.
Il moderno ICRS è distinto dal modello equatoriale classico qui illustrato.

FONTI CONFRONTATE PER LA REVISIONE

NASA Reference Systems; SAIt Bignamino, p.35; INAF Torino, p.33; Treccani Coordinate, pp.4–5;
Treccani Coordinate celesti; Pacucci, Astronomia in rete, pp.12–13. Figure qualitative, non carte di puntamento.