

## Leghosszabb villamosmegállókból álló szakasz

Egy villamosjáratról tudjuk, hogy a megállói milyen messze vannak az előző állomástól, valamint az egyes állomásokra az érkezési és indulási időket (csak az egyik irányban, a villamos a 0. percben indul a 0. állomásról). Ha egy megállóban azonos az érkezési és az indulási idő, akkor a villamos ott nem állt meg.

Készíts programot, amely kiszámítja, a leghosszabb szakaszt és hosszát, ahol mindenhol megáll a villamos!

### Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a 0. utáni villamosmegállók száma van ( $1 \leq N \leq 100$ ). Ezt követően soronként a megállók adatai vannak: távolság az előzőtől ( $1 \leq T_i \leq 6000$ ), érkezési idő ( $1 \leq Er_k_i \leq 2000$ ), indulási idő ( $Er_k_i \leq Ind_i \leq 2000$ ).

### Kimenet

A *standard kimenet* első sorába a leghosszabb szakaszt és annak hosszát kell kiírni, ahol mindenhol megáll a villamos (az intervallum kezdő és végpontja megálló, vagy pedig a kezdő és a végállomás közül az egyik)! Több megoldás esetén a legelsőt kell kiírni!

### Példa

Bemenet

```
5
300 10 15
2000 30 30
1000 40 42
500 48 58
400 63 63
```

Kimenet

```
0 2 2300
```

### Korlátok

Időlimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32 MB

Pontozás: A tesztek 40%-ában a bemenet hossza  $\leq 20$