Fagnytt nr. 1 2026



Henriette Jæger – fantastisk sesong

MEDLEMSBLAD FOR FRIIDRETTENS TRENERFORENING

Fridrettens Trenerforening sitt styre 2024-25

Formann:	**Lars Ola Sundt**	**lars.ola.sundt@idk.no**
Øvelsesansvarlige:		
Kast:	**Katarina Sederholm Hoff**	**katarina.hoff@stjordal.kommune.no**
Sprint:	**Bjørn Johansen**	**bjorn.johans1@gmail.com**
Mellom/langdistanse:	**Knut Wilhelm Svendsen**	**knut@husvarme.as**
Mangekamp/stav/hekk:	**Bjørn Bogsti**	**bbogsti@online.no**
Hopp:	**Henning Hofstad**	**henhofs@gmail.com**
Barn/ung:	**Hilde Stokvold Gundersen**	**Hilde.Stokvold.Gundersen@hvl.no**
Redaktør Fagnytt:	**Henning Hofstad**	**henhofs@gmail.com**

Dette nummeret av Fagnytt inneholder:

Henning Hofstad:	**Redaktørens corner**	**Side 3**
Trenerforeningen:	**Presentasjon av trenerseminaret 2025**	**Side 4-7**
Atle Guttormsen:	**Tallene finnes – bruk dem**	**Side 8-14**
Henning Hofstad	**Hvor forsvant alle høydehopperne**	**Side 15-19**
Bjørn Johansen:	**Kan en enkel hoppøvelse gi bedre sprint**	**Side 22-3**
Atle Guttormsen:	**Hvordan vinnes en tikamp**	
Forsidebilde:	**Reidar langkjær**	

REDAKTØRENS CORNER

Når en ser på den nå avsluttede sesongen, kan en se på den med forskjellige blikk. Vi kan glede oss over de fantastiske prestasjonene til Henriette Jæger, Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm, Sondre Guttormsen, Beatrice Llano og Anthony Ommundsen Johnsen og glede oss over at Sander Skotheim og Markus Rooth er tilbake etter skader. Sander sågar med medalje til tross for at han lå en del under toppnivå. Vi kan samtidig være bekymret over tilstanden i mange av de tekniske øvelsene. Det er også god grunn til å være bekymret over nivået generelt i yngste juniorklasse.

Norges forrige storhetsperiode som friidrettsnasjon endte med en gedigen nedtur da alle de fremste utøverne gav seg etter OL i 2000. En tiårsperiode bar Andreas Thorkildsen norsk friidrett neste alene. Hvorfor skjedde dette? Her kan en peke på at masse ressurser ble brukt på topputøverne og at juniorsektoren ble for lavt prioritert inn mot årtusenskiftet. Det var rett og slett få eller ingen til å ta over. Det kan også skyldes tilfeldigheter, at akkurat da hadde ikke Norge utøveren med de genetiske kvalitetene som er nødvendig for å nå internasjonal topp.

I øyeblikket står norsk friidrett svært sterkt, men kan det samme skje igjen? At når dagens generasjon av medaljører avslutter karrieren sin, så er det få eller ingen nye medaljører på gang?

Det er meget tenkbart. Etter å ha studert junior-NM og UM må en innse at det ikke er noen, bortsett fra Anthony, som dominerer slik Karsten, Jakob, Sander, Karoline Grøvdal og Henriette gjorde i junioralder. Kan det skje at Anthony på et tidspunkt blir en ensom svale i verdenstoppen?

En kan med rette stille spørsmål om det er nødvendig å holde så høyt nivå som junior for å komme verdenseliten. Unntak finnes alltid. Sondre Guttormsen er et eksempel på dette. Han var god, men ikke ekstremt god, som junior og har maktet å heve seg til å bli en av verdens 3-4 beste stavhoppere i dag. Uansett viser statistikken at det er en nødvendighet å være til stede under juniormesterskapene. En trenger ikke ta medalje, men en bør ha det internasjonale nivået inne som junior dersom en skal ta medaljer i seniorklassen. I år hadde vi ingen finalister i tekniske øvelser i de internasjonale juniormesterskapene, noen få i løp plasserte seg blant de 12 beste.

Det kreves tiltak for å heve nivået på juniorsiden, særlig i tekniske øvelser. Dette er tatt opp i artikkelen; «Hvor forsvant alle høydehopperne?».

Norge er et lite land med få innbyggere. Klimaet er heller ikke det beste for friidrett. Hvordan kan det så ha seg at utøvere fra Norge har vunnet gull i verdensidretten friidrett under seks av de åtte siste olympiske leker, med seks forskjellige utøvere? Ser en på Norge som et lag er det en utrolig lagprestasjon.

Det er akseptert at det kreves helt spesielle genetiske egenskaper for å nå til topps i internasjonal friidrett. Hvis en ser på genetiske egenskaper kun som iboende fysiske egenskaper skulle det være statistisk umulig for Norge med sitt innbyggertall å ha så mange utøvere i verdenseliten. En bør derfor se på genetiske egenskaper i videre forstand. En kan se på gener som et viktig grunnlag, men som det er mulig å forvalte på best mulig måte.

Kvaliteten på denne forvaltningen gir svaret på hvorfor Norge stadig har utøvere i verdenstoppen. Igjen et bevis på den høye standarden det er på norske trenere.

Til sist vil jeg gi en honnør til Reidar Langkjær. Han har stilt sine bilder til disposisjon for Fagnytt uten vederlag og er alltid positiv til å bidra til det beste for bladet.

.

TRENERSEMINARET 2025

Atle Guttormsen er først og fremst kjent som faren og treneren til stavhopperne Sondre og Simen Guttormsen. Han har også mange synspunkter på mye i norsk friidrett. Her benytter han statisike data til å se på blant annet frafall og deltagelse i friidrett.

Alt var ikke bedre før, men norske høydehoppere var det. Her gir redaktøren et historisk tilbakeblikk på norsk høydehopp fra 1965 og filosoferer om hvorfor dagens nivå er som det er.

Hvor forsvant alle høydehopperne?

Av: Henning Hofstad

Mitt første friidrettsminne kan tidfestes til 4. august 1965. Jeg var 8 år gammel og hørte tilfeldigvis på radioen. Det var landskamp i friidrett. 20 år gamle Stein Sletten gjorde seg klar til å hoppe på rekordhøyden 2,10m. Han gikk over i sin slepne dykkstil. Norsk rekord!

Stein sitt rekordhopp var samtidig slutten på en epoke norsk høydehopp. Han var den siste rekordholderen som hoppet dykk. Etter han kom flophopperne Leif Roar Falkum, Terje Totland, Håkon Særnblom og dagens rekordholder, Steinar Hoen.

Ved en tilfeldighet var det høydehopp som brakte meg inn i friidretten. Jeg gikk i speideren og på idrettsdagen der hoppet jeg mye høyere enn alle de andre. Det samme gjentok seg da guttene i gaten drog på Skansemyren (friidrettsbane) for å teste hverandre i friidrettsøvelsene. Ja, vi gjorde slikt den gangen – uten foreldre, bare vi fikk penger til buss. 10 år gammel hoppet jeg 1,20m i høyde, i saksestil.

Mine foreldre fikk meg på friidrettstrening i Gular og der møtte jeg Stein Sletten. Han trente i samme gymsal som oss gutter, og etter at vår trening var ferdig kom Stein og hoppet. Vi guttene satt på radiatoren og slukte alt. Vi fikk også med oss at Stein, etter å ha hoppet 2,10m, fikk en karriereødeleggende kneskade. Han gav ikke opp, skiftet satsfot og hoppet utrolige 2.06m på den andre foten – med dykkstil!

Etter påske foregikk treningen på Skansemyren hvor det ikke var tjukkes å lande på. Vi landet i en sandhaug. Den måtte spades godt for hver gang vi trente! Som oftest var sanden fuktig. Jeg kom som oftest hjem med grosvart treningstøy. Min mor var ikke alltid like begeistret.

Den sommeren hoppet jeg høyde hver dag på hytten, en slags dykk med bøyd svingfort. En gammel madrass gjorde nytten som landingsmatte og treningen gav resultater. I flere år var det høyde som var hovedøvelsen og høsten jeg var tretten ble det opprettet en gruppe unge høydehoppere med Oddvard Nilsen som trener. Oddvard var landslagstrener og vi hadde voldsom respekt for han.

Det var mange gode høydehoppere i Bergen på 70-tallet. Etter Stein Sletten kom dykkhopperne Rune Gjengedal fra Gular og Per Kristian Vik fra Viking, med henholdsvis 2,12m og 2,18m som personlige rekorder. Dette ble de eneste norske dykkhopperne som hoppet over 2,10m.

Etter at Dick Folbury vant OL i 1968 kom flopstilen og en periode vekslet dykk- og flophopperne om å inneha verdensrekorden. Den siste dykkehopperen som hadde verdensrekorden, var Vladimir Jastsjenko fra Sovjetunionen. I 1978 hoppet han 2,35m innendørs og 2,34m utendørs. Etter dette tolk flopstilen fullstendig over og nivået steg til nye høyder. Det er liten tvil om at flop er en enklere stilart, som flere behersker. Dykk var mer krevende teknisk. På den tid kom det også nedslagsmatter på alle friidrettsbaner. Det sier seg selv at en ikke kunne hoppe flop og lande i en sandhaug uten å risikere rygg og nakkeskader.

I Norge ble Leif Roar Falkum den dominerende hopperen med den nye stilen. I perioden 1972-76 forbedret han norgesrekorden med 10cm til 2,20m. Ved en anledning hoppet Leif Roar 2,23m i et ekstrahopp, men dette kunne selvsagt ikke godkjennes som rekord.

I 1976 kom Terje Totland og tok opp kampen med Leif Roar. Han tangerte rekorden med 2,19m. Som 15-åring imponerte Terje med enorm spenst og 1,70m i saksestil. Etter et års trening med Oddvard nådde han imponerende 2,04m i 16-årsklassen. De neste årene fulgte han opp med 2,08m (17), 2,12m (18), 2,19m (19) og 2,22m (20) i 1977, som var norsk rekord. Dessverre fikk han en plagsom ankelskade og kom aldri høyere.

Både Leif Roar og Terje deltok under OL i 1976. Begge kvalifiserte seg til finalen og den foregikk under et voldsomt regnvær. Terje, som var ung og uredd (og dessuten vant til å hoppe i regnvær) leverte en glimrende konkurranse og ble nr. 9 på 2,18m. Leif Roar ble nr. 14 med 2,10m. Dette var første gang siden 1952 Norge hadde høydehoppere som var med i olympiske leker. Etter at Terje ikke lenger holdt samme nivå og Leif Roar la opp, så var det ingen tydelige arvtagere.

Terje kombinerte enorm spenst med svær fart i tilløpet. Det var banebrytende, men etter min mening samtidig en hemsko for konkurrentene. Det oppstod nemlig en forståelse av at det bare var Terje som kunne løpe så fort i tilløpet. Det gikk 10 år før noen forsøkte og like lenge før noen hoppet like høyt. Ikke før Håkon Særnblom hoppet 2,23m i 1987 ble rekorden forbedret.

1987 ble også starten på bedre tider. Håkon satt rekord, Gisle Ellingen fulgte opp med 2,22m og Jan Langøy nærmet seg også 2,20m. Sistnevnte tangerte rekorden i 1990, men det gikk ikke lenge før Håkon tok den tilbake. Junioren Steinar Hoen (18) hoppet 2,17m i 1989 og ble nr 11 under jr-EM.

Etter at Håkon og Steinar noen år vekslet på å sette nye rekorder, ble Steinar Hoen den ledende norske høydehopperen. Han nådde toppen med i 1994 med gull under EM i Helsinki. I tillegg gjorde han mange sterke prestasjoner i mesterskap. Hans norske rekord er 2,36m. Håkon Særnblom kom aldri på medaljeplass under internasjonale mesterskap, men oppnådde en sterk 4.plass i Helsinki da Steinar vant gull.

På denne tiden, fra 1987 til 1997, var det flere som sprengte 2,20m grensen. I tillegg til de som er nevnt tidligere klarte Steinar Grini, Jon Sigurd Utgårdsløkken, Bjørn Olsson og Jan Olav Husbyn å bryte denne barrieren. Norsk høydehopp stod sterkt.

Det skulle gå 12 år før en hopper igjen klarte 2,20m, og bare 4 nye hoppere har kommet til etter tusenårsskiftet. Brede Ellingsen (2009), Ivan Kristoffer Nilsen (2010), Sander Aae Skotheim (2023 innendørs) og Erlend Bolstad Raa (2025).

Både bredde og topp har vist en sterk nedgang helt siden tusenårsskiftet, både på junior- og seniornivå. Statistikken viser dette med all tydelighet. I år ble vinnerresultatet under junior-NM (u20) 1,86m og det var ikke dårlige forhold under konkurransen. Hvis en går 50 år tilbake i tid, til 1976, var det 38 juniorer som hoppet høyere enn årets vinnerresultat. I 1986 var tallet 43, men så avtar det etter hvert dramatisk. Fra 28 i 1996, til 10 i 2006, 10 i 2016 og bare en i 2026.

Det kan ellers nevnes at i 1984 klarte 47 hoppere 2,00m og nummer 100 hoppet 1,89m. Dette var det året mest best breddenivå. I år har 4 utøvere hoppet 2,00m, 6 har klart 1,89m og nummer 47 har hoppet 1,65m og nummer 100 1,30m. Elendigheten er altså meget godt dokumentert gjennom statistikk.

På kvinnesiden er bildet litt mer variert, men bredden har også her gått tilbake siden tusenårsskiftet. Ser vi igjen på statistikken fra 1976 toppet Astrid Tveit denne på 1,84m. Det resultatet var også hennes første norske rekord. Astrid var den dominerende hopperen de neste årene og hevet den norske rekorden ved flere anledninger. Hun tangerte Kari Karlsen norske rekord med 1,80m som 17-åring i 1974 og overtok rekorden alene fra 1976. Hun flyttet rekorden opp til 1,90m i 1982, men holdt på frem til 1984, hvor hun stadig toppet statistikken, nå med 1,87m. Astrid deltok under OL i Montreol 1980 (uplassert) og i flere EM, med 10. plass i 1978 (1,80m) som beste plassering,

I 1976 var det 7 hoppere over 1,70m og 25 hoppere som klarte 1,60m. En fun fact er at de 38 beste hopperne var juniorer. Først på 39. plass finner vi beste senior som var mangekjemperen Cecil Tidemand-Hansen.

Hopper en frem til 1986 har vår beste høydehopper gjennom tidende overtatt hegemoniet. Hanne Haugland hadde en lysende karriere med VM gull i Athen 1997 som toppunktet. Hennes andre internasjonale medalje var sølvmedalje fra innendørs-EM i 1988. Hun hadde sin beste sesong i 1997, 30 år gammel. Bemerkelsesverdig er det at hun hoppet 21 konkurranse utendørs dette året, altså ikke snakk om konkurransevegring. I 13 av disse hoppet hun 1,94m eller høyere.

Bredden var også meget god i 1986. Hele 15 hoppere klarte 1,70m eller høyere og ytterligere 35 var over 1,60m.

Over på 2000 tallet kom det flere arvtagere etter Hanne Haugland som hoppet over 1,90m. Anne Gerd Eieland (1,93m - 2003), Stine Kufaas (1,93m - 2010), Øyunn Grindem (1,90m 2011), Tonje Angelsen (1,97m – 2012) og Katarina Møgenburg (1,90m – 2015). I alt 8 hoppere har hoppet 1,90m. Denne høyden vil omtrent tilsvare 2,20m for menn. En kan altså hevde at menn og kvinner historisk sett (etter 1970) har vært temmelig jevngode.

Den beste hopperen etter årtusenskiftet er Tonje Angelsen. Under EM i Helsinki 2012 utkjempet hun en særdeles spennende duell med spanske Ruth Beitia. Vi som var til stede vil alltid minnes at Tonje hoppet best, men at Beitia konkurrerte best. Tonje fikk et riv på sist klarte høyde (1,97m) og gikk over med god klaring etterpå, mens Beitia gikk over i første forsøk med en list som hoppet og danset.

Breddenivået holdt seg med 8 hoppere over 1,70m og 26 over 1,60m i 2006. 10 år frem i tid var breddenivået bedre. I 2016 var det 12 hoppere over 1.70m og 36 over 1,60m.

Så skjer det et kraftig fall i både i topp og bredde. Under årets sesong toppes statistikken med 1,77m og bare 18 hoppere er over 1,60m. Det er riktignok 9 stykker over 1,70, som er omtrent som normalen.

Toppnivået for kvinner er nå historisk svakt, og bredden går raskt nedover. For herrene er det også bredden som er katastrofalt dårlig, men et lyspunkt er at to menn har hoppet over 2,20 i løpet av de siste årene.

Hva kan være årsakene til en slik negativ utvikling? Her kan en bare spekulere, for det finnes ikke forskning (kun statistikk) som kan belyse temaet. En kan trekke frem en del momenter.

- Treningsforholdene har endret seg. Før friidrettshallene ble det trent ute eller i gymsaler. Hva kunne en gjøre av friidrett i en gymsal? Det begrenset seg til styrke- og spensttrening. Høyde og lengde uten tilløp og gjerne høydehopp. Det var rett og slett flere som prøvde og trente øvelsen høyde.
- Tidligere var det flere som begynte med friidrett, altså er det sannsynlig at det var flere som oppdaget et talent for høydehopp
- Den jevne ungdom var sprekere før. Det var mer fri lek, vanlig å gå/sykle til skolen og aktiviteter, mer fysiske aktiviteter i skolegården.
- Generelt var ungdom slankere før. Kroppsvekt har betydning for prestasjonen i høydehopp. Det er sannsynlig at flere fikk mestringsfølelse gjennom høydehopp.
- Det er en sammenheng mellom kroppshøyde og prestasjon i høydehopp. (Unntak finnes.) Høye ungdommer, som åpenbart kunne blitt gode høydehoppere, er attraktive til håndball, basketball, volleyball og ikke minst fotball.
- Tilgjengeligheten til uorganisert høydehopp er redusert. I stedet for at barn og ungdom kan gå på banen og hoppe høyde, ligger mattene ofte inne i lukkede bur. Høydematter burde være tilgjengelig for egentrening til enhver tid i utesesongen.
- Friidrett har liten plass i skolen.
- De som utdanner seg til kroppsøvingslærere får alt for lite opplæring i friidrettsteknikk. Timetallet under studiet er vesentlig lavere enn da jeg utdannet meg for 45 år siden. Det er ikke noe krav til egenferdighet for studentene.
- Konkurransen fra andre idretter har økt.
- De fleste klubbene har begrensede trenerressurser. Tekniske øvelser krever mindre grupper enn løp for å gi god veiledning på den enkelte økt. For å holde et greit aktivitetsnivå blir løp adskillig enklere å administrere. Høydehopp og tekniske øvelser blir skadelidende.
- Det er grunn til å tro at spensttrening nedprioriteres på klubbtreningene for barn og ungdom. Erfaring viser at masse spensttrening fra tidlig alder er en nøkkel for å lykkes i hoppøvelsene. Denne treningen virker også skadeforebyggende (min påstand) og gir et godt grunnlag for så godt som alle øvelser.
- På slutten av 90-tallet ble det brukt store økonomiske ressurser på seniorutøverne. Juniorsatsingen ble lidende. Det gjorde seg utslag i at troppene til internasjonale juniormesterskap var svært små. I 2002 var det tre gutter som deltok i junior-VM. De to påfølgende junior-VM, 2004 og 2006, gikk uten norske mannlige deltagere. Mye av tradisjonen og miljøene gikk tapt. Det gjorde seg spesielt gjeldende i tekniske øvelser.

- Det foreligger ikke en klart definert treningslinje for hoppøvelsene. (Her holder jeg stav utenfor.) Det er per i dag heller ikke noen autoritetsperson i hopp som kan samle troppene og presentere en faglig linje – «slik gjør vi det». Kast har hatt og har slike personer i Einar Brynemo, Thomas Rosvold, Jørund Aardal og Paul Solberg. I dag er det ikke noe strukturert samarbeid mellom de ulike hopptrenerne. Hver trener har sin egen treningsfilosofi og alle holder på med sitt.
- Det er ikke noen oppfølgingsgrupper i friidrettsforbundets regi før en er på juniorlandslagsnivå. Heller ikke er det noe system for å gi faglig støtte til trenere som har ansvar for talentfulle utøvere. Personlige trenere får ikke være med i troppen på internasjonale mesterskap.
- Det har vært lite tilsig av trenere som behersker tekniske øvelser, høydehopp inkludert. Det er også færre trenere enn før. (Det merker trenerforeningen også på oppslutningen om trenerseminarene.)

Disse momentene kan alle være med å forklare den store prestasjonsnedgangen. Det er nok mange faktorer som virker sammen. Som kjent hjelper det ikke noe å klage over en utvikling som har skjedd, en må rette blikket fremover og se hva som kan gjøres for å rette opp kursen.

En helt klar årsak til nedgangen er mangel på kompetente trenere. Det finnes en del gode trenere som helt klart kan få frem nye høydehoppere, men det er altfor få. Fremfor alt er det få unge trenere som behersker trening for og teknikk i høydehopp. Generelt er det bekymringsfullt at det er så få unge trenere. Veldig mange sentrale trener er 60+. Hvem skal erstatte disse når de en gang må gi seg?

Her sitter NFIF med nøkkelen. Det bør umiddelbart settes i gang et prosjekt for å utdanne/videreutdanne trenere i tekniske øvelser, spesielt yngre trenere. Her tenker jeg tilbake på trener III kurs i forbundets regi sent på 90-tallet. Her ble det gitt et tilbud hvor deltagerne kunne få studiepoeng. NFIF bør forsøke å inngå et samarbeid med en utdanningsinstitusjon og sette opp et studietilbud. Så må en lage og få godkjent en fagplan hvor trening i og teknikkanalyser av de tekniske øvelser er dominerende.

Etter mitt syn bør unge talenter trekkes inn til sentrale samlinger og prosjekter på et tidlig tidspunkt. Bør det opprettes grupper, enten på forbunds- eller regionsnivå, hvor utøverne tas inn fra 15-års alder? Etter min mening er svaret ja. Det er for sent når talenter er 17-18 år gamle. Det er helt avgjørende at tekniske ferdigheter og gode treningsrutiner er tidlig på plass. God veiledning gjennom et samarbeid mellom den lokale treneren og en erfaren trener engasjert av NFIF kan være løsningen. Jeg er helt sikker på at mange erfarne trenere vil bidra hvis det blir et system trenerne kan stille seg bak. Disse tiltakene kommer til å koste. Jeg tror NFIF er nødt til å se realitetene og gjennomføre tiltak.

En må også stille spørsmål om idrettslig avdeling i NFIF er for svakt bemannet. Det er mange ansatte på forbundskontoret, men er det nok tyngde i idrettslig sektor? Et litt flåsete spørsmål; er det viktigst med mange administrative ansatte eller mange som driver med idrettsaktivitet i felten?

Et tema som stadig nevnes er at friidretten må tilbake i skolen. Det har vist seg å være vanskelig å få til gjennom skolens fagplaner. Imidlertid finnes det engasjerte lærere som fanger opp talentfulle ungdommer og tipser dem om at friidrett kan være noe for dem. Jeg tror at noe (det beste?) en kan få til er at lokale klubber får anledning til å gjennomføre friidrettsrelaterte tiltak. I så fall kan klubbene fange opp enkelte talenter og håpe at de ikke allerede er så engasjert i andre idretter at friidrett kan være spennende.

Klubbene har selvsagt også et stort ansvar for situasjonen. Ansvaret for barne- og ungdomsfriidretten ligger hos klubbene opp til et visst aldersnivå. Jeg aner er at alt for mange trenere har en redsel for å starte opp med øvelser de ikke føler de behersker godt nok. Det som er helt sikkert er at uten utprøving av hopp og kast, så blir det kun spesielt interesserte som driver med disse øvelsene. En kan bare oppfordre klubbene til å ta tak og utvide repertoaret. En ser nå at slegge er en svært populær øvelse, særlig blant de yngre. Det tyder på at det lar seg gjøre å mobilisere til mer variert øvelsestrening rundt om i klubbene. Her må mottoet være at noe er langt bedre enn ingenting.

Uavhengig av klubbenes ansvar må NFIF gjøre noe for å bedre situasjonen. Resultatene i de tekniske øvelsene var totalt sett direkte pinlige under juniorlandskampen. Vi ble rett og slett utklasset av Finland og Sverige. Når det er sagt, blir det helt feil å skylde på de aktive. Mitt inntrykk er at de er seriøse og gjør så godt de kan. Det er ikke deres skyld at de ikke presterer på det nivået en ønsker, men en kan ikke stikke under en stol at Norge lå et langt stykke bak sine konkurrenter.

Junior-NM og UM ble heller ikke noen opptur når det gjelder tekniske øvelser. Det var kun enkeltstående prestasjoner som holdt et greit nivå. Ellers var det svært lite å glede seg over. Det svinger resultatmessig og akkurat nå er vi i en bølgedal. Det som må til, er at hele organisasjonen tar et tak for å snu den nedadgående trenden.

Og initiativet må komme fra de ansvarlige i NFIF.

Bjørn Johansen er sprint- og hekktrener og doktorgradsstipendiat ved Nord universitet. Artikkelen bygger på en delstudie i doktorgradsprosjektet om horisontale flerhopp og sprintprestasjon.

Kan en enkel hoppøvelse gi bedre sprint?

Av: Bjørn Johansen

Seks uker med single leg jumps ga bedre utvikling enn bounding hos unge fotballspillere.



Bounding (øverst) og single leg jumps for speed (nederst). A: sats, B: svev, C: landing. Foto/figur fra den publiserte studien, CC BY 4.0.

Bounding brukes mye i sprinttrening fordi øvelsen ligner løping i høy fart. Likevel ga single leg jumps for speed et tydeligere resultat i vår studie. Det mest interessante er ikke bare hva som skjedde, men hvorfor en tilsynelatende mindre sprintlik øvelse kan ha fungert bedre.

STUDIEN KORT FORTALT

- 19 kvinnelige fotballspillere, i gjennomsnitt 15 år
- Seks ukers trening, to økter per uke
- Én gruppe trente bounding, én gruppe trente single leg jumps for speed
- Begge gruppene avsluttet hver økt med 3 × 30 m sprint
- Vi målte 10 m, 20 m, maksimal hastighet, 40 m og bevegelsen i hoppene

Fra en kjent øvelse til et åpent spørsmål

Horizontal hopptrening har lenge hatt en naturlig plass i sprint og lagidrett. Tanken er enkel: Skal utøveren løpe fort framover, bør noe av styrke- og spensttreningen også rette kraften framover.

Bounding passer godt inn i denne tanken. Øvelsen har vekselvis sats på høyre og venstre bein, relativt korte bakkekontakter og en rytme som minner om sprint.
Men likhet med konkurranseøvelsen er ikke hele svaret. En støtteøvelse må også kunne gjennomføres med høy nok kvalitet og gi en tydelig belastning. Dersom øvelsen blir for krevende teknisk, kan mye av treningen gå med til å løse selve bevegelsen. Da er det ikke sikkert den gir den utviklingen treneren ønsker.
I studien sammenlignet vi derfor bounding for speed med single leg jumps for speed. I single leg jumps hopper utøveren gjentatte ganger på samme bein med mål om størst mulig framoverfart. Etter 15 meter byttes bein. Begge øvelsene er horisontale og gjennomføres med maksimal eller nesten maksimal innsats, men rytmen og kravene er forskjellige.

Slik trente spillerne


Treningsperioden varte i seks uker. Øvelsene ble lagt inn etter fotballoppvarmingen og før resten av fotballtreningen. Belastningen ble gradvis økt:

Periode	Bounding-gruppen	SLJ-gruppen	Begge grupper
Uke 1–2	3 × 30 m	3 × (15 + 15 m)	3 × 30 m sprint
Uke 3–4	4 × 30 m	4 × (15 + 15 m)	3 × 30 m sprint
Uke 5–6	5 × 30 m	5 × (15 + 15 m)	3 × 30 m sprint

Alle drag ble utført med omtrent 95–100 prosent innsats og 90 sekunders pause. I praksis gjennomførte gruppene rundt elleve av tolv planlagte økter. Det var altså et kort og enkelt opplegg som kunne legges inn i vanlig trening uten store endringer i ukeplanen.

Hva fant vi?

Når begge gruppene ble analysert samlet, ble sprintprestasjonen bedre gjennom perioden. Den statistiske sammenligningen viste imidlertid ikke en sikker forskjell mellom gruppene. Det betyr at vi ikke kan slå fast at single leg jumps er bedre enn bounding for alle utøvere og i alle situasjoner.
Samtidig var mønsteret tydelig. Alle de ni spillerne i single leg jump-gruppen forbedret 40 meter. Gruppen hadde også forbedringer på 10 meter, 20 meter, maksimal hastighet og 40 meter. I bounding-gruppen forbedret sju av ti spillere 40 meter, men endringene var mindre og ikke statistisk sikre innen gruppen.
De to gruppene utviklet også selve hoppene forskjellig. Single leg jump-gruppen økte hastigheten i øvelsen og fikk lengre steg. Bounding-gruppen økte stegfrekvensen, samtidig som steglengden hadde en tendens til å bli kortere. Det kan tyde på at spillerne først og fremst endret rytme og strategi i bounding, uten at den samlede framoverfarten økte.



Figur 1. Gjennomsnittlig 40 m-tid. Forskjellen mellom gruppene var ikke statistisk sikker, men alle ni i SLJ-gruppen forbedret seg. Tallene er hentet fra den publiserte studiens figur 3.

DET VIKTIGSTE FOR TRENERE

- Resultatene peker i retning av at single leg jumps kan være en effektiv og enkel støtteøvelse for unge utøvere.
- Studien beviser ikke at bounding er en dårlig øvelse.
- Kvaliteten på gjennomføringen ser ut til å være avgjørende.
- En øvelse som ligner sprint mest, er ikke nødvendigvis den som gir best treningseffekt i en bestemt gruppe.

Hvorfor kan single leg jumps ha fungert bedre?

1. Bounding krever flere ting samtidig

For å få høy fart i bounding må utøveren kombinere lange steg med høy stegfrekvens. Det høres enkelt ut, men kravene trekker delvis i hver sin retning. Lange steg krever stor kraft og nok svev, mens høy frekvens krever raske bevegelser og korte kontakttider. Hos dyktige utøvere kan dette smelte sammen til en effektiv rytme. Hos unge spillere kan det bli en krevende koordinasjonsoppgave.

I treningen observerte vi at flere spillere slet med å finne en stabil og effektiv rytme i bounding, selv om de hadde øvd på øvelsen på forhånd. Noen fikk for stor bevegelse oppover, noen tok for korte steg, og andre økte frekvensen uten å skape mer fart framover. Når utførelsen varierer mye fra drag til drag, kan også treningsutbyttet bli mindre tydelig.

2. Single leg jumps har et enklere og tydeligere mål

I single leg jumps er målet enkelt: Utøveren skal komme seg fra A til B på kortest mulig tid ved å hoppe gjentatte ganger på samme bein. Oppgaven er derfor lett å forstå, og utøveren kan konsentrere seg om å skape mest mulig fart framover.

Utøveren trenger ikke å veksle mellom høyre og venstre bein i hvert steg, slik som i bounding. Det kan gjøre rytmen lettere å holde og utførelsen mer stabil. I vår gruppe så det ut til at spillerne gjennomførte single leg jumps med bedre kontroll og jevnere kvalitet.

3. Stor belastning i hvert steg kan ha gitt bedre treningseffekt

At single leg jumps er enklere å utføre teknisk, betyr ikke at øvelsen er fysisk lettere. Øvelsen gjennomføres med lavere hastighet og lengre kontakttid enn både sprint og bounding. For at samme bein skal rekke fram til neste sats, blir også flytiden relativt lang. Det gir større bevegelse oppover og en kraftigere landing før neste sats.


Denne kombinasjonen kan ha gitt stor belastning i hvert steg og stilt tydelige krav til kraftutvikling, balanse og kontroll. Den lengre kontakttiden kan også ha gitt utøveren mer tid til å utvikle kraft i satsen.
Over tid kan dette ha forbedret evnen til å produsere kraft framover. Det kan igjen ha bidratt til lengre steg og høyere fart både i single leg jumps og i sprint.
Studien målte imidlertid ikke kraft direkte. Dette må derfor omtales som en mulig forklaring på resultatene, ikke som en bevist årsak.

4. Øvelsens vanskelighetsgrad må passe utøveren

Spesifisitet blir ofte forstått som at en øvelse bør ligne mest mulig på konkurransebevegelsen. Men god trening handler også om at øvelsen passer nivået til utøveren.
Bounding ligner mer på sprint når det gjelder rytme, veksling mellom beina og kontakttid. Likevel kan øvelsen gi begrenset effekt dersom utøveren ikke behersker den godt nok. I denne gruppen kan single leg jumps ha gitt en bedre kombinasjon av mestring, høy innsats og stor belastning.
Det betyr ikke at bounding er en dårlig øvelse. Men for unge spillere kan den ha vært for teknisk krevende til at de fikk fullt utbytte av den i løpet av seks uker.

5. Høyere frekvens ga ikke høyere fart

Bounding-gruppen økte stegfrekvensen, men hopphastigheten økte ikke. Samtidig ble steglengden noe kortere. Det viser at en enkelt teknisk variabel ikke bør tolkes alene.
Høyere frekvens er bare en fordel dersom utøveren samtidig klarer å opprettholde tilstrekkelig steglengde og kraft i hvert steg. I denne studien ser endringen derfor mer ut som en annen bevegelsesstrategi enn som en tydelig forbedring i prestasjon.



Figur 2. En mulig forklaring på forskjellen i utviklingsmønster. Figuren oppsummerer vår tolkning og skal ikke leses som et endelig bevis på mekanismene.

Hva betyr dette i praksis?

Studien gir ikke grunnlag for å fjerne bounding fra treningen. Bounding kan være en svært god øvelse for utøvere som har nok styrke, rytme og teknisk kontroll. Men treneren bør ikke velge øvelse bare

fordi den ser sprintlik ut. Det avgjørende spørsmålet er om utøveren faktisk klarer å utføre den med ønsket fart, steglengde, rytme og kvalitet.

Forslag til bruk av single leg jumps for speed

Plassering i økta	Etter oppvarming, før tung styrke eller mye løping
Mengde	3–5 serier × 15 m på hvert bein
Intensitet	Høy, men bare så lenge rytme og kontroll beholdes
Pause	Omtrent 90 sekunder mellom seriene
Underlag	Fast og jevnt; start gjerne på kunstgress eller et noe mykere dekke
Kombinasjon	Avslutt gjerne med 2–3 sprintdrag på 20–30 m

For unge eller lite erfarne utøvere kan det være klokt å begynne med kortere distanser og færre serier. Avslutt serien dersom utøveren mister balansen, får svært lange kontakttider eller begynner å hoppe tydelig mer opp enn fram. Målet er ikke størst mulig hopp per steg, men høyest mulig kontrollert framoverfart.

Når passer bounding best?

Bounding kan prioriteres når utøveren behersker vekslingen mellom beina og klarer å kombinere relativt lange steg med høy frekvens. Øvelsen kan være særlig relevant for sprintere med god teknisk bakgrunn. Den kan også brukes over kortere distanser med tydelig teknisk fokus før den gjennomføres maksimalt. For noen vil en progresjon fra submaksimal bounding til bounding for speed være mer hensiktsmessig enn å starte direkte med maksimal fart.

TRENERENS SJEKKLISTE

- Øker utøveren faktisk farten gjennom hoppserien?
- Er rytmen stabil fra steg til steg?
- Beholdes god linje i hofte, kne og ankel?
- Gir øvelsen ønsket effekt – eller trener utøveren mest på å løse koordinasjonen?

Vær forsiktig med bastante konklusjoner

Studien hadde bare 19 deltakere, og alle var unge kvinnelige fotballspillere. Det manglet også en kontrollgruppe som ikke gjennomførte hopptrening. Begge grupper trente sprint i tillegg, og annen fotballtrening kan ha påvirket resultatene. Derfor kan vi ikke vite hvor stor del av framgangen som kom fra hoppøvelsen alene.

Den statistiske testen viste heller ikke en sikker forskjell i sprintutvikling mellom gruppene. Innenfor SLJ-gruppen var mønsteret likevel konsistent, og effektstørrelsen for forskjellen i 40 meter-utvikling var relativt stor selv om p-verdien ikke nådde grensen for statistisk signifikans. Dette gjør resultatene interessante, men de må undersøkes videre i større studier.

Resultatene bør heller ikke tolkes som at én øvelse alltid er best. En eldre sprinter med høy teknisk kompetanse kan svare annerledes enn en 15 år gammel fotballspiller. Det kan også være at de to øvelsene utfyller hverandre: single leg jumps kan utvikle kraft og kontroll per steg, mens bounding kan brukes til å overføre dette til en raskere, mer sprintlik rytme.

Konklusjon

Etter seks uker viste single leg jump-gruppen et tydelig og konsistent utviklingsmønster i både sprint og den trente hoppøvelsen. Bounding-gruppen forbedret først og fremst stegfrekvensen i bounding, uten en tilsvarende sikker økning i sprintprestasjon eller hopphastighet.

Den mest sannsynlige forklaringen er at single leg jumps ga disse unge spillerne en bedre kombinasjon av teknisk mestring og fysisk belastning. Bounding lignet mer på sprint, men var samtidig vanskeligere å gjennomføre effektivt. Studien minner oss derfor om et viktig prinsipp: Den beste støtteøvelsen er ikke alltid den som ser mest spesifikk ut. Den må også passe utøverens nivå og kunne utføres med høy kvalitet.

OM STUDIEN

• Johansen, B., Neville, J. og van den Tillaar, R. (2025). Comparison of Training Effects of Bounding and Single Leg Jumps for Speed on Sprint and Jump Kinematics in Young Female Football Players.

• Journal of Functional Morphology and Kinesiology, 10, 468.

• Artikkelen er publisert med åpen lisens (CC BY 4.0).

Atle Guttormsen har sett på poengtaktikk for tikjempere. Hvilke øvelser gir stort utslag poengmessig og er viktig å beherske godt og hva lønner det seg å forbedre?

Hvordan vinnes en tikamp?

Av: Atle Guttormsen