

§ 6. Jordan 標準形（べき零行列の場合）

輪講 #3

2025-02-24

べき零行列

べき零行列

- 正方行列 N が**べき零**であるというのは、 $N^k = O$ となるような k が存在すること.

例: $\begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ はべき零.

定理 6.1: $N \in M_n(\mathbb{C})$ がべき零 $\Leftrightarrow N$ のすべての固有値が 0.

Proof:

- (\Rightarrow) 固有値 λ の固有ベクトル v に N を左から然るべき回数掛けると,
 $0 = N^k v = \lambda^k v$ より $\lambda = 0$.
- (\Leftarrow) 固有多項式は $\phi_N(x) = x^n$. Cayley-Hamilton の定理より $N^n = O$.

□

Remark 対角化可能なべき零行列は零行列に限る.

べき零行列のべきの上界

定理 6.2: $N \in M_n(\mathbb{C})$ をべき零行列とする. k を $N^k = O$ となる最小の自然数とすると, $k \leq n$.

Proof: $N^{k-1} \neq O$ より $N^{k-1}x \neq 0$ なる $x \in \mathbb{C}^n$ がとれる.

Claim $x, Nx, \dots, N^{k-1}x$ は一次独立.

- 線型関係式 $\sum_{0 \leq i < k} c_i N^i x = 0$ を考える.
- 両辺に N^{k-1} を左から掛けることで $c_0 = 0$ を得る.
- 同様に N^{k-2}, \dots, N, I を左から掛けることで線型関係式が自明であることがいえる.

したがって, 特に $k \leq n$ がいえる.

□

べき零行列の Jordan 標準形

定義 6.1: $\lambda \in \mathbb{C}$ に対して, 次の $J(\lambda; n)$ を **Jordan 細胞** という :

$$J(\lambda; n) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{C}).$$

Jordan 細胞を用いて, 次のように表される正方行列を **Jordan 標準形** という :

$$\begin{pmatrix} J(\lambda_1; m_1) & & & \\ & J(\lambda_2; m_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J(\lambda_r; m_r) \end{pmatrix} \in M_{m_1 + \cdots + m_r}(\mathbb{C}).$$

定理 6.3: $N \in M_n(\mathbb{C})$ がべき零行列ならば, ある正則な $P \in M_n(\mathbb{C})$ が存在し,

$$P^{-1}NP = \begin{pmatrix} J(0; m_1) & & \\ & J(0; m_2) & \\ & & \ddots \\ & & & J(0; m_r) \end{pmatrix}.$$

証明の流れはおおまかには次のようになる:

1. べき零行列 N には, 増大列 $\{0\} \subsetneq \text{Ker } N \subseteq \dots \subseteq \text{Ker } N^k = \mathbb{C}^n$ が付随する.
2. 増大列に“沿う”ような良い具合の基底をとっていく.
3. A をこの基底で取り換えると Jordan 標準形になっている.

Setup

$N = O$ なら始めから Jordan 標準形になっているので、以下では $N \neq O$ とする。

- k を, $N^k = O$ となるような最小の自然数とする. $\leadsto 2 \leq k \leq n$.
- $W_j = \text{Ker } N^j$ を “ j 次の Kernel” と呼ぶことにする (これは一般的でない名称) .

次のような増大列をイメージする：

$$\{\mathbf{0}\} = W_0 \subseteq W_1 \subseteq \cdots \subseteq W_{k-1} \subseteq W_k = \mathbb{C}^n.$$


N は正則でない ($\because N$ の固有値はすべて $0 \leadsto \det N = 0$) から,

$$\{\mathbf{0}\} = W_0 \subsetneq W_1 \subseteq \cdots \subseteq W_{k-1} \subseteq W_k = \mathbb{C}^n.$$

- $1 \leq j \leq k$ について $d_j = \dim W_j - \dim W_{j-1}$ とすると, d_j はつねに非負.
 - $\leadsto \sum_{j=1}^k d_j = \dim \mathbb{C}^n - \dim \{\mathbf{0}\} = n$.


増大列の様子


べき零行列の Jordan 標準形



増大列の直和分割

Remark V の部分空間 W に対して, $V = W \oplus \tilde{W}$ なる \tilde{W} が存在する.





Check! U_j は“ $N^j \times$ でやっと 0 になる”ベクトル全体によって張られる部分空間.

線型独立な $x_1, \dots, x_{d_k} \in U_k$ によって W_{k-1} の基底を延長して W_k の基底とする.

このとき, x_1, \dots, x_{d_k} は次の条件を満たしている:

1. $\langle Nx_1, \dots, Nx_{d_k} \rangle \subseteq U_{k-1}$.
 - x_j は“ N^k でやっと 0 になる”から, Nx_j は“ N^{k-1} でやっと 0”になる.
2. Nx_1, \dots, Nx_{d_k} は一次独立.
 - $\sum_j c_j Nx_j = 0 \Rightarrow N\left(\sum_j c_j x_j\right) = 0 \Rightarrow \sum_j c_j x_j \in W_1 \Rightarrow \sum_j c_j x_j \in W_{k-1}$.
 - もし $\sum_j c_j x_j \neq 0$ であれば $x_j \notin W_{k-1}$ に矛盾するので, $\sum_j c_j x_j = 0$.
 - x_1, \dots, x_{d_k} は線型独立だったから $c_1 = \dots = c_{d_k} = 0$.

W_{k-1}, W_k の上段を抜粋.


べき零行列の Jordan 標準形


$$U_{k-1}$$

$$U_k = \langle x_1, \dots, x_{d_k} \rangle$$
$$U_{k-1}$$

$\text{Im}_N U_k \subseteq U_{k-1}$ の様子.

べき零行列の Jordan 標準形





W_{k-2} の上段でも同様の現象が起こる.


U_{k-1} の基底は $Nx_1, \dots, Nx_{d_k}, x_{d_k+1}, \dots, x_{d_{k-1}}$ になっている.

$\text{Im}_N U_k \subseteq U_{k-1}$ と Nx_1, \dots, Nx_{d_k} の線型独立性を示したときとまったく同様にして次が成り立つ:

- $\text{Im}_N U_{k-1} = \langle N^2x_1, \dots, N^2x_{d_k}, Nx_{d_k+1}, \dots, Nx_{d_{k-1}} \rangle \subseteq U_{k-2}$.
- $N^2x_1, \dots, N^2x_{d_k}, Nx_{d_k+1}, \dots, Nx_{d_{k-1}}$ は一次独立.
 - 次のように換言してもよい: $N \times$ によって U_{k-1} は退化しない. つまり, $\dim \text{Im}_N U_{k-1} = d_{k-1}$.



$\text{Im } U_{k-1} \subseteq U_{k-2}$ の様子.


べき零行列の Jordan 標準形



例によって余った部分の基底をとる.

べき零行列の Jordan 標準形





\mathbb{C}^n の基底

以上のような操作を繰り返すことにより $\mathbb{C}^n = W_k$ の基底をとることができる． その構成は次の基底を集めたものになっている：

- U_k の基底： x_1, \dots, x_{d_k} ．
- U_{k-1} の基底： $Nx_1, \dots, Nx_{d_k}, x_{d_k+1}, \dots, x_{d_{k-1}}$ ．
- \vdots
- U_1 の基底 $N^{k-1}x_1, \dots, N^{k-1}x_{d_k}, N^{k-2}x_{d_k+1}, \dots, N^{k-2}x_{d_{k-1}}, \dots, x_{d_2+1}, \dots, x_{d_1}$ ．