

Informe de enmiendas del terreno (Arranque y siembra) - Bajo Cuadras

AgroNutri AI — Informe técnico de fertirrigación · 3/8/2026

1. Datos de la explotación

Finca: Bajo Cuadras (AGROSABINA SL). Los Silos Tenerife
Cultivo: platanera, variedad Pequeña enana. Fase fenológica: pre-parición.
Plantas: 5500. Superficie: 3 ha. Riego: 125 L/planta/semana (688 m³/semana).
Sectores: Sector Norte (2100 plantas); Sector Central (1800 plantas); Sector Sur (1600 plantas)

2. Analítica de agua de riego

Referencia A-25/118011, Laboratorio agroalimentario (Balten TFN), fecha de muestreo 2025-07-28. Agua alcalina con sodio elevado; se mezcla con 30 % de agua desalada.

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia	Estado
Conductividad eléctrica (CE)	910	µS/cm	0 - 1500	normal
pH	8.6		6.5 - 8.4	alto
Alcalinidad total (CaCO3)	380	mg/L	0 - 200	muy alto
Sodio (Na)	170	mg/L	0 - 115	alto
Calcio (Ca)	9.55	mg/L	40 - 120	muy bajo
Magnesio (Mg)	20.6	mg/L	10 - 50	normal
Potasio (K)	19	mg/L	0 - 20	normal
Cloruros (Cl)	101	mg/L	0 - 150	normal
Boro (B)	0.83	mg/L	0 - 0.5	alto

3. Analítica de suelo

Referencia S-25/079328, Laboratorio agroalimentario, fecha de muestreo 2025-09-25. Sodio de cambio 17,1 % de la CIC: principal problema. pH muy alcalino.

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia	Estado
pH	8.72		6 - 7.5	muy alto
CE (extracto 1:5)	750	µS/cm	0 - 800	alto
Materia orgánica	6.73	%	2 - 6	alto
Nitrógeno total	3755	mg/kg	1000 - 3000	alto
Fósforo Olsen	216	mg/kg	25 - 60	muy alto
Calcio de cambio	21.9	meq/100g	8 - 25	normal
Magnesio de cambio	14.2	meq/100g	2 - 8	muy alto

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia	Estado
Potasio de cambio	5.82	meq/100g	0.5 - 2.5	muy alto
Sodio de cambio	8.64	meq/100g	0 - 2	muy alto

4. Analítica foliar

Referencia V-25/061489, Laboratorio agroalimentario, fecha de muestreo 2025-09-25. Deficiencia de Ca inducida por antagonismo Na/Mg/K; Fe y Zn bajos, Mn muy alto.

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia	Estado
Nitrógeno (N)	2.68	%	2.6 - 3.5	normal
Fósforo (P)	0.203	%	0.16 - 0.27	normal
Potasio (K)	4.11	%	3 - 4	alto
Calcio (Ca)	0.88	%	1 - 1.5	bajo
Magnesio (Mg)	0.617	%	0.3 - 0.6	alto
Azufre (S)	0.17	%	0.2 - 0.3	bajo
Hierro (Fe)	94.1	mg/kg	100 - 300	bajo
Manganeso (Mn)	358	mg/kg	50 - 200	muy alto
Zinc (Zn)	16	mg/kg	20 - 50	bajo
Boro (B)	21.4	mg/kg	15 - 50	normal
Cloruros (Cl)	9566	mg/kg	0 - 12000	normal
Sodio (Na)	457	mg/kg	0 - 1000	normal

5. Plan de enmiendas del terreno — Arranque y siembra

Elaborado a partir de las analíticas más recientes registradas en la finca. Debe validarlo el técnico responsable antes de aplicar.

Diagnóstico del suelo y agua:

El suelo presenta un pH muy alto (8.72), lo que indica alcalinidad pronunciada.

La conductividad eléctrica (CE) del suelo es elevada (750 μ S/cm), reflejando una salinidad alta.

Los niveles de materia orgánica y nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio son altos.

Sodio de cambio representa el 17.1% de la capacidad de intercambio catiónico (CIC), indicando un problema significativo de sodicidad.

El agua de riego también presenta un pH alto (8.6) y alta alcalinidad, además de un contenido elevado de sodio.

En la analítica foliar, hay deficiencia de calcio y hierro, con presencia alta de manganeso que incrementa los antagonismos.

Enmiendas recomendadas:

Aplicar yeso agrícola para reducir la sodicidad:

Dosis: 5 toneladas por hectárea.

Momento: Inmediatamente después del arranque del cultivo.

Forma: Incorporado al suelo mediante laboreo profundo.

Enmienda de azufre elemental para corregir el pH:

Dosis: 500 kg por hectárea.

Momento: Antes de la siembra y tras incorporación del yeso.

Forma: Distribuir uniformemente y mezclar bien con el suelo.

Aplicar quelatos de hierro y zinc para corregir deficiencias foliares:

Dosis: Seguir recomendaciones del fabricante.

Momento: Durante la etapa de crecimiento, post-siembra.

Forma: Vía foliar.

Incorporar materia orgánica/estiércol:

Dosis: 10 toneladas por hectárea.

Momento: Antes de la siembra.

Forma: Incorporar al suelo superficialmente.

Qué no conviene hacer:

No aplicar fertilizantes nitrogenados, fosfatados o potásicos, dado que ya se encuentran en niveles altos en el suelo.

Evitar el uso de aguas con alta salinidad sin tratamiento o mezcla adecuada, especialmente antes de mejorar la estructura del suelo.

Analítica a repetir:

Repetir la analítica de suelo y agua seis meses post-siembra para evaluar el efecto de las enmiendas.

Analizar el foliar durante el inicio de la fase de crecimiento para monitorizar posibles deficiencias adicionales o cambios.

Asegúrate de seguir todas las regulaciones y prácticas de seguridad al aplicar las enmiendas y ajustar las dosis según las directrices locales.

6. Seguimiento

Repetir analítica foliar cada 6 meses y de suelo/agua cada 12 meses, o antes si cambian las condiciones de riego.

Este informe se ha generado con AgroNutri AI a partir de los datos registrados de la finca y debe ser validado por el técnico responsable.

Firma del técnico

Elaborado por: María Delgado Hernández. Fecha: 3/8/2026.