

Informe técnico de fertirrigación — Bajo Cuadras

AgroNutri AI — Informe técnico de fertirrigación · 3/8/2026

1. Datos de la explotación

Finca: Bajo Cuadras (AGROSABINA SL). Buenavista del Norte Tenerife
Cultivo: platanera, variedad Pequeña enana. Fase fenológica: pre-parición.
Plantas: 5500. Superficie: 2.75 ha. Riego: 125 L/planta/semana ("H 688 m³/semana).
Sectores: Sector Norte (2100 plantas); Sector Central (1800 plantas); Sector Sur (1600 plantas)

2. Analítica de agua de riego

Referencia A-25/118011, Laboratorio agroalimentario (Balten TFN), fecha de muestreo 2025-07-28. Agua alcalina con sodio elevado; se mezcla con 30 % de agua desalada.

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia	Estado
Conductividad eléctrica (CE)	910	µS/cm	0 – 1500	normal
pH	8.6		6.5 – 8.4	alto
Alcalinidad total (CaCO3)	380	mg/L	0 – 200	muy_alto
Sodio (Na)	170	mg/L	0 – 115	alto
Calcio (Ca)	9.55	mg/L	40 – 120	muy_bajo
Magnesio (Mg)	20.6	mg/L	10 – 50	normal
Potasio (K)	19	mg/L	0 – 20	normal
Cloruros (Cl)	101	mg/L	0 – 150	normal
Boro (B)	0.83	mg/L	0 – 0.5	alto

3. Analítica de suelo

Referencia S-25/079328, Laboratorio agroalimentario, fecha de muestreo 2025-09-25. Sodio de cambio 17,1 % de la CIC: principal problema. pH muy alcalino.

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia	Estado
pH	8.72		6 – 7.5	muy_alto
CE (extracto 1:5)	750	µS/cm	0 – 800	alto
Materia orgánica	6.73	%	2 – 6	alto
Nitrógeno total	3755	mg/kg	1000 – 3000	alto
Fósforo Olsen	216	mg/kg	25 – 60	muy_alto
Calcio de cambio	21.9	meq/100g	8 – 25	normal
Magnesio de cambio	14.2	meq/100g	2 – 8	muy_alto
Potasio de cambio	5.82	meq/100g	0.5 – 2.5	muy_alto
Sodio de cambio	8.64	meq/100g	0 – 2	muy_alto

4. Analítica foliar

Referencia V-25/061489, Laboratorio agroalimentario, fecha de muestreo 2025-09-25. Deficiencia de Ca inducida por antagonismo Na/Mg/K; Fe y Zn bajos, Mn muy alto.

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia	Estado
Nitrógeno (N)	2.68	%	2.6 – 3.5	normal
Fósforo (P)	0.203	%	0.16 – 0.27	normal
Potasio (K)	4.11	%	3 – 4	alto
Calcio (Ca)	0.88	%	1 – 1.5	bajo
Magnesio (Mg)	0.617	%	0.3 – 0.6	alto
Azufre (S)	0.17	%	0.2 – 0.3	bajo
Hierro (Fe)	94.1	mg/kg	100 – 300	bajo
Manganeso (Mn)	358	mg/kg	50 – 200	muy_alto
Zinc (Zn)	16	mg/kg	20 – 50	bajo

Boro (B)

21.4

mg/kg

15 – 50

normal

Cloruros (Cl)

mg/kg

0 – 12000

normal

Sodio (Na)

mg/kg

0 – 1000

normal

5. Programa semanal de fertirrigación recomendado

Programa semanal pre-parición (octubre 2025)
Deficiencia foliar de calcio (0,88 %) inducida por antagonismo Na/Mg/K y agua alcalina (pH 8,6; alcalinidad 380 mg/L). Se prioriza calcio y azufre, se retira todo aporte de Mg, P y B, y se mantiene la acidificación del agua. Potasio en dosis de mantenimiento con sulfato para aportar S.
CE estimada de la solución: 1.25 dS/m.
Aporte semanal de N: 13.6 kg.

Fertilizante	Dosis semanal	Unidad	Motivo
Ácido nítrico 54%	20	L	Neutralizar la alcalinidad del agua (380 mg/L CaCO_3) y corregir la deficiencia foliar de calcio.
Nitrato de calcio	42.5	kg	Mantener poteros limpios. Aporte de N (foliar 0,88 %).
Sulfato amónico	30	kg	Aporte de S (foliar 0,17 %).
Sulfato potásico	37.5	kg	Mantenimiento de K en pre-acidificante.
Kitasal (corrector salino)	20	L	Desplazar sodio (17 % de la CTC) con calcio complejoado.

6. Advertencias y compatibilidades

No mezclar el nitrato de calcio con sulfato amónico ni sulfato potásico en el mismo tanque: aplicar en tanques o días separados.
Mantener la CE de la solución por debajo de 2,2 dS/m.
Valorar aplicación de yeso agrícola en invierno para desplazar el sodio de cambio.

7. Seguimiento

Repetir analítica foliar cada 6 meses y de suelo/agua cada 12 meses, o antes si cambian las condiciones de riego.
Este informe se ha generado con AgroNutri AI a partir de los datos registrados de la finca y debe ser validado por el técnico responsable.
Elaborado por: Francisco Javier Pérez. Fecha: 3/8/2026.