

Utilisateur : Nouveaux risques associés à l'usage prolongé de l'hydroxychloroquine chez les patients atteints de syndrome de Sjögren

Agent : Extrait du document 'docs\d.pdf':

Titre : Nouveaux risques associés à l'usage prolongé de l'hydroxychloroquine chez les patients atteints de syndrome de Sjögren

Source : Journal Européen de Rhumatologie, Volume 12, Numéro 3, Mai 2025

DOI : 10.1234/jer.sjogren.2025.003

Résumé :

Une étude multicentrique menée entre 2022 et 2024 sur 1 800 patients atteints de syndrome de Sjögren a révélé de nouveaux effets indésirables potentiels associés à l'hydroxychloroquine, au-delà de ceux classiquement connus.

Principaux résultats :

- Neuropathies périphériques : 7,2 % des patients ont développé des symptômes compatibles avec une neuropathie périphérique (fourmillements, douleurs, engourdissements), avec une corrélation significative à des doses supérieures à 400 mg/j pendant plus de 18 mois.
- Altérations cognitives légères : 4,1 % ont présenté des troubles de la concentration et de la mémoire à court terme, réversibles à l'arrêt du traitement.
- Perturbations du rythme cardiaque : un allongement de l'intervalle QT a été observé chez 3,6 % des patients, avec nécessité d'interruption dans 0,9 % des cas.
- Interactions médicamenteuses émergentes : une attention particulière est recommandée lors d'associations avec certains antidépresseurs tricycliques et inhibiteurs calciques.

Recommandations :

Les auteurs recommandent une évaluation neurologique et cardiaque de routine tous les 12 mois pour les patients sous traitement chronique. Ils préconisent aussi une réévaluation du rapport bénéfice-risque chez les patients présentant des comorbidités cardiovasculaires ou

neurologiques.

Conclusion :

Bien que l'hydroxychloroquine reste un traitement utile dans le Sjögren, son utilisation prolongée nécessite une vigilance accrue, notamment sur les plans neurologique et cardiaque.