

TI選手 関連性ヒント

2026/03/30 ~ 05/22 各指標とパフォーマンスの関連性まとめ

Section A: 既存5項目

★ ①睡眠時間	同日RPE	7.25 [<7h] 6.22 [>=7h]	+1.03
★ ②水分摂取量	同日運動後疲労	3.12 [<1000ml] 3.65 [>=1000ml]	-0.53
★ ③タンパク質種類数	翌日RPE	6.62 [1~2種] 6.10 [3種以上]	+0.52
・ ④補食	翌日運動後疲労	3.61 [あり] 3.44 [なし]	+0.17
・ ⑤睡眠の質	同日運動後疲労	3.58 [良(<=2)] 3.52 [悪(>=3)]	+0.06

Section B: 新規追加(4項目)

★ ⑥睡眠の質	翌日RPE	6.69 [不良(>=3)] 5.94 [良好(<=2)]	+0.75 (p=0.021)
★ ⑦栄養バランス	翌日RPE	6.64 [不良3~4] 5.94 [良好1~2]	+0.70
★ ⑧起床時コンディション	同日運動後疲労	3.22 [良好1~2] 4.00 [不調4~5]	-0.78
★ ⑨起床時コンディション	同日RPE	6.33 [良好1~2] 5.00 [不調4~5]	+1.33

Section C: タンパク質詳細(5項目)

★ ⑩昼食タンパク質	翌日RPE	6.89 [0種] 6.00 [1種以上]	+0.89
★ ⑪夕食タンパク質	翌日RPE	6.52 [1~2種] 6.00 [3種以上]	+0.52
★ ⑫夕食に魚	翌日RPE	6.62 [なし] 6.10 [あり]	+0.52
・ ⑬昼食タンパク質	翌日運動後疲労	3.68 [0種] 3.44 [1種以上]	+0.24
・ ⑭夕食タンパク質	翌日運動後疲労	3.55 [1~2種] 3.55 [3種以上]	0.00

条件A(不良側) 条件B(良好側) RPE(主観的運動強度)

★ |差| >= 0.5(要注目) ◆ |差| >= 0.3(参考) ・ |差| < 0.3(関連弱) 運動後疲労

★ |差| >= 0.5(要注目) ◆ |差| >= 0.3(参考) ・ |差| < 0.3(関連弱) 差 = 条件A値 - 条件B値

※ 睡眠の質→翌日RPE は統計的有意差あり (p = 0.021)