Központi
Dietetikai Szolgálat

BUDAPESTI
SZENT MARGIT
KÓRHÁZ

Hujber-Nagy Mónika
csoportvezető dietetikus

DIÉTÁS TÁJÉKOZTATÓ CUKORBETEGEKNEK

A cukorbetegség elsősorban a szervezet szénhidrát-anyagcseréjének zavara.
Másodlagosan a fehérje; és zsíranyagcserére is hatással van.
Az emberi szervezet normális működéséhez öt tápanyag szükséges, amelyeket táplálékainkból nyerünk. Ezek a fehérjék, szénhidrátok, zsírok, ásványi anyagok és vitaminok.
Az ételeinkkel elfogyasztott szénhidrátok a gyomor-bélrendszerben megemésztődnek, glükózmolekulákra bomlanak, majd a bélfalon keresztül, a vérkeringésbe jutnak /vércukorszint (VC) nő/. A vérből a szervezet sejtjébe kerül a glükóz /VC csökken/ és az élethez szükséges energiát adja.
A glükóz a sejtekbe az inzulin nevű hormon segítségével jut át a sejtfalon. Ha a hasnyálmirigy egyáltalán nem, vagy csak kis mennyiségben termel inzulint, vagy a termelt hormon nem tud hatni a receptorokon, akkor a cukor nem kerül a sejtekbe, a véráramban felhalmozódik, amely a magas vércukorszintben mutatkozik meg.
Fő cél a vércukorszint normalizálása.

Vércukorértékek (mmol/l)	Normál vércukorérték	Kóros vércukorérték
Éhgyomri	3,5-6 mmol/l	7 mmol/l felett
Étkezés után 2 órával	7,8 mmol/l alatt	11,1 mmol/l felett

A cukorbetegség **tünetei:** fokozott szomjúságérzet, gyakori vizeletürítés, fogyás, látászavar, bőrviszketés, elhúzódó sebgyógyulás.

Az étrendi **kezelés célja:**
- az ideális testsúly elérése és megtartása
- közel normális vércukorértékek és vérzsírszintek elérése
- a magas és alacsony vércukorértékek elkerülése
- a szövődmények kialakulásának elkerülése, ill. késleltetése

Az étrendi kezelés főbb szempontjai:
- egyénre szabott energiabevitel
- gyakori, kisebb mennyiségű étkezés
- helyes fehérje-zsír-szénhidrát százalékos arányának kialakítása: 20-30-50%
- zsír-, és koleszterinszegény diéta
- rostgazdagság

A meghatározott napi szénhidrát-mennyiséget **5-6** étkezésre kell elosztani (de ettől lehet eltérő), ezáltal elkerülhetők a vércukorszint nagyobb ingadozásai. Hiszen, ha többször, egyszerre kevesebbet eszünk, az kevésbé emeli meg vércukorszintet. Ajánlott minden nap meghatározott időpontban, ~ 3 óránként enni, étkezések kihagyása nélkül.

Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 132.
Telefon: +36 1 430-4800 / 1199
Email: dietetika@sztmargit.hu

Minőségirányítási tanusítvány száma:
MSZ EN ISO 9001:2015
MSZ EN 15224:2017

Glikémiás index - GI

Az ételek szénhidráttartalmukon túl különböző mértékben emelik a vércukor szintet. Ezt hívjuk az ételek glikémiás indexének. Glikémiás index alatt az egyes szénhidráttartalmú élelmiszereknek és ételeknek a szőlőcukorhoz viszonyított vércukoremelő képességét értjük. Egyes élelmiszerek GI-e jelentősen változik attól függően, hogy milyen az étel feldolgozottsága, vagy mely konyhatechnikai eljárással készült. Pl. a főtt burgonya glikémiás indexe 25-30%-kal nő, ha a burgonyából pürét készítünk.
Az egyes ételek vércukorszintre gyakorolt hatását legjobban vércukormérésekkel tudja ellenőrizni. Időnként ellenőrizze a vércukorszintjét étkezés előtt, majd étkezés után is.

A szénhidrát

Táplálékainkban a szénhidrátok változatos formában vannak jelen, az energiatermelés szempontjából a legkönnyebben módosítható anyagok (1g szénhidrátból a szervezetben 4kcal energia keletkezik).

Két típusuk van.

- **Gyorsan felszívódó szénhidrátok:** gyümölcsök, gyümölcskészítmények, tejtermékek (tej, aludttej, kefir, író), finomított lisztek (csak állagjavításra ajánlottak, max.30%-ban), puffasztott, pirított pékáruk, pürésített, turmixolt ételek, növényi magtejek.
- **Lassan felszívódó szénhidrátok:** teljes kiőrlésű gabonák, és belőlük készült lisztek, zöldségek (kivéve a burgonya), olajos magvak

Szénhidrát elosztás napi 5x-i étkezés esetén	**160 g CH (1400 kcal)**	**180 g CH (1500 kcal)**	**200 g CH (1600 kcal)**	Gyors/Lassú szénhidrát elosztása
Reggeli	35 g	40 g	45 g	2/3 Lassú - 1/3 Gyors
Tízórai	20 g	20 g	20 g	½ Gyors - ½ Lassú
Ebéd	45 g	55 g	60 g	2/3 Lassú - 1/3 Gyors
Uzsonna	20 g	20 g	20 g	Gyors
Vacsora	40 g	45 g	55 g	2/3 Lassú - 1/3 Gyors

Szénhidrát elosztás napi 6x-i étkezés esetén	**160 g CH (1400kcal)**	**180 g CH (1500 kcal)**	**200 g CH (1600 kcal)**	Gyors/Lassú szénhidrát elosztása
Reggeli	30 g	35 g	40 g	2/3 Lassú - 1/3 Gyors
Tízórai	20 g	20 g	20 g	½ Gyors - ½ Lassú
Ebéd	45 g	50 g	55 g	2/3 Lassú - 1/3 Gyors
Uzsonna	20 g	20 g	20 g	Gyors
Vacsora	35 g	45 g	50 g	2/3 Lassú - 1/3 Gyors
Pótvacsora	10 g	10 g	15 g	Lassú

Mit egyen a cukorbeteg ?

Gabonafféleségek és pékáruk

Magas rosttartalma miatt a teljes kiőrlésű kenyér, graham kenyér, teljes kiőrlésű zsemle javasolt. A magas rosttartalmú élelmiszerek lassabban emelik meg a vércukorszintet, teltségérzetet adnak, megkötik a méreganyagokat, a koleszterint és a székrekedést is megelőzik, amennyiben elegendő folyadékot fogyasztunk mellé.

TIPP: A csomagolt pékárukon 100 g termékben minimum 6 g rost legyen, ebben az esetben beszélünk rost dús kenyérről/ zsemléről stb.

Tápanyagok	100g termékben
Energia kJ/kcal	885 kJ / 209 kcal
Zsír	0,9 g
amelyből telített zsírsavak	0,17 g
Szénhidrát	39,8 g
amelyből cukrok	2,9 g
Rost	6,5 g
Fehérje	7,2 g
Só	1,14 g



Ételek sűrítéséhez graham lisztet, zablisztet, teljes kiőrlésű lisztet használhatunk. 1-2 evőkanál korpát natúr joghurtba, light (cukormentes) gyümölcsjoghurtba keverve ajánlunk.

A müzli és natúr gabonapelyhek közül a cukormentes termékek fogyaszthatók, szénhidrát-tartalmuk beszámításával.

Kifőtt tésztát önálló ételként (túrós, sajtos, káposztás) illetve köretként hetente egy-két alkalommal fogyaszthat. A tésztaféléket mindig szárazon (elkészítés előtt) kell lemérni és így kiszámolni a szénhidráttartalmát. Elsősorban teljes kiőrlésű tészta fogyasztása ajánlott. A tésztafélék között vannak a vércukrot jobban (tojásos) és kevésbé (durum, teljes kiőrlésű) emelő termékek.

A rizs heti egy-két alkalommal illeszthető az étrendbe. Önálló köretként kb. 4-5 dkg legyen a mennyisége nyers (elkészítés előtti) állapotban. Javasoljuk párolt zöldségekkel együtt fogyasztva (pl.: petrezselymes-, sárgarépás-, gombás-, zöldborsós rizsköret).

Attól, hogy a száraztészta és a rizs az ételkészítés folyamán 1,5-2-szeresére duzzad, szénhidráttartalma nem változik. A barna rizs magas rosttartalmánál fogva lassabban emeli meg a vércukorszintet.

Köretnek szénhidrát tartalmuk beszámításával, lassabb vércukor-emelő hatásuk miatt elsősorban a barna rizs, bulgur, kuszkusz, hántolatlan köles, amaránt, quinoa és hajdina ajánlottak.

Tej, tejtermékek

A tej, aludttej, kefir, joghurt szénhidráttartalmát a napi megengedett szénhidrát mennyiségbe be kell számolni, de mindenképp a cukormentes változatokat kell választani.

Napi fél liter tej- és tejtermék fogyasztása ajánlott, cukorbetegek ezt 2-3 alkalomra elosztva rostdús étkezés mellé fogyasztva ajánlott! Fontos megjegyezni, hogy a tej fogyasztása a reggeli órákban nem ajánlott!

A sajtnak, tejfölnek, főzőtejszínnek, túrónak nincs jelentős szénhidráttartalma, mérés nélkül fogyaszthatóak.

Húsok, húskészítmények

A húsoknak, felvágottaknak, halaknak nincs szénhidráttartalma. Válassza a soványabb hús és húskészítményeket, mint például sertéscomb, sertéskaraj, csirke- és pulykamell, csirke- és pulykacomb (lebőrözve), borjúcomb, virsli, párizsi, gépsonka, csirkemell sonka, pulykamell sonka, aszpikos felvágottak.

Rántott ételek esetén liszt- és zsemlemorzsa miatt a panír szénhidráttartalmát számba kell venni, ehhez teljeskiőrlésű liszt és teljeskiőrlésű zsemlemorzsa ajánlott (opcionálisan zabpehellyel, tört olajos magvakkal, lenmaggal, szezámmaggal gazdagítva).

Zöldség- és főzelékfélék

Azoknak a zöldségféléknek, melyeknek 100 g-ja 5 g-nál több szénhidrátot tartalmaz, mért mennyiségben fogyaszthatók: pl.: burgonya, kukorica, zöldborsó, zöldbab, szárazbab, sárgarépa, sárgaborsó, lencse, sütőtök.

5g alatti szénhidráttartalmú zöldségek méretlen mennyiségben fogyaszthatók 200g-ig:

pl.: brokkoli, tökfélék, karfiol, káposztafélék, paraj, sóska, retek, paprika, uborka, gomba, saláta. Ezek nem okoznak számottevő vércukor-emelkedést, mert szénhidráttartalmuk elsősorban emészthetetlen élelmi rost. Nyersen, párolva, főzelékként is fogyaszthatók. Főzelékeket érdemes saját anyagukkal sűríteni, liszttel való sűrítés esetén a liszt szénhidrát tartalmával számolni kell.

Gyümölcsök

Magas szénhidráttartalmuk miatt a banán, a szőlő, az aszalt gyümölcsök (mazsola, datolya, füge, aszalt szilva, stb.), a cukrot tartalmazó dzsemek, befőttek fogyasztása nem javasolt, mert gyorsan és nagymértékben emelik a vércukorszintet (gyorsan felszívódó cukrokat tartalmaznak). A gyümölcsök mért mennyiségben fogyasztandók, elsősorban napközben tízórai- uzsonnára, vagy rostdús ételben/ étellel (pl.: zabkása, gyümölcs mártás édesítőszerrel és barna rizzsel). Az elfogyasztható mennyiségekhez segítséget nyújt az utolsó két oldal.

Olajos magvak

Szénhidráttartalmuk jelentős, kifejezetten a máknak és a gesztenyének. Alkalmanként 5 dkg mennyiségben fogyasztandó.

Emellett zsírtartalmuk és kalóriatartalmuk számottevő, ezért korlátozott mennyiségben fogyaszthatók. Előnyös zsírsav összetételük miatt azonban mért mennyiségben ajánlott fogyasztásuk heti pár alkalommal.

Zsír és rost tartalmuk miatt lassabban szívódnak fel, ezért javasolt gyümölcsök mellé kis étkezésekre fogyasztani.

Tojás

Nincs szénhidráttartalmuk, viszont igen magas energia- és zsírtartalommal bírnak.

Tojásból heti maximum 6db-ot fogyasszon.

Zsír, olaj, margarin, vaj

Szénhidráttartalmuk nincs, az egészséges és korszerű táplálkozásnak megfelelően a legszükségesebb minimális mennyiségben fogyasztható.

Részesítse előnyben a növényi eredetű olajokat.

A vajat magas telített zsírsav tartalma miatt kis mennyiségben ajánlott fogyasztani, Helyette javasolt növényi olajokból készült light, omega 3-6-tal dúsított, sótlan margarinok használata.

Édességek

Az egyszerű cukrok fogyasztása kerülendő: cukor, barnacukor, szőlőcukor, méz, nádcukor és a belőlük készült élelmiszerek, ételek pl.: kekszek, csokoládék, sütemények, torták, cukorkák, fagylalt, édes péksütemények, tejdesszertek /puding, cukorral ízesített gyümölcsjoghurt/, müzli szeletek.

Cukormentes édességek és édesipari termékek csak választékbővítés céljából javasoltak a diétában, az élelmiszerek szénhidráttartalma, elsősorban fruktóz tartalma hosszú távú, rendszeres fogyasztás esetén vérzsír (triglicerid) szint emelkedést okozhat.

Vásárláskor ajánlott ellenőrizni az élelmiszerek összetételét. A cukormentes termékek csomagolásán is érdemes a rosttartalmat, valamint az édesítésre használt cukor / cukorpótló fajtáját figyelni.

A cukor nevei az élelmiszer címkén:

- cukor
- barna cukor
- glükóz-fruktóz szirup
- glükóz
- fruktóz
- méz
- keményítőszirup
- invertcukor
- gyümölcscukor
- agavészirup
- rizsszirup
- maltodextrin
- szőlőcukor
- nádcukor
- melasz
- dextróz
- maltóz
- kukoricaszirup
- HFCS(magas fruktóztartalmú kukoricaszirup)
- karamell
- juharszirup
- szacharóz

Italok

Víz, cukormentes limonádé, cukormentes üdítőitalok és tea fogyaszthatók. A light és a 100 %-os gyümölcslevek hozzáadott cukrot nem, de gyümölcscukrot tartalmaznak ezért szénhidráttartalmuk beszámítandó, ám fogyasztásuk leginkább az alacsony vércukorszint korrigálására javasolható, mivel gyorsan emeli a vércukorszintet.

Nem javasolt a magas cukortartalmú alkoholos italok fogyasztása (édes pezsgők, borok, likőrök, Unicum), mert erősen emelik a vércukorszintet. Korlátozva fogyaszthatóak (vc-t enyhén emelik) a sör, száraz pezsgő, száraz bor. A tömény italoknál az alkohol gátolja a máj cukorleadó képességét, és ily módon hypoglikémiát (alacsony vércukorszintet) okoz. Ha tömény szeszesitalt fogyaszt, egyidejűleg lassú felszívódású szénhidrátot tartalmazó ételt is egyen. Az alkoholos italok szénhidráttartalmát a napi megengedett szénhidrát mennyiségbe be kell számolni.

Édesítőszerek

Energiamentes édesítőszerek:

Közös jellemzőjük, hogy nem tartalmaznak energiát, nem emelik a vércukorszintet, tehát nem kell őket az étrendbe beszámítani. Ide tartozik a szacharin, ciklamát, aceszulfám-K és az aszpartám. Legtöbbször valamilyen kombinációjuk fordul elő a különböző márkanevű termékekben, melyek tabletta, folyadék vagy por formájában kerülnek forgalomba. A dobozon meghatározott mennyiségben fogyaszthatók, a fölött hasmenést okozhatnak. Polisett, Polisweet, Pötyi, Édeske, Canderel, Huxol, Süssli Süssina, stb.

Cukorpótlók:

Energiatartalmuk a cukoréval azonos. Lassabban ugyan, de a cukorhoz hasonlóan használódnak fel a szervezetben, a vércukrot emelik, tehát a szénhidráttartalmukat számolni kell. Alapanyaguk a xilit,

mannit, szorbit és a fruktóz. Egyéni érzékenység szerint puffadást, hasmenést okozhatnak. A cukorpótlók maximum napi 30 g mennyiségben fogyaszthatók.
Glukonon, Fruktóz, Szorbitol, Glukosweet.

Természetes édesítőszerek:

- stevia: szénhidráttartalma nincs
- nyírfacukor: szénhidráttartalmát figyelembe kell venni a diéta szempontjából
- eritrit: szénhidráttartalma nem szívódik fel, tehát glikémiás indexe 0, hőálló, így sütéshez és főzéshez is alkalmas
- Negyedannyi édesítőszer/ Négyszeres erősségű édesítőszer: eritrit és stevia keveréke

Mesterséges édesítőszerrel számtalan élelmiszert édesítenek. Jó tudni, hogy abból, hogy egy termék cukormentes / hozzáadott cukor mentes, még nem feltétlenül következik az, hogy szénhidrátmentes, vagyis ezen készítmények szénhidráttartalmát le kell olvasni a csomagolásról és bele kell számolni a megadott keretbe.



Kérjük, vezessen táplálkozási naplót! Jegyezze fel több napon keresztül, mikor, mit és mennyit evett, kiszámolva a napi szénhidrátmennyiséget. Az otthoni vércukor mérés eredményeit is írja fel ide. A kórházi ellenőrzés során a dietetikussal ez alapján tudja átbeszélni diétáját.

Ha a vércukorszint túl magas (hyperglikémia): nem mindig okoz tüneteket. Kialakulhat, ha elmarad az inzulin beadása, nem veszi be a vércukorszint csökkentő tablettát vagy túlzott mennyiségű szénhidrát fogyasztás esetén.

Legjellemzőbb tünetei:

- melegségérzet
- homályos látás
- fokozott szomjúságérzet
- gyakori vizelési inger

Teendők:

1. igyon sok vizet vagy ásványvizet
2. azonnal ellenőriztesse vércukorszintjét
3. ha éhomi vércukorszintje 2 napon keresztül 10mmol/l feletti, beszéljen orvosával!

Ha a vércukorszint túl alacsony (hypoglikémia): kialakulhat inzulin vagy vércukorszint csökkentő tabletta túladagolása, étkezés késése vagy elmaradása, szokásosnál nagyobb fizikai aktivitás, túlzott alkoholfogyasztás esetén. Könnyen vezethet ájuláshoz, görcsökhöz.

Legjellemzőbb tünetei:

- gyengeség
- szédülés, fejfájás
- éhségérzet
- hideg verejtékezés
- szájzsibbadás
- zavartság, idegesség, látászavar

Teendők (15-ös szabály):

1. Fogyasszon 15 gramm gyorsan felszívódó szénhidrátot (pl.: 2 dl tej, 1-1,5 dl gyümölcslé, 3db szőlőcukor)
2. Ezt követően 15 gramm lassan felszívódó szénhidrátot (pl.: 3-5 db Korpovit keksz, 1/3-ad, fél korpás zsemlét, 3-4 dkg barna kenyér)
3. Végül 15 perc múlva ellenőrizze vércukorszintjét!

A rosszul karbantartott cukorbetegségnek számos szövődménye lehet. A tartósan magas vércukorszint károsítja a veséket, látásromláshoz, lassú sebgyógyuláshoz vezet. Ezért különösen fontos a rendszeres diabetológiai kontroll mellett az éves látásvizsgálat és a sebek megfelelő kezelése.

A nagyon magas és/vagy alacsony vércukorszint kómához vezethet!

Mértékegység-tömeg táblázat

Élelmiszer	Tömeg	Szénhidrát (g)	Energia (kcal)
1 zsemle	5,4 dkg	30,8	151
1 szelet ujjnyi vastag kenyér (átlag)	10 dkg	50	260
1 szelet vékony kenyér	7 dkg	35	182
1 kifli	4,4 dkg	25	130
2 csapott tk. liszt	1 dkg	7,6	37,5
1 csapott ek. liszt	1 dkg	7,6	37,5
1 ek.zabpehely	1 dkg	7	37,5
1 ek. száraztészta	1 dkg	8	38
1 evőkanál tarhonya	1 dkg	7	39
1 ek.nyers rizs	2 dkg	16	70
1 ek. főtt rizs	1 dkg	8	35
1 ek. zsemlemorzsa	1 dkg	7,3	34,9
1 ek. búzadara	1 dkg	7,3	34,9
2 tk kakaó	1 dkg	4	44
1 ek. túró	3 dkg	1	38
1 ek. joghurt	3 dkg	1,5	20
1 ek. reszelt sajt	1 dkg		
1 tk. margarin	0,5 dkg		40
1 tk. olaj	0,5 dkg		46,4
főzeléksűrítés (1 adaghoz): liszt+kefír/natúr joghurt	10 g+50 ml	10	42
főzelék rántása (1 adaghoz): liszt	15-20 g	10-14	51-68

Otthoni mérőeszközök alkalmazása:

A konyhai mérleg helyett az adagok méretének ellenőrzéséhez használhat mérőpoharat, csészét vagy kanalat is.

Otthoni mérőeszközök tartalma:

1 csésze 200ml
1 evőkanál 15g
1 púpozott evőkanál 20g
1 teáskanál 5g


Néhány esetben könnyebb a hozzávetőleges mennyiségekkel számolni:

½ szelet kenyér (30g) 15g szénhidrát
1 közepes méretű tisztított burgonya (78-80g) 15g szénhidrát
½ csésze főtt tészta (60g) 15g szénhidrát
1 közepes méretű alma (200g) 15g szénhidrát


Más élelmiszereknél a térfogat fontosabb:

200 ml tej 10g szénhidrát
100ml frissen préselt gyümölcslé 15g szénhidrát

Kéz adagnyi módszer:



1 ökölnyi (1 adag): szénhidrátokból, keményítő tartalmú élelmiszerekből (tészta, rizs, burgonya)
2 ökölnyi mennyiséget csak a fizikai munkát végző, normál testalkatú férfiak fogyaszthatnak
1 ökölnyi (1 adag): gyümölcsökből




Szétnyitott tenyérnyi (1 adag): alacsony szénhidráttartalmú zöldségekből (zöldbab, brokkoli, saláta, uborka, káposzta) bőséges mennyiséget ehet. Nyersen és párolva is fogyasztható.



Tenyérnyi (1 adag): húsokból (feltétekből), sajtból. Kisujjnyi vastagságú.
Teljes tenyérnyi (1 adag): kenyérből is kb. tenyérnyi méretű és egy ujjnyi vastagságú az egy adag.

Hüvelykujj hegye (1 adag): zsiradékokból, vajból, olajból





WWW.ULTRACOLORINGPAGES.COM

1 pohárnyi, 2dl (1 adag): tejből. kefirből, joghurtból

Kisétkezésekre elfogyasztható gyümölcsmennyiségek

	10 dkg gyümölcs CH-tartalma	**15 gr CH-ot** tartalmazó gyümölcs mennyiség (dkg)	**20 gr CH-ot** tartalmazó gyümölcs mennyiség (dkg)	**25 grCH-ot** tartalmazó gyümölcs mennyiség (dkg)
Elfogyasztható CH mennyiség (gr.)		**15**	**20**	**25**
áfonya	14,4	10	14	17
alma	7	21	29	36
ananász	12	13	17	21
banán	**24,2**	**6**	**8**	**10**
besztercei szilva	13,1	11	15	19
cseresznye	14	11	14	18
egres	8	19	25	31
földieper	7,2	21	28	35
görögdinnye	6,5	23	31	38
grapefruit	7,2	21	28	35
kajszibarack	10,2	15	20	25
kiwi	11,3	13	18	22
körte	12	13	17	21
málna	5,4	28	37	46
mandarin	9,8	15	20	26
mangó	13	12	15	19
meggy	11	14	18	23
narancs	8,5	18	24	29
naspolya	12	13	17	21
nektarin	11,4	13	18	22
őszibarack	9	17	22	28
ribizli	7	21	29	36
sárgabarack	3,9	38	51	64
sárgadinnye	9,5	16	21	26
szeder	6	25	33	42
szőlő	**18,1**	**8**	**11**	**14**
vörös szilva	10,2	15	20	25

FONTOS! Az alábbi írásos tájékoztató nem helyettesíti a dietetikussal történő szóbeli, egyénre szabott tájékoztatást.

ÉTRENDI ÖTLETEK NAPI 180G SZÉNHIDRÁT 5X-i ÉTKEZÉSRE TÖRTÉNŐ ELOSZTÁSÁHOZ

Reggeli 40 g szénhidrát:

- 1 db Teljes kiőrlésű nosztalgia kifli (lipóti pékségben készült – 1db 44g CH) +zsírszegény margarin+ csirkemell sonka felvágott+ kerti zöldség 80-100 g (saláta / paprika/ uborka/ retek/ paradicsom/ újhagyma stb.)
- 1 db Teljes kiőrlésű zsemle (lipótiban készült – 1 db 38 g CH) + light medvesajt + zöldség 80-100 g
- Pur Pur kenyér – (Aldi - 400g) 112g CH az egész kenyérben, 1 adag 142g kenyér (kb. a kenyér $^1/_3$-a) + májkrém + zöldség 80-100 g
- **almás-túrós-fahéjas zabkása vízzel (50g zabpehely, 100g alma, 20g túró)**

Tízórai 20 g szénhidrát:

- 3 db Gullon Tradizionale keksz (1db keksz- 6,9g CH, melyből 0,1 g cukor) (Auchan, Coop, Spar)
- 6 db Korpovit keksz (1 db keksz – 3,3g CH, melyből 0,2g cukor) (Aldi, Spar, Tesco, Auchan, Reál, G-Roby)
- 4 db Gullon Zero sugar free Fiber keksz (1db keksz - 5,5g CH, melyből >0,5g cukor) (Aldi, auchan, Spar, Tesco, DM)
- 150 g natur joghurt + 4 db Korpovit keksz
- 150 g jogobella zero hozzáadott cukor tartalmú gyümölcs joghurt + 2 db Gullon Tradizonale keksz
- Tarka gyümölcsjoghurt 0% cukorral + 20g (1 evőkanál) zabpehely
- 30g Fit többmagvas Granola piros gyümölcsökkel + 150g natúr joghurt
- **Házi csokis zabkeksz 2,5 db (8,6 g CH/ darab)**

Ebéd 55g:

- zöldborsó leves (15dkg borsó+ 1 dkg durum tészta/ fő) -28g CH + Sütőben sült sajtos sertéskaraj + bulgur (szárazon mérve: 4 dkg) + vegyes zöldsaláta
- Zöldségleves (petrezselyemgyökér, sárgarépa, karalábé, zeller) + Bácskai rizseshús (6 dkg barna rizs/ adag) + Rusa savanyúság 200 g (édesítőszeres) (Auchan, Tesco)
- Paradicsom leves (folyékony édesítőszerrel, 1 dkg tésztával) – 7 g CH + Csirkés teljes kiőrlésű tortilla lap (1,5 db tortilla lap + zöldsaláta, paradicsom, uborka, 2,5 dkg kukorica + öntet: natúr joghurt + zöldfűszerek)
- Gulyásleves (5 dkg burgonya, csipetke nélkül) + 3db **Túrókrémes Zabpalacsinta** (egy palacsinta töltelék nélkül 15g szénhidrátot tartalmaz, a túrós töltelék kb 1g szénhidrátot tartalmaz/palacsinta)
- 3,5 db Hortobágyi zabpalacsinta
- Rakott zöldbab (20 dkg zöldbab -14g CH, 6 dkg - barnarizs 42g CH)
- Tészta cottage cheese-zel és párolt zöldségekkel (80g száraz tészta)
- **Töltött tök** (töltelék 7,5 dkg bulgurból)
- Harcsapaprikás + **zabgaluska** (85g lisztből készült galuska/ 1 adag)

Uzsonna 20g:

- zöldfűszeres túrókrém (zsírszegény túró, natúr joghurt, fűszerek) + 6db Korpovit + uborka 80-100g
- Detki Vital Fitt teljeskiőrlésű paradicsomos-bazsalikomos kréker (34g keksz) (Penny, DM, Spar, Tesco)
- 200g narancs
- eperturmix (100g eper, 2,5dl tej)
- Alma (200g-14g CH) + sótlan pörkölt mogyoró 45g (6,9g CH)
- **házi fagyi** (szénhidrát tartalma alapanyag és elkészítéstől függően változó) 20 g CH alatti fagylalt mennyiség esetén keksszel vagy tölcsérrel kiegészítendő
- 1db Cornexi cukormentes zabrudi (spar)
- 1 db cukormentes cerbona szelet kakaós-mogyorós 13g CH +100g alma
- 50g Eastray Főtt Héjnélküli szelídgesztenye (Spar, Tesco)
- **Házi teljes kiőrlésű pogácsa** 2 db (9 g CH/ darab)
- Pöttyös 0% hozzáadott cukor tartalmú túrórudi 1 db -35 g (8,8g CH) + 200 g eper
- Krémtúró hozzáadott cukormentes 1 db – 90g (8,6 g CH) + 3 db Detki Vital Teljes Kiőlésű keksz (1 db 4,7 g CH) (Spar, Coop, Reál, DM, Ecofamily, CBA)
- Jogobella 0% hozzáadott cukortartalmú gyümölcs joghurt 150g (7,5 g CH) (maracujás, cseresznyés, erdei gyümölcsös, epres) (Spar, Tesco, Auchan, Coop, Reál, G-Roby) + 20 g zabpehely (12,5 g CH)

Vacsora 45g:

- meleg szendvics 100g Ceres bakonyi barna toast kenyérből (46g CH/100g), sonkával, sajttal, 30g hozzáadott cukor mentes ketchuppal, zöldségek 80-100 g
- 2 db virsli, mustár + 1,5 db Pur Pur zsemle, zöldségek 80-100 g
- **tejbegríz zabkorpából** (4dkg zabkorpa, 3 dl tej, édesítőszer, fahéj, 60g alma)
- főtt tojás, reszelt torma, sajt/sonka, 1db teljeskiőrlésű kifli, zöldségek 80-100 g
- tonhalsaláta (zöldsaláta, lilahagyma, uborka, paprika, paradicsom, zöldségek összesen 200 g, tonhal) + 110g Jókenyér kovászos rozskenyér

A mennyiségek tisztított, szárazon mért alapanyagokra vonatkoznak.

RECEPTEK

Almás-túrós-fahéjas zabkása vízzel (1 főre)
50 g zabpehely
30 g zsírszegény túró
100 g alma
fahéj (ízlés szerint)
édesítőszer (ízlés szerint)
250 ml víz

Elkészítés:
Az almát ízlés szerint daraboljuk, összekeverjük a többi hozzávalóval és egy éjszakát állni hagyjuk, vagy összefőzzük.

Zabkeksz (12 db):
75 g zabpehely (nagyszemű)
50 g zabpehely liszt (vagy zabpehely darálva)
5 g zabkorpa (elhagyható)
25 g dió (durvára törve)
¼ csomag sütőpor
1 kk. fahéj
csipet só
50 g eritrit
50 g cukormentes étcsokoládé (durvára vágva)
75 g vaj vagy margarin (puha)
1 tojás

Elkészítés:
A száraz hozzávalókat a csokival és a dióval összekeverjük, majd hozzáadjuk a vajat és a tojást és összegyúrjuk az egészet. Diónyi gombócokat formázunk, sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük és koronggá lapítjuk. 175 fokon 10-12 perc alatt készre sütjük. A sütőből kivéve a kekszek még lágyak, hűlés közben megszilárdul.

Zabgaluska (2 főre):

170 g zabpehelyliszt
1 tojás
víz
só

Elkészítés:

A lisztet egy tálba rakjuk, megsózzuk. Összekeverjük a tojást a liszttel és annyi vizzel, hogy híg galuska masszát kapjunk, majd fél órát állni hagyjuk. A fél óra alatt a zabpehelyliszt felszívja a vizet és nokedli sűrűségűvé válik. Sós, forró, lobogó vízbe szaggatjuk. Amikor feljöttek a víz tetejére még kb 2 percig forraljuk, majd szűrjük.

Túrós palacsinta (10-12db)

250 g zabliszt
350 ml tej
350 ml szénsavas víz
2 db tojás
1 ek eritrit (vagy 1 ek cukornak megfelelő más édesítőszer)
1 csipet só
1 mk sütőpor
olaj a sütéshez
250 g túró
80 g tejföl
30 g cukornak megfelelő édesítőszer (pl. eritrit)
1 db tojássárgája
1 db citrom reszelt héja

Elkészítés:

Először a tölteléket készítjük el, hogy megfelelő legyen az állaga. A túrót, a tejfölt, az édesítőszert, a tojássárgáját, a citrom reszelt héját.

A lisztet, a tejet, a vizet, a tojásokat, az eritritet, a sót és a sütőport egy tálba tesszük, majd egy botmixer segítségével csomómentesre zúzzuk. Egy tapadásmentes serpenyőt kikenünk olajjal, és közepesen erős lángon, oldalanként 1-2 perc alatt kisütjük a palacsintákat. Ezek a palacsinták kicsit vastagabbak lesznek, mintha sima lisztből készítettük volna, mert a massza kevésbé terül jól a serpenyőben.

Tészta cottage cheese-zel és párolt zöldségekkel (4 főre)

Hozzávalók:
320g teljes kiőrlésű tészta
300g cottage cheese (főzőtejszín-krémsajt keverékével helyettesítető)
300g cukkini
300g gomba (pl. csiperke)
1 hagyma
1 ek. olaj
1 tk. só
csipetnyi őrölt bors és ételízesítő
2 gerezd fokhagyma
friss bazsalikom (ízlés szerint)

Elkészítés:

Főzd a tésztát forrásban lévő, sós vízben. Mély serpenyőben vagy edényben pirítsd a finomra vágott hagymát felhevített olajon áttetszővé. Add hozzá a megmosott és felszeletelt gombát és cukkinit. Fűszerezd a zöldségkeveréket, enyhén sózd, add hozzá a préselt fokhagymagerezdeket, és 5-7 perc alatt párold puhára (ha főzőtejszínt használunk forraljuk össze a zöldségekkel, majd tűzről levéve keverjük bele a krémsajtot). A főtt tésztát szűrd le, hideg vízzel öblítsd le, és keverd össze a cottage cheese-zel, párolt zöldségekkel és friss bazsalikommal.

Töltött tök (2 főre):

2 zsenge tök, körülbelül
20-25cm hosszú
200g darált hús
1 nagy fej hagyma
300g paradicsom
2 gerezd fokhagyma
só, bors
őrölt római kömény
olaj
150g bulgur
100g trappista

Elkészítés:
A hagymát finomra vágtam, kis olajon megfonnyasztottam, majd hozzáadtam a darált húst és pirítani kezdtem. Közben vizet forraltam, a paradicsomokat beledobtam pár pillanatra, majd lehúztam a héjukat. Felkockáztam őket. Amikor a hús megpirult kevés vizet öntöttem rá, hozzátettem a paradicsomot, sóztam, borsoztam és hozzáadtam a római köményt. Legyünk vele óvatosak, inkább többször keveset tegyünk hozzá, kóstolgassunk. Főzés közben, ha szükséges, öntsünk a húshoz még vizet, de ne legyen túl szaftos.

A bulgurt kétszeres sós vízben megfőztem. A sajtot lereszeltem. A tököket félbe vágtam, a magokat karalábévájóval kiszedtem és papíros sütőlemezre állítottam őket. A sütőt 180 fokra előmelegítettem.

Mikor a hús megpuhult hozzákevertem a bulgurt, zúzott fokhagymát és utóízesítettem. A tölteléket a tökökbe kanalaztam, reszelt sajttal megszórtam és csak addig sütöttem, míg a sajt megpirult. Így a tökök még ressek maradnak.

Tipp: tök helyett használhatunk cukkinit. Ha nem szeretnénk csónakokat szeleteljük fel a zöldséget és csináljunk rakottat. Basmati rizzsel vagy kölessel is finom. A sajtot lecserélhetjük kapros tejfölre.

Szedersörbet (1 adag)

Hozzávalók:

20 dkg szeder
4 evőkanál édesítőszer
2 evőkanál citromlé
3 dl kókuszvíz
(helyettesíthető vízzel, vagy ízlés szerint tejjel)
díszítéshez:
szeder (fagyasztott is lehet)
mentalevél

Elkészítés: A megmosott szedret lábosba tesszük, villával összetörjük, majd hozzáadjuk a kókuszvizet, az édesítőt, a citromlevet, és felmelegítjük, majd hagyjuk kihűlni. Műanyag dobozba öntjük, és a fagyasztóba tesszük. A kívánt állag eléréséig 30 percenként botmixerrel vagy villával átkeverjük. Tálaláskor szederrel és mentalevéllel díszítjük. (más gyümölccsel is elkészíthető (pl. eper, málna, erdei gyümölcs mix, stb.), szénhidrát tartalma ennek függvényében változhat.

Szénhidrát: 12 g CH vízzel készítve, vagy 27 g CH tejjel készítve.

Túrós palacsinta (10-12db)

250 g zabliszt
350 ml tej
350 ml szénsavas víz
2 db tojás
1 ek eritrit (vagy 1 ek cukornak megfelelő más édesítőszer)
1 csipet só
1 mk sütőpor
olaj a sütéshez
250 g túró
80 g tejföl
30 g cukornak megfelelő édesítőszer (pl. eritrit)
1 db tojássárgája
1 db citrom reszelt héja

Elkészítés:

Először a tölteléket készítjük el, hogy megfelelő legyen az állaga. A túrót, a tejfölt, az édesítőszert, a tojássárgáját, a citrom reszelt héját.

A lisztet, a tejet, a vizet, a tojásokat, az eritritet, a sót és a sütőport egy tálba tesszük, majd egy botmixer segítségével csomómentesre zúzzuk. Egy tapadásmentes serpenyőt kikenünk olajjal, és közepesen erős lángon, oldalanként 1-2 perc alatt kisütjük a palacsintákat. Ezek a palacsinták kicsit vastagabbak lesznek, mintha sima lisztből készítettük volna, mert a massza kevésbé terül jól a serpenyőben.

Tészta cottage cheese-zel és párolt zöldségekkel (4 főre)

Hozzávalók:
320g teljes kiőrlésű tészta
300g cottage cheese (főzőtejszín-krémsajt keverékével helyettesítető)
300g cukkini
300g gomba (pl. csiperke)
1 hagyma
1 ek. olaj
1 tk. só
csipetnyi őrölt bors és ételízesítő
2 gerezd fokhagyma
friss bazsalikom (ízlés szerint)

Elkészítés:

Főzd a tésztát forrásban lévő, sós vízben. Mély serpenyőben vagy edényben pirítsd a finomra vágott hagymát felhevített olajon áttetszővé. Add hozzá a megmosott és felszeletelt gombát és cukkinit. Fűszerezd a zöldségkeveréket, enyhén sózd, add hozzá a préselt fokhagymagerezdeket, és 5-7 perc alatt párold puhára (ha főzőtejszínt használunk forraljuk össze a zöldségekkel, majd tűzről levéve keverjük bele a krémsajtot). A főtt tésztát szűrd le, hideg vízzel öblítsd le, és keverd össze a cottage cheese-zel, párolt zöldségekkel és friss bazsalikommal.

Teljes kiőrlésű pogácsa (35 db)

35 darabhoz
250 ml langyos tej
7 g porélesztő
1 db tojássárgája
1 db tojás
180 g puha vaj
2 ek tejföl
400 g teljes kiőrlésű liszt
100 g liszt
2 tk só
70 g parmezán
110 g gouda sajt
A tetejére:
1 db tojás
100 g gouda sajt

Elkészítés: teljes kiőrlésű sajtos pogácsa elkészítéséhez egy dagasztótálba tesszük a tejet, és belekeverjük az élesztőt. Hagyjuk 2 percig állni, majd beletesszük a többi hozzávalót és a reszelt sajtokat. Nagyjából összekeverjük, majd alaposan kidagasztjuk géppel vagy kézzel. Mivel ez egy nehezebb, zsírosabb tészta, ezért tovább kell keleszteni meleg helyen, mint a sima lisztből készült tésztákat. A tésztát egy tálba tesszük, lefedjük, és legalább 100 percig kelesztjük. Ennyi idő alatt a duplájára nő. Ezután enyhén lisztezett deszkán 2 cm vastagra kinyújtjuk, és tetszőleges nagyságú pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, én 5 cm átmérőjűt használtam. Ezután sütőpapírral bélelt tepsire rakjuk egymástól kb. 5 cm-re. A tetejét beirdaljuk, lekenjük a felvert tojással, és megszórjuk 1-1 nagy csipet reszelt sajttal. 180 fokos sütőben 28-30 perc alatt megsütjük.

Központi
Dietetikai Szolgálat

SZENT MARGIT
KÓRHÁZ

Hujber-Nagy Mónika
csoportvezető dietetikus

Analóg inzulin kezelés és a diéta

Az ultragyors hatású inzulinok adagolása mellett pl. Humalog,NovoRapid, Apidra az egyes étkezésekkor elfogyasztott szénhidrát mennyisége elérheti a 80-90 g –ot.
A napi háromszori étkezés elegendő, kisétkezések nem szükségesek.
Az étkezési időpontok és az egyes étkezésekre jutó szénhidrátbevitel viszonylag szabadon változtatható, az ultragyors hatású inzulin korrigálásával.

Ha szeretne enni a főétkezések között is, inzulint kell adnia, melyet az étel szénhidráttartalmához kell igazítani, ezt orvosával beszélje meg!
A két inzulinbeadás / étkezés ideje között 3 órának kell eltelnie.
Az egyes étkezésekkor fogyasztott szénhidrát mennyiségét bizonyos határok között növelheti, vagy csökkentheti, ehhez az ultragyors hatású inzulin adagját is kell módosítani, a kezelőorvossal ezt egyeztetni kell.

Az alacsonyabb glikémiás indexű élelmiszerekből, 5-6 mmol /l vércukor esetén 5-10 g szénhidrát fogyasztható ultragyors hatású inzulin adása nélkül, de érdemes kontrollálni vércukorszint mérésekkel,hogy egyénileg milyen az adott élelmiszer vércukoremelő hatása.

Az egyes élelmiszerek, ételek szénhidráttartalmának és glikémiás indexének pontos ismerete szükséges! A konyhai mérleg használata ebben a kezelési módban is fontos.

Glikémiás index : (GI) :azt fejezi ki százalékban, hogy a vizsgált szénhidrát *milyen mértékű étkezés utáni vércukoremelő hatás*sal rendelkezik, a szőlőcukor vércukoremelő hatásához képest.

90-120 % : malátacukor, méz, cukrozott üdítők, burgonyapüré, főtt burgonya, fehér kenyér, fehér zsemle és kifli
70-90 %: abonett, puffasztott búza, kétszersült, kekszek, tejberizs, fehér liszt, főtt tészták, kalács, szőlő, görögdinnye, sült burgonya
50-70 %: zabpehely, kukorica, főtt rizs, banán, ananász, 100 %-os gyümölcslé, zöldborsó, kivi
30-50 %: tej, joghurt, kefír, hazai gyümölcsök, durum tészták, narancs, tejszínes fagylaltok, vadrizs
30 % alatt : gyümölcscukor, szorbit, diabetikus méz, lencse, bab, dió, korpás müzli, Grapefruit, szójatej
15 % alatt: spárga, brokkoli, mogyoró, karfiol, zeller, uborka, padlizsán, zöldbab, saláták, paprika, spenót, cukkini, tök, paradicsom, retek, cékla.

Az ultragyors hatású inzulin beadása
Az ultragyors hatású inzulin a beadás helyéről gyorsan felszívódik.

Kovács-Vajda Edina, dietetikus

Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 132.
Telefon: +36 1 250-2420 / 1199 v. ~~1870~~
Email: szentmargit.dietetika@gmail.com

Minőségirányítási tanusítvány száma:
MSZ EN ISO 9001:2015
MSZ EN 15224:2013

A beadás ideje függ: az aktuális vércukor értéktől.

- Közvetlenül az étkezés előtt kell beadni, ha a vércukorszint 5-7 mmol/l..
- 5-10 percet várni kell az étkezéssel, ha a vércukorszint magasabb, mint 7 mmol/ l.
- Közvetlenül az étkezés után kell beadni, ha a vércukorszint 5 mmol/l alatti.

Az inzulin beadási időpontokat a kezelőorvosával beszélje meg.
(Javaslat az ultragyors hatású inzulin beadási idejére: 7:00 , 12:00 , 18:00 óra.)

Javaslat a bázisinzulin (pl. Levemir , Lantus) beadására: 6:00, 12:30 , 22:00 óra. A bázis inzulin beadási ideje kötött!

Ha a megevett táplálék mennyiség nem látható előre, pl. étteremben , menzán, az ultra gyors hatású inzulin étkezés után is beadható, ekkor az elfogyasztott étel szénhidráttartalmához igazítható az inzulinadag.

Magas vércukorszint korrigálása: 3 órával az étkezés után lehetséges, de ügyelni kell arra, hogy ugyanazt a magas vércukorszintet nem szabad kétszer korrigálni. A két korrekció között 3 órának kell eltelnie.

Javaslat a napi szénhidrátbevitel elosztására:

Reggeli: 40-60 g között,
Ebéd: 60-90 g között,
Vacsora : 50-70 g között.

- Javaslat **napi 160** g szénhidrát elosztására (1200 kcal):
  - reggeli: 50 g,
  - ebéd: 60,
  - vacsora: 50g.

- Javaslat **napi 180** g szénhidrát elosztására (1400 kcal):
  - reggeli: 50 g,
  - ebéd: 70,
  - vacsora: 60g.

- Javaslat **napi 200 g** szénhidrát elosztására:
  - reggeli: 60 g,
  - ebéd: 80 g,
  - vacsora: 60 g.

- Javaslat **napi 220 g** szénhidrát elosztására:
  - reggeli: 60 g,
  - ebéd: 90 g,
  - vacsora: 70 g.

Glikémiás indexet (GI) befolyásoló tényezők:

1. *Szénhidráttípus*. Alapszabály, hogy a csonthéjas, bogyós és savanyú citrus gyümölcsöknek, a föld felett növő zöldségeknek (továbbá a reteknek és hagymának) és hüvelyeseknek kicsi a GI-értékük. A föld felszíne alatt növő zöldségeknek (gyökérnövényeknek, pl. burgonya, répa, cékla), a finomra őrölt gabonalisztből készült péktermékeknek, valamint a rizsnek nagy a GI-értékük.
2. A *szénhidrátok* formája: vagyis a részecskék, szemcsék mérete is meghatározza a GI-értéket.
Minél kisebb a részecske mérete – minél finomabbra őrlik a gabonát, minél kisebbre aprítják a szénhidrátot (püré, turmixolás) –, annál nagyobb a GI értéke.
(pl. burgonyapüré GI-e magasabb, mint a főtt burgonyáé)

3. A *keményítőtartalmú* szénhidrátok főzési ideje szintén befolyásolja a GI-értéket.
Minél hosszabb a főzési idő, annál több vizet vesznek fel, s kocsonyássá válnak. Minél kocsonyásabb a keményítő, a belőle származó szénhidrát annál gyorsabban szívódik fel a vérbe, s emeli a vércukorszintet. Minél hosszabban főzzük a burgonyát, tésztát és rizst, a szénhidrátjuk szintén annál gyorsabban szívódik fel a vérbe, s emeli a vércukorszintet. A szétfőtt keményítőknek nagy a GI-értékük. A félkeményre főzött tészta és rizs kevésbé kocsonyásodik, így a szénhidrátja lassabban szívódik fel, s kisebb lesz a GI értéke.

4. *Rosttartalom*. A rosttartalom is csökkenti a glikémiás indexet.
A rost fizikai akadályként működik a gyomorban, így az enzimek lassan jutnak a lebontandó tápanyaghoz. A rostdús ételek telítettségérzetet váltanak ki, GI-értékük alacsony.

5. Az ételek *fehérjetartalma* csökkenti a szénhidrátok GI-értékét.
A fehérjemolekulák nagyok, ezért a fehérjét tartalmazó szénhidráttartalmú étel lassan „csordogál" a belekbe (pl. sült pulykamell főtt rizzsel). A fehérje egymagában vagy túlzott mennyiségben fogyasztva növeli a vér inzulinszintjét, s az éhes ember amúgy is alacsony vércukorszintjét még alacsonyabbra nyomja, márpedig ez hipoglikémiára vezethet.

6.*Savanyú ételek* szénhidráttal együtt fogyasztva csökkentik a GI-választ.
Savas környezet kialakítása a gyomorban fehérjefogyasztás nélkül is lassítja az ételnek a gyomorból bélbe való ürülését. Például két evőkanál citromlé akár 30%-kal is csökkentheti a GI-értéket. A salátáknál alkalmazott ecet ugyanilyen hatású.

7. Az ételben levő *zsírok* szintén csökkentik a GI-értéket.
A zsírmolekulák lassan engedik a szénhidrátmolekulákat a vérbe jutni, viszont a zsír a nagy kalóriatartalma miatt nem túl kedvező a GI-érték csökkentésére. Mérsékelt mennyiségű növényi olaj beilleszthető az étrendbe.

Ajánlott irodalom:

Dr. Bíró György és Dr. Lindner Károly: Tápanyagtáblázat
Dr. Winkler Gábor és Dr. Baranyi Éva: Cukorbetegek kézikönyve