

Matemática atuarial

Seguros Aula 9

Danilo Machado Pires

danilo.pires@unifal-mg.edu.br

SEGUROS DIFERIDOS

- Produtos atuariais.
 - Seguros de vida vitalício, seguro de vida temporário, seguro dotal puro e seguro dotal.
- Em alguns casos o segurado pode querer que a vigência se inicie alguns anos após a assinatura do contrato de seguro.
- O valor que a seguradora deverá gastar, em média, com o segurado cujo produto começará a vigorar daqui a “ m ” anos.

SEGUROS Vida vitalícios DIFERIDOS

- Pensemos, inicialmente, no seguro de **vida vitalício** que paga 1 *u.m.* Ao final do momento de morte do segurado.
- Porém, esse seguro de vida começará a vigorar daqui a “*m*” anos.

$$b = \begin{cases} 0 & ; \quad t = 0, 1, 2, \dots, m \\ 1 & ; \quad t = m, m + 1, m + 2, \dots \end{cases}$$

$$Z_T = \begin{cases} v^{T+1} & ; \quad t = m, m + 1, m + 2, \dots \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

SEGUROS Vida vitalícios DIFERIDOS

➤ Caso em que T é discreto:

$$b = \begin{cases} 0 & ; t < m \\ 1 & ; t \geq m \end{cases}$$

$$Z_T = \begin{cases} v^{T+1} & ; T \geq m \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

$${}_m|A_x = E(Z_T) = \sum_{j=m}^{\omega-x-m} v^{j+1} {}_j p_x q_{x+j}$$

SEGUROS Vida vitalícios DIFERIDOS

➤ Fazendo $j = m + t$, tem-se:

$${}_m|A_x = \sum_{j=m}^{\omega-x-m} v^{j+1} {}_j p_x q_{x+j} = \sum_{t=0}^{\omega-x-m} v^{m+t+1} \underbrace{{}_{m+t} p_x}_{\text{circled}} q_{x+m+t}$$

Lembrando que $\underbrace{{}_{m+t} p_x}_{\text{circled}} = {}_m p_x \times {}_t p_{x+m}$, então

$${}_m|A_x = \sum_{t=0}^{\omega-x-m} v^{m+t+1} {}_m p_x {}_t p_{x+m} q_{x+m+t}$$

$${}_m|A_x = v^m {}_m p_x \sum_{t=0}^{\omega-x-m} v^{t+1} {}_t p_{(x+m)} q_{(x+m)+t}$$

$${}_m|A_x = A_{x:\overline{m}|}^1 A_{x+m}$$

SEGUROS Vida vitalícios DIFERIDOS

Valor presente diferido por m anos

Seguro de vida Dotal Puro para uma pessoa de x anos ($A_{x:\overline{m}|^1}$)

$${}_m|A_x = v^m {}_m p_x A_{x+m}$$

Seguro de vida **vitalício** para uma pessoa de idade $x + m$

- É, na verdade, o seguro de vida vitalício trazido a valor presente atuarial a data de hoje.

$${}_m|A_x = {}_m E_x A_{x+m}$$

SEGUROS Vida vitalícios DIFERIDOS

Outra forma de cálculo do mesmo seguro seria:

Diagram illustrating the components of the deferred life insurance formula:

- A red arrow points from the text "Valor presente diferido por m anos" to the $m|$ term in the formula.
- A red arrow points from the text "Seguro de vida **vitalício** para uma pessoa de idade x " to the A_x term in the formula.
- A red arrow points from the text "Seguro temporário por m anos, para uma pessoa de idade x ." to the $A_{x:1:\overline{m}|}$ term in the formula.

$$m|A_x = A_x - A_{x:1:\overline{m}|}$$

Demonstração:

$$A_x = \sum_{t=0}^{\infty} v^{t+1} {}_t p_x q_{x+t}$$

$$A_x = \sum_{t=0}^{m-1} v^{t+1} {}_t p_x q_{x+t} + \sum_{t=m}^{\omega-x-m} v^{t+1} {}_t p_x q_{x+t}$$

$$A_x = A_{x^{1:\overline{m}|}} + {}_m|A_x$$

$${}_m|A_x = A_x - A_{x^{1:\overline{m}|}}$$

➤ EXEMPLO 1

Pensemos no caso de uma pessoa (mulher) de 25 anos que deseja fazer um seguro vitalício, com 3 anos de carência. Ou seja, caso esse segurado faleça após 28 anos, o beneficiário receberá uma quantia de 1. *u.m.* Considere a taxa de juros de 4% ao ano e as seguintes probabilidade de morte e então calcule o prêmio puro:

Idade	q_x	p_x	l_x
25	0,00037	0,99963	100000
26	0,00039	0,99961	99963
27	0,00040	0,99960	99924,01
28	0,00042	0,99958	99884,04
29	0,00044	0,99956	99842,09
30	0,00045	0,99955	99798,16
31	0,00046	0,99954	99753,25
32	0,00048	0,99952	99707,37
33	0,00049	0,99951	99659,51
34	0,00050	0,99950	99610,67
35	0,00052	0,99948	99560,87

$$A_{25} = 0,1079694$$

$${}_3|A_{25} = v^3 {}_3p_{25} A_{28}$$

➤ EXEMPLO 1

Pensemos no caso de uma pessoa (mulher) de 25 anos que deseja fazer um seguro vitalício, com 3 anos de carência. Ou seja, caso esse segurado faleça após 28 anos, o beneficiário receberá uma quantia de 1. *u. m.* Considere uma taxa de juros de 4% ao ano e as seguintes probabilidade de morte e calcule o prêmio puro:

Idade	q_x	p_x	l_x
25	0,00037	0,99963	100000
26	0,00039	0,99961	99963
27	0,00040	0,99960	99924,01
28	0,00042	0,99958	99884,04
29	0,00044	0,99956	99842,09
30	0,00045	0,99955	99798,16
31	0,00046	0,99954	99753,25
32	0,00048	0,99952	99707,37
33	0,00049	0,99951	99659,51
34	0,00050	0,99950	99610,67
35	0,00052	0,99948	99560,87

$$A_{25} = 0,1079694$$

$${}_3|A_{25} = A_{25} - A_{25^{1:\bar{3}}|}$$

$$A_{25^{1:\bar{3}}|} = \sum_{t=0}^2 v^{t+1} {}_t p_{25} q_{25+t} = 0,0010715$$

$${}_3|A_{25} = 0,1079694 - 0,0010715$$

$${}_3|A_{25} = 0,106978$$

$${}_3|A_{25} = v^3 {}_3p_{25} A_{28}$$

SEGUROS Vida vitalícios DIFERIDOS

➤ Para o caso em que T é discreto:

$$b = \begin{cases} 0 & ; t < m \\ 1 & ; t \geq m \end{cases}$$

$$Z_T = \begin{cases} v^{T+1} & ; T \geq m \\ 0 & c.c. \end{cases}$$

$${}_m|A_x = \sum_{t=m}^{\omega-x-m} v^{t+1} {}_t p_x q_{x+t}$$

$${}_m|A_x = v^m {}_m p_x A_{x+m}$$

$${}_m|A_x = A_x - A_{x^{1:\overline{m}|}}$$

Para um seguro de uma pessoa de x anos, seja diferido por “ m ” anos como será o valor presente atuarial caso o seguro também seja:

a) Temporário por “ n ” anos.

b) Seguro dotal puro.

Dado que $b = 1$ e T_x discreto.

Para um seguro de uma pessoa de x anos, seja diferido por “ m ” anos como será o valor presente atuarial caso o seguro também seja:

a) Temporário por “ n ” anos.

Dado que $b = 1$ e T discreto.

Resp.:

O seguro temporário por n para uma pessoa de x anos (caso discreto)

$$A_{x^{1:\overline{n}|}} = \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1} {}_t p_x q_{x+t}$$

Então:

➤ Temporário

$${}_m | A_{x^{1:\overline{n}|}} = \sum_{t=m}^{(m+n)-1} v^{t+1} {}_t p_x q_{x+t}$$

Fazendo $t = m + l$, então:

$${}_m|A_{x^1:\overline{n}}| = \sum_{l=0}^{n-1} v^{m+l+1} {}_{(m+l)}p_x q_{x+(m+l)} = v^m \sum_{l=0}^{n-1} v^{l+1} {}_{(m+l)}p_x q_{x+(m+l)}$$

$${}_m|A_{x^1:\overline{n}}| = v^m \sum_{l=0}^{n-1} v^{l+1} {}_m p_x {}_l p_{x+m} q_{x+m+l}$$

$${}_m|A_{x^1:\overline{n}}| = v^m {}_m p_x \sum_{l=0}^{n-1} v^{l+1} {}_l p_{(x+m)} q_{(x+m)+l}$$

$${}_m|A_{x^1:\overline{n}}| = v^m {}_m p_x A_{(x^1+m)^1:\overline{n}}|$$

$${}_m|A_{x^1:\overline{n}}| = A_{x^1:\overline{m+n}}| - A_{x^1:\overline{m}}|$$

Para um seguro de uma pessoa de x anos, seja diferido por “ m ” anos como será o valor presente atuarial caso o seguro também seja:

b) Seguro dotal puro.

Dado que $b = 1$ e T discreto.

Resp.:

O dotal puro por n para uma pessoa de x anos (caso discreto) .

$$A_{x:\overline{n}|^1} = v^n {}_n p_x$$

➤ Dotal Puro

$${}_m | A_{x:\overline{n}|^1} = v^m {}_m p_x A_{x+m:\overline{n}|^1} = v^m {}_m p_x (v^n {}_n p_{x+m})$$

$${}_m | A_{x:\overline{n}|^1} = v^{m+n} {}_m p_x {}_n p_{x+m} = v^{m+n} {}_{m+n} p_x$$

$$A_{x:\overline{n+m}|^1}$$

SEGUROS Vida vitalícios DIFERIDOS

$$Z_T = \begin{cases} v^{T+1} & ; T \geq m \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

$${}_m|A_x = \sum_{t=m}^{\omega-x-m} v^{t+1} {}_t p_x q_{x+t}$$

$${}_m|A_x = v^m {}_m p_x A_{x+m}$$

$${}_m|A_x = A_x - A_{x^{1:\overline{m}|}}$$

SEGUROS Vida temporários DIFERIDOS

$$Z_T = \begin{cases} v^{T+1} & ; m \leq T < (m+n) \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

$${}_m|A_{x^{1:\overline{n}|}} = \sum_{t=m}^{m+n-1} v^{t+1} {}_t p_x q_{x+t}$$

$${}_m|A_{x^{1:\overline{n}|}} = v^m {}_m p_x A_{(x+m)^{1:\overline{n}|}}$$

$${}_m|A_{x^{1:\overline{n}|}} = A_{x^{1:\overline{m+n}|}} - A_{x^{1:\overline{m}|}}$$

SEGUROS Vida DIFERIDOS

➤ EXEMPLO 2

Seja $x = 25$ que deseja fazer um seguro com benefício unitário que tenha cobertura de 5 anos, com 3 anos de carência. Considere a taxa de juros de 4% ao ano e a Tábua AT-49 e então calcule o prêmio puro único.

Idade	q_x
25	0,00077
26	0,00081
27	0,00085
28	0,00090
29	0,00095
30	0,00100
31	0,00107
32	0,00114
33	0,00121
34	0,00130
35	0,00139

Logo queremos calcular ${}_3|A_{25^1:\bar{5}}|$

$$Z_T = \begin{cases} \left(\frac{1}{1 + 0,04}\right)^{T+1} & 3 \leq T < 8 \\ 0 & c.c. \end{cases}$$

Idade	$q_x = {}_1q_x$	${}_1p_x = 1 - {}_1q_x$	${}_1l_x = \frac{l_{x+1}}{p_x}$
25	0,00077	0,99923	100000
26	0,00081	0,99919	99923
27	0,00085	0,99915	99842
28	0,00090	0,99910	99757
29	0,00095	0,99905	99667
30	0,00100	0,99900	99572
31	0,00107	0,99893	99472
32	0,00114	0,99886	99365
33	0,00121	0,99879	99251
34	0,00130	0,99870	99131
35	0,00139	0,99861	99002

$${}_m|A_{x^1:\overline{n}}| = \sum_{t=m}^{(m+n)-1} v^{t+1} {}_tp_x q_{x+t}$$

$${}_3|A_{25^1:\bar{5}}| = \sum_{t=3}^{(3+5)-1} \left(\frac{1}{1,04}\right)^{t+1} {}_tp_{25} q_{25+t}$$

$${}_m|A_{x^1:\overline{n}}| = v^m {}_mp_x A_{x^1+m:\overline{n}}|$$

$${}_3|A_{25^1:\bar{5}}| = \left(\frac{1}{1,04}\right)^3 {}_3p_{25} \sum_{t=0}^{(5)-1} \left(\frac{1}{1,04}\right)^{t+1} {}_tp_{28} q_{28+t}$$

$$Z_T = v^{T+1}; T \geq 0$$

$$A_x = \sum_{t=0}^{\infty} Z_T {}_t p_x q_{x+t}$$

$$Z_T = \begin{cases} v^{T+1}; & T = 0, 1, 2, \dots, n-1 \\ 0; & T = n, n+1, \dots \end{cases}$$

$$A_{x:1:\overline{n}} = \sum_{t=0}^{n-1} Z_T {}_t p_x q_{x+t}$$

$$Z_T = \begin{cases} v^{T+1}; & T = 0, 1, \dots, n-1 \\ v^n; & T = n, n+1, \dots \end{cases}$$

$$A_{x:\overline{n}} = A_{x:1:\overline{n}} + A_{x:\overline{n}|1}$$

$$Z_T = v^{T+1}; T \geq m$$

$${}_m A_x = \sum_{t=m}^{\infty} Z_T {}_t p_x q_{x+t}$$

$${}_m A_x = v^m {}_m p_x A_{x+m}$$

$${}_m A_x = A_x - A_{x:1:\overline{m}}|$$

$$Z_T = \begin{cases} v^{T+1}; & m \leq T < (m+n) \\ 0; & \text{c.c.} \end{cases}$$

$${}_m A_{x:1:\overline{n}} = \sum_{t=m}^{m+n-1} Z_T {}_t p_x q_{x+t}$$

$${}_m A_{x:1:\overline{n}} = v^m {}_m p_x A_{x:1+m:\overline{n}}|$$

$${}_m A_{x:1:\overline{n}} = A_{x:1:\overline{m+n}} - A_{x:1:\overline{m}}|$$

$$P(T_x = t) = {}_t p_x q_{x+t}$$

$$Z_T = \begin{cases} v^n; & T = n, n+1, \dots \\ 0; & T = 0, 1, 2, \dots, n-1 \end{cases}$$

$$A_{x:\overline{n}|1} = Z_T {}_n p_x$$

$$E(Z_T)$$

$$Z_T = e^{-\delta T}; T \geq 0$$

$$\bar{A}_x = \int_0^{\infty} Z_T {}_t p_x \mu(x+t) dt$$

$$Z_T = e^{-\delta T}; 0 \leq T \leq n$$

$$\bar{A}_{x:1:\overline{n}} = \int_0^n Z_T {}_t p_x \mu(x+t) dt$$

$$Z_T = \begin{cases} e^{-\delta T} & ; T < n \\ e^{-\delta n} & ; T \geq n \end{cases}$$

$$\bar{A}_{x:\overline{n}} = \bar{A}_{x:1:\overline{n}} + \bar{A}_{x:\overline{n}|1}$$

$$Z_T = \begin{cases} e^{-\delta n}; & T \geq n \\ 0; & T < n \end{cases} \quad \bar{A}_{x:\overline{n}|1} = Z_T {}_n p_x$$

$$f_{T_x}(t) = {}_t p_x \mu(x+t)$$

SEGUROS Vida DIFERIDOS – pago no momento da morte

- O valor presente atuarial vitalício diferido é :

$$b = \begin{cases} 0 & ; \quad t < m \\ 1 & ; \quad t \geq m \end{cases} \quad Z_T = e^{-\delta T}; \quad T \geq m$$

$${}_m|\bar{A}_x = \int_m^{\infty} e^{-\delta t} f_{T_x}(t) dt$$

- O valor presente atuarial temporário diferido é

$$b = \begin{cases} 0 & ; \quad t < m \\ 1 & ; \quad m \leq t \leq m + n \end{cases} \quad Z_T = e^{-\delta T} \quad ; \quad m \leq T \leq m + n$$

$${}_m|\bar{A}_{x^{1:\bar{n}}|} = \int_m^{m+n} e^{-\delta t} f_{T_x}(t) dt$$

SEGURO DE VIDA INTEIRO

➤ Exemplo 3

Determine o valor do prêmio puro único a ser cobrado por um segurado que deseja contratar um seguro que pague 1 *u.m.* no momento da morte, após 10 anos de carência. Considere que o tempo de vida adicional desse segurado tenha a seguinte função de densidade.

$$f_T(t) = 0,04e^{-0,04t}, t > 0$$

Considere também $\delta = 0,06$.

➤ Exemplo 3

$${}_{10|\bar{A}}_x = \int_{10}^{\infty} e^{-0,06t} 0,04 e^{-0,04T} dt$$

$${}_{10|\bar{A}}_x = \int_{10}^{\infty} e^{-0,06t} 0,04 e^{-0,04t} dt = \int_{10}^{\infty} 0,04 e^{-0,1t} dt$$

$${}_{10|\bar{A}}_x = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(-\frac{0,04}{0,1} e^{-0,1t} \right) + \frac{0,04}{0,1} e^{-0,1(10)}$$

$${}_{10|\bar{A}}_x = 0,147$$

Matemática atuarial

Seguros Aula 11

Danilo Machado Pires

danilo.pires@unifal-mg.edu.br

Exemplo:

Pensemos no caso de uma pessoa de 25 anos que deseja fazer um seguro temporário por 5 anos, com 3 anos de carência. Ou seja, caso esse segurado faleça entre seus 28 e 33 anos, o beneficiário receberá uma quantia de 1.u.m. Considere uma taxa de juros de 4% ao ano e as seguintes probabilidade de morte e calcule o prêmio puro:

Idade	q_x
25	0,00077
26	0,00081
27	0,00085
28	0,00090
29	0,00095
30	0,00100
31	0,00107
32	0,00114
33	0,00121
34	0,00130
35	0,00139

$${}_3|A_{25^{1:\overline{5}|}} = \sum_{j=3}^{(5+3)-1} v^{j+1} {}_j p_{25} q_{25+j}$$

$${}_3|A_{25^{1:\overline{5}|}} = v^3 {}_3 p_{25} A_{28^{1:\overline{5}|}}$$

$${}_3|A_{25^{1:\overline{5}|}} = A_{25^{1:\overline{5+3}|}} - A_{25^{1:\overline{3}|}}$$


```
prêmio<- function( i, idade, n,b) {
```

```
    pxx <- c(1, cumprod( px[(idade+1):(idade+n-1)]) )
```

```
    qxx <- c(qx[(idade+1):(idade+n)])
```

```
    v    <- (1/(i+1)) ^(1:n)
```

```
    Ax   <- b* sum(v*pxx*qxx)
```

```
    return (Ax) }
```

Idade	q_x
25	0,00077
26	0,00081
27	0,00085
28	0,00090
29	0,00095
30	0,00100
31	0,00107
32	0,00114
33	0,00121
34	0,00130
35	0,00139

```
dotal<-function(i,idade,n,b){
```

```
    V    <- 1/(i+1)^n
```

```
    npx <- prod( px[(idade+1):(idade+n)])
```

```
    Dt   <- V*npx*b
```

```
    return(Dt) }
```

Exemplo:

Pensemos no caso de uma pessoa de 25 anos que deseja fazer um seguro temporário por 5 anos, com 3 anos de carência. Ou seja, caso esse segurado faleça entre seus 28 e 33 anos, o beneficiário receberá uma quantia de 1.u.m. Considere uma taxa de juros de 4% ao ano e as seguintes probabilidade de morte e calcule o prêmio puro:

Idade	q_x
25	0,00077
26	0,00081
27	0,00085
28	0,00090
29	0,00095
30	0,00100
31	0,00107
32	0,00114
33	0,00121
34	0,00130
35	0,00139

$${}_3|A_{25^{1:\overline{5}}}| = v^3 {}_3p_{25}A_{28^{1:\overline{5}}}|$$

dotal(0.04,25,3,1) prêmio(0.04,28,5,1)

$${}_3|A_{25^{1:\overline{5}}}| = A_{25^{1:\overline{5+3}}}| - A_{25^{1:\overline{3}}}|$$

prêmio(0.04,25,8,1) –prêmio(0.04,25,3,1)

Exemplo:

Pensemos no caso de uma pessoa de 25 anos que deseja fazer um seguro vitalício, com 3 anos de carência. Considere uma taxa de juros de 4% ao ano e as seguintes probabilidade de morte e calcule o prêmio puro:

Idade	q_x
25	0,00077
26	0,00081
27	0,00085
28	0,00090
29	0,00095
30	0,00100
31	0,00107
32	0,00114
33	0,00121
34	0,00130
35	0,00139

????

????

$${}_3|A_{25} = v^3 {}_3p_{25}A_{28}$$

$${}_3|A_{25} = A_{25} - A_{25:1:\overline{3}|}$$

Exemplo:

Pensemos no caso de uma pessoa de 25 anos que deseja fazer um seguro vitalício, com 3 anos de carência. Considere uma taxa de juros de 4% ao ano e as seguintes probabilidade de morte e calcule o prêmio puro:

$${}_3|A_{25} = v^3 {}_3p_{25}A_{28}$$

$\text{dota}(0.04, 25, 3, 1) \times \text{prêmio}(0.04, 28, \max(\text{Idade}) - 28, 1)$

$${}_3|A_{25} = A_{25} - A_{25:1:\overline{3}|}$$

$\text{prêmio}(0.04, 25, \max(\text{Idade}) - 25, 1) - \text{prêmio}(0.04, 25, 3, 1)$

$$Z_T = v^{T+1}; T \geq 0$$

$$A_x = \sum_{t=0}^{\infty} Z_T {}_t p_x q_{x+t}$$

$$Z_T = \begin{cases} v^{T+1}; & T = 0, 1, 2, \dots, n-1 \\ 0; & T = n, n+1, \dots \end{cases}$$

$$A_{x:1:\overline{n}} = \sum_{t=0}^{n-1} Z_T {}_t p_x q_{x+t}$$

$$Z_T = \begin{cases} v^{T+1}; & T = 0, 1, \dots, n-1 \\ v^n; & T = n, n+1, \dots \end{cases}$$

$$A_{x:\overline{n}} = A_{x:1:\overline{n}} + A_{x:\overline{n}|1}$$

$$Z_T = v^{T+1}; T \geq m$$

$${}_m|A_x = \sum_{t=m}^{\infty} Z_T {}_t p_x q_{x+t}$$

$${}_m|A_x = v^m {}_m p_x A_{x+m}$$

$${}_m|A_x = A_x - A_{x:1:\overline{m}}|$$

$$Z_T = \begin{cases} v^{T+1}; & m \leq T < (m+n) \\ 0; & \text{c. c.} \end{cases}$$

$${}_m|A_{x:1:\overline{n}} = \sum_{t=m}^{m+n-1} Z_T {}_t p_x q_{x+t}$$

$${}_m|A_{x:1:\overline{n}} = v^m {}_m p_x A_{x:1+m:\overline{n}}|$$

$${}_m|A_{x:1:\overline{n}} = A_{x:1:\overline{m+n}} - A_{x:1:\overline{m}}|$$

$$P(T_x = t) = {}_t p_x q_{x+t}$$

$$Z_T = \begin{cases} v^n; & T = n, n+1, \dots \\ 0; & T = 0, 1, 2, \dots, n-1 \end{cases}$$

$$A_{x:\overline{n}|1} = Z_T {}_n p_x$$

$$E(Z_T)$$

$$Z_T = \begin{cases} e^{-\delta n}; & T \geq n \\ 0; & T < n \end{cases} \quad \bar{A}_{x:\overline{n}|1} = Z_T {}_n p_x$$

$$f_{T_x}(t) = {}_t p_x \mu(x+t)$$

$$Z_T = e^{-\delta T}; T \geq 0$$

$$\bar{A}_x = \int_0^{\infty} Z_T {}_t p_x \mu(x+t) dt$$

$$Z_T = e^{-\delta T}; 0 \leq T \leq n$$

$$\bar{A}_{x:1:\overline{n}} = \int_0^n Z_T {}_t p_x \mu(x+t) dt$$

$$Z_T = \begin{cases} e^{-\delta T}; & T \leq n \\ e^{-\delta n}; & T > n \end{cases}$$

$$\bar{A}_{x:\overline{n}} = \bar{A}_{x:1:\overline{n}} + \bar{A}_{x:\overline{n}|1}$$

$$Z_T = e^{-\delta T}; T \geq m$$


$${}_m|\bar{A}_x = \int_m^{\infty} Z_T f_{T_x}(t) dt$$

$$Z_T = e^{-\delta T}; m \leq T \leq m+n$$

$${}_m|\bar{A}_{x:1:\overline{n}} = \int_m^{m+n} Z_T f_{T_x}(t) dt$$

RELAÇÃO ENTRE O CASO DISCRETO E O CASO CONTÍNUO

- Fim do ano \rightarrow Tabela de vida, na prática, quase no momento da morte.
- Suposição



$$T = (K + 1) - (1 - S)$$

RELAÇÃO ENTRE O CASO DISCRETO E O CASO CONTÍNUO

- Assumindo que T é independente de S e que $S \sim U_c(0,1)$.
- Considere o seguro de vida inteira pago no momento de morte:

$$\bar{A}_x = \int_0^{\infty} e^{-\delta t} {}_t p_x \mu(x+t) dt = E(e^{-\delta T})$$

$$\bar{A}_x = E\{e^{-\delta[(K+1)-(1-S)]}\} = E[e^{-\delta(K+1)} e^{\delta(1-S)}]$$

RELAÇÃO ENTRE O CASO DISCRETO E O CASO CONTÍNUO

$$\bar{A}_x = E[v^{(K+1)}]E[e^{\delta(1-S)}]$$

$$\bar{A}_x = A_x \int_0^1 e^{\delta(1-s)} ds$$

$$\bar{A}_x = A_x \frac{e^{\delta} - 1}{\delta}$$

Substituindo $e^{\delta} = 1 + i$,

$$\bar{A}_x = A_x \frac{(1 + i) - 1}{\delta}$$

$$\bar{A}_x = A_x \frac{i}{\delta}$$

i : Taxa de juros discreta

δ : Taxa de juros constante

Exemplo 4

Uma pessoa de 25 anos deseja fazer um seguro de **vida inteiro** que paga 1 *u.m.* no momento da morte. Calcule o valor aproximado desse prêmio considerando que o prêmio pago para esse mesmo seguro com benefício pago ao final do ano de morte é de $A_{25} = 0,11242$.

Considere que o tempo de sobrevivência desse segurado pode ser modelado pela tábua AT-49 e a seguradora promete remunerar o capital em 5% ao ano.

Seguro de vida Inteiro

$$A_{25} = \sum_{t=0}^{90} \left(\frac{1}{1,05} \right)^{t+1} {}_t p_{25} q_{25+t} \approx 0,11242$$

$$\bar{A}_{25} = A_{25} \frac{i}{\delta} = 0,11242 \left(\frac{0,05}{\ln 1,05} \right) \approx 0,1152076$$

Exemplo 5

Considerar uma pessoa de idade de 30 anos que decide fazer um seguro de vida vitalício pague um benefício de 1 u.m. ao final do ano de morte. Admita $\bar{A}_{30} = 0,28317$ e que $i = 5\%$.

Exemplo 5

Considerar uma pessoa de idade de 30 anos que decide fazer um seguro de vida vitalício pague um benefício de 1 u.m. ao final do ano de morte. Admita $\bar{A}_{30} = 0,28317$ e que $i = 5\%$.

$$A_{30} = \frac{\delta}{i} \bar{A}_{30} = \left(\frac{\ln 1,05}{0,05} \right) 0,28317 \approx 0,2763182$$

RELAÇÃO ENTRE O CASO DISCRETO E O CASO CONTÍNUO

➤ Vitalício

$$\bar{A}_x = A_x \frac{i}{\delta}$$

➤ Temporário

$$\bar{A}_{x^{1:\bar{n}}|} = A_{x^{1:\bar{n}}|} \frac{i}{\delta}$$

➤ Misto

$$\bar{A}_{x:\bar{n}} = A_{x^{1:\bar{n}}|} \frac{i}{\delta} + A_{x:\bar{n}}^1$$

➤ Fracionado

$$A_x^{(m)} = \frac{i A_x}{i^{(m)}}$$

$$i^{(m)} = m \left[1 - (1 + i)^{-\frac{1}{m}} \right] v^{-\frac{1}{m}}$$