

Kvadratinės lygties sprendinių formulė

UŽDUOČIŲ LAPAS



Interaktyvi versija

Vardas, pavardė

Klasė

Data

SPRENDIMO PAVYZDŽIAI

Trys sprendimo pavyzdžiai

2 pavyzdys · Antrasis daržas: $x^2 + 3x - 30 = 0$

KOEFIICIENTAI

 $a = 1, b = 3, c = -30.$

DISKRIMINANTAS

 $D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-30) = 9 + 120 = 129 > 0.$

FORMULĖ

 $x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{129}}{2},$ todėl $x_1 \approx 4,18, x_2 \approx -7,18.$

ATSAKYMAS · TAVO EILĖ

3 pavyzdys · Vienas sprendinys: $4x^2 - 4x + 1 = 0$

KOEFIICIENTAI

 $a = 4, b = -4, c = 1.$

DISKRIMINANTAS

 $D = (-4)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 1 = 16 - 16 = 0,$ todėl lygtis turi vieną sprendinį.

SPRENDINYS · TAVO EILĖ

PATIKRINIMAS · TAVO EILĖ

PASITIKRINK

Patikrink save

1 lygis · slenkstinis

1.

Kiek realiųjų sprendinių turi lygtis $3x^2 - 5x + 4 = 0$?

- ☐ A vieną ☐ B nė vieno ☐ C neišsprendus negalima pasakyti ☐ D du

