

NMIT2 Numerik 2	Serie 9	Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Autoren	Rémi Georgiou, André Stocker	
Datum	15. November 2015	

Aufgabe 1

$$I(a) = 2 \int_1^a x \cdot \ln(x^2) dx$$

i	0	1	2	3
a	$e - \frac{1}{2}$	$e - \frac{1}{4}$	$e + \frac{1}{4}$	$e + \frac{1}{2}$
$I(a)$	3.9203	5.9169	11.3611	14.8550

a) Lagrange-Interpolation:

$$P_n(x_i) = y_i \quad i = 0, 1, 2, 3$$

i	Lagrange Polynome
0	$l_0 = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq 0}}^3 \frac{x - x_j}{x_0 - x_j} = \frac{e - (e - \frac{1}{4})}{(e - \frac{1}{2}) - (e - \frac{1}{4})} \cdot \frac{e - (e + \frac{1}{4})}{(e - \frac{1}{2}) - (e + \frac{1}{4})} \cdot \frac{e - (e + \frac{1}{2})}{(e - \frac{1}{2}) - (e + \frac{1}{2})}$ $= (-1) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{6}$
1	$l_1 = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq 1}}^3 \frac{x - x_j}{x_1 - x_j} = \frac{e - (e - \frac{1}{2})}{(e - \frac{1}{4}) - (e - \frac{1}{2})} \cdot \frac{e - (e + \frac{1}{4})}{(e - \frac{1}{4}) - (e + \frac{1}{4})} \cdot \frac{e - (e + \frac{1}{2})}{(e - \frac{1}{4}) - (e + \frac{1}{2})}$ $= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$
2	$l_2 = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq 2}}^3 \frac{x - x_j}{x_2 - x_j} = \frac{e - (e - \frac{1}{2})}{(e + \frac{1}{4}) - (e - \frac{1}{2})} \cdot \frac{e - (e - \frac{1}{4})}{(e + \frac{1}{4}) - (e - \frac{1}{4})} \cdot \frac{e - (e + \frac{1}{2})}{(e + \frac{1}{4}) - (e + \frac{1}{2})}$ $= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 = \frac{2}{3}$
3	$l_3 = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq 3}}^3 \frac{x - x_j}{x_3 - x_j} = \frac{e - (e - \frac{1}{2})}{(e + \frac{1}{2}) - (e - \frac{1}{2})} \cdot \frac{e - (e - \frac{1}{4})}{(e + \frac{1}{2}) - (e - \frac{1}{4})} \cdot \frac{e - (e + \frac{1}{4})}{(e + \frac{1}{2}) - (e + \frac{1}{4})}$ $= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot (-1) = -\frac{1}{6}$

$$\begin{aligned}
 P_3(x) &= \sum_{i=0}^3 (l_i(x) \cdot y_i) = 3.9203 \cdot \left(-\frac{1}{6}\right) + 5.9169 \cdot \frac{2}{3} + 11.3611 \cdot \frac{2}{3} + 14.8550 \cdot \left(-\frac{1}{6}\right) \\
 &= (-0.653383) + 3.9446 + 7.57407 + (-2.47583) = 8.38945
 \end{aligned}$$

NMIT2 Numerik 2	Serie 9	Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Autoren	Rémi Georgiou, André Stocker	
Datum	15. November 2015	

b) Analytische Berechnung des exakten Wertes:

$$\begin{aligned}
 I(e) &= 2 \int_1^e x \cdot \ln(x^2) dx = |x^2 \cdot (\ln(x^2) - 1)|_1^e \\
 &= (e^2 \cdot (\ln(e^2) - 1)) - (1^2 \cdot (\ln(1^2) - 1)) = (e^2 \cdot 1) - (1^2 \cdot (-1)) \\
 &= e^2 + 1 \approx 8.3890561
 \end{aligned}$$

absoluter Fehler: $|8.38945 - 8.38906| = 0.39 \cdot 10^{-3}$

relativer Fehler: $\frac{|8.38945 - 8.38906|}{8.38906} = 0.46 \cdot 10^{-4}$

c) Berechnung mittels Romberg-Extrapolation:

$Näherung_{Romberg} = 8.3890576$

absoluter Fehler: $|8.3890576 - 8.3890561| = 0.15 \cdot 10^{-5}$

relativer Fehler: $\frac{|8.3890576 - 8.3890561|}{8.3890561} = 0.18 \cdot 10^{-6}$

Die Romberg-Extrapolation schneidet in diesem Beispiel besser ab als die Lagrange-Interpolation.

Aufgabe 2

Höhe über Meer [m]	0	1250	2500	3750	5000	10000
Atmosphärendruck [hPa]	1013	NaN	747	NaN	540	226

1013,	0,	0,			0
	133 x				
747,	1013 - ----,	0,			0
	1250				
		2			
	207 x	59 x	591 x		
540,	954 - ----,	-----	-----	+ 1013,	0
	2500	12500000	5000		
		2			
	157 x	x	257 x	2962	
226,	854 - ----,	-----	-----	-----	+ 1013
	2500	375000	2500	3	
				3750000000000	
					2
					313 x
					3623 x

					30000

NMIT2 Numerik 2	Serie 9	Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Autoren	Rémi Georgiou, André Stocker	
Datum	15. November 2015	

Berechnung für $x = 1250$

x	y			
x_0	$y_0 = p_{00} = 1013$			
x_1	$y_1 = p_{10} = 747$	$p_{11} = 880$		
x_2	$y_2 = p_{20} = 540$	$p_{21} = 880.5$	$p_{22} = 872.625$	
x_3	$y_3 = p_{30} = 226$	$p_{31} = 775.5$	$p_{32} = 863$	$p_{33} = 871.421875$

Berechnung für $x = 3750$

x	y			
x_0	$y_0 = p_{00} = 1013$			
x_1	$y_1 = p_{10} = 747$	$p_{11} = 614$		
x_2	$y_2 = p_{20} = 540$	$p_{21} = 643.5$	$p_{22} = 636.125$	
x_3	$y_3 = p_{30} = 226$	$p_{31} = 618.5$	$p_{32} = 639.333$	$p_{33} = 637.328125$