

Image

量子统计力学笔记

作者：梁莫言

清华大学

时间：February 8, 2026

目录

第 1 章	量子多体问题和二次量子化	1
1.1	量子多体问题的表述	1
1.2	二次量子化和 Fock 空间	1
1.3	量子力学的密度矩阵表述	5
第 2 章	量子统计物理学的假设和基本原理	6
2.1	统计物理的对象与特点	6

第 1 章 量子多体问题和二次量子化

1

量子统计力学所研究的问题是大量服从 Schrodinger 方程的粒子的平衡态统计行为。对于经典粒子来说，在粒子数变多时，解出这些粒子所服从的 Hamilton 方程已经不可能，找出满足它们的初值条件的特解更是不可能。在量子的情形下，要考虑这些粒子的相互作用下再解出 Schrodinger 方程，为人来说已经不可能。但是，粒子的大量性可以使我们做出一些遍历性的假设，进而发现这些粒子所满足的统计规律，这些规律不依赖于所要求的 Schrodinger 方程的初值条件和通解。

2

3

4

5

6

7

1.1 量子多体问题的表述

8

一个量子多体问题本质上是一个 Schrodinger 方程的求解问题：

9

$$\frac{\partial}{\partial t}\Psi = \hat{H}(\hat{q}_1, \hat{p}_1, \dots, \hat{q}_n, \hat{p}_n)\Psi = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\hat{p}_i^2}{2m} + U(\hat{q}_i, t) \right) \Psi + V_{int}(\hat{q}_1, \dots, \hat{q}_n)\Psi. \quad (1.1)$$

10

在量子统计物理中，我们大多研究的是全同粒子的统计问题。因此，在 (1.1) 中首先有

11

$$m_i = m \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

12

其次，粒子间的相互作用项形如：

13

$$\hat{V}_{int} = \frac{1}{2!} \sum_{i \neq j} \hat{V}_2(\hat{q}_i, \hat{q}_j, t) + \frac{1}{3!} \sum_{i \neq j \neq k} \hat{V}_3(\hat{q}_i, \hat{q}_j, \hat{q}_k, t) + \dots$$

14

粒子的全同性首先表现在 Hamilton 量上：当对于上面写出的哈密顿量 H 实行变换

15

$$(\hat{q}_i, \hat{p}_i) \leftrightarrow (\hat{q}_j, \hat{p}_j)$$

16

时，哈密顿量的形式不变。这要求对于每一个相互作用势能项对于坐标 $\{\hat{q}_i\}$ 的置换保持不变——这是符合直觉的。于是，我们由于 Hamilton 量具有这样的对称性，自然想到波函数具有这样的对称性：也就是对于坐标与动量的对换 $(\hat{q}_i, \hat{p}_i) \leftrightarrow (\hat{q}_j, \hat{p}_j)$ ，在坐标表象下成立

17

18

19

$$\Psi(\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_i, \dots, \vec{q}_j, \dots, \vec{q}_n) = e^{i\alpha} \Psi(\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_j, \dots, \vec{q}_i, \dots, \vec{q}_n). \quad (1.2)$$

20

其中考虑到了波函数模方的不变性。这个式子的物理意义是：粒子的交换不带来物理态的改变，或全同粒子的分辨在物理上是不可能的。两种自然的情况是 $\alpha = 0$ 和 $\alpha = \pi$ ，在这些情况下粒子分别被称为满足 Bose 统计与 Fermi 统计。

21

22

23

1.2 二次量子化和 Fock 空间

24

我们只考虑一个粒子的情形，这时 Hamilton 量是：

25

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + U(\hat{q}, t)$$

26

我们由 Schrodinger 方程可以解出一组完备的解 $\{\psi_s(\vec{q})\}$, 其中 s 是某些量子数。这些波函数张成波函数 Hilbert 空间 $L^2(\mathbb{R})$ 的一组基底, 因此任何函数可用这一组本征函数展开。

于是我们现在可以构造多粒子波函数的空间, 它是 n 个单粒子波函数空间的直积空间。直觉上它的基底是形如

$$\psi_{s_1}(\vec{q}_1) \otimes \psi_{s_2}(\vec{q}_2) \otimes \cdots \otimes \psi_{s_n}(\vec{q}_n)$$

的向量。然而, 我们发现这样的选择不是物理的: 因为它们并不能反映出粒子的全同性。事实上, 服从 Fermi 统计的波函数与服从 Bose 统计的波函数构成这个直积空间的两个无穷维子空间 (这可以由 (1.2) 得到, 只需要注意到 (反) 对称波函数的线性组合还是 (反) 对称波函数), 这两个子空间被称为 Fock 空间。张成它们的基底才是我们关心的对象。

1.2.1 基向量的构造

我们现在实行一种 对称化 与 反对称化 操作, 这样它们便可以张成对应的子空间。利用置换, 我们可以写:

$$\Psi_B(s_1, s_2, \cdots, s_n) [\vec{q}_1, \cdots, \vec{q}_n] = N \sum_{\pi \in S_n} \bigotimes_{i=1}^n \psi_{s_{\pi(i)}}(\vec{q}_i) \quad (1.3)$$

以及

$$\Psi_F(s_1, s_2, \cdots, s_n) [\vec{q}_1, \cdots, \vec{q}_n] = N' \sum_{\pi \in S_n} (-1)^\pi \bigotimes_{i=1}^n \psi_{s_{\pi(i)}}(\vec{q}_i) \quad (1.4)$$

其中 $(-1)^\pi$ 是置换 π 的符号, N 和 N' 是归一化常数, 他们的值将在稍后确定。但是, 显而易见的是现在的波函数的确是 (反) 对称的。他们的正交性可以验证, 只需要注意到一次量子化的波函数具有的正交归一性。

对于 Bose 统计, 我们有:

$$\begin{aligned} \Psi_B(s_1, s_2, s_3, \cdots, s_n) \Psi_B(s'_1, s'_2, s'_3, \cdots, s'_n) &= NN' \sum_{\pi} \sum_{\pi'} \int \prod_{i=1}^n d^3 \vec{q}_i \psi_{s_{\pi(i)}}^*(\vec{q}_i) \psi_{s'_{\pi'(i)}}(\vec{q}_i) \\ &= NN' \sum_{\pi} \sum_{\pi'} \delta_{s_{\pi(i)} s'_{\pi'(i)}} \\ &= n! NN' \sum_{\pi} \delta_{s_{\pi(i)} i}. \end{aligned}$$

对于处于不同物理态的粒子, 我们看到上面的内积等于0。对于同一个态的内积, 我们注意到这些 s_i 可能是重复的, 所以做计算时应该注意。

$$N = \frac{1}{\sqrt{n! \prod_s n_s!}},$$

n_s 是 s 所标示的能级的占有数。

对于 Fermi 统计，我们同样可以做计算：

$$\begin{aligned}
 \Psi_F(s_1, s_2, s_3, \dots, s_n) \Psi_F(s'_1, s'_2, s'_3, \dots, s'_n) &= NN' \sum_{\pi} \sum_{\pi'} \int \prod_{i=1}^n d^3 \vec{q}_i \psi_{s_{\pi(i)}}^*(\vec{q}_i) \psi_{s_{\pi'(i')}}(\vec{q}_i) (-1)^{\pi} (-1)^{\pi'} \\
 &= NN' \sum_{\pi} \sum_{\pi'} \delta_{s_{\pi(i)} s_{\pi'(i')}} (-1)^{\pi} (-1)^{\pi'} \\
 &= n! NN' \sum_{\pi} \delta_{s_{\pi(i)} i'} (-1)^{\pi}.
 \end{aligned}$$

同样，对于处于不同物理态的粒子，我们看到上面的内积等于0。对于 Fermi 统计还需注意，每一个能级上至多只能占有一个粒子（如果不然，那么交换两个处于同一能级上的粒子将得到波函数为0）。因此：

$$N = \frac{1}{\sqrt{n!}},$$

因为 $n_s = 0$ 或 1 。

我们看到，这个表象下的基底自然变成了**占有数表象**，也就是说，我们可以将一个态写成一个列表 $[[n_s]]$ ， n_s 是能级 s 的占有数。对于 Fermi 统计，每个能级的占有数只能为 0 或 1；对于 Bose 统计则没有此限。

1.2.2 创造算符与湮灭算符

我们对于量子谐振子，我们构造了两个算符：**创造算符** 和 **湮灭算符**（统称为**升降算符**），他们将粒子数低的态映射至粒子数高的态。对于角动量理论，我们同样可以构造这样的算符。现在可以看到，在占有数表象下升降算符的引入不仅是必要的，而且是自然的。对于 Fermi 统计和 Bose 统计，升降算符的表现并不相同。

对于 n - 粒子态来说，我们定义算符 b_s^\dagger 和 b_s ，就像量子力学中那样，他们分别对应创造算符和湮灭算符。

$$\begin{aligned}
 b_{s_i}^\dagger \Psi &= \frac{1}{\sqrt{n+1}} \psi_{s_i} \otimes_{\pm} \Psi, \\
 b_{s_i} \Psi &= \frac{1}{\sqrt{n}} \psi_{s_i} \otimes_{+} \Psi,
 \end{aligned}$$

其中， \otimes_{+} 代表对称地插入， \otimes_{-} 代表对称地删除；换为减号的各个算符代表反对称的操作（对于第 i 个位置乘因子 $(-1)^{i-1}$ ）。

譬如，对于服从 Bose 统计的双态全同粒子来说，可以用态 $|m, n\rangle$ 来标记态，其中 m, n 是非负整数，分别象征低能级和高能级的占有数。现在对于态 $|1, 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1\psi_2 + \psi_2\psi_1)$ ，看对于低能态的创造算符与湮灭算符：

$$\begin{aligned}
 b_1^\dagger |1, 1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (b_1^\dagger \psi_1 \psi_2 + b_1^\dagger \psi_2 \psi_1) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} (\psi_1 \psi_1 \psi_2 + \psi_1 \psi_2 \psi_1 + \psi_2 \psi_1 \psi_1) \right) \\
 &= \sqrt{2} |2, 1\rangle,
 \end{aligned}$$

以及类似有

$$b_1^\dagger |1, 1\rangle = |0, 1\rangle.$$

一般的, 对于服从 Bose 统计的粒子或 Bose 子, 我们有

$$b_\alpha^\dagger |\cdots, n_\beta, n_\alpha, n_\gamma, \cdots\rangle = \sqrt{n_\alpha + 1} |\cdots, n_\beta, n_\alpha + 1, n_\gamma, \cdots\rangle, \quad (1.5)$$

$$b_\alpha |\cdots, n_\beta, n_\alpha, n_\gamma, \cdots\rangle = \sqrt{n_\alpha} |\cdots, n_\beta, n_\alpha - 1, n_\gamma, \cdots\rangle. \quad (1.6)$$

而对于 Fermi 子来说也有类似的公式, 只需要注意到 Fermi 子满足态的不相容性, 以及插入的反对称系数和可能带来的负号。例如, 对于服从 Fermi 统计的双态全同粒子来说, 可以用态 $|m, n\rangle$ 来标记态, 其中 m, n 是 0 或 1. 让我们同样看态 $|1, 1\rangle_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1\psi_2 - \psi_2\psi_1)$, 这里的 $-$ 标明的是态的反对称性。经过计算我们有

$$c_1^\dagger |1, 1\rangle = 0,$$

以及

$$c_1 |1, 1\rangle = -|1, 0\rangle.$$

对于 Fermi 子, 我们同样可以写出一般公式:

$$c_\alpha^\dagger |\cdots, n_\beta, n_\alpha, n_\gamma, \cdots\rangle = (-1)^{\sum_{\beta < \alpha} n_\beta} \sqrt{1 - n_\alpha} |\cdots, n_\beta, 1 + n_\alpha, n_\gamma, \cdots\rangle \quad (1.7)$$

与

$$c_\alpha |\cdots, n_\beta, n_\alpha, n_\gamma, \cdots\rangle = (-1)^{\sum_{\beta < \alpha} n_\beta} \sqrt{n_\alpha} |\cdots, n_\beta, 1 - n_\alpha, n_\gamma, \cdots\rangle. \quad (1.8)$$

但显然这个公式的系数是配凑得到的, 不是自然的。

1.2.3 正则对易关系与场算符

对于 Bose 子来说, 我们对于升降算符, 正如同量子力学中那样, 可以验证对易关系

$$[b_s, b_{s'}] = [b_s^\dagger, b_{s'}^\dagger] = 0, [b_s, b_{s'}^\dagger] = \delta_{ss'}. \quad (1.9)$$

对于 Fermi 子来说, 因为反对称性的要求, 我们要将对易关系换成反对易关系:

$$[c_s, c_{s'}]_- = [c_s^\dagger, c_{s'}^\dagger]_- = 0, [c_s, c_{s'}^\dagger]_- = \delta_{ss'}. \quad (1.10)$$

对于一个配备了升降算符的 Fock 空间 (Fermi 子或 Bose 子), 我们便可以定义场算符

$$\hat{\Psi}(\vec{q}) = \sum_s \psi_s(\vec{q}) a_s,$$

及

$$\hat{\Psi}^\dagger(\vec{q}) = \sum_s \psi_s^*(\vec{q}) a_s^\dagger.$$

粗略的来说, 这些场算符 (和它的 Hermite 共轭) 是在 \vec{q} 处湮灭 (对应地, 产生) 粒子的算符。

这些算符具有对易关系

$$[\hat{\Psi}(\vec{q}), \hat{\Psi}^\dagger(\vec{q})]_{\pm} = \delta^3(\vec{q} - \vec{q}).$$

这就是所谓二次量子化的波函数。我们看到，二次量子化的一般方法就是写出这样的场算符形式。在量子场论当中这种形式的出现是自然的。

作为示例，我们考虑 $U = 0$ 的情形，这时单粒子波函数（如用箱归一化）是形如

$$\psi_{\vec{p}}(\vec{q}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot \vec{q}\right)$$

的波函数，因此场算符具有形式：

$$\hat{\Psi}(\vec{q}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\vec{p}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot \vec{q}\right) a_{\vec{p}}.$$

1.3 量子力学的密度矩阵表述

为了描述统计理论所要求的按照不同概率出现的量子态，我们定义下述密度算符：

$$\hat{\rho} := \sum_{\text{可能的量子态 } \psi} p_{\psi} |\psi\rangle \langle \psi|. \quad (1.11)$$

其中， p_{ψ} 是态 ψ 在量子态空间中被找到的概率（严格定义将在下一章给出）。这样，我们能描述的态就不只局限于能用波函数表出，而是可以构造出一些混合在一起但不相干的态，我们将前者称作 **纯态**，而把后者称为 **混合态**。

若在加和中的每一态都是 Schrodinger 方程的解，也就是服从下述方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H} \psi,$$

那么我们可以计算

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{\rho} &= i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \sum_{\text{可能的量子态 } \psi} p_{\psi} |\psi\rangle \langle \psi| \\ &= i\hbar \sum_{\text{可能的量子态 } \psi} p_{\psi} \frac{\partial}{\partial t} (|\psi\rangle \langle \psi|) \\ &= \sum_{\text{可能的量子态 } \psi} p_{\psi} \left(\hat{H} |\psi\rangle \langle \psi| - |\psi\rangle \langle \psi| \hat{H} \right) \\ &= \hat{H} \hat{\rho} - \hat{\rho} \hat{H}. \end{aligned}$$

这就是 Liouville 定理，它给出了密度矩阵的运动方程：

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{\rho} = [\hat{H}, \hat{\rho}]} \quad (1.12)$$

于是，只要密度算符不显性含时间，那么它就是运动积分。注意，只要这些态是 Schrodinger 方程的本征态，那么密度矩阵就满足这个方程。我们看到，平衡态统计物理所研究的是平衡态的情形，于是密度算符对于时间的偏导必为 0，因而它是一个运动积分。

第 2 章 量子统计物理学的假设和基本原理

2.1 统计物理的对象与特点

统计物理按照第一章序言所说，是大量服从 Schrodinger 方程的粒子的平衡态统计行为。注意此处的统计不是对于每一个粒子求统计平均，而是对于大量服从同样的 Schrodinger 方程的系统求统计平均。因此很必要先对这个概念进行厘清。

2.1.1 宏观物体和量子系综