

Einführung in die Neuroinformatik

Tim Luchterhand, Paul Nykiel (Gruppe P)

31. Mai 2018

1 Cross Entropy

1. @TODO
2. War nur ne Leseaufgabe
3. (a)

$$\begin{aligned}H_A(B) &= \sum_x B(x) \cdot \log_2 \left(\frac{1}{A(x)} \right) \\&= \frac{1}{2} \log_2(8) + \frac{1}{4} \log_2(2) + \frac{1}{8} \log_2(4) + \frac{1}{8} \log_2(8) \\&= \frac{19}{8}\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}H_B(A) &= \sum_x A(x) \cdot \log_2 \left(\frac{1}{B(x)} \right) \\&= \frac{1}{8} \log_2(2) + \frac{1}{2} \log_2(4) + \frac{1}{4} \log_2(8) + \frac{1}{8} \log_2(8) \\&= \frac{9}{4}\end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned}H_B(B) &= \sum_x B(x) \cdot \log_2 \left(\frac{1}{B(x)} \right) \\&= \frac{1}{2} \log_2(2) + \frac{1}{4} \log_2(4) + 2 \cdot \frac{1}{8} \log_2(8) \\&= \frac{7}{4}\end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned}D_A(B) &= H_A(B) - H(B) = \frac{19}{8} - \frac{7}{4} = \frac{5}{4} \\D_B(B) &= H_B(B) - H(B) = H(b) - H(B) = 0 \\D_B(A) &= H_B(A) - H(A) = \frac{9}{4} - \frac{7}{4} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

4. Es gilt:

$$D_Q(P) = H_Q(P) - H(P) \geq H(P) - H(P) = 0 \quad \forall P, Q \in X$$

denn $H_Q(P) \geq H(P)$ und $H(P) < 0 \quad \forall P$

Außerdem gilt:

$$D_Q(Q) = H_Q(Q) - H(Q) = H(Q) - H(Q) = 0 \quad \forall Q \in X$$

5. (a) Das Minimum muss auftreten, wenn $C = B$

$$\Rightarrow t \cdot \frac{3}{4} \stackrel{!}{=} \frac{1}{2} \Rightarrow t = \frac{2}{3}$$

(b) Hier könnte Ihr Matlabcode stehen

2 Cross Entropy als Kostenfunktion

1. (a)

$$y_i > 0 \quad \forall i, \text{ da } e^{c \cdot u_i} > 0 \quad \forall c, u_i \in \mathbb{R}$$

und

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n y_i &= \sum_{i=1}^n \left(e^{c \cdot u_i} \cdot \frac{1}{\sum_{j=1}^n e^{c \cdot u_j}} \right) \\&= \frac{\sum_{i=1}^n e^{c \cdot u_i}}{\sum_{j=1}^n e^{c \cdot u_j}} = 1\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}y_1 &= \frac{e^{c \cdot u_1}}{e^{c \cdot u_1} + e^{c \cdot u_2} + e^{c \cdot u_3}} \\&= \frac{e^{-c \cdot u_1}}{e^{-c \cdot u_1}} \cdot \frac{e^{c \cdot u_1}}{e^{c \cdot u_1} + e^{c \cdot u_2} + e^{c \cdot u_3}} \\&= \frac{1}{1 + e^{c \cdot (u_2 - u_1)} + e^{c \cdot (u_3 - u_1)}}\end{aligned}$$

(c) Fall $u_1 > u_2 > u_3$:

$$\lim_{c \rightarrow \infty} y_1 = 1$$

Fall $u_2 > u_1 > u_3$:

$$\lim_{c \rightarrow \infty} y_1 = 0$$

Fall $u_2 > u_3 > u_1$:

$$\lim_{c \rightarrow \infty} y_1 = 0$$

(d) Für $c \rightarrow \infty$ konvergiert die Netzwerkausgabe gegen einen der Trainingsvektoren. D.h. $y_i = 0 \ \forall i \neq k \wedge y_k = 1$

(e) Fall $c > 0$:

Alle y_i werden gegenüber dem y_k , für welches $u_k > u_i \ \forall i \neq k$ gilt, gedämpft.

Fall $c < 0$:

Alle y_i werden gegenüber dem y_k , für welches $u_k < u_i \ \forall i \neq k$ gilt, gedämpft.

Fall $c = 0$:

Alle y_i haben den gleich Wert $y_i = \frac{1}{n}$

2.

$$E = -t_1 \log(y_1(u_1(w_1), u_2(w_2))) - t_2 \log(y_2(u_1(w_1), u_2(w_2)))$$

(a)

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial y_1} &= -t_1 \cdot \frac{1}{y_1} \\ \frac{\partial E}{\partial y_2} &= -t_2 \cdot \frac{1}{y_2} \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} \frac{\partial y_1}{\partial u_2} &= \frac{\partial}{\partial u_2} \left(\frac{e^{u_1}}{e^{u_1} + e^{u_2}} \right) = e^{u_1} \left(-\frac{e^{u_2}}{(e^{u_1} + e^{u_2})^2} \right) \\ &= -\frac{e^{u_1}}{e^{u_1} + e^{u_2}} \cdot \frac{e^{u_2}}{e^{u_1} + e^{u_2}} \\ &= -y_1 \cdot y_2 \\ \frac{\partial y_2}{\partial u_2} &= y_2 + e^{u_2} \cdot \left(-\frac{e^{u_2}}{(e^{u_1} + e^{u_2})^2} \right) \\ &= y_2 + \frac{e^{u_2}}{e^{u_1} + e^{u_2}} \cdot \left(-\frac{e^{u_2}}{e^{u_1} + e^{u_2}} \right) \\ &= y_2 + y_2(-y_2) = y_2(1 - y_2) \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned}u_2 &= w_2 x + b \\ \Rightarrow \frac{\partial u_2}{\partial w_2} &= x\end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned}\frac{\partial E}{\partial w_2} &= \frac{\partial E}{\partial y_1} \frac{\partial y_1}{\partial u_2} \frac{\partial u_2}{\partial w_2} + \frac{\partial E}{\partial y_2} \frac{\partial y_2}{\partial u_2} \frac{\partial u_2}{\partial w_2} \\ &= \frac{-t_1}{y_1} \cdot (-y_1 y_2) \cdot x + \frac{-t_2}{y_2} \cdot y_2 (1 - y_2) x \\ &= x \cdot (t_1 y_2 - t_2 (1 - y_2)) \\ &= x \cdot (y_2 \cdot (t_1 + t_2) - t_2) = x \cdot (y_2 - t_2)\end{aligned}$$

(e) @TODO