

Zusammenfassung Höhere Mathematik

Paul Nykiel

8. Dezember 2017

Schlagzahl erhöhen.

Inhaltsverzeichnis

I	HM 1 — Zusammenfassung	14
1	Vorkurs	15
1.1	Aussagenlogik	15
1.1.1	Definition Aussage	15
1.1.2	Verknüpfungen	15
1.1.3	Mehr zu Implikationen	16
1.1.4	Bezeichnung von Aussagen	16
1.1.5	Satz der Identität	16
1.2	Mengen	17
1.2.1	Defintion: Mengen nach Cantor	17
1.2.2	Begrifflichkeiten und Schreibweise	17
1.2.3	Leere Menge, Teilmengen	17
1.2.4	Transitivität u.a.	17
1.2.5	Verknüpfung von Mengen	18
1.2.6	Potenzmenge	18
1.2.7	Rechenregeln für Mengen	18
1.2.8	Komplement	19
1.2.9	Bemerkung	19
1.2.10	Verknüpfungen über mehrere Elemente	19
1.2.11	Wichtige Zusammenhänge	19
1.3	Vollständige Induktion	19
1.3.1	Summen und Produktzeichen	19
1.3.2	Prinzip der Vollständigen Induktion	20
1.3.3	Rechenregeln für Summen	20
1.3.4	Doppelsummen	21
1.3.5	Fakultät und Binomialkoeffizient	21
1.3.6	Rechenregeln für den Binomialkoeffizienten	21
1.3.7	Binomischer Lehrsatz	21
1.3.8	Definition Betrag	21
1.3.9	Dreiecksungleichung	22
1.4	Funktion und Differentiation	22
1.4.1	Injektivität, Surjektivität, Bijektivität	22
1.4.2	Verknüpfung von Funktionen	23
1.4.3	Verkettung von Funktionen	23

1.4.4	Stetigkeit und Differenzierbarkeit	23
1.4.5	Zusammenhang Differenzierbarkeit — Stetigkeit	23
1.4.6	Verkettung differenzierbarer Funktionen	24
1.4.7	Differentiation von Monomen	24
1.4.8	Kettenregel	24
1.4.9	Ableitung der Umkehrfunktion	24
1.5	Elementare Funktionen	24
1.6	Integralrechnung	24
1.7	Komplexe Zahlen	24
1.8	Elementare Differentialgleichungen	24
1.8.1	Definition Rechteck	24
1.8.2	Lineare DGL 1. Ordnung	25
2	Grenzwerte	26
2.1	Gruppen und Körper	26
2.1.1	Gruppen	26
2.1.2	Körper	26
2.1.3	Angeordnete Körper	27
2.1.4	Minimum und Maximum	28
2.1.5	Obere und untere Schranke	29
2.1.6	Supremum und Infimum	29
2.2	Folgen	29
2.2.1	Konvergenz	29
2.2.2	Bestimmte Divergenz	30
2.2.3	Beschränktheit	30
2.2.4	Zusammenhang Konvergenz — Beschränktheit	30
2.2.5	Grenzwertrechenregeln	30
2.2.6	Sandwich Theorem u.a.	31
2.2.7	Monotonie	31
2.2.8	Zusammenhang Monotonie und Beschränktheit	31
2.3	Häufungswerte	31
2.3.1	Teilfolgen	31
2.3.2	Teilfolgen einer Konvergenten Folge	31
2.3.3	Häufungswerte	31
2.3.4	Limes superior/inferior	32
2.3.5	Charakterisierung limsup/liminf	32
2.3.6	Konvergenz und limsup/liminf	32
2.3.7	Satz von Bolzano-Weierstraß	32
2.3.8	Cauchy-Kriterium	32
2.4	Unendliche Reihen	33
2.4.1	Definition	33
2.4.2	Cauchy-Kriterium für unendliche Reihen	33
2.4.3	Grenzwertrechenregeln für unendliche Reihen	33
2.4.4	Positive Folgen	34
2.4.5	Leibniz-Kriterium	34
2.4.6	Absolute Konvergenz	34

2.4.7	Majorantenkriterium	34
2.4.8	Minorantenkriterium	35
2.4.9	Wurzel- und Quotientenkriterium	35
2.4.10	Umordnung einer Reihe	35
2.4.11	Cauchy-Produkt	36
2.4.12	Cauchy-Verdichtungssatz	36
2.5	Potenzreihen	36
2.5.1	Definition	36
2.5.2	Hadamard (Konvergenzradius mit Wurzelkriterium) . . .	36
2.5.3	Konvergenzradius mit Quotientenkriterium	37
2.5.4	Hinweis	37
2.5.5	Integration und Differentiation von Potenzreihen	37
2.5.6	Cauchy-Produkt für Potenzreihen	37
2.5.7	Wichtige Potenzreihen	37
2.5.8	Alternative Definition der Exponentialfunktion	38
2.6	Funktionsgrenzwerte	38
2.6.1	Bemerkung	38
2.6.2	Epsilon-Umgebung	38
2.6.3	Funktionsgrenzwerte (über Delta-Epsilon-Kriterium) . . .	38
2.6.4	Folgenkriterium	39
2.6.5	Rechenregeln für Funktionsgrenzwerte	39
2.6.6	Cauchy-Kriterium für Funktionsgrenzwerte	40
2.6.7	Bestimmte Divergenz	40
2.6.8	Monotone Funktionen	40
2.6.9	Grenzwerte an Intervallgrenzen	40
2.7	Stetigkeit	41
2.7.1	Anschaulich	41
2.7.2	Stetigkeit: Delta-Epsilon-Kriterium	41
2.7.3	Bemerkungen	41
2.7.4	Rechenregeln für Stetigkeit	41
2.7.5	Stetigkeit von Potenzreihen	41
2.7.6	Umgebung positiver Funktionswerte	42
2.7.7	Zwischenwertsatz	42
2.7.8	Existenz des Logarithmus	42
2.7.9	Maximum/Minimum/Infimum/Supremum einer Funktion	42
2.7.10	Beschränktheit einer stetigen Funktion	43
2.7.11	Weierstraß: Existenz von Min und Max	43
2.7.12	Zusammenhang Injektivität — Stetigkeit	43
2.7.13	Existenz und Monotonie der Umkehrfunktion	43
2.7.14	Gleichmäßige Stetigkeit	43
3	Differentialrechnung	44
3.1	Ableitung	44
3.1.1	Definition Differenzen-Quotient	44
3.1.2	Rechtsseitige und linksseitige Ableitung	44
3.1.3	Ableitungsrechenregeln	44

3.1.4	Alternative Definition der Ableitung	45
3.1.5	Zusammenhang Differentierbarkeit — Stetigkeit	45
3.1.6	Differentiation von Potenzreihen	45
3.1.7	Ableitung der Umkehrfunktion	45
3.1.8	Kettenregel	45
3.2	Mittelwertsätze	45
3.2.1	Satz von Rolle	45
3.2.2	Definition lokaler Extrempunkt	46
3.2.3	Notwendige Bedingung für lokale Extrema	46
3.2.4	2. Mittelwertsatz	46
3.2.5	1. Mittelwertsatz (Folgerung aus 2. Mittelwertsatz)	46
3.2.6	L'Hospital	46
3.2.7	Satz von Taylor	47

II HM 2 — Zusammenfassung 48

4 Integration 49

4.1	Integration	49
4.1.1	Definition Zerlegung, Zwischenwerte	49
4.1.2	Definition Riemannsumme	49
4.1.3	Definition Riemann-Integral	50
4.1.4	Menge der Riemann-Integrierbaren Funktionen	51
4.1.5	Kriterien für Riemann-Integrierbarkeit	51
4.1.6	Endliche Änderung von Funktionen	52
4.1.7	Zusammenhang Stetigkeit und Integrierbarkeit	52
4.1.8	Stückweise Integration	52
4.1.9	1. Mittelwertsatz der Integralrechnung	52
4.1.10	Existenz der Stammfunktion	53
4.1.11	Definition Stammfunktion	53
4.1.12	Eindeutigkeit der Stammfunktion	53
4.1.13	Hauptsatz der Differential und Integralrechnung	53
4.1.14	Zusammenhang Monotonie und Riemann-Integrierbarkeit	53
4.1.15	Zweiter Mittelwertsatz der Integralrechnung	53
4.2	Uneigentliche Integrale	54
4.2.1	Definition uneigentliches Integral	54
4.2.2	Cauchy-Kriterium	54
4.2.3	Majorantenkriterium	55
4.2.4	Absolute Konvergenz	55
4.2.5	Minorantenkriterium	55
4.2.6	Integralkriterium für Reihen	55

5	Gleichmäßige Konvergenz	56
5.1	Gleichmäßige Konvergenz	56
5.1.1	Definition Funktionenfolge und Funktionenreihe	56
5.1.2	Gleichmäßige Konvergenz	56
5.1.3	Stetigkeit der Grenzfunktion	57
5.1.4	Integration der Grenzfunktion	57
5.1.5	Cauchy Kriterium für gleichmäßige Konvergenz	57
5.1.6	Differentiation der Grenzfunktion	57
5.1.7	Majorantenkriterium auf Potenzreihen anwenden	58
5.1.8	Majorantenkriterium für Funktionenreihen	58
6	Differentialrechnung mit mehreren Variablen	59
6.1	Der n-dimensionale Euklidische Raum	59
6.1.1	Definitionen	59
6.1.2	Folgerungen	59
6.1.3	Konventionen	60
6.1.4	Definition Epsilon-Umgebung	60
6.1.5	Definition Topologische Begriffe	60
6.1.6	Definition offene und abgeschlossene Menge	61
6.2	Folgen	62
6.2.1	Definition	62
6.2.2	Bolzano-Weierstraß	62
6.2.3	Grenzwertrechenregeln	62
6.2.4	Weitere Bemerkungen	63
6.3	Funktionsgrenzwerte und Stetigkeit	63
6.3.1	Definition Funktion	63
6.3.2	Definition Funktionsgrenzwert	63
6.3.3	Definitionen aus HM 1 im Mehrdimensionalen	63
6.3.4	Definition Stetigkeit	64
6.3.5	Grenzwerte von verketteten Funktionen	64
6.3.6	Grenzwertrechenregeln	64
6.3.7	Maximum und Minimum Kompakter Mengen	65
6.3.8	Weierstraß	65
6.4	Partielle Ableitungen und Richtungsableitungen	65
6.4.1	Definition partielle Ableitung	65
6.4.2	Definition Umgebung eines Punktes	66
6.4.3	Definition Richtungsableitung	66
6.5	Die totale Ableitung	66
6.5.1	Definition totale Ableitung	66
6.5.2	Zusammenhang Stetigkeit und Differenzierbarkeit	67
6.5.3	Zusammenhang partielle und totale Diffbarkeit	67
6.5.4	Kettenregel	68
6.5.5	Matrix-Produkt	68
6.6	Extremwerte, Mittelwertsatz	68
6.6.1	Definition lokales Extrema	68
6.6.2	Notwendige Bedingung für lokale Extrema	68

6.6.3	Mittelwertsatz	69
6.6.4	Gebiete bzw. kurvenweise zusammenhängende Gebiete . .	69
6.6.5	Partielle Ableitung r-ter Ordnung	69
6.6.6	Hessematrix	70
6.6.7	Definitheit	70
6.6.8	Satz von Schwarz	70
6.6.9	Satz von Taylor	71
6.6.10	Hinreichende Bedingung für lokale Extrema	71
6.7	Implizit definierte Funktionen	71
6.7.1	Bemerkung	71
6.7.2	Vorläufige Definition Rang einer Matrix	71
6.7.3	Einheitsmatrix und Inverse einer Matrix	71
6.7.4	Zusammenhang Bijektivität und reguläre Matrizen	72
6.7.5	Satz über die Umkehrfunktion	72
6.7.6	Satz über die Gebietstreue	72
6.7.7	Definition Auflösbarkeit	72
6.7.8	Hauptsatz über implizite Funktionen	73
6.7.9	Extrema unter Nebenbedingungen	73
6.7.10	Definition lokale Minima/Maxima unter Nebenbedingungen	74
6.7.11	Definition Linear Unabhängig	74
6.7.12	Satz von Lagrange	75
6.7.13	Lagrange Funktion	75
7	Integration in mehreren Veränderlichen	76
7.1	Parameterintegrale	76
7.1.1	Eigentliche Parameterintegrale	76
7.1.2	Leibniz Regel	76
7.1.3	Uneigentliche Parameterintegrale	77
7.1.4	Majorantenkriterium	77
7.1.5	Fubini für uneigentliche Parameterintegrale	77
7.1.6	Konvergenzkriterien	77
7.2	Kurvenintegrale	78
7.2.1	Äquivalenz für Kurven	78
7.2.2	Kurven im \mathbb{R}^n	78
7.2.3	Eigenschaften von Parameterdarstellungen	79
7.2.4	Weitere Definitionen zu Kurven	80
7.2.5	Kurvenintegrale 2. Art	80
7.2.6	Substitutionsregel	81
7.2.7	Definition Wegunabhängigkeit	81
7.2.8	1. Hauptsatz für Kurvenintegral	82
7.2.9	Äquivalente Aussagen zu Stammfunktionen	82
7.2.10	Definition einfach zusammenhängende Gebiete	82
7.2.11	Sternförmige Gebiete	82
7.2.12	2. Hauptsatz für Kurvenintegrale	83
7.2.13	Definition Rotation	83
7.2.14	Zusammenhang Rotation und Integrabilitätsbedingung . .	83

7.2.15	Definition Linienintegral/Kurvenintegral 1. Art	84
7.3	Bereichsintegrale	85
7.3.1	Intervalle im \mathbb{R}^n	85
7.3.2	Definition Zerlegung	85
7.3.3	Definition Riemann-Summe	86
7.3.4	Riemann integrierbare Bereichsintegrale	86
7.3.5	Bereichsintegrale über beschränkte Mengen	86
7.3.6	Cavalieri	87
7.3.7	Fubini	87
7.3.8	Definition Meßbare-Mengen	87
7.3.9	Definition 2×2 Determinante	87
7.3.10	Mehrdimensionale Substitutionsregel	88
7.4	Integralsätze in der Ebene	88
7.4.1	Positiv berandete Menge	88
7.4.2	Satz von Green	88
7.4.3	Definition Normalbereiche	88
7.4.4	Gauß'sche Integralsätze in der Ebene	88
7.5	Oberflächenintegrale und Integralsätze im \mathbb{R}^3	89
7.5.1	Definition Reguläre Flächen	89
7.5.2	Defintion Oberflächenintegral	89
7.5.3	Satz von Stokes	90
7.5.4	Divergenzsatz von Gauß	90
8	Lineare Algebra	91
8.1	Der Begriff Vektorraum	91
8.1.1	Definition Vektorraum	91
8.1.2	Rechenregeln	91
8.2	Unterräume	92
8.2.1	Definition Unterraum	92
8.2.2	Unterraumkriterien	92
8.2.3	Durchschnitt von Unterräumen	92
8.2.4	Definition lineare Hülle	92
8.2.5	Definition Linearkombination	93
8.2.6	Zusammenhang lineare Hülle — Linearkombination	93
8.3	Lineare Unabhängigkeit	93
8.3.1	Definition Lineare Unabhängigkeit	93
8.3.2	Rechenregeln für lineare Unabhängigkeit	93
8.4	Basis und Dimension	94
8.4.1	Definition Hamel-Basis	94
8.4.2	Äquivalente Aussagen zu Basen	95
8.4.3	Existenz einer Basis	95
8.4.4	Eigenschaften der Basis	95
8.4.5	Definition Dimension	95
8.4.6	Beziehung von Dimensionen	96
8.4.7	Lineare unabängigkeit im n -Dimensionalen	96
8.5	Lineare Gleichungssysteme	96

8.5.1	Definition lineares Gleichungssystem	96
8.5.2	Zusammenhang Kern und Lösung eines LGS	97
8.5.3	Definition Affiner Unterraum, lineare Mannigfaltigkeit	97
8.5.4	Definition Zeilen-/Spaltenrang	97
8.5.5	Elementare Zeilen-/Stufenoperationen	97
8.5.6	Beziehung Spalten-/Zeilenrang	99
8.5.7	Definition Rang einer Matrix	99
8.5.8	Gauß-Algorithmus	99
8.5.9	Lösbarkeit eines LGS	99
8.5.10	Lösung eines LGS	99
III HM 3 — Zusammenfassung		100
9	Exkurs Funktionanalysis	101
9.1	Normen und innere Produkte	101
9.1.1	Definition Vektornorm	101
9.1.2	Skalarprodukt / inneres Produkt	102
9.1.3	Definition induzierte Norm	102
9.1.4	Äquivalente Aussagen zu induzierten Normen	103
9.1.5	Rechenregeln für Skalarprodukte	103
9.1.6	Cauchy-Schwarz'sche-Ungleichung	103
9.2	Orthogonalität	103
9.2.1	Orthogonalität	103
9.2.2	Orthogonalität und lineare Abhängigkeit	104
9.2.3	Gram-Schmidt (Orthogonalisierung von Vektoren)	104
9.2.4	Orthogonale Projektion	104
10	Gewöhnliche Differentialgleichungen	105
10.1	Einführung	105
10.1.1	Explizite DGL 1. Ordnung	105
10.1.2	Implizite DGL 1. Ordnung	105
10.1.3	DGL-System 1. Ordnung	106
10.1.4	Umschreiben von DGLen	107
10.2	Existenz- und Eindeutigkeitsaussagen	107
10.2.1	Voltera'sche Integralgleichung	107
10.2.2	Bemerkung: Newton-Verfahren zur Bestimmung von Nullstellen	108
10.2.3	Picard-Iterator	108
10.2.4	Definition Lipschitz-Bedingung	108
10.2.5	Partielle Ableitung und Lipschitz-Bedingung	109
10.2.6	Picard-Lindelöf (Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung)	109
10.2.7	Peano (Existenz einer Lösung)	109
10.2.8	Gronwallsche Ungleichung	109
10.2.9	Banach'scher Fixpunktsatz	110
10.2.10	Norm Äquivalenz im \mathbb{R}^n	110

10.2.11 Stabilität	110
11 DGL-Systeme und DGLen n-ter Ordnung	111
11.1 Systeme von DGLen 1. Ordnung	111
11.1.1 Definition DGL-System	111
11.1.2 Schreibweise	112
11.1.3 Voltera'sche Integralgleichung	112
11.1.4 Definition Lipschitz-Bedingung	113
11.1.5 Bemerkung	113
11.1.6 Satz von Picard-Lindelöf	113
11.1.7 Satz von Peano	113
11.1.8 Stabilität	113
11.2 Lineare DGL-Systeme 1. Ordnung	113
11.2.1 Definition	113
11.2.2 Definition Frobenius-Norm	114
11.2.3 Matrixnorm und Vektornorm	114
11.2.4 Grenznorm	114
11.2.5 Lösungsmengen von linearen Gleichungssystemen	115
11.2.6 Definition Fundamentalsystem	115
11.2.7 Definition Determinante	115
11.2.8 Entwicklungssatz von Laplace	115
11.2.9 Leibniz-Formel für Determinanten	116
11.2.10 Berechnung der Wronski-Determinante ohne bekanntes FS	116
11.2.11 Ableitung der Determinante	117
11.2.12 Äquivalente Aussagen zu FSen und Wronski-Determinanten	117
11.2.13 Partikuläre Lösung aus Wronski-Determinante	117
 IV Beweisansätze	 118
 12 HM 1	 119
12.1 Grenzwerte	119
12.1.1 Eindeutigkeit des Grenzwert einer Folge	119
12.1.2 Konvergente Folgen sind beschränkt	119
12.1.3 Grenzwertrechenregeln	119
12.1.4 Monotoniekriterium	119
12.1.5 Grenzwert einer konv. Folge = Grenzwert jeder Teilfolge	119
12.1.6 Charakterisierung $\overline{\lim}$ und $\underline{\lim}$	119
12.1.7 Folge konv. $\overline{\lim} = \underline{\lim}$	119
12.1.8 Bolzano-Weierstraß	120
12.1.9 Cauchy Kriterium	120
12.1.10 Reihe konv. Folge ist Nullfolge	120
12.1.11 Grenzwert RR für Reihen	120
12.1.12 Reihe konv g. 0	120
12.1.13 Leibniz	120
12.1.14 Absolut konv. \Rightarrow konv.	120

12.1.15	Majorantenkriterium	120
12.1.16	Minorantenkriterium	120
12.1.17	Wurzelkriterium	120
12.1.18	Quotientenkriterium	120
12.1.19	Hadamard	121
12.1.20	Differenzieren / Integrieren von Potenzreihen	121
12.1.21	Lemma zu \sin , \cos und \exp	121
12.1.22	$e^z \neq 0$ und $e^{-z} = \frac{1}{e^z}$	121
12.1.23	Pythagoras	121
12.1.24	$e^x > 0 \forall x \in \mathbb{R}$	121
12.1.25	$1 + x \leq e^x \forall x \in \mathbb{R}$	121
12.1.26	$x < y \Rightarrow e^x < e^y$	121
12.1.27	Folgenkriterium	121
12.1.28	Cauchy für Funktionen	121
12.1.29	Grenzwerte an Intervallgrenzen	121
12.1.30	Verknüpfungen stetiger Funktionen stetig	121
12.1.31	Potenzreihen sind innerhalb des Konvergenzradius stetig	122
12.1.32	Umgebung pos. Funktionswerte	122
12.1.33	Zwischenwertsatz	122
12.1.34	Existenz \log	122
12.1.35	Beschränktheit stetiger Funktionen	122
12.1.36	Weierstraß existenz \min bzw. \max	122
13	HM 2	123
13.1	Integration	123
13.1.1	Riemann integrierbar impliziert Beschränktheit	123
13.1.2	Rechenregeln für Integrale (Verkettung usw.)	123
13.1.3	Transitivität	123
13.1.4	1. MWS der Integralrechnung	123
13.1.5	Eine Stammfunktion einer Funktion ist stetig und differenzierbar	123
13.1.6	Hauptsatz der DI	124
13.1.7	Monotonie impliziert Riemann Integrierbarkeit	124
13.1.8	2. MWS der Integralrechnung	124
13.1.9	Integralkriterium	124
13.2	Gleichmäßige Konvergenz	124
13.2.1	Stetigkeit der Grenzfunktion	124
13.3	Differentialrechnung mit mehreren Veränderlichen	124
13.3.1	Grenzwertrechenregeln	124
13.3.2	Max/Min kompakter Mengen	124
13.3.3	Stetigkeit einer Funktion durch beschränkte partielle Ableitungen	125
13.3.4	Differentierbarkeit impliziert Stetigkeit	125
13.3.5	Zusammenhang totale und partielle Diff'barkeit	125
13.3.6	Kettenregel	125
13.3.7	Notwendige Bedingung für Extrema	125

13.3.8	Mittelwertsatz	125
13.3.9	Konstante Funktionen	126
13.3.10	Taylor	126
13.3.11	Hinreichende Bedingung für Extrema	126
13.3.12	Beweisidee für den Hauptsatz über implizite Funktionen .	126
13.3.13	Herleitung für die Ableitung der Auflösung	126
13.3.14	Satz von Lagrange	126
13.4	Integration in mehreren Veränderlichen	126
13.4.1	Ableitung in Integral ziehen	126
13.4.2	Fubini	127
13.4.3	Leibniz Regel	127
13.4.4	Beweis-Idee Kurvenintegrale (Substitutionsregel)	127
13.4.5	1. Hauptsatz für Kurvenintegrale	127
13.4.6	Äquivalente Aussagen für Kurvenintegrale	127
13.4.7	2. Hauptsatz für Kurvenintegrale	127
13.4.8	Gauß'sche Integralsätze in der Ebene	128

V Klausurvorbereitung 129

14 HM1 131

15 HM2 132

15.1	Integration	132
15.1.1	Wichtige Beweise	132
15.1.2	Typische Aufgaben	132
15.1.3	Trickreiche Aufgaben	132
15.1.4	Weitere hilfreiche Dinge	133
15.2	Gleichmäßige Konvergenz	133
15.2.1	Wichtige Beweise	133
15.2.2	Typische Aufgaben	133
15.2.3	Trickreiche Aufgaben	133
15.3	Differentialrechnung mit mehreren Veränderlichen	133
15.3.1	Wichtige Beweise	133
15.3.2	Typische Aufgaben	134
15.4	Integration in mehreren Veränderlichen	134
15.4.1	Wichtige Beweise	134
15.4.2	Typische Aufgaben	134
15.4.3	Trickreiche Aufgaben	135
15.5	Lineare Algebra	135
15.5.1	Typische Aufgaben	135

VI	Appendix	136
16	Grenzwerte	137
16.1	Konvergenzkriterien	137
17	Integration	138
17.1	Riemann-Integrierbarkeit	138
18	Integration in mehreren Veränderlichen	139
18.1	Häufige Additionstheoreme	139
18.2	Integral-Shortcuts	140

Teil I

HM 1 — Zusammenfassung

Kapitel 1

Vorkurs

1.1 Aussagenlogik

1.1.1 Definition Aussage

Eine Aussage ist ein Satz, der entweder wahr oder falsch ist.

Bemerkung

Wir beschäftigen uns mit der klassischen zweiwertigen Logik. Es gibt auch Logiken mit 3 bzw. 4 Werten.

1.1.2 Verknüpfungen

Formal kann eine Oder-Verknüpfung mit dem \vee -Zeichen durch eine Wahrheitstabelle definiert werden:

A	B	$A \vee B$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Analog kann eine Und-Verknüpfung mit dem \wedge -Zeichen durch eine Wahrheitstabelle definiert werden:

A	B	$A \wedge B$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

Und eine Negation wird definiert durch:

A	$\neg A$
1	0
0	1

Eine sog. Implikation wird durch das \Rightarrow -Zeichen dargestellt und ist definiert durch:

A	B	$A \Rightarrow B$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

Bemerkung

Bei mehr als einer Verknüpfung muss klar sein welche Verknüpfung als erstes ausgewertet werden muss, hierfür werden Klammern verwendet.

1.1.3 Mehr zu Implikationen

Bei der Aussage $A \Rightarrow B$ bezeichnet man A als hinreichende Bedingung und B als notwendige Bedingung.

Die Aussage $A \Rightarrow B$ ist äquivalent zu $\neg B \Rightarrow \neg A$.

1.1.4 Bezeichnung von Aussagen

Eine Aussageform heißt:

- (a) Allgemeingültig (oder Tautologie), wenn sie als Wahrheitswert stets den Wert wahr annimmt.
- (b) Erfüllbar, wenn die Wahrheitstabelle mindestens einmal den Wert wahr enthält.
- (c) Unerfüllbar (oder Kontradiction), wenn die Wahrheitstabelle nur falsch-Einträge enthält.

1.1.5 Satz der Identität

Mit $A \Leftrightarrow B$ kürzen wir die Aussage:

$$(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$$

ab.

Bemerkung

Für den allg. Fall sagt man zu $A \Leftrightarrow B$: A ist äquivalent zu B . Das heißt aber nicht, dass $A = B$ ist.

1.2 Mengen

1.2.1 Definition: Mengen nach Cantor

Unter einer Menge versteht man eine Zusammenfassung bestimmter wohlunterscheidbarer Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen.

1.2.2 Begrifflichkeiten und Schreibweise

Objekte einer Menge bezeichnet man als Elemente einer Menge.

Schreibweise:

- (a) $x \in M$ oder $x \notin M$
- (b) Mengen können durch Aufzählen der Elemente beschrieben werden: $M = \{a, b, c\}$
- (c) Mengen können durch Eigenschaften der Elemente beschrieben werden: $M = \{x : x \text{ hat Eigenschaft} \dots\}$

1.2.3 Leere Menge, Teilmengen

- (a) Die Menge, die kein Element enthält, heißt leere Menge. Wir bezeichnen diese mit \emptyset .
- (b) Eine Menge M_1 heißt Teilmenge einer Menge M_2 (Schreibweise $M_1 \subseteq M_2$) falls jedes Element von M_1 auch Element von M_2 ist. D.h. es gilt:

$$x \in M_1 \Rightarrow x \in M_2$$

- (c) Zwei Mengen sind gleich wenn gilt:

$$M_1 = M_2 \Leftrightarrow M_1 \subseteq M_2 \wedge M_2 \subseteq M_1$$

- (d) M_1 heißt echte Teilmenge von M_2 wenn gilt:

$$M_1 \subseteq M_2 \wedge M_1 \neq M_2$$

Schreibweise: $M_1 \subset M_2$ oder $M_1 \subsetneq M_2$.

1.2.4 Transitivität u.a.

Für Mengen M, M_1, M_2, M_3 gilt stets:

- (a) Aus $M_1 \subseteq M_2$ und $M_2 \subseteq M_3$ folgt stets: $M_1 \subseteq M_3$
- (b) $M_1 = M_2 \Leftrightarrow M_1 \subseteq M_2 \wedge M_2 \subseteq M_1$
- (c) $M \subseteq M$ und $\emptyset \subseteq M$

1.2.5 Verknüpfung von Mengen

Für Mengen M_1 und M_2 definiert man:

- (a) Die Vereinigung von M_1 und M_2 durch:

$$M_1 \cup M_2 := \{x : x \in M_1 \vee x \in M_2\}$$

- (b) Den Schnitt von M_1 und M_2 durch:

$$M_1 \cap M_2 := \{x : x \in M_1 \wedge x \in M_2\}$$

- (c) Die Differenz von M_1 und M_2 durch:

$$M_1 \setminus M_2 := \{x : x \in M_1 \wedge x \notin M_2\}$$

- (d) Das Kartesische Produkt von M_1 und M_2 durch:

$$M_1 \times M_2 := \{(a, b) : a \in M_1 \wedge b \in M_2\}$$

- (e) Das Kartesische Produkt von M_1 und M_1 durch;

$$(M_1)^2 := M_1 \times M_1$$

1.2.6 Potenzmenge

Für eine Menge M ist durch

$$P(M) := \{A : A \subseteq M\}$$

die Potenzmenge definiert (Menge aller Teilmengen von M).

Bemerkung

Hier gilt $\emptyset \in P(M)$.

1.2.7 Rechenregeln für Mengen

Für bel. Mengen M_1, M_2, M_3 gilt:

- (a) Kommutativität:

$$M_1 \cup M_2 = M_2 \cup M_1 \text{ und } M_1 \cap M_2 = M_2 \cap M_1$$

- (b) Assoziativität:

$$(M_1 \cup M_2) \cup M_3 = M_1 \cup (M_2 \cup M_3) \text{ und } (M_1 \cap M_2) \cap M_3 = M_1 \cap (M_2 \cap M_3)$$

- (c) Distributivgesetz:

$$M_1 \cap (M_2 \cup M_3) = (M_1 \cap M_2) \cup (M_1 \cap M_3) \text{ und } M_1 \cup (M_2 \cap M_3) = (M_1 \cup M_2) \cap (M_1 \cup M_3)$$

1.2.8 Komplement

Ist X eine feste Menge und $M \subseteq X$ beliebig, so heißt

$$M^c := X \setminus M$$

das Komplement von M (bzgl. X).

1.2.9 Bemerkung

Die Schreibweise erfordert das X aus dem Kontext bekannt sein muss.

1.2.10 Verknüpfungen über mehrere Elemente

Für Mengen M_1, M_2, \dots, M_n mit $n \in \mathbb{N}$ definieren wir die Notation:

(a)

$$\bigcup_{k=1}^n M_k = M_1 \cup M_2 \cup \dots \cup M_n$$

(b)

$$\bigcap_{k=1}^n M_k = M_1 \cap M_2 \cap \dots \cap M_n$$

(c)

$$\prod_{k=1}^n M_k = M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n$$

1.2.11 Wichtige Zusammenhänge

(a) $(M^c)^c = M$

(b) $M_1 \subseteq M_2 \Rightarrow M_2^c \subseteq M_1^c$

(c) $(M_1 \cup M_2)^c = M_1^c \cap M_2^c$

1.3 Vollständige Induktion

1.3.1 Summen und Produktzeichen

Für $m, n \in \mathbb{Z}, m \leq n$ und $a_m, a_{m+1}, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ definieren wir:

$$\sum_{k=m}^n a_k := a_m + a_{m+1} + \dots + a_n$$

und

$$\prod_{k=m}^n a_k := a_m \cdot a_{m+1} \cdot \dots \cdot a_n$$

Falls $m > n$ ist definieren wir $\sum_{k=m}^n a_k := 0$ und $\prod_{k=m}^n a_k := 1$

1.3.2 Prinzip der Vollständigen Induktion

Gegen seien Aussagen $A(n)$ für $n \geq n_0$ mit $n_0, n \in \mathbb{Z}$ (n_0 beliebig aber fest).
Und es gelte:

- (a) $A(n_0)$ ist wahr
- (b) Für alle $n \geq n_0$ gilt: $A(n) \Rightarrow A(n+1)$

Bemerkung

- (a) n_0 wird als Induktionsanfang, n als Induktionsschritt bezeichnet
- (b) Nachteil: wir wissen nicht wieso etwas gilt, nur dass es gilt

1.3.3 Rechenregeln für Summen

Für $m, n \in \mathbb{Z}$ und $a_k, b_k, c \in \mathbb{R}$ gilt:

- (a) Indexverschiebung:

$$\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=m+l}^{n+l} a_{k-l}$$

für beliebiges $l \in \mathbb{Z}$

- (b) Trennen von Summen:

$$\sum_{k=m}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=m}^n a_k + \sum_{k=m}^n b_k$$

- (c) Konstante Faktoren können aus der Summe “gezogen” werden:

$$\sum_{k=m}^n c \cdot a_k = c \cdot \sum_{k=m}^n a_k$$

- (d) “Teleskopsummen”:

$$\sum_{k=m}^n (a_k - a_{k+1}) = a_m - a_{n+1}$$

- (e) Summe über Konstanten:

$$\sum_{k=m}^n c = c \cdot (n - m + 1)$$

1.3.4 Doppelsummen

Für $n \in \mathbb{N}$ und $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $1 \leq i \leq j \leq n$ gilt:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n a_{ij} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j a_{ij}$$

1.3.5 Fakultät und Binomialkoeffizient

Für $n \in \mathbb{N}_0$ und ein $\alpha \in \mathbb{R}$ heißt

(a) die Fakultät von n

$$n! := \begin{cases} n \cdot (n-1)! & ; n \neq 0 \\ 1 & ; n = 0 \end{cases}$$

(b) den Binomialkoeffizienten

$$\binom{\alpha}{n} := \frac{\prod_{k=1}^n (\alpha - k + 1)}{n!}$$

1.3.6 Rechenregeln für den Binomialkoeffizienten

Für $n, m \in \mathbb{N}_0$ mit $m \geq n$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt:

(a)

$$\binom{\alpha}{n} + \binom{\alpha}{n+1} = \binom{\alpha+1}{n+1}$$

(b)

$$\binom{m}{n} = \frac{m!}{n!(m-n)!}$$

1.3.7 Binomischer Lehrsatz

Für $a, b \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

1.3.8 Definition Betrag

Für $x \in \mathbb{R}$ heißt

$$|x| := \begin{cases} x & , x \geq 0 \\ -x & , x < 0 \end{cases}$$

der Betrag von x

Bemerkung

Es gilt:

- (a) $|x| \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- (b) $|x \cdot y| = |x| \cdot |y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$
- (c) $|x - a| < \varepsilon \Leftrightarrow a - \varepsilon < x < a + \varepsilon$
- (d) $|x| = \max\{x, -x\} \quad \forall x \in \mathbb{R}$

1.3.9 Dreiecksungleichung

Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt:

- (a) $|x + y| \leq |x| + |y|$ (obere Dreiecksungleichung)
- (b) $|x + y| \geq ||x| - |y||$ (untere Dreiecksungleichung)

Bemerkung

Es gilt $x \leq |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

1.4 Funktion und Differentiation

Eine Funktion (bzw. Abbildung, Operator) f von X nach Y ist eine Vorschrift, die jedem $x \in X$ ein eindeutig bestimmtes $y \in Y$ zuordnet. Das $x \in X$ zugeordnete Element aus Y wird mit $f(x)$ bezeichnet.

Schreibweise

$$f : X \rightarrow Y, \quad x \mapsto f(x)$$

Bemerkung

X heißt Definitionsbereich, $Y := \{y \in Y : \exists x \in X \text{ mit } y = f(x)\}$ die Zielmenge.

1.4.1 Injektivität, Surjektivität, Bijektivität

- (a) Eine Funktion heißt injektiv, falls gilt:

$$x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y) \text{ for all } x, y \in X$$

- (b) Eine Funktion heißt surjektiv, falls gilt:

$$\forall y \in Y \exists x \in X : y = f(x)$$

- (c) Eine Funktion heißt bijektiv, wenn sie injektiv und surjektiv ist.

1.4.2 Verknüpfung von Funktionen

Gegeben seien $f, g : X \rightarrow Y$ und $c \in \mathbb{R}$. Dann definieren wir die Funktionen

$$\begin{aligned} c \cdot f : X &\rightarrow Y, & x &\mapsto (cf)(x) := c \cdot f(x) \\ f + g : X &\rightarrow Y, & x &\mapsto (f+g)(x) := f(x) + g(x) \\ f \cdot g : X &\rightarrow Y, & x &\mapsto (fg)(x) := f(x) \cdot g(x) \\ \frac{f}{g} : X &\rightarrow Y, & x &\mapsto \left(\frac{f}{g}\right)(x) := \frac{f(x)}{g(x)} \text{ für } x \text{ mit } g(x) \neq 0 \end{aligned}$$

1.4.3 Verkettung von Funktionen

Seien $f : X \rightarrow Y$ und $g : Y \rightarrow Z$ gegeben, dann heißt die Funktion

$$g \circ f : X \rightarrow Z, x \mapsto (g \circ f)(x) := g(f(x))$$

die Verkettung von g mit f oder das Kompositum von g mit f

1.4.4 Stetigkeit und Differenzierbarkeit

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$

- (a) f heißt stetig in x_0 , wenn $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ gilt
- (b) f heißt stetig auf I , wenn f in jedem $x_0 \in I$ stetig ist.
- (c) f heißt differenzierbar in x_0 , wenn der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existiert.

Bemerkung

Im Fall der Differenzierbarkeit bezeichnen wir den Grenzwert mit $f'(x_0)$ (Newton Notation) oder $\frac{d}{dx}f(x_0)$ (Leibniz Notation).

1.4.5 Zusammenhang Differenzierbarkeit — Stetigkeit

Eine differenzierbare Funktion ist stets stetig.

Bemerkung

Die Ableitung einer differenzierbaren Funktion muss hingegen nicht stetig sein.

1.4.6 Verkettung differentierbarer Funktionen

Seien $g, f : I \rightarrow \mathbb{R}$ differentierbar, dann sind cf , $f + g$, $f \cdot g$ und im Fall $g(x) \neq 0 \forall x \in I$ auch $\frac{f}{g}$ differentierbare Funktionen, und es gilt:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(c \cdot f)(x) &= (c \cdot f)'(x) = c \cdot f'(x) \\ \frac{d}{dx}(f + g)(x) &= (f + g)'(x) = f'(x) + g'(x) \\ \frac{d}{dx}(f \cdot g)(x) &= (f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x) \\ \frac{d}{dx}\left(\frac{f}{g}\right)(x) &= \left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{(g(x))^2}\end{aligned}$$

1.4.7 Differentiation von Monomen

Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $x \mapsto x^n = f(x)$ und $n \in \mathbb{Z}$. Dann ist f differentierbar mit $f'(x) = n \cdot x^{n-1}$.

1.4.8 Kettenregel

Gegeben seien Intervalle $I, J \subseteq \mathbb{R}$ und differentierbare Funktionen $f : I \rightarrow J, g : J \rightarrow \mathbb{R}$. Dann ist auch $g \circ f$ differentierbar und es gilt:

$$\frac{d}{dx}(g \circ f)(x) = \frac{d}{dx}g(f(x)) = (g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

1.4.9 Ableitung der Umkehrfunktion

Sei $f : I \rightarrow J$ bijektiv und differentierbar dann ist die Umkehrfunktion $f^{-1} : J \rightarrow I$ ebenfalls differentierbar und es gilt:

$$\frac{d}{dx}f^{-1}(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

1.5 Elementare Funktionen

1.6 Integralrechnung

1.7 Komplexe Zahlen

1.8 Elementare Differentialgleichungen

1.8.1 Definition Rechteck

- (a) $I_1, I_2, \dots, I_n \subseteq \mathbb{R}^n$ seien nicht leeren Intervalle. Dann heißt die Menge $M = I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n$ ein (n-Dimensionales) Rechteck.

- (b) Sei $M \subseteq \mathbb{R}^n$ ein Rechteck und $\varphi : M \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann heißt eine Funktion $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ die Lösung der Differentialgleichung (1. Ordnung)

$$y' = \varphi(t; y)$$

wenn gilt:

- i y ist stetig differentierbar
 - ii $(t, y(t)) \in M \forall t \in I$
 - iii $y'(t) = \varphi(t, y(t)) \forall t \in I$
- (c) Sei $M \subseteq \mathbb{R}^2$ ein Rechteck, $\varphi : M \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $(t_0, y_0) \in M$. Dann heißt $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Lösung des Anfangswertproblems (AWP)

$$y' = \varphi(t, y); y(t_0) = y_0$$

wenn y eine Lösung von $y' = f(t, y)$ ist und $y(t_0) = y_0$ gilt.

Bemerkung

Eine DGL n -ter Ordnung mit $n \geq 2$ ist nicht direkt durch die Definition beschrieben.

Wenn wir aber eine Funktion $\vec{y} : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ definiert mit:

$$\begin{aligned} y(t) &= \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} \\ y_1(t) &= x(t) \\ y_2(t) &= \dot{y}_1(t) - \dot{x}(t) \\ \dot{y}_2(t) &= \ddot{x}(t) = -\frac{a_1}{a_2}\dot{x}(t) - \frac{a_0}{a_2}x(t) = -\frac{a_1}{a_2}y_2(t) - \frac{a_0}{a_2}y_1(t) \end{aligned}$$

1.8.2 Lineare DGL 1. Ordnung

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und t_0 ein Punkt in I mit $t_0 - \delta; t_0 + \delta \subseteq I$ (d.h. nicht auf dem Rand von I). Weiter seien $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig.

Definiere

$$\begin{aligned} y_0 &: I \rightarrow \mathbb{R} \\ y_0(t) &= \exp\left(\int_{t_0}^t f(u) du\right) \\ y &: I \rightarrow \mathbb{R} \\ y(t) &= \left(y_0 \cdot \int_{t_0}^t \frac{g(u)}{y_0(u)} du\right) \cdot y_0(t) \end{aligned}$$

Dann ist:

- (a) y_0 eine Lösung von $y' = f(t)y; y(t_0) = 1$
- (b) y eine Lösung von $y' = f(t)y + g(t); y(t_0) = y_0$

Kapitel 2

Grenzwerte

2.1 Gruppen und Körper

2.1.1 Gruppen

Eine Gruppe ist definiert als ein Tupel aus einer (nicht-leeren) Menge und einer Verknüpfung. Eine Gruppe erfüllt die folgenden Axiome (seien $a, b, c \in \mathbb{G}$):

$$\begin{array}{ll} a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c & \text{(Assoziativität)} \\ a \circ \varepsilon = a & \text{(Rechtsneutrales Element)} \\ a \circ a' = \varepsilon & \text{(Rechtsinverses Element)} \end{array}$$

Eine abelsche Gruppe erfüllt des weiteren:

$$a \circ b = b \circ a \quad \text{(Kommutativität)}$$

2.1.2 Körper

Ein Körper ist definiert als eine Menge mit mindestens zwei Elementen (0 und 1) und zwei Verknüpfungen.

$$\begin{array}{ll} + : \mathbb{K} \times \mathbb{K} & \rightarrow \mathbb{K} \\ \cdot : \mathbb{K} \times \mathbb{K} & \rightarrow \mathbb{K} \end{array}$$

\mathbb{K} ist bezüglich der Addition und der Multiplikation (genauer: $\mathbb{K} \setminus \{0\}$) ein abelscher Körper, das heißt es gilt (seien $a, b, c \in \mathbb{K}$):

$$\begin{aligned}
 a + (b + c) &= (a + b) + c && \text{(Assoziativität bez. der Addition)} \\
 a + 0 &= a && \text{(Existenz einer 0)} \\
 a + (-a) &= 0 && \text{(Existenz eines Inversen bez. der Addition)} \\
 a + b &= b + a && \text{(Kommutativität bez. der Addition)} \\
 a \cdot (b \cdot c) &= (a \cdot b) \cdot c && \text{(Assoziativität bez. der Multiplikation)} \\
 a \cdot 1 &= a && \text{(Existenz einer 1)} \\
 a \cdot a^{-1} &= 1 \quad \forall a \neq 0 && \text{(Existenz eines Inversen bez. der Multiplikation)} \\
 a \cdot b &= b \cdot a && \text{(Kommutativität bezüglich der Multiplikation)}
 \end{aligned}$$

außerdem gilt:

$$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c) \quad \text{(Distributivgesetz)}$$

Bemerkung

\mathbb{Q} , \mathbb{R} und \mathbb{C} sind Körper. \mathbb{Z} und \mathbb{N} nicht (kein additiv inverses bei \mathbb{N} , kein multiplikativ inverses bei beiden).

2.1.3 Angeordnete Körper

Ein Körper heißt angeordnet wenn folgende Axiome erfüllt sind (seien $a, b, c \in \mathbb{K}$):

$$\begin{aligned}
 a < b \vee b < a \vee a &= b \\
 a < b \wedge b < c &\Rightarrow a < c \\
 a < b &\Rightarrow a + c < b + c \\
 a < b \wedge c > 0 &\Rightarrow a * c < b * c
 \end{aligned}$$

Bemerkung

\mathbb{Q} und \mathbb{R} sind angeordnete Körper. Für \mathbb{C} kann keine Ordnungsrelation definiert werden so das alle Axiome erfüllt sind.

Gebräuchliche Definition zu angeordneten Körpern

Es gilt $0 < 1$, sonst Widerspruch in (O3).

Die Ordnungsrelation wird dann definiert durch:

$$\begin{aligned}
 2 &:= 1 + 1 \\
 3 &:= 2 + 1 \\
 4 &:= 3 + 1 \\
 &\vdots
 \end{aligned}$$

Die Natürlichen Zahlen werden Induktiv definiert:

1. $1 \in \mathbb{N}$
2. $n \in \mathbb{N} \Rightarrow (n + 1) \in \mathbb{N}$

Bemerkung

Aus 2. lässt sich direkt ableiten das \mathbb{N} nach oben unbeschränkt ist (Archimedisches Prinzip).

Vollständig Angeordnete Körper

Ein Körper heißt Vollständig, falls jede nach oben beschränkte, nicht-leere Teilmenge ein Supremum besitzt.

$\Rightarrow \mathbb{R}$ ist der einzige Vollständig angeordnete Körper.

Bemerkung

\mathbb{Q} ist nicht vollständig angeordnet, da $A := \{x | x^2 \leq 2\} \subset \mathbb{Q}$ kein Supremum besitzt (Supremum ist $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$).

2.1.4 Minimum und Maximum

Sei \mathbb{K} ein angeordneter Körper und $A \subset \mathbb{K}$ dann heißt m Minimum falls gilt:

1. $m \in \mathbb{K}$
2. $a \geq m \quad \forall a \in A$

Analog ist das Maximum definiert: Sei \mathbb{K} ein angeordneter Körper und $A \subset \mathbb{K}$ dann heißt m Maximum falls gilt:

1. $m \in \mathbb{K}$
2. $a \leq m \quad \forall a \in A$

Schreibweisen: $m = \min(A)$ bzw. $m = \max(A)$

Bemerkung

Minimum und Maximum existieren nicht immer.

Beispiel: $A := \{x | x > 0\} \subset \mathbb{R}$ hat nicht 0 als Minimum da $0 \notin A$ und kein beliebiges m da $\tilde{m} := \frac{m}{2} < m \quad \forall m \in A$

2.1.5 Obere und untere Schranke

Sei \mathbb{K} ein angeordneter Körper und $A \subset \mathbb{K}$ dann ist s untere Schranke falls gilt:

- $s \leq a \quad \forall a \in A$

Analog ist die obere Schranke definiert: Sei \mathbb{K} ein angeordneter Körper und $A \subset \mathbb{K}$ dann ist s obere Schranke falls gilt:

- $s \geq a \quad \forall a \in A$

Bemerkung

Hat eine Menge eine obere (bzw. untere) Schranke heißt er nach oben (bzw. unten) beschränkt. Ist eine Menge nach unten und oben beschränkt bezeichnet man sie als beschränkt.

2.1.6 Supremum und Infimum

s heißt Infimum (größte untere Schranke) falls gilt:

- s ist untere Schranke
- Falls \tilde{s} ebenfalls untere Schranke ist gilt $s \geq \tilde{s}$

Analog ist das Supremum definiert: s heißt Supremum (kleinste obere Schranke) falls gilt:

- s ist obere Schranke
- Falls \tilde{s} ebenfalls obere Schranke ist gilt $s \leq \tilde{s}$

Schreibweise: $s = \inf(A)$ bzw. $s = \sup(A)$

Bemerkung

Wenn Minimum (bzw. Maximum) existieren sind diese gleich dem Infimum (bzw. Supremum).

2.2 Folgen

Eine Folge a_n ist definiert als eine Funktion:

$$a_n := \varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{M} \subset \mathbb{R}$$

oder auch $(a_n)_{n=1}^{\infty}$.

2.2.1 Konvergenz

Eine Folge a_n heißt konvergent wenn gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0(\varepsilon) : |a_n - a| < \varepsilon \quad \forall n > n_0(\varepsilon)$$

Bemerkung

Der Grenzwert ist eindeutig, d.h. es existiert nur ein Grenzwert.

Schreibweise

Falls a_n gegen a konvergiert schreibt man:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

2.2.2 Bestimmte Divergenz

Eine Folge a_n heißt bestimmt Divergent wenn gilt

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists n(x) : a_n > x \text{ bzw. } a_n < x$$

Schreibweise:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \text{ bzw. } -\infty$$

2.2.3 Beschränktheit

Eine Folge heißt beschränkt wenn gilt:

$$|a_n| < c \quad \forall n$$

Beschränktheit nach oben/unten

Eine Folge heißt nach oben (bzw. unten) beschränkt wenn gilt:

$$a_n < c \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ bzw. } a_n > c \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

2.2.4 Zusammenhang Konvergenz — Beschränktheit

Jede konvergente Folge ist beschränkt.

2.2.5 Grenzwertrechenregeln

Seien $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, $(b_n)_{n=1}^{\infty}$, $(c_n)_{n=1}^{\infty}$ Folgen in \mathbb{C} mit:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \text{ und } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$$

Dann gilt:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$
- Falls $b \neq 0$: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$

2.2.6 Sandwich Theorem u.a.

Seien $(a_n)_{n=1}^\infty, (b_n)_{n=1}^\infty, (c_n)_{n=1}^\infty$ Folgen in \mathbb{R} mit:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \text{ und } \gamma \in \mathbb{R}$$

Dann gilt:

- $a_n \leq \gamma \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow a \leq \gamma$
- $a_n \geq \gamma \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow a \geq \gamma$
- $a_n \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow a \leq b$
- $a_n \leq c_n \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \wedge a = b \Rightarrow c = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a = b$

2.2.7 Monotonie

Eine Folge $(a_n)_{n=1}^\infty$ in \mathbb{R} heißt:

- Monoton wachsend falls: $a_{n+1} \geq a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ (Schreibweise: $a_n \nearrow$)
- Monoton fallend falls: $a_{n+1} \leq a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ (Schreibweise: $a_n \searrow$)
- Streng monoton wachsend falls: $a_{n+1} > a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ (Schreibweise: $a_n \uparrow$)
- Streng monoton fallend falls: $a_{n+1} < a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ (Schreibweise: $a_n \downarrow$)

2.2.8 Zusammenhang Monotonie und Beschränktheit

Jede Monotone und beschränkte Folge konvergiert.

2.3 Häufungswerte

Häufungswerte sind Grenzwerte einer Teilfolge.

2.3.1 Teilfolgen

Eine Folge $(b_n)_{n=1}^\infty$ heißt Teilfolge von $(a_n)_{n=1}^\infty$, wenn eine streng monotone Funktion $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ existiert mit $b_n = a_{\varphi(n)}$.

2.3.2 Teilfolgen einer Konvergenten Folge

Sei $(a_n)_{n=1}^\infty$ eine konvergente Folge in \mathbb{C} mit: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ und $(b_n)_{n=1}^\infty$ sei eine Teilfolge. Dann gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$.

2.3.3 Häufungswerte

Sei $(a_n)_{n=1}^\infty$ eine Folge in \mathbb{C} . Dann heißt $a \in \mathbb{C}$ ein Häufungswert einer Folge, falls eine Teilfolge gegen a konvergiert.

2.3.4 Limes superior/inferior

Sei $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ eine reelle Folge, dann heißt:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n := \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n := \sup\{x \in \mathbb{R}, a_n > x \text{ } \infty\text{-oft}\}$$

der Limes superior von $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ und

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n := \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n := \inf\{x \in \mathbb{R}, a_n < x \text{ } \infty\text{-oft}\}$$

der Limes inferior von $(a_n)_{n=1}^{\infty}$.

2.3.5 Charakterisierung limsup/liminf

Sei $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ eine reelle Folge und $s \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

(a)

$$s = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \text{ gilt:}$$

i $a_n < s + \varepsilon$ für fast alle n

ii $a_n > s - \varepsilon$ für ∞ -viele n

(b)

$$s = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \text{ gilt:}$$

i $a_n > s - \varepsilon$ für fast alle n

ii $a_n < s + \varepsilon$ für ∞ -viele n

2.3.6 Konvergenz und limsup/liminf

Eine beschränkte Folge $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ in \mathbb{R} konvergiert \Leftrightarrow

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$$

2.3.7 Satz von Bolzano-Weierstraß

Jede beschränkte Folge in \mathbb{C} besitzt eine konvergente Teilfolge.

2.3.8 Cauchy-Kriterium

Sei $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ eine Folge in \mathbb{C} , dann gilt

$$(a_n)_{n=1}^{\infty} \text{ konv. } \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0(\varepsilon) : |a_n - a_m| < \varepsilon \forall n, m > n_0(\varepsilon)$$

Bemerkung

Im Gegensatz zur Definition der Folgenkonvergenz muss der Grenzwert nicht bekannt sein.

2.4 Unendliche Reihen

2.4.1 Definition

Sei $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ eine Folge in \mathbb{C} , dann heißt die durch

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

definiert Folge $(s_n)_{n=1}^{\infty}$ eine Folge von Partialsummen der unendlichen Reihe:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

Falls die Folge $(s_n)_{n=1}^{\infty}$ konvergiert setzen wir:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n =: \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

2.4.2 Cauchy-Kriterium für unendliche Reihen

Sei $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ eine ∞ -Reihe, dann gilt:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ konv.} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0(\varepsilon) : \left| \sum_{k=m}^n a_k \right| < \varepsilon \quad \forall n, m > n_0(\varepsilon)$$

und:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ konv.} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

2.4.3 Grenzwertrechenregeln für unendliche Reihen

Seien

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_k \text{ und } \sum_{n=1}^{\infty} b_k \text{ gegeben und } \alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

dann gilt:

(a)

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_k \text{ und } \sum_{n=1}^{\infty} b_k \text{ konv.:} \\ \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} (\alpha a_k + \beta b_k) \text{ konv.} \\ \text{und: } \sum_{k=1}^{\infty} (\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_k + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_k \end{aligned}$$

(b)

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ konv.} \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{Re}(a_k) \text{ und } \sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{Im}(a_k) \text{ konv.}$$

(c)

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ konv.} \Leftrightarrow \text{die Restreihe } R_n := \sum_{k=n}^{\infty} a_k \text{ konv. gegen } 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} R_n = 0$$

2.4.4 Positive Folgen

Es sei $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ eine Folge mit $(a_n)_{n=1}^{\infty} \in [0, \infty)$ dann gilt:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ konv.} \Leftrightarrow \text{Folge der Partialsummen } \sum_{k=1}^n a_k \text{ ist beschr.}$$

2.4.5 Leibniz-Kriterium

Sei $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ eine monoton fallende, reelle Folge. Dann gilt falls $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ist, konv. die sogenannte alternierende Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k$$

2.4.6 Absolute Konvergenz

Eine Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ heißt absolut konvergent, wenn

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$$

konvergiert.

Bemerkung

Jede absolut konvergente Reihe ist auch konvergent.

2.4.7 Majorantenkriterium

Seien $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ und $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ mit $b_k \geq 0$ gegeben.
Wenn $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konv. und ein $c > 0$ ex. mit

$$|a_k| \leq c \cdot |b_k|$$

für fast alle k , dann konv. $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ absolut.

2.4.8 Minorantenkriterium

Falls ein $c > 0$ ex. mit $a_k \geq c \cdot b_k > 0$ für fast alle k , dann:

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k \text{ div.} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ div.}$$

2.4.9 Wurzel- und Quotientenkriterium

Sei $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ gegeben. Dann gilt:

(a) Wenn

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$$

gilt, dann konv. $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ absolut.

Wenn

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1$$

gilt, dann div. $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

(b) Wenn $a_n \neq 0 \forall n$ und

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$$

gilt, dann konv. $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ absolut.

Wenn $a_n \neq 0 \forall n$ und

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1$$

gilt, dann divergiert. $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

Bemerkung

Wenn das Wurzelkriterium keine Aussage macht, kann das Quotientenkriterium trotzdem eine Aussage machen.

2.4.10 Umordnung einer Reihe

Eine Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ heißt Umordnung der Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, wenn eine bij. Abb $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ex. mit $b_k = a_{\varphi(k)}$.

Bemerkung

Die Reihe konvergiert nur gegen den selben Wert, wenn $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ absolut konvergent ist.

2.4.11 Cauchy-Produkt

Die Reihen $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ und $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ seien absolut konv.. Dann gilt:

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k\right) \cdot \left(\sum_{k=0}^{\infty} b_k\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^k a_j \cdot b_{k-j}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k$$

und $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$ konv. ebenfalls absolut.

2.4.12 Cauchy-Verdichtungssatz

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ konv.} \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} 2^k a_{2^k} \text{ konv.}$$

2.5 Potenzreihen

2.5.1 Definition

Sei $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ eine Folge in \mathbb{C} und $z_0 \in \mathbb{C}$. Dann heißt

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot (z - z_0)^k$$

eine Potenzreihe mit Entwicklungspunkt z_0 und Koeffizienten a_n .

Bemerkung

Viele wichtige Funktionen können als Potenzreihen dargestellt werden.

2.5.2 Hadamard (Konvergenzradius mit Wurzelkriterium)

Sei $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$ eine PR. Definiere

$$R := \frac{1}{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

Dabei sei $R := \infty$, falls $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 0$ und $R = 0$ falls $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \infty$.

Dann konv. die PR absolut, falls $|z - z_0| < R$ und divergiert falls $|z - z_0| > R$.

Bemerkung I

Für $|z - z_0| = R$ wird keine Aussage gemacht.

Bemerkung II

R heißt der Konvergenzradius der Potenzreihe.

2.5.3 Konvergenzradius mit Quotientenkriterium

Sei $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(z - z_0)^k$ eine PR. Der Potenzradius kann ebenfalls berechnet werden durch:

$$R = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

2.5.4 Hinweis

Es gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

2.5.5 Integration und Differentiation von Potenzreihen

Sei $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(z - z_0)^k$ mit Konvergenzradius R . Dann besitzen auch die Potenzreihen

$$\sum_{k=0}^{\infty} k a_k(z - z_0)^{k-1} \text{ und } \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} (z - z_0)^{k+1}$$

den Konvergenzradius R .

2.5.6 Cauchy-Produkt für Potenzreihen

Seien $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(z - z_0)^k$ und $\sum_{k=0}^{\infty} b_k(z - z_0)^k$ Potenzreihen, die den Konvergenzradius R_1 bzw. R_2 besitzen. Dann besitzt

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k(z - z_0)^k \text{ mit } c_k = \sum_{l=0}^k a_l \cdot b_{k-l}$$

den Konvergenzradius $R = \min\{R_1, R_2\}$.

2.5.7 Wichtige Potenzreihen

(a) Die Exponentialfunktion ist definiert durch:

$$\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \quad z \mapsto \exp(z) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$$

(b) Die Trigonometrischen Funktionen sind definiert durch:

$$\begin{aligned} \sin : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \quad z \mapsto \sin(z) &:= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} z^{2k+1} \\ \cos : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \quad z \mapsto \cos(z) &:= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} z^{2k} \end{aligned}$$

(c) Tangens und Cotangens sind dann definiert als:

$$\begin{aligned}\tan : \{z \in \mathbb{C} : \cos(z) \neq 0\} &\rightarrow \mathbb{C} & z \mapsto \tan(z) &:= \frac{\sin(z)}{\cos(z)} \\ \cot : \{z \in \mathbb{C} : \sin(z) \neq 0\} &\rightarrow \mathbb{C} & z \mapsto \cot(z) &:= \frac{\cos(z)}{\sin(z)}\end{aligned}$$

2.5.8 Alternative Definition der Exponentialfunktion

$$\forall z \in \mathbb{C} \text{ gilt } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = \exp(z)$$

2.6 Funktionsgrenzwerte

2.6.1 Bemerkung

In diesem Intervall bezeichnet I stets ein offenes Intervall und \bar{I} dessen sog. Abschluss z.B.:

- (a) $I = (a, b)$ und $\bar{I} = [a, b]$
- (b) $I = (-\infty, b)$ und $\bar{I} = (-\infty, b]$
- (c) $I = (a, \infty)$ und $\bar{I} = [a, \infty)$
- (d) $I = (\infty, \infty)$ und $\bar{I} = (\infty, \infty)$

2.6.2 Epsilon-Umgebung

Für $x_0 \in \mathbb{R}$ und $\varepsilon > 0$ heißt

$$U_\varepsilon(x_0) := \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < \varepsilon\} = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$$

die ε -Umgebung von x_0 . Und

$$\dot{U}_\varepsilon(x_0) := U_\varepsilon(x_0) \setminus \{0\} = (x_0 - \varepsilon, x_0) \cup (x_0, x_0 + \varepsilon)$$

die punktierte ε -Umgebung von x_0 .

2.6.3 Funktionsgrenzwerte (über Delta-Epsilon-Kriterium)

Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ und $x_0 \in I$

- (a) f konv. gegen ein $a \in \mathbb{R}$ für $x \rightarrow x_0$ (kurz: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$) wenn gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) : |f(x) - a| < \varepsilon \quad \forall x \text{ mit } |x - x_0| < \delta(\varepsilon) \text{ und } x \neq x_0$$

Schreibweise:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \text{ oder } f(x) = a \text{ für } x \rightarrow x_0$$

(b) Sei $x_0 \in I$, dann konv. f einseitig von links gegen $a \in \mathbb{R}$ wenn gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) : |f(x) - a| < \varepsilon \quad \forall x \in (x_0 - \delta\varepsilon, x_0)$$

Schreibweise:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = a$$

(c) Sei $x_0 \in I$, dann konv. f einseitig von rechts gegen $a \in \mathbb{R}$ wenn gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) : |f(x) - a| < \varepsilon \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta\varepsilon)$$

Schreibweise:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = a$$

(d) Sei $I = (\alpha, \infty)$ (bzw. $I = (-\infty, \beta)$) dann konv. f gegen a für $x \rightarrow \infty$ (bzw. $x \rightarrow -\infty$) wenn gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x_1(\varepsilon) : |f(x) - a| < \varepsilon \quad \forall x \in I : x > x_1(\varepsilon) \text{ (bzw. } x < x_1(\varepsilon))$$

2.6.4 Folgenkriterium

Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ und $x_0 \in \bar{I}, u \in \mathbb{R}$ dann gilt $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a \Leftrightarrow$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Für eine beliebige Folge } (x_n)_{n=1}^{\infty} \text{ mit} \\ \text{(i) } x_n \neq x_0 \forall n \\ \text{(ii) } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \\ \text{gilt stets:} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a \end{array} \right.$$

2.6.5 Rechenregeln für Funktionsgrenzwerte

Seien $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ und $x_0 \in I$ und gelte

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$$

Dann gilt:

(a)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (\alpha \cdot f(x)) = \alpha \cdot a$$

(b)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (g(x) + f(x)) = a + b$$

(c)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (g(x) \cdot f(x)) = a \cdot b$$

(d)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{a}{b} \quad \text{falls } b \neq 0$$

2.6.6 Cauchy-Kriterium für Funktionsgrenzwerte

Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ und $x_0 \in I$ dann ex. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \Leftrightarrow$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) : |f(x) - f(y)| < \varepsilon \forall x, y \in I \text{ mit } 0 < |x - x_0| < \delta(\varepsilon) \text{ und } 0 < |y - x_0| < \delta(\varepsilon)$$

2.6.7 Bestimmte Divergenz

Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$ dann definieren wir die bestimmte Divergenz (uneigentliche Konvergenz) von $(f \rightarrow \infty)$ durch

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall c > 0 \exists \delta(c) : f(x) > c \forall x \text{ mit } 0 < |x - x_0| < \delta(c)$$

Analog definieren man links- und rechtsseitig Divergenz gegen ∞ bzw. $-\infty$.

2.6.8 Monotone Funktionen

Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dann heißt (auf I)

- (a) monoton wachsend ($f \nearrow$), falls gilt

$$x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$$

- (b) streng monoton wachsend ($f \uparrow$), falls gilt

$$x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$$

- (c) monoton fallend ($f \searrow$), falls gilt

$$x < y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$$

- (d) streng monoton fallend ($f \downarrow$)

$$x < y \Rightarrow f(x) > f(y)$$

- (e) monoton falls f monoton fallend oder monoton steigend ist

- (f) streng monoton falls f streng monoton fallend oder streng monoton steigend ist

- (g) Beschränkt falls gilt:

$$\exists c : |f(x)| < c \forall x \in I$$

2.6.9 Grenzwerte an Intervallgrenzen

Sei $a \leq b$ und $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ monoton und beschränkt, dann ex.

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \text{ und } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

2.7 Stetigkeit

2.7.1 Anschaulich

Graph einer Funktion kann ohne Absetzen gezeichnet werden \Leftrightarrow

Es gibt keine Sprünge \Leftrightarrow

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$ an keiner Stelle $x_0 \in I$ ist ein Sprung \Leftrightarrow

$$\forall x_0 \in I : \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

2.7.2 Stetigkeit: Delta-Epsilon-Kriterium

Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ und $x_0 \in I$, dann ist f in x_0 stetig falls gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) : |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \quad \forall x \in I \text{ mit } |x - x_0| < \delta(\varepsilon)$$

Und f ist stetig (auf I), wenn f in jedem $x_0 \in I$ stetig ist.

2.7.3 Bemerkungen

(a) f ist stetig in $x_0 \Leftrightarrow$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

gilt.

(b) f ist stetig in x_0 dann gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$$

2.7.4 Rechenregeln für Stetigkeit

Sind $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, dann sind auch die Funktionen

(a) $c \cdot f$ (für $c \in \mathbb{R}$)

(b) $f + g$

(c) $f \cdot g$

(d) und falls $g(x) \neq 0 \forall x \in I$ $\frac{f}{g}$

stetig.

Ist $f : I \rightarrow J, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ und beide stetig dann ist auch $g \circ f$ stetig.

2.7.5 Stetigkeit von Potenzreihen

Sei $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(x - x_0)^k$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $R > 0$, dann gilt für $x_1 \in U_R(x_0)$, dass $\lim_{x \rightarrow x_1} f(x) = f(x_1)$ (d.h. Potenzreihen sind innerhalb des Konvergenzradius stetig).

2.7.6 Umgebung positiver Funktionswerte

Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig in x_0 , dann gilt:

$$f(x_0) > 0 \Rightarrow \exists \delta > 0 : f(x) > 0 \quad \forall x \in I \text{ mit } |x - x_0| < \delta$$

2.7.7 Zwischenwertsatz

Sei $D = [a, b]$ (also abgeschlossen) und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ stetig dann ex. zu jedem y zwischen $f(a)$ und $f(b)$ ein $x \in [a, b]$ mit $f(x) = y$.

Genauer:

$$\forall y \in [m, M] \quad \exists x \in [a, b] \text{ mit } f(x) = y$$

Wobei $m = \min\{f(a), f(b)\}$ und $M = \max\{f(a), f(b)\}$.

Bemerkung

Bei einer Funktion ist das Bild eines Intervalls wieder ein Intervall. D.h.

$$f([a, b]) = [c, d]$$

2.7.8 Existenz des Logarithmus

Die Exponentialfunktion $\exp : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ ist bijektiv. Das heißt es existiert eine Umkehrfunktion, diese wird $\log : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ genannt.

2.7.9 Maximum/Minimum/Infimum/Supremum einer Funktion

Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $D \subseteq \mathbb{R}$, dann heißt im Fall der Existenz:

(a)

$$\max_{x \in D} f(x) := \max_D f(x) := \max\{f(x) \mid x \in D\}$$

das Maximum von f auf D .

(b)

$$\min_{x \in D} f(x) := \min_D f(x) := \min\{f(x) \mid x \in D\}$$

das Minimum von f auf D .

(c)

$$\sup_{x \in D} f(x) := \sup_D f(x) := \sup\{f(x) \mid x \in D\}$$

das Supremum von f auf D .

(d)

$$\inf_{x \in D} f(x) := \inf_D f(x) := \inf\{f(x) \mid x \in D\}$$

das Infimum von f auf D .

2.7.10 Beschränktheit einer stetigen Funktion

Seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ und eine stetige Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben, dann ist f beschränkt. (d.h. $\sup_{[a,b]}(f) < \infty$ und $\inf_{[a,b]}(f) > -\infty$).

2.7.11 Weierstraß: Existenz von Min und Max

Seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ und $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, dann ex.:

$$\min_{[a,b]} f \text{ und } \max_{[a,b]} f$$

2.7.12 Zusammenhang Injektivität — Stetigkeit

Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig auf einem Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$. Dann gilt:

$$f \text{ inj. auf } I \Leftrightarrow f \text{ ist streng monoton}$$

2.7.13 Existenz und Monotonie der Umkehrfunktion

Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und streng monoton auf einem Intervall I . Dann ex. auf $J := f(I)$ die Umkehrfunktion $f^{-1} : J \rightarrow I$ und diese ist im gleichen Sinn wie f streng Monoton und stetig.

2.7.14 Gleichmäßige Stetigkeit

Eine Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ heißt gleichmäßig stetig auf I , wenn gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon \forall x_1, x_2 \in I \text{ mit } |x_1 - x_2| < \delta(\varepsilon)$$

Bemerkung

Im Gegensatz zur normalen Stetigkeit wird bei der gleichmäßigen Stetigkeit eine Funktion $\delta(\varepsilon)$ für die ganze Funktion bestimmt und nicht nur für jeden Punkt einzeln (also $\delta(x_0, \varepsilon)$). Es wird also zwischen Stetigkeit in einem Punkt und Stetigkeit auf einem Intervall unterschieden.

Kapitel 3

Differentialrechnung

3.1 Ableitung

3.1.1 Definition Differenzen-Quotient

Sei $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dann heißt f in $x_0 \in D$ differentierbar, falls

$$f'(x_0) := \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

für alle $x_0 \in D$ existiert.

3.1.2 Rechtsseitige und linksseitige Ableitung

Im Fall der Existenz heißen

$$\begin{aligned} f'(x_0^+) &:= \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \text{ bzw.} \\ f'(x_0^-) &:= \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \end{aligned}$$

die rechts- bzw. linksseitige Ableitung in x_0

Bemerkung

$$f'(x_0) \text{ ex.} \Leftrightarrow f'(x_0^+) \text{ und } f'(x_0^-) \text{ ex. und } f'(x_0^+) = f'(x_0^-)$$

3.1.3 Ableitungsrechenregeln

Seien $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ differentierbar in $x_0 \in D$, dann gilt:

- (a) $(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$
- (b) $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$

(c) Falls $g(x_0) \neq 0$: $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$

3.1.4 Alternative Definition der Ableitung

Sei $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $x_0 \in D$. Dann gilt: f differenzierbar in $x_0 \Leftrightarrow$

$\exists A \in \mathbb{R}$ und $r : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\lim_{x \rightarrow x_0} r(x) = 0$ so dass gilt: $f(x) = f(x_0) + A \cdot (x - x_0) + r(x) \cdot (x - x_0)$

3.1.5 Zusammenhang Differentierbarkeit — Stetigkeit

Ist $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar in $x_0 \in D \Rightarrow f$ stetig in x_0

3.1.6 Differentiation von Potenzreihen

Sei $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ eine Potenzreihe mit $R > 0$, dann ist f für x mit $|x - x_0| < R$ differenzierbar, und es gilt:

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cdot k \cdot (x - x_0)^{k-1}$$

Bemerkung

Der Konvergenzradius von $f'(x)$ ist ebenfalls R .

3.1.7 Ableitung der Umkehrfunktion

Seien $I, J \subseteq \mathbb{R}$ Intervalle und $f : I \rightarrow J$ sei differenzierbar und bijektiv, dann ist auch $f^{-1} : J \rightarrow I$ differenzierbar und es gilt:

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{d}{dx} f^{-1}(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))} \forall y_0 \in J \text{ für ein } y_0 = f(x_0) \text{ und } f'(y_0) \neq 0$$

3.1.8 Kettenregel

Seien $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ mit $A, B \subseteq \mathbb{R}$ differenzierbar auf A bzw. B , dann ist auch $g \circ f$ auf A differenzierbar und es gilt:

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0) \quad \forall x_0 \in A$$

3.2 Mittelwertsätze

3.2.1 Satz von Rolle

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und auf (a, b) differenzierbar. Falls $f(a) = f(b)$ gilt, existiert ein $x_0 \in (a, b)$ mit $f'(x_0) = 0$

3.2.2 Definition lokaler Extrempunkt

Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ und $x_0 \in D$. Dann besitzt f in x_0 ein lokales Maximum (bzw. Minimum): \Leftrightarrow

$$\exists \delta > 0 : f(x) \leq f(x_0) \text{ (bzw. } f(x) \geq f(x_0)) \quad \forall x \in D \cap U_\delta(x_0)$$

3.2.3 Notwendige Bedingung für lokale Extrema

Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar in $x_0 \in D$ und x_0 sei kein Randpunkt, dann gilt:
Liegt bei x_0 ein lokales Maximum/Minimum $\Rightarrow f'(x_0) = 0$.

3.2.4 2. Mittelwertsatz

Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und auf (a, b) differenzierbar dann existiert ein $x_0 \in (a, b)$ mit

$$f'(x_0) \cdot (g(b) - g(a)) = g'(x_0) \cdot (f(b) - f(a))$$

Bzw. falls nicht durch Null geteilt wird:

$$\frac{f'(x_0)}{g'(x_0)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

3.2.5 1. Mittelwertsatz (Folgerung aus 2. Mittelwertsatz)

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und auf (a, b) differenzierbar

$$\Rightarrow \exists x_0 \in (a, b) \text{ mit } f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

3.2.6 L'Hospital

Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ($a < b, b \in (\mathbb{R} \cup \infty)$) differenzierbar auf (a, b) mit $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b)$. Falls der Grenzwert $\alpha = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ ex. und:

(a) $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = 0$ oder

(b) $\lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = \infty$

dann gilt:

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

3.2.7 Satz von Taylor

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ $n + 1$ mal differentierbar auf (a, b) und $x_0 \in (a, b)$. Dann gilt für ein $\xi \in (x_0, x)$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \cdot (x - x_0)^{n+1}$$

Teil II

HM 2 — Zusammenfassung

Kapitel 4

Integration

4.1 Integration

4.1.1 Definition Zerlegung, Zwischenwerte

Eine Teilmenge T von $[a, b]$ mit $a, b \in T$ nennt man eine Unterteilung, Zerlegung oder Partitionierung von $[a, b]$ wenn gilt:

$$T = \{x_0, x_1, \dots, x_n\} \text{ mit} \\ a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

Schreibweise für diese Menge T sei:

$$T : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

Ist T eine Zerlegung, dann heißt:

- (a) Die Zahl $\mu(T) := \max\{|x_{k-1} - x_k|, k = 0, \dots, n\}$ das Feinheitsmaß von T .
- (b) Ein Vektor $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n$ heißt ein Zwischenwertvektor zu T , wenn gilt

$$x_{k-1} \leq \xi_k \leq x_k \text{ für } k = 1, \dots, n$$

Dann heißt die Komponente ξ_k ein Zwischenwert von x_{k-1} und x_k .

4.1.2 Definition Riemannsumme

Ist $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, $T : a = x_0 < \dots < x_n = b$ eine Zerlegung von $[a, b]$ und $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ ein Zwischenwertvektor zu T , dann nennen wir die Summe

$$S(f; T, \xi) = S_f(T, \xi) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k)(x_k - x_{k-1})$$

die Riemannsumme von f bezüglich T und ξ .

4.1.3 Definition Riemann-Integral

Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ heißt Riemann-Integrierbar unter $[a, b]$ wenn für jede Folge $(T_N)_{N=1}^{\infty}$ von Zerlegungen von $[a, b]$ mit $\mu(T_N) \rightarrow 0$ für $N \rightarrow \infty$ und jede Folge $(\xi_N)_{N=1}^{\infty}$ von Zwischenpunktvektoren der Grenzwert

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S(f; T_N, \xi_N) \text{ existiert.}$$

Behauptung

Der Grenzwert ist im Fall der Existenz für jede Folge identisch.

Bemerkung

(a) Im Fall der Existenz bezeichnet man den Grenzwert durch:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{N \rightarrow \infty} S(f; T_N, \xi_N)$$

(b) Zu $(T_N)_{N=1}^{\infty}$, also T_1, T_2, T_3, \dots :

$$\begin{aligned} T_1 : & \quad a = x_0^{(1)} < \dots < x_n^{(1)} = b \\ T_2 : & \quad a = x_0^{(2)} < \dots < x_n^{(2)} = b \\ T_3 : & \quad a = x_0^{(3)} < \dots < x_n^{(3)} = b \\ & \quad \vdots \\ T_l : & \quad a = x_0^{(l)} < \dots < x_n^{(l)} = b \end{aligned}$$

(c) Zu $(\xi_N)_{N=1}^{\infty}$, also $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \dots$:

$$\begin{aligned} \xi_1 &= (\xi_1^{(1)}, \dots, \xi_n^{(1)}) \text{ mit } x_{k-1}^{(1)} \leq \xi_k^{(1)} \leq x_k^{(1)} \text{ mit } 1 \leq k \leq n_1 \\ \xi_2 &= (\xi_1^{(2)}, \dots, \xi_n^{(2)}) \text{ mit } x_{k-1}^{(2)} \leq \xi_k^{(2)} \leq x_k^{(2)} \text{ mit } 1 \leq k \leq n_2 \\ \xi_3 &= (\xi_1^{(3)}, \dots, \xi_n^{(3)}) \text{ mit } x_{k-1}^{(3)} \leq \xi_k^{(3)} \leq x_k^{(3)} \text{ mit } 1 \leq k \leq n_3 \\ & \quad \vdots \\ \xi_l &= (\xi_1^{(l)}, \dots, \xi_n^{(l)}) \text{ mit } x_{k-1}^{(l)} \leq \xi_k^{(l)} \leq x_k^{(l)} \text{ mit } 1 \leq k \leq n_l \end{aligned}$$

(d) Sei f integrierbar und $(T_N)_{N=1}^{\infty}$ und $(\xi_N)_{N=1}^{\infty}$ sowie $(\tilde{T}_N)_{N=1}^{\infty}$ und $(\tilde{\xi}_N)_{N=1}^{\infty}$ entsprechende Folgen, d.h. $\mu(T_N) \rightarrow 0, \mu(\tilde{T}_N) \rightarrow 0$ für $N \rightarrow \infty$. Dann gilt für $(\hat{T}_N)_{N=1}^{\infty}$ und $(\hat{\xi}_N)_{N=1}^{\infty}$ mit

$$\hat{T}_N := \begin{cases} T_N & \text{für } N \text{ gerade} \\ \tilde{T}_N & \text{für } N \text{ ungerade} \end{cases}$$

und

$$\hat{\xi}_N := \begin{cases} \xi_N & \text{für } N \text{ gerade} \\ \tilde{\xi}_N & \text{für } N \text{ ungerade} \end{cases}$$

dass

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S(f; \hat{T}_N, \hat{S}_N)$$

existiert, da f integrierbar ist.

Dann stimmt der Grenzwert von $\lim_{N \rightarrow \infty} S(f; \tilde{T}_N, \tilde{S}_N)$ und $\lim_{N \rightarrow \infty} S(f; T_N, S_N)$ überein.

4.1.4 Menge der Riemann-Integrierbaren Funktionen

Mit $R[a, b]$ oder $R([a, b])$ bezeichnen wir die Menge von Funktionen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ die auf $[a, b]$ Riemann integrierbar sind.

4.1.5 Kriterien für Riemann-Integrierbarkeit

(a)

$$f \in R[a, b] \Rightarrow f \text{ ist auf } [a, b] \text{ beschränkt}$$

(b) Ist $f, g \in R[a, b]$ und $c \in \mathbb{R}$ dann sind auch die Funktionen

$$\begin{array}{rcl} f & + & g \\ f & - & g \\ c & \cdot & f \end{array}$$

Riemann integrierbar auf $[a, b]$.

(c) Ist $f, g \in R[a, b]$, dann ist auch

$$f \cdot g \in R[a, b]$$

(d) Ist $f, g \in R[a, b]$ und falls $|g(x)| > \delta > 0 \forall x \in [a, b]$ dann ist auch

$$\frac{f}{g} \in R[a, b]$$

(e) Für beliebiges $c \in [a, b]$ gilt:

$$f \in R[a, b] \Leftrightarrow f \in R[a, c] \wedge f \in R[c, b]$$

und weiter gilt:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx$$

(f)

$$f \in R[a, b] \Rightarrow |f| \in R[a, b]$$

und

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx$$

4.1.6 Endliche Änderung von Funktionen

Wenn $f \in R[a, b]$ ist und durch endlich viele Änderungen daraus $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ konstruiert werden kann, d.h.

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{falls } x \notin \{x_1, \dots, x_n\} \\ y_1 & \text{falls } x = x_1 \\ \vdots & \\ y_n & \text{falls } x = x_n \end{cases}$$

dann gilt $g \in R[a, b]$ und

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b g(x) \, dx$$

4.1.7 Zusammenhang Stetigkeit und Integrierbarkeit

Es gilt:

$$f \in C[a, b] \Rightarrow f \in R[a, b]$$

4.1.8 Stückweise Integration

Falls $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stückweise stetig ist, d.h. es existieren endlich viele Intervall-Stücke auf denen f stetig ist, dann ist $f \in R[a, b]$ und es gilt:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_{x_0}^{x_1} f(x) \, dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x) \, dx + \dots + \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x) \, dx$$

4.1.9 1. Mittelwertsatz der Integralrechnung

Seien $f, g \in R[a, b]$ und $g \geq 0$ auf $[a, b]$. Dann gibt es ein $\mu \in \mathbb{R}$ mit $\inf_{[a, b]} f(x) \leq \mu \leq \sup_{[a, b]} f(x)$ sodass gilt:

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = \mu \int_a^b g(x) \, dx$$

Ist f stetig auf $[a, b]$, dann existiert ein $\xi \in [a, b]$ mit

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = f(\xi) \int_a^b g(x) \, dx$$

Bemerkung

Für $g(x) = 1$ und f stetig lautet die Aussage also:

$$\int_a^b f(x) \, dx = f(\xi) \cdot (b - a)$$

4.1.10 Existenz der Stammfunktion

Sei $f \in R[a, b]$, dann ist für jedes $c \in [a, b]$ durch:

$$F(x) := \int_c^x f(t) dt$$

eine stetige Funktion definiert. Und für jedes $x_0 \in (a, b)$ gilt:

$$f \text{ stetig in } x_0 \Rightarrow F \text{ ist differentierbar in } x_0 \wedge F'(x_0) = f(x_0)$$

4.1.11 Definition Stammfunktion

Gilt $F'(x) = f(x) \forall x \in [a, b]$ dann wird F als Stammfunktion von f bezeichnet.

4.1.12 Eindeutigkeit der Stammfunktion

Sind F und G Stammfunktionen von f , dann existiert ein $c \in \mathbb{R}$ mit

$$F(x) = G(x) + c \forall x \in [a, b]$$

4.1.13 Hauptsatz der Differential und Integralrechnung

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben dann gilt:

(a) Ist $f \in R[a, b]$ und F eine Stammfunktion, dann gilt:

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a) =: [F(x)]_a^b$$

(b) Ist $f \in C[a, b]$ dann existiert eine Stammfunktion und zwar

$$F(x) := \int_c^x f(t) dt$$

Bemerkung

Aus dem Hauptsatz folgen Integrationstechniken wie partielles Integrieren oder die Substitutionsregel.

4.1.14 Zusammenhang Monotonie und Riemann-Integrierbarkeit

Ist $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ auf $[a, b]$ monoton, dann ist $f \in R[a, b]$.

4.1.15 Zweiter Mittelwertsatz der Integralrechnung

Ist f monoton auf $[a, b]$, g integrierbar auf $[a, b]$, dann existiert ein $\xi \in [a, b]$ mit:

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(a) \int_a^\xi g(x) dx + f(b) \int_\xi^b g(x) dx$$

4.2 Uneigentliche Integrale

4.2.1 Definition uneigentliches Integral

Eine Funktion $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $a < b \leq \infty$ heißt über $[a, b)$ uneigentlich Riemann integrierbar, wenn gilt:

- (a) $\forall c$ mit $a \leq c < b$ ist $f \in R[a, c]$
- (b) Der Grenzwert

$$\alpha = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) \, dx$$

existiert. In dem Fall schreiben wir

$$\alpha = \int_a^b f(x) \, dx$$

und sagen das uneigentliche Integral

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

konvergiert gegen α oder hat den Wert α .

Andernfalls divergiert das uneigentliche Integral. Analog geht man für Funktionen

- $f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ mit $-\infty \leq a < b$ und
- $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $-\infty \leq a < b \leq \infty$

vor.

4.2.2 Cauchy-Kriterium

Sei $f \in R[a, b]$ $\forall c \in (a, b)$, $a < c \leq \infty$ Dann konv.

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

- (a) Im Fall $b < \infty$ genau dann, wenn gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \left| \int_{T_1}^{T_2} f(x) \, dx \right| < \varepsilon \quad \forall T_1, T_2 \in [b - \delta, b)$$

- (b) Im Fall $b = \infty$, wenn gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists K \geq a : \left| \int_{T_1}^{T_2} f(x) \, dx \right| < \varepsilon \quad \forall T_1, T_2 \geq K$$

4.2.3 Majorantenkriterium

Seien $f, g \in R[a, c]$ $\forall c \in (a, b)$, $a < b \leq \infty$ oder $f, g \in R[c, b] \forall c \in (a, b) - \infty \leq a < b$. Außerdem $|f(x)| \leq g(x)$. Und

$$\int_a^b g(x) \, dx$$

konvergiert, dann konvergiert auch

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

4.2.4 Absolute Konvergenz

Ist $f \in R[T_1, T_2]$ für $a < T_1 \leq T_2 < b \leq \infty$ so heißt

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

absolut konvergent, wenn

$$\int_a^b |f(x)| \, dx$$

konvergent ist.

4.2.5 Minorantenkriterium

$$f(x) \geq g(x) \geq 0 \wedge \int_a^b g(x) \, dx = \infty \Rightarrow \int_a^b f(x) \, dx = \infty$$

4.2.6 Integralkriterium für Reihen

Sei $f : [a, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ und $f \searrow$ ($a \in \mathbb{Z}$). Dann gilt:

$$\sum_{n=m}^{\infty} f(n) < \infty \Leftrightarrow \int_a^{\infty} f(x) \, dx < \infty$$

Kapitel 5

Gleichmäßige Konvergenz

5.1 Gleichmäßige Konvergenz

5.1.1 Definition Funktionenfolge und Funktionenreihe

Sei M eine Menge und $m \in \mathbb{Z}$. Ist jedem $n \in \{m, m+1, \dots\}$ eine Funktion $f_n : M \rightarrow \mathbb{R}$ zugeordnet, so nennt man:

- (a) Die Folge $(f_n)_{n=m}^{\infty}$ eine Funktionenfolge auf M
- (b) Die Reihe $\sum_{n=m}^{\infty} f_n(x)$ eine Funktionenreihe auf M

konvergiert $(f_n)_{n \geq m}$ (bzw. $\sum_{n=m}^{\infty} f_n(x)$) für alle $x \in \tilde{M} \subseteq M$ so heißt die durch $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ (bzw. $f(x) = \sum_{n=m}^{\infty} f_n(x)$) definierte Funktion $f : \tilde{M} \rightarrow \mathbb{R}$ die Grenzfunktion von $(f_n)_{n=m}^{\infty}$ (bzw. $\sum_{n=m}^{\infty} f_n$).

5.1.2 Gleichmäßige Konvergenz

Sei M eine Menge und sei $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion.

- (a) Eine Funktionenfolge $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ heißt auf M gleichmäßig konvergent gegen f wenn gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0(\varepsilon) : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in M \text{ und } n \geq n_0(\varepsilon)$$

- (b) Eine Funktionenfolge $\sum_{n=m}^{\infty} f_n$ konvergiert gleichmäßig auf M wenn gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0(\varepsilon) : \left| \sum_{k=m}^n f_k(x) - f(x) \right| < \varepsilon \quad \forall x \in M \text{ und } n \geq n_0(\varepsilon)$$

Bemerkung

Offensichtlich gilt:

$$\text{Gleichmäßig konvergent} \Rightarrow \text{Punktweise Konvergent}$$

5.1.3 Stetigkeit der Grenzfunktion

Sei $(f_n)_{n=1}^\infty$ (bzw. $\sum_{n=1}^\infty f_n(x)$) gleichmäßig konvergent gegen f auf einem Intervall I und alle f_n stetig auf I . Dann ist auch die Grenzfunktion f stetig.

5.1.4 Integration der Grenzfunktion

Sei $(f_n)_{n=1}^\infty$ eine Folge von integrierbaren Funktionen auf $[a, b]$

- (a) Falls $(f_n)_{n=1}^\infty$ gleichmäßig gegen f konvergiert, dann ist auch f auf $[a, b]$ integrierbar und es gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) \, dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \, dx$$

- (b) Analog für Funktionenreihen

5.1.5 Cauchy Kriterium für gleichmäßige Konvergenz

- (a) Eine Funktionenfolge $(f_n)_{n=1}^\infty$ konvergiert genau dann gleichmäßig auf einer Menge M (\subseteq Definitionsbereich), wenn gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists n(\varepsilon) : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \, \forall n \geq n(\varepsilon) \, \forall x \in M$$

- (b) Analog für Funktionenreihen

5.1.6 Differentiation der Grenzfunktion

Sei $(f_n)_{n=1}^\infty$ eine auf dem Intervall I differentierbare Folge von Funktionen.

- (a) Konvergiert die Folge $(f'_n)_{n=1}^\infty$ gleichmäßig auf I und konvergiert für ein beliebiges, festes $x_0 \in I$ die reelle Folge $(f_n(x_0))_{n=1}^\infty$ dann ist auch die Grenzfunktion f von $(f_n)_{n=1}^\infty$ differentierbar und es gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{dx} f_n(x) = \frac{d}{dx} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

- (b) Analog für Funktionenreihen

Bemerkung

Außerdem gilt dass $(f_n)_{n=1}^\infty$ (bzw. $\sum_{n=1}^\infty f_n$) auf jedem beschränkten Teilintervall von I gleichmäßig konvergiert.

5.1.7 Majorantenkriterium auf Potenzreihen anwenden

Für eine reelle Potenzreihe $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ mit Konvergenzradius $R > 0$ gilt:

- (a) f ist stetig auf $(x_0 - R, x_0 + R) =: I$
- (b) f ist differentierbar auf I und

$$f'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot k \cdot (x - x_0)^{k-1}$$

- (c) f ist integrierbar auf I und hat die Stammfunktion

$$F(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} (x - x_0)^{k+1}$$

Bemerkung

Wurde alles schon in HM1 gezeigt aber mühsam.

5.1.8 Majorantenkriterium für Funktionenreihen

Falls $|f_n(x)| \leq a_n$ und $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergiert $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ ist gleichmäßig konvergent.

Kapitel 6

Differentialrechnung mit mehreren Variablen

6.1 Der n-dimensionale Euklidische Raum

6.1.1 Definitionen

Sind $n, m \in \mathbb{N}$, so gelten folgende Bezeichnungen:

$$\mathbb{R}^n := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ für } x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\mathbb{R}^{m \times n} := \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \text{ für } a_{ij} \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n \right\}$$

$$\langle x, y \rangle := x \cdot y := x^T y := \sum_{k=1}^n x_k y_k \text{ (Skalarprodukt)}$$

$$\|x\| := \|x\|_2 := |x| := \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} \text{ euklidische Norm des } \mathbb{R}^n / \text{Betrag in } \mathbb{R}^n$$

6.1.2 Folgerungen

1.

$$\|x\|_\infty = \max_{k=1 \dots n} |x_k| \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \max_{k=1 \dots n} |x_k| \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

2.

$$\|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k|$$

und

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1$$

3. $\|x\|_1, \|x\|_2, \|x\|_\infty$ sind drei mögliche Festlegungen für Vektornormen. Allgemein hat eine Norm $\|\cdot\|$ ($\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$) folgende Eigenschaften:

$$\begin{aligned} \|x\| &\geq 0 & \forall x \in \mathbb{R}^n \wedge \|x\| = 0 &\Leftrightarrow x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{0} \\ \|\alpha \cdot x\| &= |\alpha| \cdot \|x\| & \forall \alpha \in \mathbb{R} \wedge \forall x \in \mathbb{R}^n \\ \|x + y\| &\leq \|x\| + \|y\| & \forall x, y \in \mathbb{R}^n \end{aligned}$$

4. Der Einheitskreis ist bezüglich verschiedener Normen nicht immer ein Kreis

5. p-Norm:

$$\|x\|_p = \sqrt[p]{\sum_{k=1}^n |x_k|^p}$$

6. $x \cdot y$ im \mathbb{R}^2 hat die anschauliche Bedeutung

$$\langle x, y \rangle = x \cdot y = \|x\|_2 \cdot \|y\|_2 \cdot \cos(\alpha)$$

Daraus folgt die Cauchy-Schwarzsche-Ungleichung (CSU)

$$\langle x, y \rangle \leq \|x\|_2 \cdot \|y\|_2$$

6.1.3 Konventionen

- (a) In \mathbb{R}^n sei stets $A^c := \mathbb{R}^n \setminus A$ für eine Menge $A \subseteq \mathbb{R}^n$
- (b) Mit $\|\cdot\|$ bezeichnen wir die euklidische Norm $\|\cdot\|_2$. Außer es wird explizit gesagt, dass $\|\cdot\|$ eine allgemeine Norm ist (z.B. „Sei $\|\cdot\|$ eine Norm auf \mathbb{R}^n “)

6.1.4 Definition Epsilon-Umgebung

Sei $a \in \mathbb{R}^n, \varepsilon > 0$ dann heißt

$$U_\varepsilon(a) := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\| < \varepsilon\} \text{ die } \varepsilon\text{-Umgebung von } a$$

$$\dot{U}_\varepsilon(a) := U_\varepsilon(a) \setminus \{a\} \quad (= \{x \in \mathbb{R}^n \mid 0 < \|x - a\| < \varepsilon\}) \text{ die punktierte } \varepsilon\text{-Umgebung von } a$$

6.1.5 Definition Topologische Begriffe

Sei $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Ein Punkt $a \in \mathbb{R}^n$ heißt:

- (a) Innerer Punkt von A , falls ein $\varepsilon > 0$ existiert, sodass $U_\varepsilon(a) \subseteq A$ Kurz:

$$a \text{ innerer Punkt von } A :\Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0 : U_\varepsilon(a) \subseteq A$$

Die Menge $\overset{\circ}{A}$ ist die Menge aller innerer Punkte von A

$$\overset{\circ}{A} := \{a \in \mathbb{R}^n \mid \exists \varepsilon > 0 \text{ mit } U_\varepsilon(a) \subseteq A\}$$

- (b) Berührungspunkt von A , wenn jede ε -Umgebung von a mindestens einen Punkt aus A enthält. Kurz:

$$a \in \mathbb{R}^n \text{ ist Berührungspunkt von } A :\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : U_\varepsilon(a) \cap A \neq \emptyset$$

Die Menge aller Berührungspunkte von

$$\bar{A} := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \forall \varepsilon > 0 \text{ ist } U_\varepsilon(x) \cap A \neq \emptyset\}$$

heißt der Abschluss oder abgeschlossene Hülle von A .

- (c) Häufungspunkt von A , wenn jede punktierte ε -Umgebung von a ein Element von A enthält. Kurz:

$$a \in \mathbb{R}^n \text{ ist Häufungspunkt} :\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \dot{U}_\varepsilon(a) \cap A \neq \emptyset$$

- (d) Randpunkt von A , wenn jede ε -Umgebung Elemente aus A und A^c enthält. Kurz:

$$a \in \mathbb{R}^n \text{ ist Randpunkt von } A :\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 (U_\varepsilon(a) \cap A \neq \emptyset) \wedge (U_\varepsilon(a) \cap A^c \neq \emptyset)$$

Die Menge

$$\partial A := \{a \in \mathbb{R}^n \mid a \text{ ist Randpunkt von } A\}$$

heißt der Rand von A .

Bemerkung

Man kann zeigen:

$$\bar{A} = A \cup \partial A = \overset{\circ}{A} \cup \partial A$$

6.1.6 Definition offene und abgeschlossene Menge

Eine Menge $A \subseteq \mathbb{R}^n$ heißt:

- (a) offen, wenn $A = \overset{\circ}{A}$ gilt (also A besteht nur aus inneren Punkten)
- (b) abgeschlossen, wenn $\partial A \subseteq A$ (Rand gehört zu A)

6.2 Folgen

6.2.1 Definition

Eine Folge

$$a_k = \begin{pmatrix} a_1^{(k)} \\ \vdots \\ a_n^{(k)} \end{pmatrix}$$

in \mathbb{R}^n heißt:

- (a) Konvergent gegen einen Grenzwert a , wenn gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n(\varepsilon) : \|a_k - a\| < \varepsilon \quad \forall k \geq n(\varepsilon)$$

Schreibweise:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = a \text{ oder } a_k \rightarrow a \quad (k \rightarrow \infty)$$

- (b) Beschränkt, wenn gilt:

$$\exists c > 0 : \|a_k\| < c \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Bemerkung

- (a) Die Norm $\|\cdot\|$ sei hier die euklidische Norm $\|\cdot\|_2$. Wir werden aber sehen:
Jede Norm auf \mathbb{R}^n wäre ok.

- (b)

$$a_k \rightarrow a \quad (k \rightarrow \infty) \Rightarrow \text{Jede Komponente von } a_k \text{ konvergiert gegen entsprechende Komponente von } a$$

- (c) Cauchy-Kriterium:

$$(a_k)_{k=1}^{\infty} \text{ konv.} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n(\varepsilon) : \|a_k - a_l\| < \varepsilon \quad \forall k, l \geq n(\varepsilon)$$

6.2.2 Bolzano-Weierstraß

Jede beschränkte Folge im \mathbb{R}^n hat eine konvergente Teilfolge.

6.2.3 Grenzwertrechenregeln

Die Grenzwertrechenregeln übertragen sich auch auf Folgen im \mathbb{R}^n .

6.2.4 Weitere Bemerkungen

Sei $A \subseteq \mathbb{R}^n$ und $a \in \mathbb{R}^n$, dann gilt:

(a)

$$a \in \bar{A} \Leftrightarrow \exists (a_k)_{k=1}^{\infty} \text{ mit } a_k \in A \forall k \text{ mit } \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = a$$

(b) a ist ein Häufungspunkt von A

$$\exists (a_k)_{k=1}^{\infty} \text{ mit } a_k \in A \setminus \{a\} \text{ mit } \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = a$$

(c) A ist abgeschlossen \Leftrightarrow für jede konvergente Folge $(a_k)_{k=1}^{\infty}$ mit $a_k \in A \forall k$ gilt $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k \in A$.

(d) A ist kompakt \Leftrightarrow Jede Folge in A besitzt einen Häufungspunkt in A .

6.3 Funktionsgrenzwerte und Stetigkeit

6.3.1 Definition Funktion

Eine Funktion $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ nennt man eine Funktion in n Veränderlichen (oder Vektorfeld). Im Fall $m = 1$ nennt man f eine reelle Funktion (oder Skalarfeld).

Schreibweise

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) := f \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \right) := \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}$$

6.3.2 Definition Funktionsgrenzwert

Sei $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ und $a \in \bar{A}$ dann heißt ein $b \in \mathbb{R}^m$ mit:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) : \|f(x) - b\| < \varepsilon \forall x \in \dot{U}_{\delta(\varepsilon)}(a) \cap A$$

der Grenzwert von f für x gegen a . Kurz:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$$

6.3.3 Definitionen aus HM 1 im Mehrdimensionalen

Sei $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $a \in \bar{A}$ und $b \in \mathbb{R}^m$

(a) Folgende Aussagen sind äquivalent:

$$(a) f(x) \rightarrow b \ (x \rightarrow a)$$

(b) $\|f(x) - b\| \rightarrow 0 \ (x \rightarrow a, x \in A)$

(c) Für jede Komponente

$$f_l(x) \text{ von } f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{pmatrix} \text{ gilt } f_l(x) \rightarrow b_l \ (x \rightarrow a)$$

(d) Für eine Folge $(x_k)_{k=1}^\infty$ in A mit $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k \neq a \ \forall k$ folgt:

$$f(x_k) \rightarrow b \ (k \rightarrow \infty)$$

(b) Falls $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existiert ist dieser Eindeutig.

(c) Cauchy-Kriterium:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta(\varepsilon) : \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon \ \forall x, y \in \dot{U}_{\delta(\varepsilon)}(a) \cap A$$

(d) Grenzwertrechenregeln gelten analog zu HM 1

(e) Sei $B \subseteq A$ mit $a \in \bar{B}$ dann gilt:

$$\lim_{x \rightarrow a \text{ mit } x \in B} f(x) = b \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a \text{ mit } x \in A} f(x) = b$$

6.3.4 Definition Stetigkeit

Sei $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ und $a \in A$, dann ist f in a stetig wenn gilt $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. Das heißt:

$$\forall \varepsilon \ \exists \delta(\varepsilon) : \|f(x) - f(a)\| < \varepsilon \ \forall x \in U_{\delta(\varepsilon)}(a) \cap A$$

6.3.5 Grenzwerte von verketteten Funktionen

Sei $A \subseteq \mathbb{R}^n, B \subseteq \mathbb{R}^m, a \in \bar{A}$ und $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow \mathbb{R}^l$. Existiert $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ so gilt $b \in \bar{B}$ und es gilt:

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = \lim_{y \rightarrow b} g(y)$$

sofern der Grenzwert $\lim_{y \rightarrow b} g(y)$ existiert.

6.3.6 Grenzwertrechenregeln

Für $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ gilt: Falls $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$ und $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ existiert, dann gilt:

(a)

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) + g(x) = \alpha + \beta$$

(b)

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)^T g(x) = \alpha^T \beta$$

6.3.7 Maximum und Minimum Kompakter Mengen

- (a) Ist $\emptyset \neq A \subseteq \mathbb{R}$ kompakt, so existiert $\max A$ und $\min A$.
- (b) Ist $A \subseteq \mathbb{R}^n$, A kompakt und $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig auf A , dann ist $f(A)$ kompakt.

6.3.8 Weierstraß

Falls $A \subseteq \mathbb{R}^m$ und $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ stetig ist dann gilt:

$$A \text{ kompakt} \Rightarrow \min_{x \in A} f(x), \max_{x \in A} f(x) \text{ existiert}$$

6.4 Partielle Ableitungen und Richtungsableitungen

6.4.1 Definition partielle Ableitung

Eine Funktion $f : A \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißt in einem Punkt $a \in \mathbb{R}^m$ partiell differenzierbar nach seiner k -ten Variable x_k ($k \in \{1, \dots, m\}$) wenn $f(a + h \cdot e_k)$ mit

$$e_k = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \text{ (} k\text{-te Komponente)} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

für ein festes $\delta > 0$ und alle h mit $|h| < \delta$ existiert:

$$\frac{\partial}{\partial x_k} f(a) := f_{x_k}(a) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h \cdot e_k) - f(a)}{h}$$

Dieser Grenzwert heißt partielle Ableitung von f nach x_k bei a .

Existiert bei a die partiellen Ableitungen $f_{x_1}(a), \dots, f_{x_m}(a)$ so heißt f (einmal) partiell differenzierbar bei a und nennt man im Fall $n = 1$ den Spaltenvektor

$$\nabla f(a) := \text{grad } f(a) := \begin{pmatrix} f_{x_1}(a) \\ \vdots \\ f_{x_m}(a) \end{pmatrix}$$

den Gradienten von f bei a .

Falls alle partiellen Ableitungen stetig sind nennt man f stetig partiell differenzierbar.

Schreibweise

$C^k(G, \mathbb{R}^n) := \{f : G \rightarrow \mathbb{R}^n \mid \text{alle } k\text{-ten partiellen Ableitungen existieren und sind stetig}\}$

6.4.2 Definition Umgebung eines Punktes

Eine Umgebung eines Punktes $a \in \mathbb{R}^n$ ist eine Menge $U \subseteq \mathbb{R}^n$ für die ein $\varepsilon > 0$ existiert, so dass $U_\varepsilon(a) \subseteq U$. Eine offene Umgebung U ist eine Umgebung, die zusätzlich eine offene Menge ist.

Bemerkung

Ist $f : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ partiell differentierbar und sind in einer Umgebung von $a \in G$ alle partiellen Ableitungen beschränkt, dann ist f stetig in a .

6.4.3 Definition Richtungsableitung

Seien $a, r \in \mathbb{R}^n$ und r eine Richtung, d.h. $\|r\| = 1$. Eine Funktion $f : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ heißt bei a in Richtung r differentierbar, wenn der Grenzwert

$$\frac{\partial}{\partial r} f(a) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h \cdot r) - f(a)}{h}$$

existiert. Dieser Grenzwert heißt dann die Richtungsableitung von f bei a in Richtung r .

6.5 Die totale Ableitung

6.5.1 Definition totale Ableitung

Sei $f : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ und $a \in G \subseteq \mathbb{R}^n$

- (a) Man nennt f total differentierbar bei a , wenn es eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ gibt, dass bei einer Umgebung U von a gilt:

$$f(x) = f(a) + A(x - a) + r(x)$$

mit

$$\frac{r(x)}{\|x - a\|} \rightarrow \vec{0} \quad (x \rightarrow a)$$

In dem Fall nennen wir A die (totale) Ableitung von f bei a und wir schreiben $f'(a) = A$

(b) Ist $f = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}$ partiell differenzierbar bei a , so heißt

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} f_1(a) & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_n} f_1(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_1} f_m(a) & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_n} f_m(a) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla f_1(a)^T \\ \vdots \\ \nabla f_n(a)^T \end{pmatrix} = \frac{\partial}{\partial x} f(a) = J_f(a)$$

die Jacobi-Matrix von f bei a .

Bemerkung

(a) Wir werden sehen, dass gilt:

$$f \text{ ist in } a \text{ total differenzierbar} \Leftrightarrow f'(a) = J_f(a)$$

(b) Im Fall $m = 1$ gilt also:

$$J_f(a) = \nabla f(a)^T$$

und falls f total differenzierbar ist gilt:

$$f'(a) = \nabla f(a)^T$$

(c) Bedeutung des Skalarprodukts $x, y \in \mathbb{R}^n$

$$x \cdot y := x^T y := \sum_{k=1}^n x_k y_k = \|x\|_2 \|y\|_2 \cos \alpha$$

(d) Definition des Matrix-Vektor-Produktes:

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}, x \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}^m$$

$$A \cdot x = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

6.5.2 Zusammenhang Stetigkeit und Differenzierbarkeit

Ist $f : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ differenzierbar in $a \in G \Rightarrow f$ stetig in a .

6.5.3 Zusammenhang partielle und totale Diffbarkeit

Sei $f : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ und $a \in G$

(a) Ist f total differenzierbar bei a , so gilt:

(a) f ist bei a partiell differenzierbar und

$$f'(a) = \frac{\partial}{\partial x} f(a)$$

(b) f ist bei a in jede Richtung r differenzierbar und

$$\frac{\partial}{\partial r} f(a) = J_f(a) \cdot r$$

(b) Wenn f partiell differenzierbar in a ist und alle partiellen Ableitungen in a stetig sind, so ist f in a differenzierbar.

$$\frac{\partial}{\partial x_n} f(x_n) \text{ stetig in } a \Leftrightarrow f \text{ differenzierbar in } a$$

6.5.4 Kettenregel

Ist $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}^m$ total differenzierbar in $a \in A$ und $g : B \rightarrow \mathbb{R}^l$ total differenzierbar in a . Dann gilt $g \circ f$ ist in a differenzierbar und

$$(g \circ f)' = g'(f(a)) \cdot f'(a)$$

6.5.5 Matrix-Produkt

Für $A \in \mathbb{R}^{m \times k}$, $B \in \mathbb{R}^{k \times n}$ und $C \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ist das Matrix-Produkt $C = A \cdot B$ definiert durch:

$$c_{ij} = \sum_{l=1}^k a_{il} b_{lj}$$

6.6 Extremwerte, Mittelwertsatz

6.6.1 Definition lokales Extrema

(a) Eine Funktion $f : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ besitzt in $x_0 \in G$ ein lokales Minimum (bzw. Maximum), wenn in einer Umgebung von U von x_0 gilt:

$$f(x) \geq f(x_0) \text{ (bzw. } f(x) \leq f(x_0)) \forall x \in U$$

unter einem lokalen Extrema versteht man ein lokales Minimum oder Maximum

(b) f besitzt in x_0 ein globales Minimum (bzw. Maximum), wenn

$$f(x) \geq f(x_0) \text{ (bzw. } f(x) \leq f(x_0)) \forall x \in G$$

6.6.2 Notwendige Bedingung für lokale Extrema

Besitzt $f : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^1(G, \mathbb{R})$ in $x_0 \in \overset{\circ}{G}$ ein lokales Extrema, so gilt:

$$\nabla f(x_0) = 0$$

Bemerkung

Einen Punkt $x_0 \in G$ mit $\nabla f(x_0) = 0$ nennen wir kritischen Punkt oder stationären Punkt.

6.6.3 Mittelwertsatz

Sei $f : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ mit G offen differentierbar und G enthalte die Menge

$$L(a, b) := \overline{ab} := \{a + t \cdot (b - a) \mid t \in [0, 1]\}$$

für $a, b \in G$. Dann existiert ein $\xi \in (0, 1)$ mit

$$f(b) = f(a) + \nabla f(a + \xi(b - a))^T (b - a)$$

6.6.4 Gebiete bzw. kurvenweise zusammenhängende Gebiete

(a) Eine Menge

$$\overline{a_0, a_1, \dots, a_n} := \bigcup_{k=0}^{n-1} \overline{a_k, a_{k+1}}$$

für $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}^m$ heißt Polygonzug

(b) Eine Menge $M \subseteq \mathbb{R}^n$ heißt kurvenweise zusammenhängend, wenn zu $a, b \in M$ stets eine stetige Funktion $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$ existiert mit $\gamma(0) = a$ und $\gamma(1) = b$ (dann ist γ) eine Kurve von a nach b .

(c) Eine Menge $G \subseteq \mathbb{R}^n$ heißt Gebiet, wenn G offen und kurvenweise zusammenhängend ist (keine Inseln).

Bemerkung

Ist G ein Gebiet und $a, b \in G$ dann existiert stets ein Polynomzug, der a und b verbindet und durch G verläuft.

6.6.5 Partielle Ableitung r -ter Ordnung

Für $f : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ definiert man (falls existent) für $x_0 \in G$ und $k_1, \dots, k_r \in \{1, \dots, n\}$ die partielle Ableitung r -ter Ordnung indirekt durch:

$$\frac{\partial^r}{\partial x_{k_1} \dots \partial x_{k_r}} f(x_0) := f_{x_{k_1} \dots x_{k_r}}(x_0) := \begin{cases} \frac{\partial}{\partial x_{k_1}} f(x_0) & \text{falls } r = 1 \\ \frac{\partial}{\partial x_{k_1}} \left(\frac{\partial^{r-1}}{\partial x_{k_2} \dots \partial x_{k_r}} f(x_0) \right) & \text{sonst} \end{cases}$$

existieren alle partiellen Ableitungen der Ordnung r , dann ist f r -mal partiell differentierbar sind diese außerdem stetig, so ist f r -mal stetig partiell differentierbar.

Schreibweise

$C^r(G, \mathbb{R}^m) := \{f : G \rightarrow \mathbb{R}^m \mid f \text{ } r\text{-mal stetig partiell differentierbar}\}$ und $C^r(G) := C^r(G, \mathbb{R}^1)$

6.6.6 Hessematrix

Ist $f : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 2-mal partiell differentierbar bei $a \in G$ so heit

$$H_f(a) := \begin{pmatrix} f_{x_1 x_1}(a) & \cdots & f_{x_1 x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{x_n x_1}(a) & \cdots & f_{x_n x_n}(a) \end{pmatrix} = (\nabla f_{x_1}(a) \quad \cdots \quad \nabla f_{x_n}(a))$$

die Hesse-Matrix von f bei a .

6.6.7 Definitheit

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

(a) Die durch $Q_A(x) := x^T \cdot A \cdot x$ definierte Funktion $Q_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ heit die Quadratische Form von A .

(b) Die Matrix und die Quadratische Form heien:

(a) positiv definit

$$:\Leftrightarrow Q_A(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$$

(b) positiv semidefinit

$$:\Leftrightarrow Q_A(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

(c) negativ definit

$$:\Leftrightarrow Q_A(x) < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$$

(d) negativ semidefinit

$$:\Leftrightarrow Q_A(x) \leq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

(e) indefinit

$$:\Leftrightarrow \exists x, y \in \mathbb{R}^n : Q_A(x) < 0, Q_A(y) > 0$$

6.6.8 Satz von Schwarz

Ist $G \neq \emptyset, f : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 2-mal stetig partiell differentierbar, dann gilt:

$$H_f(x, y) = H_f(y, x)^T$$

6.6.9 Satz von Taylor

Seien $a, b \in G$ (G eine Gebiet mit $G \neq \emptyset$), $f : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbar und $\overline{ab} \subseteq G$. Dann existiert eine $\xi \in (0, 1)$ mit

$$f(b) = f(a) + \nabla f(a)^T(b-a) + \frac{1}{2}(b-a)^T H_f(a + \xi(b-a))(b-a)$$

6.6.10 Hinreichende Bedingung für lokale Extrema

Sei $f \in C^2(U, \mathbb{R})$ mit U eine Umgebung von a und $\nabla f(a) = \vec{0}$ dann gilt:

- (a) Ist $H_f(a)$ positiv definit, so ist bei a ein lokales Minimum
- (b) Ist $H_f(a)$ negativ definit, so ist bei a ein lokales Maximum

6.7 Implizit definierte Funktionen

6.7.1 Bemerkung

Wir betrachten zunächst lineare Funktionen $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ dann lässt sich $f(x)$ darstellen als:

$$f(x) = Ax + b$$

mit $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, b \in \mathbb{R}^m$

6.7.2 Vorläufige Definition Rang einer Matrix

Wir definieren für eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ den Rang vorläufig als die Anzahl der Stufen nachdem mit dem Gauss-Algorithmus die Matrix in Zeilen-Stufenform überführt wurde.

Bemerkung

Allgemein werden wir sehen, dass $Ax = b$ lösbar ist \Leftrightarrow Rang von A gleich Rang von $(A|b)$ gilt. Eindeutig lösbar ist das LGS wenn in der Zeilen-Stufen Form in jeder Zeile eine Stufe anfängt und A quadratisch ist.

6.7.3 Einheitsmatrix und Inverse einer Matrix

Ist $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} I \text{ (Einheitsmatrix)}$$

dann nennt man B die zu A inverse Matrix und schreibt $A^{-1} := B$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} Ax &= b \\ \Leftrightarrow A^{-1} \cdot A \cdot x &= A^{-1} \cdot b \\ \Leftrightarrow I \cdot x &= A^{-1} \cdot b \\ \Leftrightarrow x &= A^{-1} \cdot b \end{aligned}$$

Falls zu einer Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ die Inverse A^{-1} existiert nennt man A regulär.

Bemerkung

Die Menge $G := \{A \in \mathbb{R}^n : A \text{ ist regulär}\}$ ist bezüglich der Matrixmultiplikation eine nicht abelsche Gruppe mit I als neutrales Element und A^{-1} als das zu A (links-) inverse Element.

6.7.4 Zusammenhang Bijektivität und reguläre Matrizen

Für $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ mit $f(x) = A \cdot x + b$ gilt:

$$f \text{ ist bijektiv} \Leftrightarrow A \text{ ist regulär}$$

6.7.5 Satz über die Umkehrfunktion

Sei $f \in C^1(G, \mathbb{R}^n)$ für ein Gebiet $G \subseteq \mathbb{R}^n$ und $x_0 \in G$. Weiter gelte, dass $f'(x_0)$ regulär ist. Dann gibt es eine offene Umgebung U von x_0 ($U \subseteq G$), dass gilt:

- (a) $f(U)$ ist offen und $f'(x)$ ist regulär
- (b) $f : U \rightarrow V$ ist bijektiv und $f^{-1} : V \rightarrow U$ ist aus $C^1(V, U)$
- (c)

$$\frac{d}{dy} f^{-1}(y) = (f'(f^{-1}(y)))^{-1} \quad \forall y \in V$$

6.7.6 Satz über die Gebietstreue

Ist G eine offene Menge in \mathbb{R}^n und $f \in C^1(G, \mathbb{R}^n)$ mit $f'(x)$ ist regulär auf G , so ist auch $f(G)$ ein Gebiet.

6.7.7 Definition Auflösbarkeit

Sei $g : \mathbb{R}^{m+n} \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}$) und $b \in \mathbb{R}^m$. Man nennt die Gleichung

$$g(x, y) = b \text{ mit } x \in \mathbb{R}^n \text{ und } y \in \mathbb{R}^m$$

- (a) Auf $G \in \mathbb{R}^n$ (global) nach y auflösbar, wenn es eine Funktion $f : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ gibt mit $g(x, f(x)) = b \quad \forall x \in G$

- (b) Bei $x_0 \in \mathbb{R}^n$ lokal nach y auflösbar, wenn $g(x, y) = b$ in einer Umgebung von x_0 nach y (global) auflösbar ist.

D.h mit $y_0 := f(x_0)$ existiert die Auflösung $y = f(x)$ mit $g(x, f(x)) = b$ und $y_0 = f(x_0)$ in einer Umgebung von x_0 .

Bemerkung

Allgemein soll auch für nichtlineare Funktionen einfach geprüft werden können ob eine lokale Auflösung nach x oder y existiert.

Wir werden sehen es gilt:

$$\frac{\partial}{\partial x} g|_{x=x_0} \text{ regulär} \Leftrightarrow \text{Es existiert eine lokale Auflösung nach } x \quad (6.1)$$

(Analog für Auflösungen nach y).

6.7.8 Hauptsatz über implizite Funktionen

Sei $x_0 \in \mathbb{R}^n$ und $y_0, b \in \mathbb{R}^m$. Für eine offene Umgebung G von $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$. Sei $g \in C^1(G, \mathbb{R}^m)$ (d.h $g : G \subseteq \mathbb{R}^{m+n} \rightarrow \mathbb{R}^m$ und stetig differentierbar) ist $g(x_0, y_0) = b$ und $\frac{\partial}{\partial y} g(x_0, y_0)$ regulär, so gibt es eine Umgebung U von x_0 und V von y_0 , so dass:

(a)

$$\frac{\partial}{\partial y} g(x, y) \text{ ist regulär } \forall x \in U \text{ und } \forall y \in V$$

- (b) Die Gleichung $g(x, y) = b$ besitzt eine eindeutige Auflösung $f : U \rightarrow V$ mit $y_0 = f(x_0)$ und es gilt:

$$f'(x) = \left(\frac{\partial}{\partial y} g(x, f(x)) \right)^{-1} \cdot \frac{\partial}{\partial x} g(x, f(x)) \forall x \in U$$

(die Auflösung ist also differentierbar)

- (c) Ist $g \in C^r(g, \mathbb{R}^m)$ dann ist $f \in C^r(U, \mathbb{R}^m)$

6.7.9 Extrema unter Nebenbedingungen

$$\begin{cases} x + y \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \rightarrow \max \text{ oder } \min$$

Idee Nebenbedingung nach y auflösen und in Zielfunktion einsetzen

$$1. \ y = \pm \sqrt{1 - x^2}$$

$$\Rightarrow f(x, y) = f(x, \pm \sqrt{1 - x^2}) = \tilde{f}(x) \quad (6.2)$$

2.

$$\tilde{f}(x) \stackrel{!}{=} \tilde{f}^{(k)}(x) \stackrel{!}{=} \dots, \tilde{f}^{(2l)}(x) \stackrel{!}{=} 0 \quad k = 1, \dots, 2 \cdot l - 1$$

Beobachtung Bei den gesuchten Extrema berühren sich die Höhenlinien von f und g

$$\stackrel{\text{Formaler}}{\Rightarrow} \exists \lambda \in \mathbb{R} : \nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$$

Aber die Bedingung ist nicht hinreichend, sondern nur notwendig.
Trotzdem: Die notwendige Bedingung liefert (hoffentlich) eine Endliche Anzahl Kandidaten, diese können einzeln überprüft werden.

6.7.10 Definition lokale Minima/Maxima unter Nebenbedingungen

Seien $f, g_1, \dots, g_m : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ mit G offen gegeben sowie $b_1, \dots, b_m \in \mathbb{R}$. Dann nennt man ein $x_0 \in G$ ein lokales Minimum (bzw. Maximum) von f unter der Nebenbedingung $g_1(x) = b_1 \dots g_m(x) = b_m$ wenn es eine offene Umgebung $U \subseteq G$ von x_0 gibt mit $f(x) \geq f(x_0) \forall x \in U$ und $g_k(x) = b_k$ für $k = 1 \dots m$ (bzw. $f(x) \leq f(x_0) \forall x \in U$).

6.7.11 Definition Linear Unabhängig

Seien $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}^n$ mit $m \in \mathbb{N}$. Dann heißen diese Vektoren linear unabhängig, wenn das lineare Gleichungssystem

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_m a_m = \vec{0}$$

nur die Lösung $\alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0$ besitzt.

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_1 & \dots & a_m \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ansonsten sind die Vektoren linear abhängig.

Bemerkung

Sind a_1, \dots, a_k nicht linear abhängig:

$$\begin{aligned} &\stackrel{\text{Def.}}{\Rightarrow} \exists k \in \{1, \dots, m\} \text{ und Lösung } \alpha_1, \dots, \alpha_m \text{ mit} \\ &\quad \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k + \dots + \alpha_m a_m = 0 \quad \alpha_k \neq 0 \\ &\Rightarrow a_k = -\frac{\alpha_1}{\alpha_k} a_1 \dots - \frac{\alpha_{k-1}}{\alpha_k} a_{k-1} - \frac{\alpha_{k+1}}{\alpha_k} a_{k+1} \dots \end{aligned}$$

d.h. a_k lässt sich aus durch $a_1, \dots, a_{k-1}, a_{k+1}, \dots, a_m$ bestimmen.

6.7.12 Satz von Lagrange

Seien $f, g_1, \dots, g_m \in C^1(U)$ für eine offene Umgebung U von $x_0 \in \mathbb{R}^n$ (wie oben $f, g_1, \dots : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$) und seien $b_1, \dots, b_m \in \mathbb{R}$. Ist x_0 ein lokales Extrema unter der Nebenbedingung $g_k(x) = b_k, k = 1, \dots, m$ und die Vektoren $\nabla g_1(x_0), \dots, \nabla g_m(x_0)$ linear unabhängig.

$$\begin{aligned} \exists \lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R} \quad \text{mit} \quad & \nabla f(x_0) + \lambda_1 \nabla g_1(x_0) + \dots + \lambda_m \nabla g_m(x_0) = \vec{0} \\ \Leftrightarrow & f'(x_0)^T + J_g(x_0)^T \cdot \lambda = \vec{0} \\ \Leftrightarrow & f'(x_0) = -\lambda^T J_g(x_0) \end{aligned}$$

Zudem muss x_0 die Nebenbedingung erfüllen.

6.7.13 Lagrange Funktion

$$\begin{aligned} L(x, \lambda) &= L(x_1, \dots, x_m, \lambda_1, \dots, \lambda_m) := f(x) + \lambda^T (g(x) - b) \\ \Leftrightarrow L'(x, \lambda) &= \left(f'(x) + \lambda^T g'(x), g(x) - b \right) \stackrel{!}{=} \vec{0} \end{aligned}$$

Kapitel 7

Integration in mehreren Veränderlichen

7.1 Parameterintegrale

7.1.1 Eigentliche Parameterintegrale

Sei $f(x, t)$ reel und stetig in $[\alpha, \beta] \times [a, b]$ (also $x \in [\alpha, \beta], t \in [a, b]$). Dann gilt für

$$F(x) := \int_a^b f(x, t) \, dt$$

- (a) F ist stetig auf $[\alpha, \beta]$
- (b) Ist f_x stetig in $[\alpha, \beta] \times [a, b]$, so ist $F \in C^1([\alpha, \beta])$ und $F'(x) = \int_a^b f_x(x, t) \, dt$
- (c) Satz von Fubini:

$$\int_{\alpha}^{\beta} F(x) \, dx = \int_{\alpha}^{\beta} \int_a^b f(x, t) \, dt \, dx = \int_a^b \int_{\alpha}^{\beta} f(x, t) \, dx \, dt$$

7.1.2 Leibniz Regel

Seien $f(x, t), f_x(x, t)$ stetig in $[\alpha, \beta] \times [a, b]$ und $u, v \in C^1([a, b])$. Dann ist

$$F(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(x, t) \, dt \in C^1([a, b])$$

und

$$F'(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f_x(x, t) \, dt + f(x, v(x))v'(x) - f(x, u(x))u'(x)$$

7.1.3 Uneigentliche Parameterintegrale

Ist für jedes $x \in M \subseteq \mathbb{R}$ ein uneigentliches Integral

$$\int_a^b f(x, t) \, dt$$

mit kritischem Punkt a oder b gegeben, so heißt dieses gleichmäßig konvergent in M , wenn gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists L \in (a, b) : \left| \int_{T_1}^{T_2} f(x, t) \, dt \right| < \varepsilon \quad \forall x \in M \quad \forall T_1, T_2 \in (a, L) \text{ (bzw. } \forall T_1, T_2 \in (L, b))$$

7.1.4 Majorantenkriterium

Ein uneigentliches Integral $\int_a^b f(x, t) \, dt$ konvergiert gleichmäßig in M wenn ein konvergentes Integral

$$\int_a^b g(t) \, dt \text{ ex. mit } |f(x, t)| \leq g(t)$$

7.1.5 Fubini für uneigentliche Parameterintegrale

Ist $f(x, t)$ stetig in $[\alpha, \beta] \times [a, b]$ und konvergiert

$$F(x) = \int_a^b f(x, t) \, dt$$

gleichmäßig auf $[\alpha, \beta]$ dann ist F stetig und

$$\int_{\alpha}^{\beta} \int_a^b f(x, t) \, dt \, dx = \int_a^b \int_{\alpha}^{\beta} f(x, t) \, dx \, dt$$

7.1.6 Konvergenzkriterien

Sind $f(x, t), f_x(x, t)$ stetig auf $[\alpha, \beta] \times [a, b]$ und ist

$$\int_a^b f(x, t) \, dt$$

für ein $x_0 \in [\alpha, \beta]$ konvergent und ist

$$\int_a^b f_x(x, t) \, dt$$

gleichmäßig konvergent. Dann gilt:

$$F(x) = \int_a^b f(x, t) \, dt \quad \forall x \in [\alpha, \beta]$$

und

$$F'(x) = \int_a^b f_x(x, t) \, dt \quad \forall x \in (\alpha, \beta)$$

existiert und ist stetig.

7.2 Kurvenintegrale

7.2.1 Äquivalenz für Kurven

Zwei stetige Funktionen $x : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n, y : [\alpha, \beta] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißen Äquivalent (schreibweise $x \sim y$), wenn eine streng monoton wachsende Funktion

$$\phi : [a, b] \rightarrow [\alpha, \beta]$$

gibt mit

$$x(t) = y(\phi(t)) \quad \forall t \in [a, b]$$

Bemerkung

Es gilt:

- (a) $x \sim x$ (Reflexivität)
- (b) $x \sim y \Rightarrow y \sim x$ (Symmetrie)
- (c) $x \sim y \wedge y \sim z \Rightarrow x \sim z$ (Transitivität)

7.2.2 Kurven im \mathbb{R}^n

Ist $x : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig, so nennt man die Menge

$$\mathbb{K} := \{y : [\alpha, \beta] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ mit } x \sim y\}$$

die Kurve \mathbb{K} mit Parameterdarstellung x und den Punkt $x(a)$ Anfangspunkt und $x(b)$ Endpunkt.

Schreibweise

$$\mathbb{K} : x(t), a \leq t \leq b$$

Die Menge

$$T(\mathbb{K}) := \{x(t) : t \in [a, b]\} = x([a, b])$$

nennt man den Träger der Kurve \mathbb{K} .

Bemerkung

Verschieden Kurven können also den gleichen Träger haben.

Man nennt K :

- (a) Geschlossen, wenn $x(a) = x(b)$
- (b) Einfach oder Jordankurve, wenn $x(t) \neq x(s) \forall t, s : a \leq t < s < b$

7.2.3 Eigenschaften von Parameterdarstellungen

- (a) Eine Parameterdarstellung $x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ einer Kurve heißt stückweise stetig differentierbar, wenn eine Zerlegung

$$T : a = t_0 < \dots < t_k = b \quad (7.1)$$

existiert und x auf (t_l, t_{l+1}) $l \in \{0, \dots, k-1\}$ differentierbar ist.

- (b) Besitzt eine Kurve \mathbb{K} eine (stückweise) stetig differentierbare Parameterdarstellung $x(t), t \in [a, b]$ mit $\dot{x}(t) \neq \vec{0}$ für $t \in [a, b]$ so heißt \mathbb{K} stückweise glatt oder stückweise regulär.
- (c) Ist eine Parameterdarstellung x von \mathbb{K} differentierbar und glatt, so heißt

$$T(t) := \frac{\dot{x}(t)}{\|\dot{x}(t)\|}$$

der Tangential (einheits) vektor von x und \mathbb{K}

- (d) Ist auch T differentierbar und glatt (also $\dot{T}(t) \neq \vec{0}$) so heißt

$$N(t) := \frac{\dot{T}(t)}{\|\dot{T}(t)\|}$$

der (Haupt-) Normalen (einheits) vektor von \mathbb{K} und x bei t

- (e) Und falls $n = 3$

$$B(t) = T(t) \times N(t)$$

der Binormalen (einheits) vektor von \mathbb{K} und x bei t (Man nennt dann $T(t), N(t), B(t)$ ein begleitendes Dreibein von \mathbb{K})

- (f) Existiert $T(t)$, so nennt man die Gerade

$$\{x(t) + \lambda \dot{x}(t) : \lambda \in \mathbb{R}\}$$

die Tangente von \mathbb{K} bei t

- (g) Existiert auch $N(t)$ so nennt man die Ebene

$$\{x(t) + \lambda \dot{x}(t) + \mu \ddot{x}(t) : \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$$

die Schmiegeebene von \mathbb{K} bei t .

Bemerkung

Sei $x(t) = y(\phi(t))$ mit $a \leq t \leq b$ zwei Parameterdarstellungen von x . Dann gilt:

$$T(t) = \frac{\dot{x}(t)}{\|\dot{x}(t)\|} = \frac{\dot{y}(\phi(t)) \cdot \dot{\phi}(t)}{\|\dot{y}(\phi(t)) \cdot \dot{\phi}(t)\|} = \frac{\dot{y}(\phi(t))}{\|\dot{y}(\phi(t))\|}$$

Das heißt die Berechnung von T ist unabhängig von der konkreten Parameterdarstellung

Existiert $N(t)$ dann gilt:

$$N(t) \perp T(t)$$

Existiert auch $B(t)$ (im \mathbb{R}^3), dann gilt: $N(t), T(t), B(t)$ sind paarweise Orthogonal.

7.2.4 Weitere Definitionen zu Kurven

(a) Ist $\mathbb{K} : x(t), a \leq t \leq b$ eine Kurve, so heißt:

$$-\mathbb{K} : y(t), a \leq t \leq b \text{ mit } y(t) = x(a + b - t)$$

die zu \mathbb{K} entgegengesetzte Kurve

(b) Sind $\mathbb{K} : x(t), a \leq t \leq b$ und $\mathbb{L} : y(t), \alpha \leq t \leq \beta$ zwei Kurven und gilt $x(b) = y(\alpha)$ dann ist

$$\mathbb{K} + \mathbb{L} : z(t), a \leq t \leq (\beta - \alpha) + b$$

und

$$z(t) = \begin{cases} x(t) & , a \leq t \leq b \\ y(t - b + \alpha) & , b \leq t \leq (\beta - \alpha) + b \end{cases}$$

die aus \mathbb{K} und \mathbb{L} zusammengesetzte Kurve.

7.2.5 Kurventintegrale 2. Art

Sei \mathbb{K} eine Kurve im \mathbb{R}^n und

$$f : T(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{R}^n$$

(a) Sei $x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung von \mathbb{K}

(i) Für eine Zerlegung $T : a = t_0 < \dots < t_n = b$, Zwischenpunkte $Z : (\xi_1, \dots, \xi_n)$ mit $t_{k-1} \leq \xi_k \leq t_k$ heißt

$$S(f, x, T, Z) := \sum_{k=1}^n f(x(\xi_k)) \cdot (x(t_k) - x(t_{k-1}))$$

die Riemann-Summe von f, T, Z bezüglich x .

- (ii) Existiert eine Zahl $I \in \mathbb{R}$ derart, dass für jede Folge von Zerlegungen T_n mit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(T_n) = 0$$

stets

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S(f, x, T_n, Z_n) = I$$

folgt, so heißt I das Kurvenintegral (2. Art) von f längs \mathbb{K} bzgl. x .

- (b) Gibt es stets ein I wie in (a) so heißt f längs \mathbb{K} (Riemann-) integrierbar und man nennt I das (unbestimmte) Kurvenintegral von f längs \mathbb{K} und schreibt:

$$I = \int_{\mathbb{K}} f = \int_{\mathbb{K}} f(x) \cdot dx = \int_{\mathbb{K}} f_1(x) dx_1 + \cdots + f_n(x) dx_n$$

7.2.6 Substitutionsregel

Ist $\mathbb{K} : x(t), a \leq t \leq b$ eine Kurve im \mathbb{R}^n und $x(t)$ stückweise differentierbar, sowie $f : T(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig, so ist f längs \mathbb{K} integrierbar und es gilt:

$$\int_{\mathbb{K}} f(x) dx = \int_a^b f(x(t)) dx(t) = \int_a^b f(x(t)) \cdot \dot{x}(t) dt$$

7.2.7 Definition Wegunabhängigkeit

Sei $f \in C(G, \mathbb{R}^n)$ mit $G \subseteq \mathbb{R}^n$ ein Gebiet:

- (a) Gilt für zwei Wege \mathbb{K} und \mathbb{L} mit gleichem Anfangs- und Endpunkt stets

$$\int_{\mathbb{K}} f = \int_{\mathbb{L}} f$$

dann heißen die Kurvenintegrale Wegunabhängig in G .

- (b) Eine Funktion $F \in C^1(G, \mathbb{R})$ heißt Stammfunktion von f in G , wenn

$$\nabla F(x) = f(x) \quad \forall x \in G$$

gilt.

- (c) Man nennt

$$P := -F$$

das Potential von f .

- (d) Man nennt f konservativ in G oder ein Potentialfeld oder Gradientenfeld in G , wenn f eine Stammfunktion hat.

7.2.8 1. Hauptsatz für Kurvenintegral

Sei f konservativ in G mit Stammfunktion F und Potential P dann gilt für jeden Weg \mathbb{K} in G mit Anfangspunkt $A \in G$ und Endpunkt $B \in G$:

$$\int_{\mathbb{K}} f = F(B) - F(A) = P(A) - P(B)$$

insbesondere ist also das Integral wegunabhängig.

7.2.9 Äquivalente Aussagen zu Stammfunktionen

(a)

$$\int_{\mathbb{K}} f \text{ ist wegunabhängig in } G$$

(b) f besitzt eine Stammfunktion

(c)

$$\int_{\mathbb{K}} f = 0 \text{ für jede geschlossene Kurve } \mathbb{K}$$

Bemerkung

Rechenregeln für zwei Kurven \mathbb{K} und \mathbb{L} :

(a)

$$\int_{\mathbb{K}+\mathbb{L}} f = \int_{\mathbb{K}} f + \int_{\mathbb{L}} f$$

(b)

$$\int_{-\mathbb{K}} f = - \int_{\mathbb{K}} f$$

7.2.10 Definition einfach zusammenhängende Gebiete

Ein Gebiet $G \subseteq \mathbb{R}^n$ heißt einfach zusammenhängend, wenn sich jede geschlossene Kurve in G innerhalb von G „auf einen beliebigen Punkt zusammenziehen lässt“.

7.2.11 Sternförmige Gebiete

Eine Menge $G \subseteq \mathbb{R}^n$ heißt Sternförmig bezüglich $x_0 \in G$, wenn für alle $x \in G$ gilt, dass $\overline{x_0 x} \subseteq G$ (d.h. jedes x ist von x_0 durch einen Streckenzug erreichbar). G ist ein sternförmiges Gebiet, wenn G offen und sternförmig ist.

Bemerkung

$$G \text{ sternförmig} \Rightarrow G \text{ einfach zusammenhängend}$$

7.2.12 2. Hauptsatz für Kurvenintegrale

Sei $f \in C^1(G, \mathbb{R}^n)$, $G \subseteq \mathbb{R}^n$ ein Gebiet, dann gilt:

- (a) Besitzt f eine Stammfunktion in G , so erfüllt f in G die Integrabilitätsbedingung:

$$\frac{\partial f_l}{\partial x_k} = \frac{\partial f_k}{\partial x_l} \quad k, l \in \{1, \dots, n\}$$

D.h. die Jacobi-Matrix von f ist symmetrisch.

Kurz:

$$f \text{ hat Stammfunktion} \Rightarrow f' = (f')^T$$

- (b) Ist G einfach zusammenhängend und erfüllt f die Integrabilitätsbedingung dann besitzt f eine Stammfunktion.

Kurz:

$$G \text{ einfach zusammenhängend} \wedge f' = (f')^T \Rightarrow \exists F : \nabla F = f$$

7.2.13 Definition Rotation

Sei $G \subseteq \mathbb{R}^3$ offen und $f : G \rightarrow \mathbb{R}^3$ partiell differentierbar, dann heißt die Funktion $\text{rot } f : G \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit

$$\text{rot } f(x) := \begin{pmatrix} \frac{\partial f_3}{\partial x_2} - \frac{\partial f_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial f_1}{\partial x_3} - \frac{\partial f_3}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \end{pmatrix}$$

die Rotation von f in G .

Bemerkung

Im Fall $f : G \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definiert man

$$\text{rot } f(x_1, x_2) = \frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2}$$

Formal betrachtet man die Hilfsfunktion

$$\tilde{f}(x, y, z) := \begin{pmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \\ 0 \end{pmatrix}$$

7.2.14 Zusammenhang Rotation und Integrabilitätsbedingung

Ist $f \in C^1(G, \mathbb{R}^3)$, G ein Gebiet, dann gilt

- (a) f besitzt eine Stammfunktion $\Rightarrow \text{rot } f = \vec{0}$
 (b) G einfach zusammenhängend und $\text{rot } f = \vec{0} \Rightarrow f$ hat Stammfunktion.

7.2.15 Definition Linienintegral/Kurvenintegral 1. Art

Sei $\mathbb{K} : x(t), a \leq t \leq b$ ein Weg, und x stückweise differentierbar. Für ein $\phi \in C(T(\mathbb{K}), \mathbb{R})$ heißt

$$\int_{\mathbb{K}} \phi \, ds := \int_a^b \phi(x(t)) \|\dot{x}(t)\| \, dt$$

ein Linienintegral oder Kurvenintegral 1. Art von ϕ längs \mathbb{K} .

Bemerkung

(a) Mit $\phi \equiv 1$:

$$\int_{\mathbb{K}} 1 \, ds = \int_a^b \phi(x(t)) \|\dot{x}(t)\| \, dt = \int_a^b \|\dot{x}(t)\| \, dt = l(\mathbb{K})$$

d.h. mit Linienintegralen können auch Weglängen berechnet werden, bzw. Weglängen berechnet man mit $\phi = 1$.

(b) $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ wähle $\mathbb{K} : x(t) = a + t \cdot (b - a) \, t \in [0, 1]$:

$$\int_{\mathbb{K}} \phi \, ds = \int_0^1 \phi(a + t \cdot (b - a)) \|b - a\| \, dt = \int_a^b \phi(t) \, dt$$

(c) Linienintegrale hängen nicht von der Parameterdarstellung ab.

(d) Man schreibt (falls Parameter-Darstellung bekannt ist) oft

$$ds = \|\dot{x}(t)\| \, dt$$

und nennt ds Bogensegment oder Liniensegment.

(e) Ist $f \in C(T(\mathbb{K}), \mathbb{R}^n)$ und $\dot{x}(t) \neq \vec{0} \, \forall t \in [a, b]$, dann ist:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{K}} f &= \int_{\mathbb{K}} f(x) \, dx = \int_a^b f(x(t)) \dot{x}(t) \, dt \\ &= \int_a^b \frac{f(x(t)) \dot{x}(t)}{\|\dot{x}(t)\|} \|\dot{x}(t)\| \, dt \\ &= \int_a^b f(x(t)) \cdot T(t) \|\dot{x}(t)\| \, dt \\ &= \int_{\mathbb{K}} \phi \, ds \text{ mit } \phi(t) = f(x(t)) \cdot T(t) \end{aligned}$$

7.3 Bereichsintegrale

Hier: $f : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ und

$$\int_G f = \int_G f(x_1, \dots, x_n) \, d(x_1, \dots, x_n)$$

sollen anschaulich bedeuten:

Welches Volumen schließt der Graph von f mit der Grundfläche G ein.

7.3.1 Intervalle im \mathbb{R}^n

Für $a, b \in \mathbb{R}^n$ bezeichnet die Menge

$$[a, b] := [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]$$

einen (kompakten) Quader oder (kompaktes) Intervall im \mathbb{R}^n . Die Zahl

$$V([a, b]) = \begin{cases} \prod_{k=1}^n (b_k - a_k) & , \text{ falls } b_k > a_k \text{ für } k = 1, \dots \\ 0 & , \text{ sonst} \end{cases}$$

bezeichnet das Volumen, und die Zahlen $b_1 - a_1, \dots, b_n - a_n$ als Kantenlängen.

7.3.2 Definition Zerlegung

Ist $[a, b] = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]$ und ist für jedes $k \in \{1, \dots, n\}$ mit

$$T^{(k)} : a_k = x_0 < \dots < x_{l_k} = b_k$$

eine Zerlegung von $[a_k, b_k]$ dann heißt die Menge

$$I_{l_1, \dots, l_n} = [x_{l_1-1}^{(1)} - x_{l_1}^{(1)}] \times \dots \times [x_{l_n-1}^{(n)} - x_{l_n}^{(n)}]$$

mit $l_k \in \{1, \dots, l_k\}$ für $k \in \{1, \dots, n\}$ eine Zerlegung T von $[a, b]$.

Das Feinheitsmaß von T ist

$$\mu(T) = \max_{l_1, \dots, l_n} V(I_{l_1, \dots, l_n})$$

Allgemein ist ein Intervall von der Form

$$[x_i^{(1)}, x_{i+1}^{(1)}] \times [x_j^{(2)}, x_{j+1}^{(2)}]$$

mit $i \in \{0, \dots, l_1 - 1\}$ und $j \in \{0, \dots, l_2 - 1\}$.

7.3.3 Definition Riemann-Summe

Sei T eine Zerlegung eines kompakten Quaders $I \subseteq \mathbb{R}^n$ mit Teilquadrern I_1, \dots, I_l mit $l = l_1 \cdot \dots \cdot l_n$ (entstehen indem man die Zerlegungsintervalle fortlaufend durchnummeriert) und Zwischenpunkte $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_l)$ mit $\xi_i \in I_i (i \in \{1, \dots, n\})$ und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ (d.h. Skalarwertige Funktion). Dann heißt

$$S(f, T, \xi) = \sum_{i=1}^l f(\xi_i) \mu(I_i)$$

die Riemann-Summe von f bezüglich T und ξ .

7.3.4 Riemann integrierbare Bereichsintegrale

Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, $I \subseteq \mathbb{R}^n$ ein Quader. Gibt es eine Zahl $\alpha \in \mathbb{R}$, so dass für jede Folge von Zerlegungen $(T_k)_{k=1}^\infty$ mit Zwischenpunkten $(\xi_k)_{k=1}^\infty$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} \mu(T_k) = 0$ die Riemann-Summe $S(f, T_k, \xi_k)$ gegen α konvergiert für $k \rightarrow \infty$ dann heißt f Riemann integrierbar über I und α nennen wir das Bereichsintegral von f über I .

Schreibweise

$$\alpha = \int_I f(x) \, dx$$

Zur Schreibweise: z.B. $n = 2$ auch:

$$\alpha = \iint_I f(x, y) \, d(x, y) := \int_I f(x, y) \, d(x, y)$$

oder Angabe von I an dem Integral:

$$\alpha = \int_{[a_1, b_1] \times [a_2, b_2]} f(x, y) \, d(x, y)$$

7.3.5 Bereichsintegrale über beschränkte Mengen

Sei $M \subseteq \mathbb{R}^n$ beschränkt und $I = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]$ ein Quader mit $M \subseteq I$. Dann heißt $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ über M integrierbar wenn die Funktion

$$\tilde{f} : I \rightarrow \mathbb{R} \text{ mit } \tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & , x \in M \\ 0 & , \text{sonst} \end{cases}$$

über I Bereichs-Riemann integrierbar ist. Wir definieren:

$$\int_M f(x) \, dx = \int_I \tilde{f}(x) \, dx$$

7.3.6 Cavalieri

Sei $M \subseteq \mathbb{R}^n (n > 1)$ und bezeichne

$$M' = \{x \in \mathbb{R} : (x, y)^T \in M \text{ für ein } y \in \mathbb{R}^{n-1}\}$$

und für $x \in M'$

$$M(x) = \{y \in \mathbb{R}^{n-1} : (x, y) \in M\}$$

dann gilt für $f \in C(\bar{M})$ (falls $M, M', M(x)$ sogenannte messbare Mengen sind, d.h. $\mu(M), \mu M', \mu M(x)$ sind definiert)

$$\int_M f(x, y) \, d(x, y) = \int_{M'} \left[\int_{M(x)} f(x, y) \, dy \right] dx$$

mit $x \in \mathbb{R}$ und $y \in \mathbb{R}^{n-1}$.

7.3.7 Fubini

Im Fall $n = 2$ steht nach Cavalieri ein Parameterintegral und mit Fubini gilt:

$$\int_{M'} \int_{M(x)} f(x, y) \, dy \, dx = \int_{\tilde{M}'} \int \tilde{M}(y) f(x, y) \, dx \, dy$$

wobei $\tilde{M}', \tilde{M}(y)$ analog zu $M', M(x)$ bezüglich y definiert sind.

7.3.8 Definition Meßbare-Mengen

Eine beschränkte Menge $M \subseteq \mathbb{R}^n$ heißt (Jordan-) meßbar, wenn

$$\int_M 1 \, dx$$

existiert, in diesem Fall nennt man

$$\mu(M) := \int_M 1 \, dx$$

das Volumen von M . Ist $\mu M = 0$, so nennt man M eine Nullmenge.

7.3.9 Definition 2×2 Determinante

Für

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

definieren wir die Funktion

$$\det : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}$$

durch $A \mapsto \det(A) = a \cdot d - c \cdot b$ und nennen die Funktionsauswertung die Determinante von A .

7.3.10 Mehrdimensionale Substitutionsregel

Sei $M \subseteq \mathbb{R}^n$ meßbar und $G \supseteq M$ ein Gebiet. Ist $T \in C^1(G, \mathbb{R}^m)$ und gilt $\det(T'(x)) \neq 0 \forall x \in M \setminus N$ für eine Nullmenge N , dann gilt:

$$\int_{T(M)} f(x_1, \dots, x_n) \, d(x_1, \dots, x_n) = \int_M f(T(u_1, \dots, u_n)) |\det(T'(u_1, \dots, u_n))| \, d(u_1, \dots, u_n)$$

7.4 Integralsätze in der Ebene

7.4.1 Positiv berandete Menge

Eine beschränkte Menge $B \subseteq \mathbb{R}^2$ heißt positiv berandet durch einen Weg, (Randkurve) \mathbb{K} , wenn $T(\mathbb{K}) = \partial B$ ist und wenn \mathbb{K} eine stückweise stetig differenzierbare Parameterdarstellung $x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ hat mit:

- (i) $\dot{x}(t) \neq 0$ für fast alle $t \in [a, b]$
- (ii) der Normalenvektor von $x(t)$ zeigt nach außen

7.4.2 Satz von Green

Ist $B \subseteq \mathbb{R}^2$ positiv berandet, dann gilt für alle $f \in C^1(B, \mathbb{R}^2)$

$$\iint_B \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} \, d(x, y) = \int_{\partial B} f(x, y) \, d(x, y)$$

7.4.3 Definition Normalbereiche

Eine Menge $B \subseteq \mathbb{R}^2$ heißt Normalbereich bezüglich der x -Achse (bzw. y -Achse), wenn es ein Intervall $[a, b]$ gibt und die Funktion φ, ψ mit

$$B = \{(x, y)^T : a \leq x \leq b, \phi(x) \leq y \leq \psi(x)\}$$

7.4.4 Gauß'sche Integralsätze in der Ebene

Sei $B \subseteq \mathbb{R}^2$ ein positiv berandeter Bereich und $f \in C^1(B, \mathbb{R}^2)$ bzw. $f \in C^2(B, \mathbb{R}^2)$ und bezeichne ν die nach außen gerichtete Normale auf ∂B . Dann gelten die Integralsätze:

(i)

$$\iint_B (\operatorname{div} f)(x, y) \, d(x, y) = \int_{\partial B} f \cdot \nu \, ds$$

(ii)

$$\iint_B f_1(x, y) \Delta f_2(x, y) - f_2(x, y) \Delta f_1(x, y) \, d(x, y) = \int_{\partial B} f_1 \frac{\partial f_2}{\partial \nu} - f_2 \frac{\partial f_1}{\partial \nu}$$

7.5 Oberflächenintegrale und Integralsätze im \mathbb{R}^3

7.5.1 Definition Reguläre Flächen

Sei $B \subseteq \mathbb{R}^2$ und $x : B \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$x(u, v) = \begin{pmatrix} x_1(u, v) \\ x_2(u, v) \\ x_3(u, v) \end{pmatrix}$$

eine stetig diffbare Funktion, für die $x_u = \frac{\partial x}{\partial u}$ und $x_v = \frac{\partial x}{\partial v}$ linear unabhängig sind (d.h. die Vektoren x_u und x_v zeigen nicht in die gleiche oder entgegengesetzte Richtung) (für fast alle $(u, v)^T \in B$) die Menge der Ausnahmen muss $\tilde{B} \subseteq B$ muss $\mu \tilde{B} = 0$ erfüllen.

Das Bild einer solchen Funktion, d.h. die Menge

$$A = x(B) := \{x(u, v) | (u, v)^T \in B\}$$

heißt dann eine reguläre Fläche im \mathbb{R}^3 und die Funktion x heißt die Parametrisierung von A .

Man nennt

- (i) $x_u(u, v), x_v(u, v)$ die Tangentialvektoren in $(u, v)^T$
- (ii) $n(u, v) := \frac{(x_u \times x_v)(u, v)}{\|(x_u \times x_v)(u, v)\|}$
 - Vektor mit Länge 1 der Senkrecht auf den Tangentialvektoren steht
 - Rechnerisch zu erhalten durch das Kreuzprodukt der Tangentialvektoren

der (Flächen-) Normalenvektor in $(u, v)^T$ falls $x_u(u, v)$ und $x_v(u, v)$ linear unabhängig sind.

Ist B positiv berandet durch $\mathbb{K} : y(t), a \leq t \leq b$ so nennt man A positiv berandet durch Kurve mit Parameterdarstellung $x(y(t)), a \leq t \leq b$.

7.5.2 Definition Oberflächenintegral

Sei A eine reguläre Fläche im \mathbb{R}^3 mit Parameterdarstellung $x : B \rightarrow \mathbb{R}^3, B \subseteq \mathbb{R}^2$ meßbar und x injektiv auf $B \setminus N$ für eine Nullmenge N .

- (a) Für jedes $f \in C(A, \mathbb{R})$ heißt

$$\iint_A f \cdot d\sigma = \iint_B f(x(u, v)) \cdot \|(x_u \times x_v)(u, v)\| \, d(u, v)$$

das Oberflächenintegral von f über A und man nennt

$$d\sigma = \|(x_u \times x_v)(u, v)\| \, d(u, v)$$

das Oberflächenelement.

- (b) $O(A) := \iint_A 1$ heißt Oberflächeninhalt von A .

Bemerkung

1. Das Oberflächenintegral hängt nicht von der Parameterdarstellung ab.
2. Ein Summand des Oberflächeintegrals sieht so aus:

$$f(x(u, v)) \cdot \|(x_u \times x_v)(u, v)\| \cdot \Delta u \Delta v$$

7.5.3 Satz von Stokes

Sei A eine reguläre Fläche im \mathbb{R}^3 und ∂A positiv berandet. Dann gilt für $f \in C^1(A, \mathbb{R}^3)$

$$\iint_A \operatorname{rot} f \cdot n \, do = \int_{\partial A} f$$

Mit n :

- (i) Normalenvektor
- (ii) Länge 1
- (iii) Senkrecht auf Fläche
- (iv) Immer auf der gleichen Seite von A

also

$$\iint_B \operatorname{rot}(f(x(u, v))) \cdot n(x(u, v)) \cdot \|(x_u \times x_v)(u, v)\| \, d(u, v) = \int_{\partial A} f$$

mit

$$n(x(u, v)) = \pm \frac{(x_u \times x_v)(u, v)}{\|(x_u \times x_v)(u, v)\|}$$

7.5.4 Divergenzsatz von Gauß

Sei $M \subseteq \mathbb{R}^3$ kompakt und ∂M ergebe sich als endliche Vereinigung von regulären Flächen, deren Normale n (normiert) nach Außen zeigt. Dann gilt für jedes $f \in C^1(M, \mathbb{R}^3)$

$$\iiint_M \operatorname{div} f = \iint_{\partial M} f \cdot n \, do$$

Kapitel 8

Lineare Algebra

8.1 Der Begriff Vektorraum

8.1.1 Definition Vektorraum

Gegeben sei eine abelsche Gruppe V und ein Körper \mathbb{K} (bei uns wird $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ gelten) und eine Abbildung:

$$\cdot : \mathbb{K} \times V \rightarrow V, (\alpha, x) \mapsto \alpha \cdot x =: \alpha x \text{ (Skalierung)}$$

Dann nennt man V einen Vektorraum über \mathbb{K} , wenn die folgenden Vektorraumaxiome erfüllt sind:

- (V1) $\alpha \cdot (\beta \cdot v) = (\alpha \cdot \beta) \cdot v$ (Assoziativgesetz)
- (V2) $\alpha \cdot (x + y) = (\alpha \cdot x) + (\alpha \cdot y) = \alpha x + \alpha y$
 $(\alpha + \beta) \cdot x = \alpha x + \beta x$ (Distributivgesetzte)
- (V3) $1 \cdot x = x$ für die $1 \in \mathbb{K}$ (Gesetz der Eins)

In einem Vektorraum V über \mathbb{K} nennt man Elemente aus V Vektoren, die Elemente aus \mathbb{K} Skalare, \mathbb{K} den Skalarkörper und „ \cdot “ die Multiplikation mit Skalaren. Die „ $+$ “ Verknüpfung in V die V die Vektoraddition und das neutrale Element $\vec{0} \in V$ den Nullvektor.

8.1.2 Rechenregeln

Ist V ein Vektorraum über \mathbb{K} , so gilt für $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ und $x, y \in V$:

1. (a) $0 \cdot x = \vec{0} = \alpha \vec{0}$
(b) $\alpha \cdot x = \vec{0} \Rightarrow \alpha = 0 \vee x = \vec{0}$

2.

$$\alpha(-x) = (-\alpha)x = -(\alpha x)$$

8.2 Unterräume

8.2.1 Definition Unterraum

Eine Teilmenge U eines Vektorraums V über \mathbb{K} heißt Unterraum von V , wenn U bezüglich der in V definierten Vektoraddition und Skalierung ein Vektorraum ist.

8.2.2 Unterraumkriterien

Für $U \subseteq V$ und $U \neq \emptyset$ sind folgende Aussagen äquivalent

(a) U ist ein Unterraum von V

(b)

$$x, y \in U, \alpha, \beta \in \mathbb{K} \Rightarrow \alpha x + \beta y \in U$$

(c)

$$(x, y \in U \Rightarrow x + y \in U) \wedge (\alpha \in K, x \in U \Rightarrow \alpha x \in U)$$

8.2.3 Durchschnitt von Unterräumen

Der Durchschnitt von Unterräumen ist wieder ein Unterraum, d.h.:

$$U_i \text{ } i \in J \text{ (} J \text{ eine Indexmenge) sind Unterräume} \Rightarrow \bigcap_{i \in J} U_i \text{ ist Unterraum}$$

8.2.4 Definition lineare Hülle

- Ist M eine beliebige Teilmenge eines Vektorraums. Dann heißt

$$\text{span}(M) := \bigcap_{U \in S} U \text{ mit } S := \{U \subseteq V : U \text{ ist Unterraum, } U \supseteq M\}$$

der von M aufgespannte Unterraum oder die lineare Hülle von M .

- Ist U ein Unterraum und $M \subseteq V$ mit $\text{span}(M) = U$, dann heißt M ein erzeugendes System von U .

Bemerkung

1. $\text{span}(M)$ ist der kleinste Unterraum, der M enthält
2. $\text{span}(\emptyset) = \vec{0}$
3. $M \subseteq N \Rightarrow \text{span}(M) \subseteq \text{span}(N)$
4. Ist U ein Unterraum, dann gilt $U = \text{span}(U) = \text{span}(U \setminus \{\vec{0}\})$

8.2.5 Definition Linearkombination

Ist V ein Vektorraum über \mathbb{K} und $x_1, \dots, x_n \in V, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ dann heißt

$$\sum_{k=1}^n \alpha_k x_k \in V$$

eine Linearkombination von x_1, \dots, x_n (mit Koeffizienten $\alpha_1, \dots, \alpha_n$).

8.2.6 Zusammenhang lineare Hülle — Linearkombination

Sei V ein Vektorraum über \mathbb{K} und $M \subseteq V$, dann gilt $\text{span } M$ ist die Menge aller Linearkombinationen, d.h.

$$\text{span}(M) = \{\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n \mid x_1, \dots, x_n \in M, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}\}$$

im Fall $M = \{x_1, \dots, x_n\}$ gilt:

$$\text{span}(M) = \{\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n \mid \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}\}$$

8.3 Lineare Unabhängigkeit

8.3.1 Definition Lineare Unabhängigkeit

Sei V ein Vektorraum über \mathbb{K}

- (a) Eine endliche Liste $a_1, \dots, a_n \in V$ heißt linear unabhängig (l.u.), wenn gilt

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n = \vec{0} \Rightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$$

Andernfalls heißen a_1, \dots, a_n linear abhängig (l.a.).

- (b) Eine beliebige Teilmenge $M \subseteq V$ heißt linear unabhängig, wenn für eine beliebige endliche Liste $a_1, \dots, a_n \in M$ gilt, dass diese linear unabhängig sind. Andernfalls ist M linear abhängig.

8.3.2 Rechenregeln für lineare Unabhängigkeit

Für Vektoren $a, a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ eines Vektorraumes V gilt:

- (a)

$$a \text{ l.u.} \Leftrightarrow \{a\} \text{ l.u.} \Leftrightarrow a \neq \vec{0}$$

Bemerkung:

a_1, a_2 mit $a_1 = a_2$ ist linear unabhängig, aber $M = \{a, a\} = \{a\}$ ist nur dann linear abhängig wenn $a = \vec{0}$.

- (b) a_1, \dots, a_n linear abhängig $\Rightarrow a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_k$ sind linear abhängig für $k \geq 0$.

- (c) a_1, \dots, a_n linear unabhängig $\Rightarrow a_1, \dots, a_k$ linear unabhängig für $k \leq n$
- (d) a_1, \dots, a_n linear unabhängig $\Rightarrow a_1, \dots, a_n$ sind paarweise verschieden
- (e) Für $n \geq 2$ sind a_1, \dots, a_n genau dann linear abhängig, wenn ein Vektor als Linearkombination darstellbar ist. D.h.:

$$\exists i \in \{1, \dots, n\} : a_i = \sum_{k=1, k \neq i}^n \alpha_k a_k \text{ für } \alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$$

- (f) Sind a_1, \dots, a_n linear unabhängig und a_1, \dots, a_n, a linear abhängig, so ist a die linear Kombination von a_1, \dots, a_n und die Koeffizienten sind eindeutig.
- (g) Ist a eine Linearkombination von a_1, \dots, a_n und jeder Vektor a_k eine Linearkombination von b_1, \dots, b_m so ist a eine Linearkombination von b_1, \dots, b_m

Bemerkung

Für Teilmengen M, N eines Vektorraums V gilt:

- (a) M l.a. $M \subseteq N \Rightarrow N$ l.a.
- (b) $M = \emptyset \Rightarrow M$ l.u.
- (c) $\vec{0} \in M \Rightarrow M$ l.a.

Für $V = \mathbb{R}^3$

- (a) a_1, a_2, a_3 seien linear abhängig und a_1, a_2 linear unabhängig
 \Leftrightarrow also a_3 ist in der von a_1 und a_2 aufgespannten Ebene
 \Rightarrow Spat mit Kanten a_1, a_2, a_3 hat Volumen 0
 $\Leftrightarrow \det(a_1, a_2, a_3) = 0$
- (b) a_1, a_2 linear abhängig $\Rightarrow a_2$ ist auf der von a_1 aufgespannten Gerade
 $\Rightarrow \det(a_1, a_2) = 0$

8.4 Basis und Dimension

8.4.1 Definition Hamel-Basis

- (a) Eine Teilmenge B eines Vektorraums V heißt (Hamel-) Basis von V , wenn gilt
 - (i) B ist linear unabhängig
 - (ii) $V = \text{span}(B)$

Kurz:

B ist ein linear unabhängiges Erzeuger-System von V

- (b) Man sagt Vektoren b_1, \dots, b_n bilden eine Basis von V , wenn gilt $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ ist eine Basis von V .

8.4.2 Äquivalente Aussagen zu Basen

Sei $B \subseteq V$, V ein Vektorraum, dann sind folgende Aussagen äquivalent

1. B ist eine Basis
2. B ist ein minimales Erzeugersystem
 - (a) $V = \text{span}(B)$
 - (b) $V \neq \text{span}(\tilde{B})$ mit $\tilde{B} \subsetneq B$
3. B ist eine maximale, linear Unabhängige Teilmenge von V , d.h.
 - (a) B ist linear unabhängig
 - (b) $B \cup \{x\}$ ist linear abhängig für $x \in V \setminus B$ beliebig. D.h. $x \in \text{span}(B)$
4. Falls $B \neq \emptyset$ ist dies auch äquivalent zu:
Jedes $x \in V$ ist eine Linearkombination von endlich vielen Vektoren aus B und die Koeffizienten sind eindeutig bestimmt.

8.4.3 Existenz einer Basis

Jeder Vektorraum V besitzt eine Basis. Genauer gilt: Ist M ein Erzeugendensystem von V , so gibt es eine Basis B von V mit $B \subseteq M$.

8.4.4 Eigenschaften der Basis

Sei V ein Vektorraum, dann gilt

1. Ist $M \subseteq V$ endlich und linear unabhängig so existiert eine Basis B von V mit $M \subseteq B$. D.h. M kann zu einer Basis von V erweitert werden.
2. Ist B und \tilde{B} jeweils eine Basis von V dann haben beide gleich viele Elemente. Also $|B| = |\tilde{B}|$ (also auch im Fall $\infty = \infty$).

8.4.5 Definition Dimension

Ist V ein Vektorraum und B eine Basis, dann ist

$$\dim V := |B|$$

die Dimension von V . Im Fall $|B| < \infty$ also $\dim V \in \mathbb{N}_0$ heißt V endlich dimensional.

8.4.6 Beziehung von Dimensionen

Ist U ein Unterraum von V , so gilt

- (a) $\dim U \leq \dim V$
- (b) $\dim U = \dim V \Leftrightarrow U = V$ für $\dim V < \infty$

8.4.7 Lineare unabhängigkeit im n -Dimensionalen

Ist V ein n -Dimensionaler Vektorraum, so gilt:

- (a) n linear unabhängige Vektoren bilden eine Basis
- (b) $n + 1$ Vektoren V sind linear abhängig.

8.5 Lineare Gleichungssysteme

8.5.1 Definition lineares Gleichungssystem

Sei $m, n \in \mathbb{K}, \mathbb{K}$ ein Körper. $A \in \mathbb{K}^{m \times n}, b \in \mathbb{K}^m$ dann nennt man die Gleichung

$$A \cdot x = b \Leftrightarrow \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & = b_2 \\ \vdots & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n & = b_m \end{cases}$$

ein Lineares Gleichungssystem mit Koeffizienten A , rechter Seite b und Unbekannten x .

Etwas allgemeiner mit $A \in \mathbb{K}^{m \times n}, B \in \mathbb{K}^{m \times r}, X \in \mathbb{K}^{n \times r}$.

Dann ist

$$A \cdot X = B \Leftrightarrow \begin{cases} A \cdot x_1 & = b_1 \\ \vdots & \vdots \\ A \cdot x_r & = b_r \end{cases}$$

ein System von Lineargleichungen mit Koeffizienten X , rechten Seiten B und Unbekannten X .

Im Fall $b = \vec{0}$ (bzw. $B = \vec{0}$) heißt das LGS homogen.

Bemerkung

Im Fall $Ax = b$ nennt man

- (a) $\mathbb{L}(A, b) := \{x \in \mathbb{K}^n : Ax = b\}$ die Lösungsmenge des LGS
- (b) $\text{Kern}(A) := \{x \in \mathbb{K}^n : A \cdot x = \vec{0}\}$ den Kern von A . Es gilt $\text{Kern}(A) = \mathbb{L}(A, \vec{0})$.
- (c) $\text{Im}(A) := \{y \in \mathbb{K}^m : \exists x \in \mathbb{K}^n \text{ mit } Ax = y\}$ das Bild von A .

8.5.2 Zusammenhang Kern und Lösung eines LGS

Sei $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, dann gilt

- (a) $\text{Kern}(A)$ ist Unterraum von \mathbb{K}^n
- (b) Ist $b \in \mathbb{K}^m$ und $x_0 \in \mathbb{K}^n$ eine Lösung von $Ax = b$, dann ist die Lösungsgesamtheit

$$x_0 + \text{Kern}(A) := \{x_0 + y : y \in \text{Kern}(A)\}$$

Bemerkung

Außerdem ist $\mathbb{L}(A, b)$ und $\text{Kern}(A) = \mathbb{L}(A, \vec{0})$ ein Unterraum von \mathbb{K}^n .

8.5.3 Definition Affiner Unterraum, lineare Mannigfaltigkeit

Ist x_0 ein Vektor und U ein Unterraum, dann ist

$$x_0 + U := \{x_0 + u : u \in U\}$$

ein affiner Unterraum und $\dim(x_0 + U) := \dim(U)$ die Dimension von $x_0 + U$.

8.5.4 Definition Zeilen-/Spaltenrang

Sei

$$A = (a_1, \dots, a_n) = \begin{pmatrix} \tilde{a}_1^T \\ \vdots \\ \tilde{a}_m^T \end{pmatrix}$$

. Dann heißt

- (a) $\dim(\text{span}(a_1, \dots, a_n))$ der Spaltenrang
- (b) $\dim(\text{span}(\tilde{a}_1, \dots, \tilde{a}_m))$ der Zeilenrang

Bemerkung

Also Spaltenrang $\hat{=}$ Anzahl der linear unabhängigen Spalten.

Und Zeilenrang $\hat{=}$ Anzahl der linear unabhängigen Zeilen.

8.5.5 Elementare Zeilen-/Stufenoperationen

Mittels elementarer Zeilen- bzw. Stufenoperationen kann man eine Matrix auf Zeilenstufenform bringen.

1. Vertauschen von Zeilen bzw. Spalten

Spalten-Operation:

$$A \cdot E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 \\ 9 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

Zeilen-Operationen

$$E \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

2. Das α -fache der zweiten Zeile/Spalte zur ersten Zeile/Spalte addieren

Spalten-Operation:

$$A \cdot E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \alpha & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2\alpha & 2 & 3 \\ 4+5\alpha & 5 & 6 \\ 7+8\alpha & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

Zeilen-Operationen

$$E \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \alpha & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+4\alpha & 2+5\alpha & 3+6\alpha \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

3. Zeile/Spalte 2 mit α multiplizieren

Spalten-Operation:

$$A \cdot E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2\alpha & 3 \\ 4 & 5\alpha & 6 \\ 7 & 8\alpha & 9 \end{pmatrix}$$

Zeilen-Operationen:

$$E \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4\alpha & 5\alpha & 6\alpha \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

Formal bedeutet die Überführung von A in Zeilenstufenform \tilde{A} also:

- (a) mit elementaren Zeilenoperationen (Gauß) überführt ist $\tilde{A} = E_r \cdots E_1 \cdot A$ mit Elementarmatrizen E_1, \dots, E_r .
- (b) Mit elementaren Spaltenoperationen ist $\tilde{A} = A_1 \cdot E_1 \cdots E_s$ mit Elementarmatrizen E_1, \dots, E_s .

Bemerkung

Statt in Zeilenstufenform kann man A auch in die Form der Pseudo-Einheitsmatrix

$$\hat{I} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & \vec{0} & \\ & \vec{0} & \ddots & \\ & & & 0 \end{pmatrix} = \text{diag}(1, 1, \dots, 0, 0)$$

Man kann zeigen:

1. Wird eine Zeilenoperation durchgeführt ändert sich nicht der Zeilenrang
2. Wird eine Spaltenoperation durchgeführt ändert sich nicht der Spaltenrang

8.5.6 Beziehung Spalten-/Zeilenrang

Zeilen- und Spaltenrang sind gleich.

8.5.7 Definition Rang einer Matrix

Sei $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, dann ist der Rang von A definiert als der Zeilenrang von A und wir schreiben dafür:

$$\text{rg}(A) := \text{Zeilenrang}$$

8.5.8 Gauß-Algorithmus

Sei für $A \in \mathbb{K}^{m \times n}, b \in \mathbb{K}^m, x \in \mathbb{K}^n$ $Ax = b$ ein LGS mit gewissen elementaren Zeilenoperationen wird A in eine Zeilenstufenform \tilde{A} überführt ($\tilde{A} = E_r \cdots \cdots E_1 \cdot A$). Gleichzeitig werden diese auf b angewendet, wobei man ein \tilde{b} erhält ($\tilde{b} = E_r \cdots \cdots E_1 \cdot b$).

Dann gilt für x :

$$Ax = b \Leftrightarrow \tilde{A}x = \tilde{b}$$

8.5.9 Lösbarkeit eines LGS

Ein LGS $AX = b$ ist lösbar, genau dann wenn

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(A|b)$$

gilt.

8.5.10 Lösung eines LGS

Falls ein LGS $Ax = b$ lösbar ist, dann ist $\mathbb{L}(A|b)$ ein affiner Unterraum und es gilt:

$$\dim(\mathbb{L}(A|b)) = n - \text{rg}(A)$$

Teil III

HM 3 — Zusammenfassung

Kapitel 9

Exkurs Funktionalanalyse

9.1 Normen und innere Produkte

9.1.1 Definition Vektornorm

Sei V ein Vektorraum über \mathbb{K} eine Abbildung

$$\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$$

nennt man eine Norm, wenn für $\lambda \in \mathbb{K}, x, y \in V$ stets gilt:

(a)

$$\|x\| \geq 0 \forall x \in V \quad \wedge \quad \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = \vec{0}$$

(b)

$$\|\lambda \cdot x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$$

(c)

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

In dem Fall heißt V normierter Vektorraum. Einen Vektor $a \in V$ nennen wir normiert, wenn $\|a\| = 1$ ist.

Bemerkung

1. In einem normierten Vektorraum, kann man jedes $a \in V \setminus \{\vec{0}\}$ durch

$$\tilde{a} = \frac{1}{\|a\|} \cdot a$$

normieren, dann

$$\|a\| = \left\| \frac{1}{\|a\|} \cdot a \right\| = \left| \frac{1}{\|a\|} \right| \|a\| = \frac{1}{\|a\|} \|a\| = 1$$

2. Es gilt in einem normierten Vektorraum auch, dass

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| \quad \forall x, y \in V$$

Bew.: folgt aus (N3) (vgl. HM1)

9.1.2 Skalarprodukt / inneres Produkt

Sei V ein Vektorraum über $K = \mathbb{C}$ oder $K = \mathbb{R}$. Eine Abbildung:

$$\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{K}, (x, y) \mapsto \langle x, y \rangle$$

heißt inneres Produkt oder Skalarprodukt in V , wenn für $\lambda \in \mathbb{K}, x, y \in V$ stets gilt:

1.

$$\langle x, x \rangle \geq 0 \wedge \langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = \vec{0}$$

2. Homogenität:

$$\langle x, \lambda y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$$

3. Additivität:

$$\langle x, y + z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$$

4.

$$\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$$

Ist $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein inneres Produkt von V , dann heißt V innerer Produktraum und genauer:

(a) euklidischer Raum für $V = \mathbb{R}^n$

(b) unitärer Raum für $V = \mathbb{C}^n$

Bemerkung

In (S1) wird implizit verlangt, dass $\langle x, x \rangle \in \mathbb{R}$ gilt.

9.1.3 Definition induzierte Norm

Ist V ein innerer Produktraum bezüglich $\langle \cdot, \cdot \rangle$ so heißt die durch $\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}$ definierte Abbildung

$$\|\cdot\|: V \rightarrow \mathbb{R}$$

die induzierte Norm.

Bemerkung

Dass die induzierte Norm eine Norm ist, ist noch zu zeigen.

9.1.4 Äquivalente Aussagen zu induzierten Normen

Sei V ein Vektorraum über \mathbb{K} und $\|\cdot\|$ eine Norm, dann sind folgende Aussagen äquivalent:

1. Die Norm wird durch ein Skalarprodukt induziert
2. Es gilt die sogenannte Parallelogramm Identität:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

9.1.5 Rechenregeln für Skalarprodukte

Seien $x, y \in V, \lambda \in \mathbb{K}$:

- 1.

$$\langle \lambda x, y \rangle = \bar{\lambda} \langle x, y \rangle$$

- 2.

$$\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$$

- 3.

$$\langle \vec{0}, y \rangle = \langle x, \vec{0} \rangle = 0$$

9.1.6 Cauchy-Schwarz'sche-Ungleichung

Sei V ein Vektorraum mit Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ und induzierter Norm $\|\cdot\|$ dann gilt $\langle x, y \rangle \leq \|x\| \|y\|$

9.2 Orthogonalität

9.2.1 Orthogonalität

Sei V ein innerer Produktraum, dann nennt man

- (a) Zwei Vektoren $x, y \in V$ orthogonal (schreibweise $x \perp y$)

$$:\Leftrightarrow \langle x, y \rangle = 0$$

- (b) $M \subseteq V$ ein Orthogonalsystem (OGS) in V , wenn gilt:

$$x, y \in M \wedge x \neq y \Rightarrow x \perp y$$

- (c) $M \subseteq V$ ein Orthonormalsystem (ONS) in V , wenn M ein OGS ist und gilt

$$x \in M \Rightarrow \|x\| = 1$$

- (d) $B \subseteq V$ eine Orthogonalbasis von V wenn B eine Basis von V ist und B ein OGS ist.

- (e) $B \subseteq V$ eine Orthonormalbasis von V wenn B eine Basis von V ist und B ein ONS ist.

9.2.2 Orthogonalität und lineare Abhängigkeit

Sei V ein innerer Produktraum. Dann gilt:

- (a) Seien $b_1, \dots, b_n \in V$ orthogonal und alle $\neq \vec{0} \Rightarrow b_1, \dots, b_n$ sind linear unabhängig.
- (b) Ist $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ ein OGS und $x \in \text{span } B$, dann gilt

$$x = \alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_n b_n$$

mit

$$\alpha_k = \frac{\langle b_k, x \rangle}{\langle b_k, b_k \rangle}$$

9.2.3 Gram-Schmidt (Orthogonalisierung von Vektoren)

Seien x_1, \dots, x_n linear unabhängige Vektoren eines inneren Produktraums. Definiert man:

$$\begin{aligned} y_1 &:= x_1 \\ y_k &:= x_k - \sum_{l=1}^{k-1} \frac{\langle y_l, x_k \rangle}{\langle y_l, y_l \rangle} y_l \text{ für } k \in \{2, \dots, n\} \end{aligned}$$

dann gilt: $\text{span}(x_1, \dots, x_n) = \text{span}(y_1, \dots, y_n)$ und $y_l \perp y_k$ für $l \neq k$.

9.2.4 Orthogonale Projektion

Sei V ein innerer Produktraum und x_1, \dots, x_n linear unabhängig. Dann gilt für $x \in V$

- (a) $\exists! \hat{x} \in V : \|x - \hat{x}\| = \min\{\|x - u\| : u \in \text{span}(x_1, \dots, x_n)\}$

- (b) Für \hat{x} aus (a) gilt $x - \hat{x} \perp U$ d.h.

$$x - \hat{x} \perp u \quad \forall u \in U$$

Sind y_1, \dots, y_n ein OGS mit $U = \text{span}(y_1, \dots, y_n)$ dann gilt:

$$\hat{x} = \sum_{k=1}^n \frac{\langle y_k, x \rangle}{\langle y_k, y_k \rangle} y_k$$

Kapitel 10

Gewöhnliche Differentialgleichungen

10.1 Einführung

10.1.1 Explizite DGL 1. Ordnung

Gegeben sei ein Gebiet $G \subseteq \mathbb{R}^2$ und eine stetige Funktion $f : G \rightarrow \mathbb{R}$, dann heißt eine Funktion $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ (mit $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall) eine Lösung der (expliziten) Differentialgleichung (DGL)

$$y' = f(x, y)$$

wenn gilt:

(a)

$$\begin{pmatrix} x \\ y(x) \end{pmatrix} \in G \quad \forall x \in I$$

(b)

$$y'(x) = f(x, y(x)) \quad \forall x \in I$$

Ferner heißt y eine Lösung des Anfangswertproblems

$$(\text{AWP}) = \begin{cases} y' & = f(x, y) \\ y(x_0) & = y_0 \end{cases}$$

wenn y eine Lösung von $y' = f(x, y)$ ist und $y(x_0) = y_0$ gilt.

10.1.2 Implizite DGL 1. Ordnung

(a) Eine DGL der Form

$$g(x, y, y') = 0$$

mit $g : M \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ heißt eine implizite DGL 1. Ordnung und

$$(\text{AWP}) = \begin{cases} g(x, y, y') & = 0 \\ y(x_0) & = y_0 \end{cases}$$

ist das dazugehörige AWP.

(b) Das lässt sich (manchmal) auf eine explizite DGL zurückführen:

$$g(x, y, z) = 0$$

hat bei (x_0, y_0) eine Auflösung nach $z = f(x, y)$ falls die Determinante der Jakobi-Matrix $J = \frac{\partial}{\partial z} g(x, y, z)$ nicht null ist.

10.1.3 DGL-System 1. Ordnung

Sei $G \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ und für $k \in \{1, \dots, n\}$ sei $f_k : G \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. $y : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ mit $y(x) = (y_1(x), \dots, y_n(x))^T$ heißt Lösung des Systems

$$\begin{cases} y'_1 & = f_1(x, y_1, \dots, y_n) \\ \vdots & \\ y'_n & = f_n(x, y_1, \dots, y_n) \end{cases}$$

kurz:

$$y' = f(x, y)$$

von Differentialgleichungen 1. Ordnung, wenn gilt:

1.

$$\begin{pmatrix} x \\ y(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y_1(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{pmatrix} \in G \quad \forall x \in I$$

2. y_k ist stetig differenzierbar auf I

3. $y'_k(x) = f_k(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) = f_k(x, y(x))$

Außerdem heißt y eine Lösung des zugehörigen AWP

$$(\text{AWP}) = \begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = \begin{pmatrix} y_1(x_0) \\ \vdots \\ y_n(x_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{y}_1 \\ \vdots \\ \tilde{y}_n \end{pmatrix} = \tilde{y} = y_0 \end{cases}$$

wenn gilt: y ist eine Lösung von $y' = f(x, y)$ und $y(x_0) = y_0$.

10.1.4 Umschreiben von DGLen

Eine sogenannte DGL n -ter Ordnung

$$y^{(n+1)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n+1)})$$

kann man stets in ein System 1. Ordnung umschreiben.

1. y_1, \dots, y_n definieren als:

$$\begin{aligned} y_1 &:= y \\ y_2 &:= y_1' \\ y_n &:= y_{n-1}' \end{aligned}$$

2. Das ursprüngliche Problem einsetzen:

$$y_n' = y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) = f(x, y_1, \dots, y_n)$$

3. Als System formulieren:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} f_1(x, y_1, \dots, y_n) \\ \vdots \\ f_n(x, y_1, \dots, y_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ f(x, y_1, \dots, y_n) \end{pmatrix}$$

4. Die Anfangsbedingung formulieren:

$$\begin{aligned} y(x_0) &= \tilde{y}_1 \\ y'(x_0) &= \tilde{y}_2 \\ &\vdots \\ y^{(n-1)}(x_0) &= \tilde{y}_n \end{aligned}$$

ergibt den Vektor

$$\tilde{y} := \begin{pmatrix} \tilde{y}_1 \\ \vdots \\ \tilde{y}_n \end{pmatrix}$$

10.2 Existenz- und Eindeutigkeitsaussagen

10.2.1 Volterra'sche Integralgleichung

Sei $G \subseteq \mathbb{R}^2$ ein Gebiet und $f : G \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und $x_0 \in I$. Dann gilt:

1. $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ löst das AWP.

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

genau dann, wenn die Integralgleichung

- 2.

$$y(x) = y(x_0) + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) \, dt \quad \forall x \in I$$

für alle y erfüllt ist.

Von der Form $y = \Phi(y)$ mit

$$\Phi(y) := y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) \, dt$$

genauer: $\Phi : C^1(I) \rightarrow C^1(I)$ also y muss Fixpunkt von Φ sein.

10.2.2 Bemerkung: Newton-Verfahren zur Bestimmung von Nullstellen

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Tangente bestimmen:

$$\begin{aligned} T(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = 0 \\ \Rightarrow x_1 &= x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = \Phi(x_0) \\ x_{n+1} &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = \Phi(x_n) \end{aligned}$$

Hoffnung die so erzeugte Folge $(x_n)_{n=1}^\infty$ konvergiert gegen ein \bar{x} , das heißt es gilt (falls Φ stetig):

$$\bar{x} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(x_n) = \Phi(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n) = \Phi(\bar{x})$$

Das heißt, falls alles gut geht ist \bar{x} der Fixpunkt von Φ (muss aber nicht immer so sein, z.B. $f(x) = \sin(x)$).

10.2.3 Picard-Iterator

Der sogenannte Picard-Iterator bildet Funktionen auf Funktionen ab und ist definiert durch:

$$\Phi : y \rightarrow y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) \, dt$$

10.2.4 Definition Lipschitz-Bedingung

Sei $G \subseteq \mathbb{R}^2$ ein Gebiet. Eine Funktion $f : G \rightarrow \mathbb{R}$ erfüllt eine Lipschitz-Bedingung (L-Bedingung) bezüglich der zweiten Komponente wenn gilt:

$$\exists L > 0 : |f(x, y_1) - f(x, y_2)| < L \cdot |y_1 - y_2|$$

Bemerkung

Für x fest, ist die L-Bedingung äquivalent zur Lipschitz-Stetigkeit.

10.2.5 Partielle Ableitung und Lipschitz-Bedingung

Ist bei f die partielle Ableitung nach der zweiten Komponente beschränkt, dann ist die L-Bedingung erfüllt:

$$|f_y(x, y)| < L \quad \forall \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in G \Rightarrow |f(x, y_1) - f(x, y_2)| = |f_y(x, \xi)(y_1 - y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$$

10.2.6 Picard-Lindelöf (Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung)

Seien $r, s > 0, x_0, y_0 \in \mathbb{R}; M := [x_0, x_0 + r] \times [y_0 - s, y_0 + s]$ sei G ein Gebiet mit $M \subseteq G \subseteq \mathbb{R}^2$. Außerdem erfülle f auf G eine L-Bedingung bezüglich der zweiten Komponente mit $L > 0$. Außerdem gelte $|f(x, y)| \leq c \quad \forall (x, y)^T \in M$. Dann besitzt das AWP

$$(\text{AWP}) = \begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

auf dem Intervall $I := [x_0, x_0 + \alpha]$ mit $\alpha = \min\{r, \frac{s}{c}\}$ genau eine Lösung.

10.2.7 Peano (Existenz einer Lösung)

Gelten alle Voraussetzungen von Picard-Lindelöf bis auf die L-Bedingung, dann besitzt

$$(\text{AWP}) = \begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

mindestens eine Lösung $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ mit $I = [x_0, x_0 + \alpha]$ und $\alpha = \min\{r, \frac{s}{c}\}$.

10.2.8 Gronwallsche Ungleichung

Sei $c > 0; f, g : [a, b] \rightarrow [0, \infty)$ stetig gilt:

$$f(x) \leq c + \int_a^x f(t)g(t) \, dt \quad \forall x \in [a, b]$$

dann ist

$$f(x) \leq c \cdot \exp\left(\int_a^x g(t) \, dt\right) \quad \forall x \in [a, b]$$

10.2.9 Banach'scher Fixpunktsatz

Sei $V = \mathbb{R}^n$ und $M \subseteq \mathbb{R}^n$ abgeschlossen (bezüglich $\|\cdot\|_\infty$) weiter sei: $\Phi : M \rightarrow M$ eine Kontraktion, das heißt Φ ist L-stetig mit $L < 1$.

Dann besitzt Φ genau einen Fixpunkt $\bar{x} \in M$ (das heißt $\Phi(\bar{x}) = \bar{x}$) und \bar{x} ist der Grenzwert der Folge $(x_n)_{n=1}^\infty$ mit:

$$x_k = \begin{cases} \text{beliebig} & k = 0 \\ \Phi(x_{k-1}) & \text{sonst} \end{cases}$$

10.2.10 Norm Äquivalenz im \mathbb{R}^n

Sei $\|\cdot\|$ eine beliebige Norm im \mathbb{R}^n , dann existieren $c_1, c_2 > 0$ mit

$$c_1 \|x\|_\infty \leq \|x\| \leq c_2 \|x\|_\infty \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

10.2.11 Stabilität

Sei $G \subseteq \mathbb{R}^2$ ein Gebiet, $f_1, f_2 : G \rightarrow \mathbb{R}$ stetige Funktionen die auf G eine L-Bedingung erfüllen mit $L > 0$. Zusätzlich gelte $|f_1(x, y) - f_2(x, y)| < c \quad \forall (x, y)^T \in G$ (Modellierungsfehler).

Dann gilt ist y_1 eine Lösung des AWP $y' = f_1(x, y), y(x_0) = y_0$ und y_2 eine Lösung des AWP $y' = f_2(x, y), y(x_0) = \tilde{y}_0$ so folgt:

$$|y_1(x) - y_2(x)| \leq |y_0 - \tilde{y}_0| + c \cdot (x - x_0) \exp(L(x - x_0))$$

Kapitel 11

DGL-Systeme und DGLen n-ter Ordnung

11.1 Systeme von DGLen 1. Ordnung

11.1.1 Definition DGL-System

Sei $G \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ und für $k \in \{1, \dots, n\}$ sei $f_k : G \rightarrow \mathbb{R}$ stetig:

(a) $y(x) = (y_1(x), \dots, y_n(x))^T$ heißt Lösung des Systems:

$$\begin{aligned} y_1' &= f_1(x, y_1, \dots, y_n) \\ &\vdots \\ y_n' &= f_n(x, y_1, \dots, y_n) \end{aligned}$$

von DGLen n -ter Ordnung, wenn gilt:

(a)

$$\begin{pmatrix} x \\ y(x) \end{pmatrix} \in G \quad \forall x \in I$$

(b) y ist differentierbar auf I (Komponentenweise, d.h. y_k ist diff'bar $\forall k$)

(c) $y_k'(x) = f_k(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) \quad \forall x \in I$ und bel. $k \in \{1, \dots, n\}$

(b) Ist $(x, y)^T = (x_0, y_1^{(0)}, \dots, y_n^{(0)})^T \in G$ dann löst $y : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ das AWP.

$$(AWP) = \begin{cases} y_1'(x) &= f_1(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) \\ &\vdots \\ y_n'(x) &= f_n(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) \\ y_k(x_0) &= y_k^{(0)} \quad k \in \{1, \dots, n\} \end{cases}$$

wenn y die DGL löst und $y(x_0) = (y_1^{(0)}, \dots, y_n^{(0)})^T$ gilt.

11.1.2 Schreibweise

(a) DGL:

(a)

$$y : I \rightarrow \mathbb{R}^n, y(x) := \begin{pmatrix} y_1(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{pmatrix} \text{ oder } y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

(b)

$$f_k(x, y) = f_k(x, y_1, \dots, y_n) \text{ bzw. } f_k(x, y(x)) = f_k(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) \quad \forall x \in I$$

(c) $f : G \subseteq \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$ mit

$$f(x, y) = f(x, y_1, \dots, y_n) = \begin{pmatrix} f_1(x, y_1, \dots, y_n) \\ \vdots \\ f_n(x, y_1, \dots, y_n) \end{pmatrix}$$

(b) AWP:

$$(\text{AWP}) = \begin{cases} y' & = f(x, y) \\ y(x_0) & = y_0 \end{cases} \text{ mit } y_0 = \begin{pmatrix} y_1^{(0)} \\ \vdots \\ y_n^{(0)} \end{pmatrix}$$

(c) Integration von Vektoren: Für $g : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n, g(x) = (g_1(x), \dots, g_n(x))^T$ definieren wir (falls g_1, \dots, g_n int'bar sind):

$$\int_a^b g(x) \, dx = \begin{pmatrix} \int_a^b g_1(x) \, dx \\ \vdots \\ \int_a^b g_n(x) \, dx \end{pmatrix}$$

11.1.3 Volterra'sche Integralgleichung

Sei $G \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ ein Gebiet, $f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig und

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ y_1^{(0)} \\ \vdots \\ y_n^{(0)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} \in G$$

dann ist $y : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ genau dann eine Lösung des AWP $y' = f(x, y), y(x_0) = y_0$, wenn gilt

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) \, dt$$

11.1.4 Definition Lipschitz-Bedingung

Sei $f : M \subseteq \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$. Dann erfüllt f eine L-Bed. Mit $L > 0$, wenn gilt:

$$\|f(x, y_1) - f(x, y_2)\| < L \cdot \|y_1 - y_2\| \quad \forall (x, y_1), (x, y_2) \in M$$

11.1.5 Bemerkung

Welche Norm hier verwendet wird ist egal, denn es existiert ein c_1, c_2 mit

$$c_1 \|\cdot\|_\infty \leq \|\cdot\| \leq c_2 \|\cdot\|$$

11.1.6 Satz von Picard-Lindelöf

Seien $r, s > 0; x_0 \in \mathbb{R}, y_0 = (y_1^{(0)}, \dots, y_n^{(0)})^T \in \mathbb{R}^n$ und $M = \{(x, y_1, \dots, y_n)^T \in \mathbb{R}^n : x \in [x_0, x_0 + r], y_k \in [y_k^{(0)} - s, y_k^{(0)} + s]\}$ und $f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig.

Falls f auf M eine L-Bed. erfüllt so existiert auf $I = [x_0, x_0 + \alpha]$ mit $\alpha = \min\{r, \frac{s}{c}\}$ für

$$c := \max_{(x,y)^T \in M} \|f(x, y)\|_\infty$$

11.1.7 Satz von Peano

Falls die L-Bed. im Satz von Picard-Lindelöf nicht erfüllt ist, alle anderen Voraussetzungen aber gelten kann man auf $I = [x_0, x_0 + \alpha]$ (mit α wie oben) trotzdem die Existenz einer Lösung zeigen, nicht aber deren Eindeutigkeit.

11.1.8 Stabilität

Analog gilt, falls f eine L-Bed. erfüllt und eine Lösung existiert:

$$\|y_1(x) - y_2(x)\|_\infty \leq (\|y_0 - \tilde{y}_0\|_\infty c(x - x_0)) \exp(L(x - x_0))$$

dabei ist y_1 Lösung von $y' = f_1(x, y), y(x_0) = y_0$ und $y' = f_2(x, y), y(x_0) = \tilde{y}_0$

11.2 Lineare DGL-Systeme 1. Ordnung

11.2.1 Definition

Ein DGL System der Form

$$\begin{pmatrix} y_1'(x) \\ \vdots \\ y_n'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}(x) & \cdots & a_{1n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(x) & \cdots & a_{nn}(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1(x) \\ \vdots \\ b_n(x) \end{pmatrix}$$

oder in kurz:

$$y'(x) = A(x)y(x) + b(x)$$

mit stetigen Funktionen $a_{ij} : I \rightarrow \mathbb{R}, b_i : I \rightarrow \mathbb{R} \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}, I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall heißt ein lineares DGL-System 1. Ordnung.

11.2.2 Definition Frobenius-Norm

Für $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ist durch

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2}$$

die sogenannte Frobenius-Norm $\|\cdot\|_F : \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert.

11.2.3 Matrixnorm und Vektornorm

- (a) $\|\cdot\|_F$ ist eine Vektornorm auf dem Vektorraum $\mathbb{R}^{m \times n}$ (oder $\mathbb{C}^{m \times n}$)
- (b) Die Matrix-Norm $\|\cdot\|_F$ ist bezüglich der Vektornorm $\|\cdot\|_2$ submultiplikativ, d.h. es gilt

$$\|A \cdot x\|_2 \leq \|A\|_F \cdot \|x\|_2$$

- (c) Bezüglich einer beliebigen Vektornorm auf \mathbb{R}^n gilt:

$$\|Ax\| \leq c_1 \|Ax\|_2 \leq \|A\|_F \|x\|_2 \leq c_2 \|A\|_F \|x\|$$

11.2.4 Grenznorm

Die sogenannte Grenznorm für eine Matrix-Norm wird bezüglich einer Vektornorm $\|\cdot\|$ so definiert:

$$\|A\| := \sup_{x \in \mathbb{R}^n \wedge x \neq \vec{0}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

Daraus folgt:

$$\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$$

und für mindestens ein x gilt = (d.h. die Abschätzung ist scharf).

Die Bezeichnung der Grenznorm wird von der Vektornorm übernommen. Es gilt also:

$$\|A\|_p = \sup_{x \in \mathbb{R}^n \wedge x \neq \vec{0}} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p}$$

die Grenznorm bezüglich $\|\cdot\|_p$.

Bemerkung

Es gilt:

$$\|A\|_2 \leq \|A\|_F$$

11.2.5 Lösungsmengen von linearen Gleichungssystemen

- (a) Die Lösungsmenge von $y' = A(x)y$ ist ein Unterraum des Vektorraums der stetigen Funktionen
- (b) Die Lösungsmenge von $y' = A(x)y + b(x)$ ist ein affiner Unterraum des Vektorraums der stetigen Funktionen

11.2.6 Definition Fundamentalsystem

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein nicht entartetes Intervall und $A : I \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ stetig

- (a) Eine Basis des Lösungsraums von $y' = A(x)y$ heißt Fundamentalsystem (FS). Ist y_1, \dots, y_n so ein FS, dann heißt die Matrix

$$Y(x) = (y_1(x), \dots, y_n(x))$$

die Fundamentalmatrix

- (b) Für $y_1, \dots, y_n : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißt $W : I \rightarrow \mathbb{R}$ mit $W(x) = \det(Y(x))$ die Wronski-Determinante des Fundamentalsystems.

11.2.7 Definition Determinante

Eine Funktion $\det : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ heißt Determinante, wenn gilt

- (a) Mit I der Einheitsmatrix:

$$\det(I) = 1$$

- (b) \det ist linear in jeder Spalte, d.h. für $1 \leq l \leq n$ gilt:

$$\det(a_1, \dots, a_{l-1}, \alpha x + \beta y, a_{l+1}, \dots, a_n) = \alpha \det(a_1, \dots, a_{l-1}, x, a_{l+1}, \dots, a_n) + \beta \det(a_1, \dots, a_{l-1}, y, a_{l+1}, \dots, a_n)$$

- (c) Spalten tauschen ändert Vorzeichen:

$$\det(a_1, \dots, a_i, \dots, a_j, \dots, a_n) = -\det(a_1, \dots, a_j, \dots, a_i, \dots, a_n)$$

11.2.8 Entwicklungssatz von Laplace

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und bezeichne A_{ij} die $(n-1) \times (n-1)$ Matrix, die aus A durch Streichen der i -ten Zeile und j -ten Spalte entsteht. Die Einträge von A bezeichnen wir mit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$. Dann gilt:

- (a) Für $j \in \{1, \dots, n\}$ beliebig aber fest ist

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \det A_{ij} (-1)^{i+j}$$

- (b) Für $i \in \{1, \dots, n\}$ beliebig aber fest ist

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} \det A_{ij} (-1)^{i+j}$$

11.2.9 Leibniz-Formel für Determinanten

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und bezeichne S_n die Gruppe der Permutationen von $\{1, \dots, n\}$ und sei $\text{sgn}(\sigma)$ definiert durch $\text{sgn} : S_n \rightarrow \{-1, 1\}$:

$$\text{sgn } \sigma = \begin{cases} 1 & \text{falls } \sigma \text{ durch eine gerade Anzahl Permutationen entsteht} \\ -1 & \text{sonst} \end{cases}$$

wobei eine Transposition einer paarweisen Vertauschung entspricht. Dann gilt:

$$\det(A) = \det((a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{k=1}^n a_{k\sigma(k)}$$

11.2.10 Berechnung der Wronski-Determinante ohne bekanntes FS

Für die Wronski-Determinante gilt (d.h. FS existiert, sonst ist Wronski-Determinante nicht definiert):

- (a) $W(x)$ kann durch eine lineare DGL 1. Ordnung bestimmt werden:

$$W'(x) = \text{spur}(A(x)) \cdot W(x)$$

mit

$$\text{spur}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

- (b) Durch Lösen der DGL folgt:

$$W(x) = W(x_0) \cdot \exp \left(\int_{x_0}^x \text{spur}(A(t)) \, dt \right)$$

Bemerkung

Falls $y' = A(x)y$ eine Anfangsbedingung hat ist $W(x_0)$ durch die Anfangsbedingung bekannt, dadurch ist $W(x)$ bekannt.

11.2.11 Ableitung der Determinante

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein nicht-entartetes Intervall und $A(x)$ (komponentenweise) differenzierbar auf I , dann ist $\det(A(x))$ differenzierbar und es gilt:

$$\frac{d}{dx} \det(A(x)) = \sum_{i=1}^n \det \begin{pmatrix} a_{11}(x) & \cdots & a_{1n}(x) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1}(x) & \cdots & a_{i-1,n}(x) \\ a'_{i1}(x) & \cdots & a'_{in}(x) \\ a_{i+1,1}(x) & \cdots & a_{i+1,n}(x) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(x) & \cdots & a_{nn}(x) \end{pmatrix}$$

11.2.12 Äquivalente Aussagen zu FSen und Wronski-Determinanten

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein nicht entartetes Intervall, $A : I \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ stetig. Sind y_1, \dots, y_n Lösungen von $y' = A(x)y$ und bezeichne $W(x) = \det(y_1(x), \dots, y_n(x))$ dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- (a) y_1, \dots, y_n bilden ein FS
- (b) $W(x) \neq 0 \ \forall x \in I$
- (c) $\exists x_0 \in I : W(x_0) \neq 0$

11.2.13 Partikuläre Lösung aus Wronski-Determinante

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein nicht entartetes Intervall, $A : I \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ stetig und $b : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig, weiter sei y_1, \dots, y_n ein FS des homogenen Systems $y' = A(x)y$. Dann ist:

$$y_p : I \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ mit } y_p(x) = \sum_{k=1}^n y_k(x) \int_{x_0}^x \frac{W_k(t)}{W(t)} dt$$

mit $x_0 \in I$ beliebig und

$$W_k(x) = \det(y_1(x), \dots, y_{k-1}(x), b(x), y_{k+1}(x), \dots, y_n(x))$$

eine Lösung des inhomogenen Systems

$$y'(x) = A(x)y(x) + b(x)$$

Teil IV

Beweisansätze

Kapitel 12

HM 1

12.1 Grenzwerte

12.1.1 Eindeutigkeit des Grenzwert einer Folge

Zeige, dass Grenzwert a = Grenzwert b , nahrhafte 0

12.1.2 Konvergente Folgen sind beschränkt

Nahrhafte 0, Dreiecks-ugl.

12.1.3 Grenzwertrechenregeln

Nahrhafte 0, Dreiecks-ugl. $a_n \leq \gamma \forall n \Rightarrow a \leq \gamma$ Ausgehend von a über nahrh. 0 zu Def Konvergenz $a_n \leq b_n \forall n \Rightarrow a \leq b$ Definiere Hilfsfolge, argumentiere nach s.o Sandwich-Theorem Zeige, dass $-\varepsilon < c_n < \varepsilon$ (Quasi Epsilon-Schlauch)

12.1.4 Monotoniekriterium

Da $|a_n| < c \forall n$, argumentiere über das Supremum der Menge, die aus a_n besteht

12.1.5 Grenzwert einer konv. Folge = Grenzwert jeder Teilfolge

Def. Konvergenz + Def Teilfolge

12.1.6 Charakterisierung $\overline{\lim}$ und $\underline{\lim}$

Argumentiere über Eigenschaften \sup und \inf

12.1.7 Folge konv. $\overline{\lim} = \underline{\lim}$

Hin: Eindeutigkeit des Grenzwert; Rück: Charakterisierung \limsup und \liminf

12.1.8 Bolzano-Weierstraß

Zunächst für reelle Folge (trivial), dann für komplex: Realteil ist klar, Imaginärteil: Teilfolge konstruieren

12.1.9 Cauchy Kriterium

Hin: nahrhafte 0; Rück: zeige Beschränktheit, dann folge daraus, dass ein Häufungswert existiert und benutze diesen als Grenzwert-Kandidat

12.1.10 Reihe konv. Folge ist Nullfolge

Cauchy für Reihen

12.1.11 Grenzwert RR für Reihen

Grenzwert RR für Folgen

12.1.12 Reihe konv g. 0

Restreihe als Differenz darstellen

12.1.13 Leibniz

Cauchy für Reihen

12.1.14 Absolut konv. \Rightarrow konv.

Cauchy und Dreiecks-ugl.

12.1.15 Majorantenkriterium

Cauchy

12.1.16 Minorantenkriterium

Kontradiktion von Majorantenkriterium

12.1.17 Wurzelkriterium

Majorantenkrit: geom. Summe über $Q := q + \varepsilon < 1$, in q das Wurzelkriterium einsetzen, Charakterisierung $\overline{\lim}$

12.1.18 Quotientenkriterium

Majorantenkrit: setze in q das Quotientenkriterium ein und Argumentation über \lim

12.1.19 Hadamard

Wurzelkriterium+ Fallunterscheidung für Sonderfälle

12.1.20 Differenzieren / Integrieren von Potenzreihen

Wurzelkriterium

12.1.21 Lemma zu sin, cos und exp

Cauchy-Produkt + Definitionen

12.1.22 $e^z \neq 0$ und $e^{-z} = \frac{1}{e^z}$

Inverses Element der Multiplikation

12.1.23 Pythagoras

3. binomische Formel

12.1.24 $e^x > 0 \ \forall x \in \mathbb{R}$

Betrachte $x \geq 0$, angeordneter Körper

12.1.25 $1 + x \leq e^x \ \forall x \in \mathbb{R}$

Bernoulli

12.1.26 $x < y \Rightarrow e^x < e^y$

nährhafte 0

12.1.27 Folgenkriterium

Hin: Def. Folgenkonv. und dann Def Funktionsgrenzwert einsetzen; Rück: Wähle versch. δ und zeige Widerspruch

12.1.28 Cauchy für Funktionen

Hin: Def. FunktionsGrenzwert + Nährhafte 0; Rück: Cauchy für Folgen

12.1.29 Grenzwerte an Intervallgrenzen

Argumentiere über Supremum / Infimum

12.1.30 Verknüpfungen stetiger Funktionen stetig

Folgenkriterium

12.1.31 Potenzreihen sind innerhalb des Konvergenzradius stetig

Abschätzung: $\exists r > 0 : |x - x_0| \text{ bzw. } |x_1| \leq r$, dann einfach $|f(x) - f(x_1)|$ nach oben abschätzen

12.1.32 Umgebung pos. Funktionswerte

Wähle $\varepsilon = \frac{f(x_0)}{2}$, Def. Stetigkeit

12.1.33 Zwischenwertsatz

Definiere $x_0 := \sup\{x \in [a, b] : f(x) \leq y\}$ und zwei Hilfsfolgen, die gegen x_0 konvergieren

12.1.34 Existenz log

Zeigen \exp ist bijektiv (Zwischenwertsatz)

12.1.35 Beschränktheit stetiger Funktionen

Annahme f nicht beschränkt Folgenkriterium

12.1.36 Weierstraß existenz min bzw. max

Zeigen das $\sup = \max$

Kapitel 13

HM 2

13.1 Integration

13.1.1 Riemann integrierbar impliziert Beschränktheit

Betrachte Riemannsumme

13.1.2 Rechenregeln für Integrale (Verkettung usw.)

Betrachte Riemannsumme

13.1.3 Transitivität

Betrachte Riemannsumme

13.1.4 1. MWS der Integralrechnung

Benutze die Transitivität des Integrals und folgende Abschätzung:

$$\begin{aligned} m \cdot g(x) &\leq f(x)g(x) \leq M \cdot g(x) \\ \text{mit} \\ m &:= \inf_{[a,b]}(f) \\ M &:= \sup_{[a,b]}(f) \end{aligned}$$

13.1.5 Eine Stammfunktion einer Funktion ist stetig und differentierbar

Stetigkeit mit $\delta - \varepsilon$ -Kriterium nachrechnen und dabei die Beschränktheit von f ausnutzen

Differentierbarkeit mit Differenzenquotient prüfen (f muss stetig in x_0 sein)

13.1.6 Hauptsatz der DI

Schreibe $F(b) - F(a)$ als Teleskopsumme und nutze den 1. MWS aus HM1
Zweiter Teil folgt aus 13.1.5

13.1.7 Monotonie impliziert Riemann Integrierbarkeit

Betrachte Riemannsumme und nutze SWT (mithilfe der Randpunkte, die ξ einschließen)

13.1.8 2. MWS der Integralrechnung

Nur für den vereinfachten Fall ($f \in C^1[a, b], g \in C[a, b]$):

Definiere passende Stammfunktion für g . Löse das Integral $\int_a^b f(x)g(x)dx$ über partielle Integration. Weiterhin wird 13.1.4 benötigt.

13.1.9 Integralkriterium

Nutze folgende Abschätzung:

$$f(n) = \int_n^{n+1} f(t) dt \geq \int_n^{n+1} f(n) dt \geq \int_n^{n+1} f(n+1) dt = f(n+1)$$

und dann das Majorantenkriterium.

13.2 Gleichmäßige Konvergenz

13.2.1 Stetigkeit der Grenzfunktion

Zeige Stetigkeit mithilfe $\delta - \varepsilon$ -Kriterium durch einfügen von nahrhaften Nullen.
Und dann Dreiecksungleichungen.

13.3 Differentialrechnung mit mehreren Veränderlichen

13.3.1 Grenzwertrechenregeln

Verwende GWRR aus HM1, indem du die einzelnen Vektorkomponenten betrachtest.

13.3.2 Max/Min kompakter Mengen

- (a) Konstruiere eine Folge aus der Menge A , die gegen das Supremum von A konvergiert und zeige damit, dass das Supremum in A enthalten ist.

- (b) Ansatz: Zeige, dass eine konvergente Folge $(y_n)_{n=1}^\infty$ aus dem Bild B von f $B := f(A)$ beschränkt ist und gegen einen Wert in B konvergiert. Dazu nutzt du eine Folge $(x_n)_{n=1}^\infty \in A$ mit $f(x_n) = y_n$. Nutze nun die Stetigkeit von f .

13.3.3 Stetigkeit einer Funktion durch beschränkte partielle Ableitungen

Für $f : G \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ist zu zeigen: $\left| \frac{\partial f}{\partial x_k} \right| \leq c_k \in \mathbb{R} \ \forall k \Rightarrow f \in C(G, \mathbb{R})$

Ansatz: Definition der Stetigkeit mit nahrhaften Nullen (verändere immer nur ein Argument aus f , sodass du den eindimensionalen Mittelwertsatz aus HM1 anwenden kannst).

13.3.4 Differentierbarkeit impliziert Stetigkeit

Betrachte $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ und setze die Definition für totale Differentierbarkeit ein.

13.3.5 Zusammenhang totale und partielle Diff'barkeit

Ist f total differentierbar und es ist zu zeigen: $\frac{\partial f(x)}{\partial r} = f'(x) \cdot r$ mit r eine Richtung.

Ansatz: Richtungsableitung mit Definition ausrechnen und dann die Definition der totalen Differentierbarkeit einsetzen. Betrachte also:

$$\left\| \frac{f(x + h \cdot r) - f(x)}{h} - J_f(x) \cdot r \right\|$$

Weiterhin ist zu zeigen, dass wenn alle partiellen Ableitungen von f stetig sind, f differentierbar ist. Dies haben wir nur für Skalarfelder gezeigt.

Ansatz: Schreibe $f(x) = f(a) + (f(x) - f(a))$ und gehe dann vor wie in 13.3.3.

13.3.6 Kettenregel

Setze in $g \circ f = g(f(x))$ die Definition der totalen Differentierbarkeit ein.

13.3.7 Notwendige Bedingung für Extrema

Definiere eine Hilfsfunktion $g(t) := f(x_0 + t(x - x_0))$ und argumentiere dann für lokale Extrema wie in HM1.

13.3.8 Mittelwertsatz

Hilfsfunktion $g(t) := f(a + t(b - a))$. Verwende den eindimensionale MWS.

13.3.9 Konstante Funktionen

Zeige: $f(x) \equiv \text{const} \Leftrightarrow \nabla f(x) = \vec{0} \forall x \in G$

Ansatz für Rückrichtung: Nutze die Punkte eines Polygonzuges vom Punkt a nach Punkt x und den MWS.

13.3.10 Taylor

Nutze die Hilfsfunktion $g(t) := f(a + t(b - a))$ und Taylor aus HM1.

13.3.11 Hinreichende Bedingung für Extrema

Nutze den Satz von Taylor.

13.3.12 Beweisidee für den Hauptsatz über implizite Funktionen

Laut Voraussetzung ist $g(x, y) \in C^1(G, \mathbb{R})$. Deswegen kann man g als näherungsweise linear annehmen (lokal betrachtet). Mit dieser Näherung lässt sich g einfach nach z.B. y auflösen.

13.3.13 Herleitung für die Ableitung der Auflösung

Hier für den Fall $g : G \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Nutze folgenden Ansatz:

$$\frac{d}{dx} g(x, f(x)) \stackrel{!}{=} 0$$

Diese Gleichung lässt sich einfach nach $f'(x)$ auflösen.

13.3.14 Satz von Lagrange

Nur für den vereinfachten Fall $f, g : G \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

Da in unserem Fall $\nabla g(x_0, y_0) \neq 0$, existiert eine Auflösung a nach x oder y . Damit kannst du dir eine Hilfsfunktion $h(x) := f(x, a(x))$ definieren und diese auf Extremstellen untersuchen (wie in HM1).

13.4 Integration in mehreren Veränderlichen

13.4.1 Ableitung in Integral ziehen

Betrachte

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$$

sowie

$$F'(x) = \int_a^b f_x(x, t) dt$$

$F'(x)$ einsetzen, Integral in Grenzwert einsetzen, MWS, zeigen das Differenz im Grenzwert 0.

13.4.2 Fubini

Hilfsfunktion:

$$g(u) = \int_{\alpha}^{\beta} \int_a^b f(x, t) \, dt \, dx - \int_a^b \int_{\alpha}^{\beta} f(x, t) \, dx \, dt$$

zeigen dass $g'(u) \equiv 0$ und $g(x) = g(a) = 0$.

13.4.3 Leibniz Regel

Hilfsfunktion:

$$G(x, a, b) = \int_a^b f(x, t) \, dt$$

∇G berechnen, innere Ableitung.

13.4.4 Beweis-Idee Kurvenintegrale (Substitutionsregel)

Riemann Summe, Mittelwertsatz, Abschätzung für verschiedene ξ , da f stetig.

13.4.5 1. Hauptsatz für Kurvenintegrale

Kurvenintegral mit Parametrisierung, integrant als Ableitung darstellen.

13.4.6 Äquivalente Aussagen für Kurvenintegrale

Kurven kombinieren/aufteilen um aus mehreren Kurven eine geschlossene bzw. aus einer geschlossenen Kurven mehrer mit gleichem Anfangs-/Endpunkt zu erzeugen.

13.4.7 2. Hauptsatz für Kurvenintegrale

1. f stetig, $F \in C^2$, Satz von Schwarz

2. Nur für Sternförmiges Gebiet.

F als Integral von x_0 (Mittelpunkt von Sternförmigem Gebiet) zu x darstellen und Weg Parametrisieren.

Ableitung von F nach x_k berechnen, Skalarprodukt als Summe schreiben, Produktregel, Integrabilitätsbedingung anwenden, als Ableitung nach t darstellen.

13.4.8 Gauß'sche Integralsätze in der Ebene

1. Hilfsfunktion:

$$h(x, y) = \begin{pmatrix} -f_2(x, y) \\ f_1(x, y) \end{pmatrix}$$

zeigen dass $\iint \operatorname{div} h = - \iint \operatorname{rot} f$, Stokes anwenden, f durch h darstellen, Normalenvektor normieren, Linienintegral.

2. Hilfsfunktion:

$$h(x, y) = f_1(x, y) \nabla f_2(x, y) - f_2(x, y) \nabla f_1(x, y)$$

$\operatorname{div} h$ und $h\nu$ ausrechnen und Gleichheit über ersten Teil von Gauß.

Teil V

Klausurvorbereitung

Hier findest du eine kurze Übersicht über alle Themen, die du für die jeweilige Klausur beherrschen solltest: Wichtige Definitionen und Beweise, die man gut in der Klausur abfragen kann, besonders trickreiche Aufgaben, die mehrmals in der Vorlesung oder in der Übung besprochen wurden und generelle Kompetenzen, die höchstwahrscheinlich von dir verlangt werden.

Kapitel 14

HM1

Kapitel 15

HM2

15.1 Integration

15.1.1 Wichtige Beweise

- 1. und 2. Mittelwertsatz der Integralrechnung
- Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

15.1.2 Typische Aufgaben

Berechne den GW von z.B. folgender Reihe (hast du also das Prinzip der Riemann-Summen verstanden?)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \sin \frac{k\pi}{n}$$

Untersuche Reihen auf Konvergenz (wende das Integralkriterium an)

$$\sum_{n=-m}^{\infty} \frac{1}{1+n^2} \quad (m \in \mathbb{N})$$

Oder diese hier (Tipp: Eulersche Gammafunktion)

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^3 e^{-n^2}$$

Untersuche uneigentliche Integrale auf Konvergenz

15.1.3 Trickreiche Aufgaben

Schwierige uneigentliche Integrale. Konvergiert beispielsweise dieses Integral? (Ja, tut es)

$$\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x} \, dx$$

15.1.4 Weitere hilfreiche Dinge

Schau dir uneigentliche Integrale an, die man gut als Majorante oder Minorante verwenden kann, z.B.:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx$$

15.2 Gleichmäßige Konvergenz

15.2.1 Wichtige Beweise

- Stetigkeit der Grenzfunktion
- Satz von Dini (ziemlich tricky, aber die Idee sollte man im Kopf haben)

15.2.2 Typische Aufgaben

Untersuche Reihen auf gleichmäßige Konvergenz, z.B.:

$$\sum_{k=0}^{\infty} x(1-x)^k, \quad \forall x \in [0, 1] \quad \text{bzw.} \quad \forall x \in [a, 1] \quad \text{mit} \quad 0 < a \leq 1$$

15.2.3 Trickreiche Aufgaben

Auf welchem Intervall konvergiert die Riemannsche Zeta-Funktion gleichmäßig?

$$\zeta(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

15.3 Differentialrechnung mit mehreren Veränderlichen

15.3.1 Wichtige Beweise

- Beweise über z.B. die Vereinigung von beliebig vielen offenen Mengen
- Mehrdimensionaler Mittelwertsatz
- Notwendige Bedingung für Extrema
- Satz über konstante Funktionen
- Satz von Taylor
- Hinreichende Bedingung für Extrema
- Herleitung für die Ableitung der Auflösung (kann sehr hilfreich sein, wenn man die Formel vergessen hat)

15.3.2 Typische Aufgaben

Kannst du:

- dir Mengen vorstellen und zeichnen?
- Funktionsgrenzwerte berechnen?
- Funktionen auf Stetigkeit prüfen?
- partielle Ableitungen und Richtungsableitungen berechnen?
- Funktionen auf totale Diff'barkeit prüfen?
- Extremwerte von Funktionen finden und klassifizieren?
- mit Matrizen rechnen und Inverse bestimmen?
- prüfen, ob eine Funktion umkehrbar ist und die Umkehrung bestimmen?
- die Ableitung einer unbekannten Umkehrfunktion bestimmen?
- prüfen, ob eine Funktion nach einer / mehreren Variablen auflösbar ist und die Auflösung bestimmen?
- die Ableitung einer unbekannten Auflösung berechnen?
- Extrema unter Nebenbedingung bestimmen?

15.4 Integration in mehreren Veränderlichen

15.4.1 Wichtige Beweise

- Fubini
- Ableitung eines Parameterintegrals
- Leibniz-Formel herleiten können
- 1. Hauptsatz für Kurvenintegrale

15.4.2 Typische Aufgaben

Kannst du:

- die Länge von Kurven bestimmen?
- Funktionen auf Wegunabhängigkeit prüfen?
- Potentiale und Stammfunktionen berechnen?
- Flächen und Volumina berechnen mit:

- Fubini und Cavalieri?
- der Substitutionsregel?
- Integralsätze:
 - verifizieren?
 - geschickt anwenden?

15.4.3 Trickreiche Aufgaben

Schau dir schwierige uneigentliche Integrale an, wie z.B.:

$$\int_0^1 \frac{t^b - t^a}{\log t} dt$$

oder

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$$

15.5 Lineare Algebra

15.5.1 Typische Aufgaben

Kannst du:

- prüfen, ob eine Menge ein Vektorraum ist?
- prüfen, ob eine Menge ein Unterraum ist?
- lineare Unabhängigkeit nachprüfen?
- die Basis eines VR bestimmen?
- die Dimension eines VR bestimmen?
- LGS lösen?

Teil VI

Appendix

Kapitel 16

Grenzwerte

16.1 Konvergenzkriterien

Zusammenfassung verschiedener Konvergenzkriterien nach Wikipedia (Seite: Konvergenzkriterium):

Kriterium	nur f. mon. F.	Konv.	Div.	abs. Konv.	Absch.	Fehlerabsch.
Nullfolgenkriterium			X			
Monotoniekriterium		X		X		
Leibniz-Kriterium	X	X			X	X
Cauchy-Kriterium		X	X			
Abel-Kriterium	X	X				
Dirichlet-Kriterium	X	X				
Majorantenkriterium		X		X		
Minorantenkriterium			X			
Wurzelkriterium		X	X	X		X
Integralkriterium	X	X	X	X	X	
Cauchy-Kriterium	X	X	X	X		
Grenzwertkriterium		X	X			
Quotientenkriterium		X	X	X		X
Gauß-Kriterium		X	X	X		
Raabe-Kriterium		X	X	X		
Kummer-Kriterium		X	X	X		
Bertrand-Kriterium		X	X	X		
Ermakoff-Kriterium	X	X	X	X		

Kapitel 17

Integration

17.1 Riemann-Integrierbarkeit

Kriterium	Integrierbar	Nicht Integrierbar
Funktion nicht beschränkt		X
Verknüpfung Riemann-Integrierbarer Funktionen	X	
Stetige Funktion	X	
Endliche vielen Änderungen zu Riemann-Int.barer Funktion	X	
Monotone Funktion	X	

Kapitel 18

Integration in mehreren Veränderlichen

18.1 Häufige Additionstheoreme

$$\begin{aligned}\sin^2(t) &= \frac{1}{2}(1 - \cos(2t)) \\ \cos^2(t) &= \frac{1}{2}(1 + \cos(2t)) \\ \sin(t) \cos(t) &= \frac{1}{2} \sin(2t)\end{aligned}$$

18.2 Integral-Shortcuts

$$\begin{aligned}
 \int_a^b \sin(t) \, dt &= \int_a^b \cos(t) \, dt = 0 \quad \text{Für eine volle Periode } [a, b] \subset \mathbb{R} \\
 \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \sin(t) \, dt &= \pm 2 \quad \forall k \in \mathbb{Z} \\
 \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \cos(t) \, dt &= 0 \quad \forall k \in \mathbb{Z} \\
 \int_{l\pi}^{(l+1)\pi} \cos(t) \, dt &= \pm 2 \quad \forall l \in \{x : x = k + \frac{1}{2}, k \in \mathbb{Z}\} \\
 \int_{l\pi}^{(l+1)\pi} \sin(t) \, dt &= 0 \quad \forall l \in \{x : x = k + \frac{1}{2}, k \in \mathbb{Z}\} \\
 \int_a^b \sin(t) \cos(t) \, dt &= 0 \quad \forall [a, b] \subseteq \mathbb{R} \text{ mit } a - b = k\pi, k \in \mathbb{Z} \\
 \int_a^b \sin^2(t) \, dt &= \frac{a-b}{2} \quad \forall [a, b] \subseteq \mathbb{R} \text{ mit } a - b = k\pi, k \in \mathbb{Z} \\
 \int_a^b \cos^2(t) \, dt &= \frac{a-b}{2} \quad \forall [a, b] \subseteq \mathbb{R} \text{ mit } a - b = k\pi, k \in \mathbb{Z}
 \end{aligned}$$