پاسخ تشریحی آزمون فصل دوم

() گزینه ۳ صحیح است

بررسی خطی بودن:

$$T\{\alpha x(t)\} = \alpha x(r) \cdot \alpha x(t-r) + \alpha x(t) \neq \alpha T\{x(t)\}$$

ست. $\alpha T\{x(t)\}$ برابر $T\{\alpha x(t)\}$ نمیباشد، پس این سیستم غیرخطی است.

بررسی TI بودن:

$$\begin{cases} T\left\{x(t-t_\circ)\right\} = x(\mathbf{r}-t_\circ) \cdot x(t-\mathbf{r}-t_\circ) + x(t-t_\circ) \\ \\ y(t-t_\circ) = x(\mathbf{r}) \cdot x(t-t_\circ-\mathbf{r}) + x(t-t_\circ) \end{cases} \xrightarrow{T\left\{x(t-t_\circ)\right\} \neq y(t-t_\circ)} TV \text{ where } TV$$

۲) گزینه ۱ صحیح است

ابتدا برای راحتی در محاسبات، با تغییر متغیر $\lambda=\alpha$ در رابطه سیستم داریم:

$$y(t) = \int_{-t}^{+\infty} x(-\lambda) \, d\lambda = \int_{t}^{-\infty} x(\alpha) (-d\alpha) = \int_{-\infty}^{t} x(\alpha) \, d\alpha$$

بررسی علی بودن: طبق رابطه فوق، خروجی در هر لحظه t به t (از $\alpha = -\infty$ تا $\alpha = 1$) بستگی دارد. بنابراین خروجی در هر لحظه t به ورودیِ لحظات بعد از t وابسته نیست. پس سیستم علی است. بررسی t بودن:

۳) گزینه ۴ صحیح است.

بررسی پایداری

$$x(t) = A \longrightarrow x(t-\alpha) = A$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} e^{-\left|\alpha\right|} x(t-\alpha) \, d\alpha = \int_{-\infty}^{t} e^{-\left|\alpha\right|} A \, d\alpha = A \int_{-\infty}^{t} e^{-\left|\alpha\right|} d\alpha < A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left|\alpha\right|} d\alpha < \infty$$

$$x = A$$

توجه کنید که اولاً $\int_{-\infty}^{t} e^{-|\alpha|} d\alpha$ از $\int_{-\infty}^{t} e^{-|\alpha|} d\alpha$ کوچکتر میباشد، زیـرا عبـارت داخـل انتگـرال (یعنی $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|\alpha|} d\alpha$ مقدار $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|\alpha|} d\alpha$ معدود است، زیـرا یـک نمـایی از دو طـرف نزولی، در داخل آن قرار دارد. بنابراین خروجی به ازای همه t ها کرانـدار مـیباشـد و در نتیجـه سیسـتم پایدار است.

بررسی TI بودن:

$$\begin{cases} T\left\{x(t-t_{\circ})\right\} = \int_{-\infty}^{t} e^{-|\alpha|} x(t-\alpha-t_{\circ}) \, d\alpha \\ \\ y(t-t_{\circ}) = \int_{-\infty}^{t-t_{\circ}} e^{-|\alpha|} x(t-t_{\circ}-\alpha) \, d\alpha \end{cases} \qquad \qquad T\left\{x(t-t_{\circ})\right\} \neq y(t-t_{\circ}) \qquad TV \text{ where } T \in \mathbb{R}^{n}$$

۴) گزینه ۲ صحیح است.

با توجه به رابطه سیستم، خروجی در هر لحظه t به ورودی لحظات گذشته و آینده، بستگی نـدارد، زیـرا فرم ورودی در رابطه سیستم، فقط به صورت (x(t است و ورودی لحظات گذشته و آینده در رابطه سيستم ديده نمي شود. بنابراين سيستم بدون حافظه است.

برای بررسی پایداری فرض می کنیم ورودی محدود و برابر A باشد، داریم:

$$x(t) = A \longrightarrow y(t) = \begin{cases} e^{-t}, & t \le A \\ A, & t > A \end{cases}$$

خروجی در لحظه $\infty - = t$ ، از ضابطه اول برابر ∞ بهدست می آید. پس سیستم ناپایدار است.

۵) گزینه ۱ صحیح است.

بررسی سیستم A:

ورودی (t+1)، لحظات قبل از $(x(1\downarrow))$ را پوشش و به خروجی انتقال می دهد. ضابطه دوم نیز ورودی بعضی از زمانها را به خروجی منتقل می کند و چون ضابطههای اول و سوم، ورودی همه زمانها را به خروجی انتقال میدهند، دیگر نیازی به بررسی ضابطه دوم نیست. بنابراین ورودی همه زمان ها به خروجی منتقل میشود. همچنین همه مقادیر ورودی (مقادیر X) نیز به خروجی منتقل میشـود و هـیچ محـدودیتی روی آن وجود ندارد. پس شرط لازم برای وارون پذیری برقرار است و بنابراین باید مرحله دوم را مورد بررسی قرار دهیم؛ یعنی باید ورودی را بر حسب خروجی بنویسیم. داریم:

$$\begin{cases} y(t) = x(t) &, t \ge 1 & \longrightarrow & x(t) = y(t) &, t \ge 1 \\ y(t) = x^{\Upsilon}(t) &, \circ \le t < 1 & \longrightarrow & x(t) = \pm \sqrt{y(t)} &, \circ \le t < 1 \\ y(t) = x(t+1) &, t < \circ & \xrightarrow{t \longrightarrow t-1} & x(t) = y(t-1) &, \underbrace{t-1 < \circ}_{t < 1} \end{cases}$$

در هر ضابطه ورودی را بر حسب خروجی نوشتیم، ولی ظاهراً در علامت ضابطه دوم ابهام داریم، زیرا دو جواب مثبت و منفی برای ورودی به دست می آید. اما می توان این ابهام را برطرف کرد. کافی است که ضابطه دوم را حذف نموده و ورودی در لحظات 1>t>0 را از ضابطه سوم که ابهام نداریم به دست آوریم. زیرا زمان 1>t>0 در شرط ضابطه سوم نیز صدق می کند. بنابراین رابطه فوق به شکل زیر ساده می شود:

$$\begin{cases} x(t) = y(t) &, t \ge 1 \\ x(t) = y(t-1) &, t < 1 \end{cases}$$

ملاحظه می کنید که ابهامی در ضابطهها وجود ندارد. حال به شرطها نگاه می کنیم. شرطها روی زمان است (حالت اول نکته ۲۴)؛ پس شرط وارون پذیری این است که همه زمانها در شرطها پوشش داده شوند که همین طور است. در نتیجه این سیستم وارون پذیر است.

بررسی سیستم B:

$$y(t) = t x(Y) + x(t-Y)$$

ابتدا مرحله اول را بررسی می کنیم؛ با تغییرات t، ورودیِ همه زمانها به خروجی منتقل می شود. همچنین همه مقادیر ورودی (مقادیر x) نیز به خروجی منتقل می شود و هیچ محدودیتی روی آن وجود ندارد. پس شرط لازم برای وارون پذیری برقرار است و بنابراین باید مرحله دوم را مورد بررسی قرار دهیم؛ باید سعی کنیم ورودی را بر حسب خروجی بنویسیم؛ برای این کار ابتدا باید x(t) را بر حسب خروجی به دست آوریم. اگر در دو طرف رابطه سیستم، x(t) قرار دهیم، خواهیم داشت:

$$y(t) = t x(\tau) + x(t-1) \xrightarrow{t=\tau} y(\tau) = \tau x(\tau) + x(\tau) \implies x(\tau) = \frac{1}{\tau} y(\tau)$$

با جایگذاری (x(۲) از رابطه فوق، در رابطه سیستم داریم:

$$y(t) = t x(\tau) + x(t-1) = t \frac{1}{\epsilon} y(\tau) + x(t-1) \qquad \xrightarrow{t \to t+1} \qquad x(t) = y(t+1) - (t+1) \frac{1}{\epsilon} y(\tau)$$

ملاحظه می کنید که ورودی به صورت تابعی بدون ابهام از خروجی به دست آمد و ورودی را می توان با استفاده از رابطه فوق، از روی خروجی محاسبه و بازیابی نمود. در نتیجه سیستم وارون پذیر است.