


問題

$n \geq 1$ を整数とする. 同じサイズの立方体型ランプを隙間なく n^3 個並べて, 全体として $n \times n \times n$ の大きな立方体を作る. すると, その外面には各面に $n \times n$ 個, 計 $6n^2$ 個の小正方形 (外側に見えているランプの外面) が現れる. 各ランプは on/off のいずれかの状態をもち, 外面の小正方形のうち一つを押すと, その小正方形とちょうど反対側にある小正方形を結ぶ直線上の n 個のランプだけが同時に反転 (on \leftrightarrow off) する. 全ランプの on/off の状態が与えられたとき, 上記の操作の繰り返しのみですべてのランプを off にできるための必要十分条件をなるべく簡潔に記述し, その条件の正しさを証明せよ.

1 Small example


例として, まず $2 \times 2 \times 2$ の立方体を考えます. 点灯パターンは次のように書かれます:

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8 \in \mathbb{F}_2$$



切り替えパターンは次のように書かれます:

$$y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6, y_7, y_8, y_9, y_{10}, y_{11}, y_{12} \in \mathbb{F}_2$$



1 回の切り替え操作は $y_i = 1(\text{true})$ に対応します. 切り替え後, 光の結果は y_i と接続された x_n および x_m に対して $x_n \oplus y_i$, $x_m \oplus y_i$ となります. したがって, 全てのライトが同一の点灯を持つというのは, 与えられた x_1, \dots, x_8 に対して, 次の式を満たす y_1, \dots, y_{12} が存在する時です.

$$(x_1 \oplus y_1 \oplus y_5 \oplus y_{11}) \wedge \dots \wedge (x_8 \oplus y_8 \oplus y_7 \oplus y_{10})$$

$$(x_1 \oplus y_1 \oplus y_{11} \oplus y_5) \wedge \quad (1)$$

$$(x_2 \oplus y_3 \oplus y_5 \oplus y_6) \wedge \quad (2)$$

$$(x_3 \oplus y_{12} \oplus y_6 \oplus y_9) \wedge \quad (3)$$

$$(x_4 \oplus y_{11} \oplus y_{12} \oplus y_7) \wedge \quad (4)$$

$$(x_5 \oplus y_1 \oplus y_2 \oplus y_8) \wedge \quad (5)$$

$$(x_6 \oplus y_2 \oplus y_3 \oplus y_4) \wedge \quad (6)$$

$$(x_7 \oplus y_4 \oplus y_9 \oplus y_{10}) \wedge \quad (7)$$

$$(x_8 \oplus y_{10} \oplus y_7 \oplus y_8) \quad (8)$$

各辺に対して 2 回以上の切り替え操作の必要性を考慮する必要があります。どのタイミングでも、切り替え回数が奇数であれば 1 回の切り替えに帰着し、偶数であれば切り替えなしに帰着します。これは排他的論理和の計算によるものです。以上の議論から以下の連立方程式が立式できる。

$$\begin{cases} x_1 \oplus y_1 \oplus y_{11} \oplus y_5 &= 1 \\ x_2 \oplus y_3 \oplus y_5 \oplus y_6 &= 1 \\ x_3 \oplus y_{12} \oplus y_6 \oplus y_9 &= 1 \\ x_4 \oplus y_{11} \oplus y_{12} \oplus y_7 &= 1 \\ x_5 \oplus y_1 \oplus y_2 \oplus y_8 &= 1 \\ x_6 \oplus y_2 \oplus y_3 \oplus y_4 &= 1 \\ x_7 \oplus y_4 \oplus y_9 \oplus y_{10} &= 1 \\ x_8 \oplus y_{10} \oplus y_7 \oplus y_8 &= 1 \end{cases}$$

したがって

$$\begin{cases} y_1 \oplus y_{11} \oplus y_5 &= \neg x_1 \\ y_3 \oplus y_5 \oplus y_6 &= \neg x_2 \\ y_{12} \oplus y_6 \oplus y_9 &= \neg x_3 \\ y_{11} \oplus y_{12} \oplus y_7 &= \neg x_4 \\ y_1 \oplus y_2 \oplus y_8 &= \neg x_5 \\ y_2 \oplus y_3 \oplus y_4 &= \neg x_6 \\ y_4 \oplus y_9 \oplus y_{10} &= \neg x_7 \\ y_{10} \oplus y_7 \oplus y_8 &= \neg x_8 \end{cases}$$

連立方程式を掃き出し法で解くことを考える。行基本変形によって矛盾行の存在の有無が解の存在に対応し、つまりボタン押下戦略の有無に対応する。係数が打ち消されるのは、排他的論理和によって打ち消しが発生したときのみであり、その可能性は全方程式をすべて足したときのみである。そこで、全両辺の排他的論理和をとってみると

$$\begin{aligned} (y_1 \oplus y_{11} \oplus y_5) \oplus \cdots \oplus (y_{10} \oplus y_7 \oplus y_8) &= \neg x_1 \oplus \cdots \oplus \neg x_8 \\ 0 &= \neg x_1 \oplus \cdots \oplus \neg x_8 \\ 0 &= x_1 \oplus \cdots \oplus x_8 \end{aligned}$$

つまり y_i の値に関係なく x_j は上記の条件を満たす必要がある。そしてこのとき掃き出し法によって以下の解

を得る。

$$y_1 = \neg x_1 \oplus y_5 \oplus y_{11} \quad (9)$$

$$y_3 = \neg x_2 \oplus y_5 \oplus y_6 \quad (10)$$

$$y_{12} = \neg x_3 \oplus y_6 \oplus y_9 \quad (11)$$


$$y_7 = \neg x_4 \oplus y_{11} \oplus y_{12} \quad (12)$$

$$y_2 = \neg x_5 \oplus y_1 \oplus y_8 \quad (13)$$

$$y_4 = \neg x_6 \oplus y_2 \oplus y_3 \quad (14)$$

$$y_{10} = \neg x_7 \oplus y_4 \oplus y_9 \quad (15)$$

2 Larger example



$$(x_1 \otimes y_{1,4,7} \otimes y_{1,2,3} \otimes y_{1,10,19}) \wedge \cdots \wedge (x_{27} \otimes y_{25,26,27} \otimes y_{21,24,27} \otimes y_{9,18,27})$$

$$y_{1,2,3} \otimes \cdots \otimes y_{25,26,27} = x_1 \otimes \cdots \otimes x_{27}$$

3 General case

$$f : x_{i,j,k} \mapsto (y_{-,j,k}, y_{i,-,k}, y_{i,j,-})$$

$$\bigwedge_{i=1,\dots,n} \bigwedge_{j=1,\dots,n} \bigwedge_{k=1,\dots,n} x_{i,j,k} \oplus y_{-,j,k} \oplus y_{i,-,k} \oplus y_{i,j,-}$$

$$\begin{cases} x_{1,1,1} \oplus y_{-,1,1} \oplus y_{1,-,1} \oplus y_{1,1,-} & = 1 \\ & \vdots \\ x_{i,j,k} \oplus y_{-,j,k} \oplus y_{i,-,k} \oplus y_{i,j,-} & = 1 \\ & \vdots \\ x_{n,n,n} \oplus y_{-,n,n} \oplus y_{n,-,n} \oplus y_{n,n,-} & = 1 \end{cases}$$

掃き出し法の最中で矛盾行が存在するとすれば、それはすべての行を足した時のみである。なぜならば係数行列を足した時0となるのは、各変数について偶数回ずつ足す時のみだからである。しかし、変数の表れ方から係数がすべて偶数になりうるのは、総和の時のみであり、それも n が偶数の時しか発生しない。

$$\bigoplus_n y_{-,1,1} \oplus \cdots \oplus \bigoplus_n y_{n,n,-} = x_{1,1,1} \oplus \cdots \oplus x_{n,n,n}$$

$$\bigoplus_n y_{*,*,*} = \begin{cases} 0 & \text{if } n \text{ is even} \\ y_{*,*,*} & \text{if } n \text{ is odd} \end{cases}$$

3.1 Odd case