


- No hacerse masaje en el sitio de aplicación: colocar hielo o paños de agua fría en el lugar de aplicación o tomar medicamento según criterio médico.
- Si usted se vacuna contra meningococo o tétanos son normales las siguientes reacciones: fiebre, dolor frecuente y enrojecimiento,
- Si se aplica M.M.R. (Rubeola, Papera y Sarampión) debe esperar tres (3) meses para quedar en embarazo.
- Si se presenta un síntoma diferente a los explicados anteriormente 000230 por favor dirigirse al médico.



Yo no corro riesgos... me vacuno!

Inteligencia es prevenir, no solucionar

Calle 49 No. 40-11 Loca 2 Calle 40 No. 40-11

ADACEL®
Toxoides tetánico y diftérico reducido

Línea Única 444 92 86 / www.previnm.com

Orientamos su estado actual de vacunación Atención de Lunes a Sábado - Jornada Continua PRECIOS ESPECIALES PARA ESTUDIANTES



Qué inteligente es prevenir, vacunación segura

CERTIFICADO DE VACUNACIÓN DEL ADULTO

NOMBRES:

BNWIN

DANLE L.

APELLIDOS:

VILLIB

201 AS

DOC. IDENT.: C.C. 7T.I. PASAPORTE

No. 1040 181 869

F. NACIMIENTO: Día 1 6 Mes O 9 Año 1 9 91

