

國立成功大學 學年度第 學期考試試卷				107 年 11 月 6 日	
National Cheng Kung University Examination Sheet for Academic Year:				Semester: Year Month Day	
姓名 Name	劉育如	科目名稱 Subject Name	電磁學	教師簽章 Signature of Instructor	
學號 Student No.	E94056233	評閱成績 Score	95		
院系 College	工學院 工機系 三年 班 College Department Year Class				

Part A. 1. gradient (梯度): 在純量場中, 純量隨空間的最大變化率及方向。  $\Delta$  詳述細節。

+13 +5  $V + \Delta V$   $V$   $\left| \frac{\Delta V}{\Delta l} \right| < \left| \frac{\Delta V}{\Delta n} \right|$   $\nabla V = \hat{a}_n \frac{dV}{dn}$  ✓

2. divergence (散度): 從微體積上, 其外圍封閉曲面上的通量總和。

+4  $\nabla \cdot \vec{A} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S}}{\Delta V}$  illustration?

3. curl (旋度): 向量場中, 微小面積上, 其外圍 contour 的最大環流量及其相對應的方向

+4  $\nabla \times \vec{A} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{[\hat{a}_n \oint \vec{A} \cdot d\vec{l}]}{\Delta S}$

2. fundamental postulates of electrostatics in free space.

+18 [Differential form]

[Integral form]

+3 ①  $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_V}{\epsilon_0}$  Divergence Theorem

+5 ①  $\int_V \nabla \cdot \vec{E} dV = \int_V \frac{\rho_V}{\epsilon_0} dV = \frac{Q}{\epsilon_0}$

$\epsilon_0$ : 真空介電係數  
 $\rho_V$ : 體電荷密度  
②  $\nabla \times \vec{E} = 0$  +5

②  $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}$  (Gauss's Law)

在一個封閉曲面上電量的通量等於封閉曲面內所有電量和除以  $\epsilon_0$  體電荷密度


③  $\int_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = 0$

Stoke's Theorem +5  $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

在電場中沿任意封閉路徑移動電荷, 作功量為 0.

3. No.  $\vec{E} = -\nabla V$   $\vec{E} = 0$  不代表  $V$  為 0, 是代表  $\nabla V = 0$ .

+10  $\epsilon_x$  在靜電場中的金屬球殼



球殼中的電荷會被  $+Q$  吸引及排斥到導體表面, 導致其內部沒有自由電存在  $\Rightarrow \rho_V = 0$  由 fundamental postulate  $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_V}{\epsilon_0} = 0 \Rightarrow \vec{E} = 0$ .

在導體內部  $\vec{E} = 0$ , 移動電荷並不會使其電位能增加

$V_1 = V_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_1}$

由此即可證明, 即使  $\vec{E} = 0$ , 並不代表  $V$  亦為 0.

4. 良好的金屬導體中沒有自由電荷 (續寫轉背頁)

+5 是因為其內部電荷會被吸引及排斥到導體表面, 如上題所繪之圖形。

Part B. 1.



+20

why 徑向  $\vec{E} = E_R \hat{R}$

①  $0 \leq R \leq b$ .  $\rho_V = -\rho$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{-\rho (\frac{4}{3}\pi R^3)}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = E_R \hat{R} \quad d\vec{s} = ds \hat{R}$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = E_R (4\pi R^2) = \frac{-\rho (\frac{4}{3}\pi R^3)}{\epsilon_0} \Rightarrow E_R = \frac{-\rho R}{3\epsilon_0}$$


$$\vec{E} = \frac{-\rho R}{3\epsilon_0} \hat{R}$$

②  $R > b$ .  $\rho_V = 0$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{-\rho (\frac{4}{3}\pi b^3)}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = E_R \hat{R} \quad d\vec{s} = ds \hat{R} \quad \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = E_R (4\pi R^2) = \frac{-\rho (\frac{4}{3}\pi b^3)}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E_R = \frac{-\rho b^3}{3\epsilon_0 R^2} \quad \vec{E} = \frac{-\rho b^3}{3\epsilon_0 R^2} \hat{R}$$



+19

$$\vec{E} = \frac{\rho}{4\pi\epsilon_0 R^2} \hat{R} \quad d\vec{E} = \frac{\rho ds' \vec{R}}{4\pi\epsilon_0 R^3}$$

$$\vec{R} = -r \hat{r} + z \hat{z} \quad R = \sqrt{r^2 + z^2}$$

$$\vec{E} = \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{-r \hat{r} + z \hat{z}}{(\sqrt{r^2 + z^2})^3} ds'$$

$$= \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^b \frac{-r}{(r^2 + z^2)^{3/2}} r dr d\phi + \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^b \frac{z}{(r^2 + z^2)^{3/2}} r dr d\phi \hat{z}$$

+15

會有封閉項抵消

$$= \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^b \frac{z r}{(r^2 + z^2)^{3/2}} dr d\phi \hat{z}$$

$$\text{令 } r^2 + z^2 = u \quad du = 2r dr \Rightarrow r dr = \frac{1}{2} du$$

$$= \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_z^{z^2+b^2} \frac{z}{u^{3/2}} \times \frac{1}{2} du d\phi \hat{z}$$

$$= \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0} \times 2\pi \times \frac{1}{2} \times z \times (-2u^{-1/2}) \Big|_z^{z^2+b^2} \hat{z}$$

$$= -\frac{\rho_s z}{2\epsilon_0} \left( \frac{1}{\sqrt{b^2 + z^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2}} \right) \hat{z}$$

if b is large.

$$\vec{E} = -\frac{\rho_s z}{2\epsilon_0} \left( \frac{1}{b} - \frac{1}{|z|} \right) \hat{z}$$

+4

3. (a)

+10

$$\rho_{ps} = \vec{p} \cdot \hat{n} \quad \hat{n} = \hat{R} \\ = \rho_0 \hat{a}_x \cdot \hat{R} = \rho_0 \sin\theta \cos\phi$$

$$\rho_{pv} = -\nabla \cdot \vec{p} = -\frac{\partial}{\partial x} \rho_0 = 0$$

$$\begin{aligned} \oint_S \rho_{ps} ds &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \rho_0 \sin\theta \cos\phi R^2 \sin\theta d\theta d\phi \\ &= \rho_0 R^2 \int_0^{2\pi} \cos\phi d\phi \int_0^\pi \sin^2\theta d\theta = 0 \end{aligned}$$

$$\int_V \rho_{pv} dV = 0$$