

Astrarium（アストラリウム） 使用マニュアル

バージョン 1.2 対応

2026年7月29日

目次

1. はじめに
2. 画面の構成
3. 観測地を決める
4. 星図の操作
5. 時刻を動かす
6. 表示を切り替える
7. 流星群
8. 彗星・小惑星
9. 人工衛星
10. イベント
11. 情報タブ
12. 音声タブ
13. こんなときは
14. 用語
15. クレジットと問い合わせ

1. はじめに

Astrarium（アストラリウム） は、iPhone と iPad で動く星座早見・天文シミュレーターです。いま空にあるものを表示するだけでなく、時刻を自由に動かして過去と未来の空を再現し、惑星の満ち欠け、日食・月食、流星群、人工衛星、彗星までを同じ星図の上で扱えます。

計算は JPL の惑星暦 DE421、IAU の歳差・章動モデル、IERS の地球回転パラメータに基づいており、位置は実用上の観測計画に十分な精度で求められます。

1.1 動作環境

項目	内容
対応機種	iPhone / iPad (iOS・iPadOS 17.0 以降)
画面の向き	縦・横どちらでも使えます
価格	無料。App 内課金・広告はありません
通信	星図の表示・計算はすべて端末内で完結します（オフライン可）
データ収集	行っていません。観測地や設定は端末内にのみ保存されます

インターネット接続が必要なのは、次の三つを**更新するとき**だけです。

- 人工衛星の軌道要素（TLE）のダウンロード
- 彗星・小惑星の軌道要素の取得（MPC / JPL）
- 現在地の取得（位置情報サービス。通信ではなく端末の機能です）

1.2 最初にすること

1. アプリを起動すると、東京を観測地とした今の空が表示されます。
2. 上段の  を押すと、現在地の使用を許可するか尋ねられます。許可すると、最寄りの登録地点の名前と距離が表示され、観測地がその場所になります。許可しない場合は、後述の一覧か手動入力で観測地を選べます。
3. 屋外で使うときは （ナイトビジョン）を押してください。画面全体が赤い表示になり、暗順応した目が眩みにくくなります。

2. 画面の構成

画面は上から順に五つの区画に分かれています。

区画	位置	役割
上段バー	最上部	時計、観測地、現在地、パネル、言語、ナイトビジョン
星図	中央	星空そのもの。指で操作します
クイックバー	星図の下	等級スライダーと、よく使う表示切替 12 個
時刻バー	その下	表示モード、経緯線、時刻の移動と再生
署名行	最下部	ロゴと作者名（それぞれリンク）



図 1 全天モードの画面全体（東京・2026 年 8 月 12 日 20 時）

2.1 上段バー



図 2 上段バー。左から観測地の分類・地点、現在地、パネル、言語、ナイトビジョン

- **時計**：観測地の地方時、世界時（UT）、地方恒星時（LST）を並べて表示します。LST は「いまどの赤経が南中しているか」を表す時刻で、望遠鏡を向けるときの目安になります。
- **観測地の分類**：都道府県／国内の観測適地／海外の都市／天文台などを選びます。天文台を選ぶと、その右にもう一つ「地域」のプルダウンが現れ、大陸ごとに絞り込めます。
- **観測地**：分類の中から具体的な地点を選びます。都道府県と国内星見スポットは 北から南の順、海外の都市は日本語表示ならあいうえお順、英語表示なら アルファベット順に並びます。
- 📍：現在地を観測地にします。
- ☰：詳細パネル（六つのタブ）を開閉します。
- **EN / 日本語**：表示言語を切り替えます。天体名・星座名・説明文もすべて切り替わります。
- 🔴：ナイトビジョン。もう一度押すと元に戻ります。

2.2 署名行

最下部のロゴを押すと Astrarium の公開ページ、© AveIIsky を押すと作者のページが ブラウザで開きます。

3. 観測地を決める

観測地の選び方は三通りあります。

一覧から選ぶ

上段バーの分類と地点のプルダウンから選びます。47 都道府県、国内星見スポット（都道府県名つき、北から南の順）、世界の主要都市、世界の天文台（MPC コード 付き）が登録されています。

現在地を使う

📍 を押します。位置情報の許可を求められたら「App の使用中は許可」を選んでください。取得できた緯度経度がそのまま観測地になり、最寄りの登録地点の名前が参考として表示されます。

緯度経度を直接入れる

☰ → **情報** タブ → 「観測地を手動で入力」を開き、緯度・経度・標高を入力して「この地点を使う」を押します。位置情報を使わずに任意の地点を指定できます。「現在地から取得」を押すと、入力欄に現在地の値が入ります。

観測地を変えると、時計・出没時刻・星図の見え方（地平線の位置）がすべて連動して変わります。

4. 星図の操作

4.1 全天モードと地平モード

時刻バー左端の **全天** と **地平** で切り替えます。

- **全天**：天頂を中心に空全体を丸く描きます。北が上、東が左。星座早見盤と同じ見え方です。天の川はこのモードで表示されます。
- **地平**：地平線の一部を、実際に空を見上げたときに近い形で描きます。隣のプルダウンで**北・東・南・西**のどちらを向くかを選びます。



図 3 地平モード（南を向いた状態、視野 110°）

4.2 指とマウスの操作

操作	全天モード	地平モード
一本指のドラッグ	日周回転。星空が天の北極（南半球では南極）を軸に回り、それに合わせて時刻も進みます	視野を上下左右に動かします
二本指のピンチ	拡大・縮小（指の間の点を中心に）	同じ
ダブルタップ	中心を天頂に戻します	—
天体をタップ	その天体の情報がポップアップします	同じ
マウスホイール	拡大・縮小	同じ
SHIFT+ドラッグ	視野の中心を動かします（回転させずに移動）	—

全天モードのドラッグは、星座早見盤の円盤を回す動作にあたります。回した分だけ時刻が動くので、「あと二時間でオリオン座はどこまで昇るか」を指先で確かめられます。

4.3 天体をタップしたとき

ポップアップには、名称、赤経・赤緯、方位・高度、光度が表示され、下に操作ボタンが並びます。



図 4 土星をタップしたところ。座標・光度・出没時刻と 2 つのボタン

- 🔍 **中心にして拡大**：その天体を画面中央に置いて拡大し、**追尾**を始めます。追尾中は時刻を進めても天体が中央に留まります。解除は、星図の隅に出る **解除**、または Esc キーです。追尾したまま画面を動かしても追尾は切れません。
- 🔍 **拡大**（太陽・月・惑星のみ）：別窓を開き、その天体を面積体として描きます。月なら月齢・輝面比・秤動・満月の呼称（ピンクムーン、スーパームーンなど）、木星なら四つのガリレオ衛星、土星なら環とタイタン、火星ならフォボスとダイモスの位置まで示します。窓の中は指で動かせます。




図5 「拡大」で開いた土星。環と衛星（タイタン、レア、ディオネほか）

星雲・星団を選んだときは写真と解説が、彗星・小惑星を選んだときは軌道要素と 推定光度が同じポップアップに出ます。人工衛星を選ぶと距離・高度・見かけの明るさと、「次の可視パス」ボタンが現れます。

星座絵を表示している状態で黄道 12 星座をタップすると、その星座に対応する 占星術のサインと誕生日期間が表示されます（歳差により、太陽が実際にその星座にいる 時期とは約一か月ずれることも併記されます）。



図 6 星座絵を表示した全天

5. 時刻を動かす

時刻バーの二段で操作します。

5.1 ステップと再生

ボタン	動作
-1d / -1h / -1m	1 日・1 時間・1 分戻す
+1m / +1h / +1d	1 分・1 時間・1 日進める
+朔望	朔望月（29.53 日）進める。同じ月相の日へ飛ぶときに使います
日時入力欄	年月日と時刻を直接指定します
◀ / ▶	逆再生 / 再生（もう一度押すと停止）
現在	いまの時刻に戻します
x1 ~ x6000	再生速度。x600 なら 1 秒が 10 分に相当します

キーボードが使える環境では、←→で±10 分、Shift を足して±1 日、Alt を足して±1 分、↑↓で±1 時間だけ時刻を動かせます。

5.2 経緯線

経緯線 ボタンを押すと、重ねる線を選ぶメニューが開きます。複数同時に選べます。

項目	内容
方位・高度線	地平座標の格子。方位角と高度
赤経・赤緯線	赤道座標の格子。星表と同じ座標系
黄経・黄緯線	黄道座標の格子。惑星や月はこの帯に沿って動きます
銀経・銀緯線	銀河座標の格子。天の川の帯が銀緯 0° にあたります
天の赤道	一本の大円として強調表示
銀河面	銀緯 0° の大円。天の川の帯の中心にあたります
黄道	同上。太陽の通り道
子午線	南北を結ぶ大円。天体が南中する線

線の間隔と数値ラベルの細かさは、拡大率に応じて自動で変わります。




図 7 経緯線メニュー。赤経・赤緯線と黄道を重ねたところ

6. 表示を切り替える

6.1 クイックバー（星図のすぐ下）

左端のスライダーは**等級限界**です。値を下げると暗い星が消え、都市部の実際の見え方に近づきます。上げると 6.5 等（肉眼の限界）まで表示します。

1 段目は星図の中身、2 段目は天体の種類です。

ボタン	内容
星座線	88 星座の結び線
星座名	星座の名前
星座絵	星座絵（86 星座分。等級限界の設定にかかわらず表示されます）
恒星名	固有名を持つ恒星の名前
星雲・星団	メシエ天体・カルドウェル天体
天の川	天の川。全天モードで、地平線近くまで途切れず描かれます
月光	月明かりによる空の明るさ
流星群	活動中の流星群の輻射点と予想出現数（第 7 章）
彗星	いま明るい彗星をまとめて表示（初回は軌道要素を取得します）
人工衛星	人工衛星を表示（初回は TLE を取得します）
イベント	イベントタブを開きます
情報	情報タブを開きます



図 8 クイックバーと時刻バー（1 段目＝星図の中身、2 段目＝天体、その下が時刻）

6.2 表示タブ（≡ → 表示）

クイックバーにない項目もここで設定します。

- ・ **太陽・月・惑星**：太陽・月・惑星の表示。

- **恒星**：恒星の表示。切ると星が消え、星座線だけの図にできます。
- **太陽光**：昼間の青空と薄明を再現します。
- **月光**：月明かりによる空の明るさを再現します。太陽光とは別に切り替えられます。 もとの説明（切ると常に暗夜として描かれ、昼間の星の配置を確かめられます）は太陽光に当たります。 切ると常に暗夜として描かれ、昼間の星の配置を確かめられます。
- **鏡像反転**：像が裏返る天体望遠鏡のファインダーに合わせるための反転表示。
- **光跡残し**：再生中に天体の軌跡を残します。日周運動や人工衛星の通過が線で描かれます。
- **長時間露光**：光跡を消さずに積み上げます。通常的光跡は後ろから薄れていきますが、こちらは写真の長時間露光と同じく、描いた軌跡がそのまま残ります（入れると光跡残しも同時に入ります）。
- **写野角**：カメラの矩形視野や、アイピースの円形視野を星図に重ねる枠です。「枠を追加」で作り、センサーサイズと焦点距離、または見かけ視界と倍率を入力します。枠の中心をドラッグで移動、中心をクリックで拡大、四隅をドラッグで回転できます。構図決めや、その視野に何が入るかの確認に使います。
- **等級限界**：クイックバーのスライダーと同じものです。



図 9 表示タブ

6.3 PNG 出力・PDF 出力

その時刻・その観測地の星図を画像として保存します。印刷して観測に持ち出せるよう、出力では次の処理が入ります。

- 背景は白（紙）、星と線は黒で描かれます。
- 空の明るさ（太陽光・月光）は描かれませんが、
- 天の川は**輪郭線**だけで描かれ、塗りつぶしません。
- 右下に日時と Astrarium © Avellsky のクレジットが入ります。




図 10 PNG 出力の例。天の川は輪郭線だけで描かれる

6.4 デモ再生・録画

デモ再生は、アプリの主な機能を一巡する二分半ほどのツアーです。音声は流れません。各場面の説明は星図の下に字幕として表示されます。薄明、天の川、惑星、土星の環、写野角、月、流星群、ISS の通過、Starlink、イベント一覧、言語切替、日周運動の順に 進みます。途中で画面に触れると中断し、元の表示に戻ります。

録画は星図の動きを動画として保存します（対応していない環境では、押したときに その旨が表示されます）。デモ再生中に録画を始めると、デモの終了と同時に保存されます。

7. 流星群

天体 タブ、またはクイックバーの **流星群** ボタンから使います。

7.1 一覧と詳細

天体タブのプルダウンには年間の主要な流星群が並び、**いま表示している日時の極大に 近い順**に並べ替えられています。選ぶと、その流星群の極大の夜（現地時間で午前 1 時ごろ）の空へ星図が移動し、詳細が表示されます。

項目	内容
極大	世界時（UT）と観測地の地方時の両方で表示
輻射点	赤経・赤緯と、極大時および現在の高度
対地速度	流星が大気に飛び込む速さ
個数指数 r	明るい流星の割合を表す指数。小さいほど明るい流星が多い
母天体	その流星群の元になった彗星・小惑星
予想出現数	後述のモデルによる 1 時間あたりの個数

7.2 予想出現数の考え方

表示される「個/時」は、理想的な暗い空での最大値（ZHR）ではなく、**その観測地・その日時に実際に見込まれる数**です。次の四つを掛け合わせています。

- 極大からの隔たり**：ガウス分布を仮定し、極大から離れるほど減ります。±1 日程度で散在流星なみの水準まで落ち、活動期間の外では表示しません。
- 輻射点の高度**：地平線に近いほど見える流星は減ります。地平線下なら 0 です。
- 薄明**：日の出から日没までは 0。薄明中は空の明るさに応じて減らします。
- 月明かり**：月齢と月の高度から求めた明るさの分だけ減らします。

星図の上部には、活動中の流星群を橙色の枠でまとめて表示します。枠内の流星群名を 押すと詳細が開き、**解除**を押すと表示が消えます（クイックバーの流星群ボタンも 同時に解除されます）。



図 11 ペルセウス座流星群の極大（8 月 13 日 3 時、予想 64 個/時）

8. 彗星・小惑星

天体 タブの下半分です。

- **現在明るい順を取得**：いま空にある彗星・小惑星を明るい順に並べます。
- **検索欄**：名前や符号の一部で探します。手元のデータに無い天体は、JPL に自動で問い合わせて取り込みます（要通信）。
- **すべて / 彗星 / 小惑星**：一覧の絞り込み。
- **選択中**：星図に表示する天体のリスト。ここに入れたものが星図に描かれます。
- **MPCから最新取得**：彗星の軌道要素を MPC から、小惑星を JPL から取り込みます。取得した日時が下に表示されます。

星図上の彗星をタップすると、太陽距離・地心距離・位相角・推定直径・軌道要素・公転周期・元期が表示されます。

9. 人工衛星

人工衛星 タブ、またはクイックバーの **人工衛星** ボタンです。

- 最初に **TLEをダウンロード / 更新** を押して軌道要素を取り込みます（要通信）。取得から 2 時間以内なら「最新です」と表示され、無駄な再取得を避けます。
- 星図に表示** を入れると、衛星が星図上を動きます。
- 表示するグループを選びます。

グループ	内容
宇宙ステーション	ISS（国際宇宙ステーション）と天宮
肉眼で見える衛星	明るい衛星のまとめ
科学衛星	観測・実験衛星
Starlink	Starlink 衛星群
気象衛星	気象観測衛星

- **等級限界**：初期値は 4 等。肉眼で見える範囲だけに絞られます。
- **日照中のみ**：地球の影に入っていない（＝太陽光を反射して光っている）衛星だけを 表示します。実際に見えるのはこの状態の衛星だけです。
- 衛星をタップすると、距離・高度・見かけの明るさ・軌道要素の元期からの経過日数が出ます。 **次の可視パス** を押すと、今後 5 日間の見えるパスが一覧されます。
- 再生速度が ×600 を超えると、計算が追いつかないため衛星の表示を一時停止します。



図 12 人工衛星タブ。ISS の今後の可視パス

10. イベント

イベント タブでは、日食・月食、惑星の衝・合、二至二分、流星群の極大、月と惑星の接近、恒星食などを一覧できます。

- **期間**：7 日／30 日／90 日／180 日／1 年／5 年／10 年。
- **方向**：今後／過去／前後。
- **恒星食を含める**：月が恒星を隠す現象を加えます。潜入・出現、暗縁・明縁の別と 恒星の光度まで表示します。
- **ISS・Starlinkのパスを含める**：人工衛星の可視パスを一覧に加えます。
- **日食・月食のみ**：食だけに絞ります。局地予報（その観測地での食分と時刻）付きです。
- 行をタップすると、**その日時の星図へ移動します**。何が見えるかをその場で確かめられます。
- ♻️ はイベントの再計算です。5 年・10 年の初回計算には数分かかりますが、結果は保存され、二度目からは即座に表示されます。



図 13 イベントタブ

11. 情報タブ

- **今夜の空**：日の入り・日の出、薄明の始まりと終わり、暗夜の時間帯、月の出入りと月齢、太陽と月の南中、旧暦・六曜・二十四節気、地方恒星時などをまとめた表です。
- **選択中の天体**：星図でタップした天体の位置と出没時刻が残ります。
- **観測地を手動で入力**：第 3 章のとおりです。
- **クレジット・出典**：使用している星表・暦・画像・ソフトウェアの一覧と、それぞれの出典・ライセンス・確認日です。言語切替に対応しています。



図 14 情報タブ「今夜の空」

12. 音声タブ

読み上げ機能です。UI の言語とは別に、日本語・英語を選べます。

- ・ **今夜のハイライトを読み上げ**：その夜の見どころを読み上げます。
- ・ **選択天体を読み上げ**：星図で選んだ天体の位置と出没時刻を読み上げます。
- ・ **速度・音量**：スライダーで調整します。
- ・ **読み上げ停止**：途中で止めます。

暗い観測地で画面を見ずに情報を得たいとき、あるいは望遠鏡から目を離せないときに使います。

13. こんなときは

現在地が取得できない

「設定」→「プライバシーとセキュリティ」→「位置情報サービス」で Astrarium を「App の使用中のみ許可」にしてください。許可しないまま使う場合は、情報タブの手動入力で緯度経度を指定できます。

人工衛星が表示されない

TLE を一度もダウンロードしていないか、再生速度が $\times 600$ を超えています。「日照中のみ」を入れていると、地球の影に入っている衛星は表示されません。

彗星が出てこない

「彗星」ボタンは、設定した等級より明るい彗星がないときは何も表示しません。最新の軌道要素を取り込むには通信が必要です。

流星群の出現数が表示されない

極大から ± 1 日を超えている、または活動期間の外です。日中も 0 になります。

星が少なすぎる／多すぎる

等級限界のスライダーを動かしてください。実際の空に合わせるなら、都市部は 4 等前後、郊外で 5 等台、暗い山中で 6.5 等が目安です。

イベントの一覧が出るまで遅い

5 年・10 年を選んだ初回だけ数分かかります。計算結果は保存されます。

14. 用語

用語	意味
等級	天体の明るさ。数が小さいほど明るく、1 等違うと約 2.5 倍
方位・高度	観測地から見た方角（北 0° 、東 90° ）と地平線からの角度
赤経・赤緯	天球上に固定された座標。星表の座標系
地方恒星時（LST）	いま南中している赤経。望遠鏡を向ける目安
世界時（UT）	経度 0° の時刻。日本時間から 9 時間引いた時刻
月齢	新月からの日数。0 が新月、約 14.8 が満月
輝面比	月面の光っている割合
エアマス	天頂を 1 としたときの大気の厚み。低空ほど大きく、像が悪くなります
ZHR	輻射点为天頂にあり、6.5 等まで見える理想条件での 1 時間あたりの流星数
輻射点	流星群の流星が飛び出してくるように見える一点
TLE	人工衛星の軌道要素。数日で古くなるため定期的な更新が必要です

15. クレジットと問い合わせ

Astrarium の計算とデータの出典は、アプリ内の **情報** → **クレジット・出典** に すべて記載しています。
主なものは以下のとおりです。

- 惑星暦：JPL DE421
- 恒星：Yale Bright Star Catalogue、Tycho-2
- 星雲・星団：メシエ／カルドウェル目録、写真は Wikimedia Commons（自由利用可のもののみ）
- 人工衛星：Celestrak（TLE）、SGP4/SDP4
- 彗星・小惑星：Minor Planet Center、JPL Small-Body Database
- 地球回転：IERS finals2000A

作者：Shinsuke Abe a.k.a. Avell 公開ページ：<https://avellsky.github.io/Astrarium/> 連絡先：
<https://x.com/AvellSky>

Astrarium © Avellsky